




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.298





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.298



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.298

IM. 7

1. 7. 298


De l'ont en grand Marmiz 3 - 134


402


XV


MERC. de

Mulier Affection.









Ex legato J. Equitis Antonii
Francisci de Maronis

D E
MVLIERVVM
AFFECTIONIBVS.
EARVMQVE
CVRATIONE;

LIBRI QVATVOR.

*Primus, De Communibus Mulierum passionibus disserit.
Secundus, Virginum, & Viduarum morbos tractat.
Tertius, Sterilium, & Pregnantium } accidentia ad vnguem
Quartus, Puerperarum, & Nutricum } exequitur.*

AVCTORE LVDOVICO MERCATO
Doct. Medic. Et in Vallis Soletanæ Academia
primariæ Cathedræ Professore.

Cum Indice Capitum, tum rerum omnium locupletissimo.



VENETIIS, Apud Ioannem Guerilium. M D XCVII.

De Mulierum affectionibus.

M V L L E R V M
A F F E C T I O N I B V S
E A R V M Q V E
C O R A T I O N E

L I B R O V N O R
Vini, Vini, P. Miniacensis

A V T O R E L V D O V I C O M E R C A T O
Doct. Medicæ in Vallis Solanae Academia
primariae Cathedrae Professor.

Cum Index Capituli, cum voluminis descriptione.



V E N E T I E , A n d r e a s s e n s u G u a d i n u m , M D C X C I I I

bitra
illum
clari
in p
Mer
offic
mod
bus
tia, &




PRÆSTANTISSIMO VIRO

D. SALVO SCLANO
NEAPOLITANO,

Philosopho, & Medico Excellentissimo,

Ioannes Guerilius. S. D.



L I I alia de causa, aliaq; mente duci solent, ut alicui, vel suas, vel aliorum lucubrationes inscribant, & consacrent. Ego verò, cum iam sit occasio denuo typis cudendi Ludouici Mercati Librum de Mulierum affectionibus, idq; mihi contigerit, arbitratus sum æquum esse, ac mihi bono omini futurum, si illum è nostra Officina in publicum emitterem sub tui præclarissimi nominis auspicijs. Quod sanè ut facerè, duo me in primis comonuere. Nam perspiciebã, tum inter ipsum Mercatum, & Te conuenientiam quandã intercedere: tum officij mei esse, aliquo meo munusculo Tibi, quo possem modo, meæ in Te obseruantie significationem dare: ex quibus utrisq; videtur huic meo facto, & voluntati aliqua gratia, & satis probata ratio inesse. Nam constat Ludouicum

*

2

Mer-

Mercatum, & publice artem Medicam docendo, & eam in
ēgris exercēdo magnum sibi peperisse nomen, magnamq;
laudē: cuius liber de Mulierum Affectionibus, ita probatur
a doctis, ita expetitur, vt diu nō possint illo nostrę Officinę
carere. Quem cum mea nunc cura, & editione reparem, &
instaurem; cui conuenientius illum, cui decentius, quā
Tibi potui ipse dicare? Quandoquidem Tu, dum feliciter
medicinam facis in Regno Neapolitano, apud omnes ma-
gnam consequeris gratiam, magnumq; honorē: dum au-
tem veterum de eadem scientia monumentis insignibus
interpretationes adhibes summo à Te ingenio elaboratas,
scriptisq; eas cōmendas, etiam tui nominis fama per mul-
tos populos celebris vagatur. Tu enim probatissima com-
mentaria in Aphorismos Hippocratis euulgasti: alia etiam
quę in Artem Galeni Medicinalem acri studio perpolisti,
modò excuduntur: alia præterea sunt Tibi, vt audio, in ma-
nibus. Rursus frater meus, qui Neapoli commoratur, ita est
Tuę virtuti, Tuęq; probitati addictus, vt me quoque suis
literis, quę de Te sepe multa prędicant, impulerit ad tui ho-
noris studium, & Tui nominis cultum: quem, cum longe
absim, quo quęso modo alio demonstrē, quā mea hac
præsenti Ludouici Mercati editione? Itaque hac præsertim
de causa eum Tibi nuncupo, eum Tibi muneri mitto, vt
istud ipsum nunc, quā scilicet ego celebritati nominis
tui, quā item meus frater faueamus, & bene cupiamus,
primum Tibi, deinde alijs proteſtetur. Quamobrem Te
oro, vt quo animo à me traditur, eo à Te suscipiatur, bene-
uolo nimirum, benigno, ac comi. Vale.

LVDO-

L V D O V I C V S M E R C A T V S, A D L E C T O R E M.



SAEP E mecum ipse excogitavi, candide Lector, ac veluti à longè prospexi, medicam artem non mediocrem interitum minari. Quinimò, si quis diligenti animo id intueatur instantem iam ruinam certò polliceri. Nam quis praesagium futuri mali non persentiscet, si quæ arti, & ijs, qui ei operam præstant, quotidie accidunt, cordatius pensitet, & diligenter examinet. Cum maiorem huius artis professorum partem, quæ suæ deditam magis esse, quàm bonarum literarum cultui, & ornamento evidenter constet; ita ut non paucos reperies, qui practicis quibusdam libellis, aut chymicis fictionibus contenti, quod perfectum est, & pulchrum, ac summo opere in arte necessarium, tanquam inutile, ac vanum iudicent; & viros strenuos, ac studiosos, vel contemnant, vel odio habeant, aut inutilem, & inanem eorum vitam ijs studiis deditam existiment. Iudicariq; hoc hominum genus in alijs etiam vanum, quod nec ipsi habent, nec consequi amant. Quamobrem mirum non est, mulierculis, aut remissioribus, tutius aliquando conceditam esse laborantium salutem, quàm ijs, qui se hoc vinendi genere Medicos venditant: dignum quidem imperitis, seditiosis, vel ijs, qui tantum quæstui indulgent, supplitium. Quippe hoc ultimum vitium non minus in re medica adfert periculi, quàm imperium quemvis adferre comperimus. Nam lucrò magis, quàm communi, vel privato bono inniti, hallucinari quidem, vel peritissimos cogit. Generosum enim virum, & artis huius dignum, ne olfacere quidem pecuniam, fas est: illud quidem grati laborantis munus existit, non Medici, cui satis est morbum superasse. Quid enim illi pretiosius ore, aut utilius existimas? nil profecto: nam reliqua veluti accidentia considerasse sat est. Quæ sanè omnia cum considero, me quidem totum libentissimo animo laboribus, vigilijs, ac literarum studijs dedo, ut & mihi, & alijs prodesse aliquando possim: ac docere quanti momenti magis sit in probo viro fini suæ artis, quàm quæstui inniti. Illud proculdubio pretiosum est, & utile quidem, ac gloriæ, & honoris plenum: hoc verò dedecoris, & contemptus sibi, & arti. Quam sanè rationem insequens & grauius virorum vestigia, qui huic etiam operi plurimum insudarunt (ut desit otiosis communis excusatio, qua non raro suæ ignorantie, & pigritiæ

gritiae culpam reierunt in pleraque eorum, quae arti proficua, & necessaria sunt, cum vel obscura, vel defecta, ac mutila, aut perperam distributa, dissectaq; adhuc in arte existant) ego etiam ob id communissimam illam rationalem methodum per singula auxilia, & indicationes distributam, non sine magnis laboribus, & vigilijs scribere studui. Necnon & pulsum artem, quam tantum maior Medicorum pars exhorrescit, ut inutilem arbitretur, pauca solum ex ea colligens, cetera vero ob difficultatem deferens. Pari etiam ratione febrium omnium naturam, causas, digressionem, & veram, ac uberrimam curandi rationem typo mandauimus: sicut febris malignae non contemnenda praecipua, & curationem. Quae sane omnia considerans, ac diu insequens artis arcana, compertum proculdubio habui, alteram nostrae artis partem, quam feminis propriam, & peculiarem esse existimaui, mutilam esse, & defectam, ac incultam, ita ut misere feminas ipsas mille morbis premi conspiciamus, nullo vel inutili, aut alieno prestito auxilio, quod veluti viri curentur, nulla facta, vel leui distinctione earum affectionum, quae illis sub ratione sexus succrescunt: praesertim cum Hippocra. tantum huic parti insudasse constet. Quem sane laborem, vel praevetustate, aut posterorum incuria, vel nostri negligentia, veluti mutilum iudicamus. Quo factum esse censeo, ut femineum genus valetudinarium, plerumque existat, ut nec sibi, nec viris prodesse possit. Cuius rei rationem reddens Hippocrat. lib. de morb. mulier. haec refert verba de hydrope loquens; Periculosa vero sunt, velut dictum est, & plerumque acuta & magna, & intellectu difficilia, eo quod mulieres participant morbis, & aliquando, neque ipse sciunt, quod aegrotant prius quam morbos experiantur a mensibus, & seniores factae fuerint. Tunc autem & necessitas, & tempus ipsas morborum causas docent, & quandoque non cognoscentibus ex quo morbo aegrotent, morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur recte Medicus ab aegrotante. Verentur enim narrare, etiam si sciant, & praevi peritia, & ignorantia turpe sibi id esse putant. Sed & Medici simul peccant non exacte causam morbi percontantes, sed velut viriles morbos sanantes, & multas novitiam ab huiusmodi affectionibus correptas. Quare statim causam exacte interrogare oportet: multum enim differt muliebrium morborum, ac virilium curatio. Quae sane Hippocrat. sententia me compulit, in viridi senectute mea, huic artis parti nonnihil etiam insudare, & Hippocra. praecleara praecipua lucidiora reddere, distinctiusq; ea discernere, & cuique affectioni, quod ex eis proprium existit, ut par est, dicare. Quae proculdubio necessitas me plurimum coegit, ut susceperem eius rei descriptionem, quam non solum meum, verum, & multorum ingenium superare existimo. Ceterum, ut posteris principium ad perfectionem huius partis subit: satius esse iudicavi, aliquid in hac re utile scribere, dicit nomen audacis subeam, quam fugiens huiusmodi calumniam, quae multis profutura spero, celare. Qua in re feminarum affectiones in quatuor partes diuidens, quatuor subinde libros construxi: quorum primus feminei sexus morbos in genere recenset: secundus, eos omnes, qui virginibus, & viduis peculiares sunt: tertius vero quos sterilibus, & pregnantibus accidere compertimus: quartus denique & ultimus, eos nimirum, quos ipsae, quae pepererunt, aut nutrices sunt, accidere scimus. Ob quam sane tractationem hoc opus gynaecias iure optimo, ut antiqui asseuerant, appellamus: quippe gynaecias, feminarum affectiones nuncuparunt: sumpta nimirum ratione, ab antiquissima vocabuli significatione, nam

nam gynæconites, siue gynæcium locus eadum secretior, in quo solè mulieres habita-
bant, dictus erat. Vnde Panthedas Spartanus cùm in Asia obiret legationem,
ostentantibus quibusdam murum valde munitum, latum, ac sublimem: fertur di-
xisse. Per Deos, ò hospites, pulchra gynæconites, idest, domus mulierum. Apud
Iurisperitos etiã gynæcium capitur pro secretiore loco, in quo opera textoria, &
ista muliebria conficiuntur: & gynætiari pro ijs, qui ea muliebria opera conficiunt.
Sed & gynæconitis mentionem quoque fecit Procopius in bello Vandalico lib. 3.
vbi satis declarat, locum esse secretiorem famine solùm dicatum. Sic & Vitruuius
idem fateri videtur. Ex quo sanè, iuxta optimam rationem viri docti non pauci,
librum eum, qui feminarum continet affectiones, gynæcias appellarunt. Quem si ex
toto euolueris, equòq; animo, legeris, quantum utilitatis sis extrahatur, tu ipse vi-
deris. Vale, & lege, & magno hoc labore bonis auidis frui.

De mulieribus in genere. cap. 1.	De mulieribus in genere. cap. 1.
De mulieribus in genere. cap. 2.	De mulieribus in genere. cap. 2.
De mulieribus in genere. cap. 3.	De mulieribus in genere. cap. 3.
De mulieribus in genere. cap. 4.	De mulieribus in genere. cap. 4.
De mulieribus in genere. cap. 5.	De mulieribus in genere. cap. 5.
De mulieribus in genere. cap. 6.	De mulieribus in genere. cap. 6.
De mulieribus in genere. cap. 7.	De mulieribus in genere. cap. 7.
De mulieribus in genere. cap. 8.	De mulieribus in genere. cap. 8.
De mulieribus in genere. cap. 9.	De mulieribus in genere. cap. 9.
De mulieribus in genere. cap. 10.	De mulieribus in genere. cap. 10.
De mulieribus in genere. cap. 11.	De mulieribus in genere. cap. 11.
De mulieribus in genere. cap. 12.	De mulieribus in genere. cap. 12.
De mulieribus in genere. cap. 13.	De mulieribus in genere. cap. 13.
De mulieribus in genere. cap. 14.	De mulieribus in genere. cap. 14.
De mulieribus in genere. cap. 15.	De mulieribus in genere. cap. 15.
De mulieribus in genere. cap. 16.	De mulieribus in genere. cap. 16.
De mulieribus in genere. cap. 17.	De mulieribus in genere. cap. 17.
De mulieribus in genere. cap. 18.	De mulieribus in genere. cap. 18.
De mulieribus in genere. cap. 19.	De mulieribus in genere. cap. 19.
De mulieribus in genere. cap. 20.	De mulieribus in genere. cap. 20.
De mulieribus in genere. cap. 21.	De mulieribus in genere. cap. 21.
De mulieribus in genere. cap. 22.	De mulieribus in genere. cap. 22.
De mulieribus in genere. cap. 23.	De mulieribus in genere. cap. 23.
De mulieribus in genere. cap. 24.	De mulieribus in genere. cap. 24.
De mulieribus in genere. cap. 25.	De mulieribus in genere. cap. 25.
De mulieribus in genere. cap. 26.	De mulieribus in genere. cap. 26.
De mulieribus in genere. cap. 27.	De mulieribus in genere. cap. 27.
De mulieribus in genere. cap. 28.	De mulieribus in genere. cap. 28.
De mulieribus in genere. cap. 29.	De mulieribus in genere. cap. 29.
De mulieribus in genere. cap. 30.	De mulieribus in genere. cap. 30.
De mulieribus in genere. cap. 31.	De mulieribus in genere. cap. 31.
De mulieribus in genere. cap. 32.	De mulieribus in genere. cap. 32.
De mulieribus in genere. cap. 33.	De mulieribus in genere. cap. 33.
De mulieribus in genere. cap. 34.	De mulieribus in genere. cap. 34.
De mulieribus in genere. cap. 35.	De mulieribus in genere. cap. 35.
De mulieribus in genere. cap. 36.	De mulieribus in genere. cap. 36.
De mulieribus in genere. cap. 37.	De mulieribus in genere. cap. 37.
De mulieribus in genere. cap. 38.	De mulieribus in genere. cap. 38.
De mulieribus in genere. cap. 39.	De mulieribus in genere. cap. 39.
De mulieribus in genere. cap. 40.	De mulieribus in genere. cap. 40.
De mulieribus in genere. cap. 41.	De mulieribus in genere. cap. 41.
De mulieribus in genere. cap. 42.	De mulieribus in genere. cap. 42.
De mulieribus in genere. cap. 43.	De mulieribus in genere. cap. 43.
De mulieribus in genere. cap. 44.	De mulieribus in genere. cap. 44.
De mulieribus in genere. cap. 45.	De mulieribus in genere. cap. 45.
De mulieribus in genere. cap. 46.	De mulieribus in genere. cap. 46.
De mulieribus in genere. cap. 47.	De mulieribus in genere. cap. 47.
De mulieribus in genere. cap. 48.	De mulieribus in genere. cap. 48.
De mulieribus in genere. cap. 49.	De mulieribus in genere. cap. 49.
De mulieribus in genere. cap. 50.	De mulieribus in genere. cap. 50.

T E R T I U M

S E C V N D U M

De mulieribus in genere. cap. 1.	De mulieribus in genere. cap. 1.
De mulieribus in genere. cap. 2.	De mulieribus in genere. cap. 2.
De mulieribus in genere. cap. 3.	De mulieribus in genere. cap. 3.
De mulieribus in genere. cap. 4.	De mulieribus in genere. cap. 4.
De mulieribus in genere. cap. 5.	De mulieribus in genere. cap. 5.
De mulieribus in genere. cap. 6.	De mulieribus in genere. cap. 6.
De mulieribus in genere. cap. 7.	De mulieribus in genere. cap. 7.
De mulieribus in genere. cap. 8.	De mulieribus in genere. cap. 8.
De mulieribus in genere. cap. 9.	De mulieribus in genere. cap. 9.
De mulieribus in genere. cap. 10.	De mulieribus in genere. cap. 10.
De mulieribus in genere. cap. 11.	De mulieribus in genere. cap. 11.
De mulieribus in genere. cap. 12.	De mulieribus in genere. cap. 12.
De mulieribus in genere. cap. 13.	De mulieribus in genere. cap. 13.
De mulieribus in genere. cap. 14.	De mulieribus in genere. cap. 14.
De mulieribus in genere. cap. 15.	De mulieribus in genere. cap. 15.
De mulieribus in genere. cap. 16.	De mulieribus in genere. cap. 16.
De mulieribus in genere. cap. 17.	De mulieribus in genere. cap. 17.
De mulieribus in genere. cap. 18.	De mulieribus in genere. cap. 18.
De mulieribus in genere. cap. 19.	De mulieribus in genere. cap. 19.
De mulieribus in genere. cap. 20.	De mulieribus in genere. cap. 20.
De mulieribus in genere. cap. 21.	De mulieribus in genere. cap. 21.
De mulieribus in genere. cap. 22.	De mulieribus in genere. cap. 22.
De mulieribus in genere. cap. 23.	De mulieribus in genere. cap. 23.
De mulieribus in genere. cap. 24.	De mulieribus in genere. cap. 24.
De mulieribus in genere. cap. 25.	De mulieribus in genere. cap. 25.
De mulieribus in genere. cap. 26.	De mulieribus in genere. cap. 26.
De mulieribus in genere. cap. 27.	De mulieribus in genere. cap. 27.
De mulieribus in genere. cap. 28.	De mulieribus in genere. cap. 28.
De mulieribus in genere. cap. 29.	De mulieribus in genere. cap. 29.
De mulieribus in genere. cap. 30.	De mulieribus in genere. cap. 30.
De mulieribus in genere. cap. 31.	De mulieribus in genere. cap. 31.
De mulieribus in genere. cap. 32.	De mulieribus in genere. cap. 32.
De mulieribus in genere. cap. 33.	De mulieribus in genere. cap. 33.
De mulieribus in genere. cap. 34.	De mulieribus in genere. cap. 34.
De mulieribus in genere. cap. 35.	De mulieribus in genere. cap. 35.
De mulieribus in genere. cap. 36.	De mulieribus in genere. cap. 36.
De mulieribus in genere. cap. 37.	De mulieribus in genere. cap. 37.
De mulieribus in genere. cap. 38.	De mulieribus in genere. cap. 38.
De mulieribus in genere. cap. 39.	De mulieribus in genere. cap. 39.
De mulieribus in genere. cap. 40.	De mulieribus in genere. cap. 40.
De mulieribus in genere. cap. 41.	De mulieribus in genere. cap. 41.
De mulieribus in genere. cap. 42.	De mulieribus in genere. cap. 42.
De mulieribus in genere. cap. 43.	De mulieribus in genere. cap. 43.
De mulieribus in genere. cap. 44.	De mulieribus in genere. cap. 44.
De mulieribus in genere. cap. 45.	De mulieribus in genere. cap. 45.
De mulieribus in genere. cap. 46.	De mulieribus in genere. cap. 46.
De mulieribus in genere. cap. 47.	De mulieribus in genere. cap. 47.
De mulieribus in genere. cap. 48.	De mulieribus in genere. cap. 48.
De mulieribus in genere. cap. 49.	De mulieribus in genere. cap. 49.
De mulieribus in genere. cap. 50.	De mulieribus in genere. cap. 50.

CATALOGVS CAPITVM

LIBRORVM OMNIVM.

PRIMI.

DE sexus differentia. Cap. 1
De affectionibus vtriq; se-
xuum cōmunibus, & cuiq;
proprijs. cap. 2

De affectionibus quæ fœminis oībus
sunt cōes, ac de alijs q̄ cuiq; fœmi-
narū sorti peculiares existūt. cap. 3

De menstrua purgatione. cap. 4

De fœminis quibus menses nunquam
fluxerunt. cap. 5

De his quæ clausa habent genitalia, et
vterum. cap. 6

De menstruis per locum non natura-
lem erumpentibus. cap. 7

De menstruis superfluis. cap. 8

De menstruum suppressione. cap. 9

De menstruis diminutis, ac de men-
struorum stillicidio. cap. 10

De menstruis difficillimis, & cum gra-
uissimis accidentibus. cap. 11

De menstruis quæ debitum tēpus an-
teuertunt. cap. 12

De menstruis quæ debitum tēpus re-
morantur. cap. 13

De menstruis corruptis. cap. 14

De albis vteri purgamentis. cap. 15

De menstruum cum morbis imple-
xu, & prouidentia. cap. 16

De duris, & canerosis mammarum tu-
moribus. cap. 17

De febre alba, & de virginum obstu-
ctionibus. cap. 6

De vehementi pulsatione quæ in arte-
rijs iuxta dorsum, in plerisq; fœmi-
nis reperitur. cap. 7

De varijs ventriculi accidentibus: ex
vtero. cap. 8

De varijs, & grauissimis totius corpo-
ris, & capitis doloribus ex vtero. cap. 9

De pruritu, & furore vteri, ac de sym-
ptomate turpitudinis. cap. 10

De vteri procidentia. cap. 11

De auersione seu recurſu vteri ad va-
rias partes. cap. 12

De vteri imbecillitate. cap. 13

De varijs vteri doloribus. cap. 14

De vteri hydrope. cap. 15

De vteri inflationi. cap. 16

De vteri inflammatione. cap. 17

De scirrroso vteri tumore. cap. 18

De vteri cancro. cap. 19

De vteri vlceribus. cap. 20

De vteri rhagadijs. cap. 21

De vteri condilomate. cap. 22

De vteri, ac pudendi verrucis thymijs
& ficu. cap. 23

De scabris vteri ac pudēdi pustulis. cap. 24

De vteri fistulis. cap. 25

De vteri hæmorrhoidibus. cap. 26

De vteri calculo. cap. 27

De vteri vermibus. cap. 28

TERTII.

DE vteri natura ac de morbis, qui
bus affici potest. cap. 1

De hysteriis affect. in genere. cap. 2

De vteri strangulatione. cap. 3

De virg. & vidu. melancholia. cap. 4

De varietate epilepsiæ ex vtero. cap. 5

DE sterilitate in genere. cap. 1

De fœminæ sterilitate per colla-
tionem ad virum. cap. 2

De sterilitate morbosa. cap. 3

De sterilitate quæ fit ad tēpus. cap. 4

De virorum sterilitate. cap. 5

De conceptu. cap. 6

De

I N D E X.

De monstroſo conceptu. cap. 385	7	De partu naturali, ac difficili, & laborioſo. cap.	5
De vteri mola. cap.	8	De ſecunda relictâ. cap.	4
De falſa grauidatione. cap. 404	9	De ſortu mortuo. cap.	5
De picaceo prægnantium appetitu. c.	10	De mola poſt partum in vtero relictâ. cap.	6
De prægnantium inappetentia. cap.	11	De hiſ que à partu accidunt, ac primo de enixæ providentiâ. cap. 644	7
De prægnantibus, quæ cibum euomunt. cap.	12	De torminibus à partu. cap. 646	8
De vteris dolore in prægnantib. cap.	13	De immodico ſanguinis fluxu poſt partum. cap.	9
De cordis ſaltu, ac de ſyncopi in prægnantibus. cap.	14	De diminuto ſanguinis fluxu poſt partum. cap.	10
De prægnantium tuſſi. cap.	15	De recta curandi methodo adſeruanda in hiſ affectionibus, quæ enixis ſuperueniunt. cap.	11
De aluo ſuppreſſâ, aut nimis citata in prægnantibus. cap.	16	De vteri inflammatione, & vlcerib. à partu relictis. cap.	12
De inflatis prægnantiû crurib. cap.	17	De rugis quæ poſt partum in ventre ſuperſunt. cap.	13
De ſanguinis profuſione à prægnantium vteris. cap.	18	De virginali adſtrictione à partu companda. cap.	14
De mammis prægnantium gracilibus, aut lacte turgentibus. cap.	19	De nutrice eligenda, & moderanda. cap.	15
De prægnantibus quibus aqua ab vtero prodiit. cap.	20	De lactis defectu. cap.	16
De prægnantium moderamine, & cuſtodia. cap.	21	De lactis redundantia. cap.	17
De prægnantibus morbo acuto correptis. cap.	22	De lactis vitioſi emendatione. cap.	18
		De lactis concretione. cap.	19

Q V A R T I.

De partu. Cap.	445	1
De abortu. cap.	463	2

INDEX RERVM OMNIVM

QVAE IN HOC OPERE CONTINENTVR

COPIOSISSIMVS.

- A**
ABORSVS minoris etatis, sa-
lubrior aborsu maioris etatis,
433. A
Aetas aptior ad concubitum tam in viris,
quam in feminis, 330. B
Alba vteri purgamenta, lege vteri purga-
menta.
Anastomosis, diapedesis, & diarefis differen-
tia, 37. C
Angina correptis puerperis quomodo etiam
fluente partus purgatione sanguis ex bra-
chio mitti debet, 512. C
Animaliu sexus triplex reperitur apud Ari-
stotelem, 4. C
Appetentia abolita & diminuta ad animale
facultatem perinet, at hoc vel illud appe-
tere, aut odio habere, ad facultatem natu-
ralem appetitiuam, 225. C
Appetitus viciatus quid indicet, 227. B
Appetitus deprauati causa, 408. C
Appetitus carbonum ab exusto humore pro-
uenit, 409. A
Aqua frigida nidoroso ventriculo confert,
412. A
Aqua fluens in praegnantibus quando abor-
sum ostendit, 427. C
Aqua aluminosa plurimum valet ad vteri
ulcera erodentia abluenda, 299. A
Aqua ex theriaca extracta, quando profit
doloribus vteri, 260. B
Aqua theriacalis vteri inflationibus prodest
& eius compositio vtendi modus, 270. B
Aretusam feminam in virum Aristem nomi-
ne commigrasse, & barba, ac virilitate, ac
quisita uxorem fauste duxisse, Lucius Mu-
cianus refert, 225. C
Aristolochiae longe radix accelerat partus.
403. B
Aristoteles explicatur, 439. C
Ars medica minatur ruinam, in arg. in prin.
Ars feminas curandi, mutila. ibid. C
Aversio vteri quid sit. 245. C
Aversio vteri non sit propria vteri sede de-
relieta, 246. A
Aversio vteri causa, 246. B C
Aversio vteri signa secundum omnes eius
differentias, 246. & 247. C
Aversio vteri curatio secundum omnes
differentias. 248. 249. & 250.
Aversio, seu retractio vteri si versus intesti-
na, vesicam, vel pedes fuerit, tutius est ex
brachio, quam ex talo sanguinem mittere
praecipue si menstruationis tempus non in-
stauerit. 251. A
Aversio vteri quando vomitus conueniat,
ibidem A
Auxilia frigida prope vterum maiorem men-
sium fluorem solent concitare. 42. B
Auxilia quae ad immodicum mensium fluxum
parantur. 44. C. & 45. A B
B
B Alnea ex sulphure profunt ad corrigen-
dam partis dolentis intemperiem pra-
sertim si pars dolore affecta in tumore at-
tollatur, 233. A
Barba quare feminis plerumque adnascatur,
235. B C
Barba tam feminam ob mariti absentiam, &
mensium suppressione Hippocra. refert.
ibidem.
C
C Alculos in utero fieri ibidemque non esse
solutos, ac liberos, quemadmodum in
vesica, sed tunicis vteri, aut colo adnasci,
velut callosa substantia, 315. C
Calida, aut frigida femina temperies, quibus
signis inuestigari possit, 331. C
Caliditas partium genitalium feminae, quo-
modo attemperanda, 334. A
Cancer

- Cancer duplex ulceratus, & non ulceratus,**
 & utriusque definitio, 285. B C
Canceri uteri cause, ibidem
Canceri uteri signa, 290. A B
Canceri uteri curatio, 290. C
Cancrosus mammarum tumor, 145. A
Cancrosi tumoris, & ulcerati differentia, &
descriptio, ibid. B
Cancrorum materia qualis, ibid.
Cancrosi & ulcerati tumoris curatio. 146. B
Cancrosus tumor duobus modis fit, 139. B
Cancrosi tumoris causa, 140. A
Cancrosi tumoris signa, ibid. C
Cancrosi tumoris curandi ratio, 141. B
Cancrosi tumoris curandi ratio cauta, & ua-
ria, 142. A B C
Capitis habitualis siccitas, nulla debet eua-
cuatione curari, sed solum humectantibus
& quibus, 234. A
Capitis traumatica affectio, quando uelut mor-
bis Gallicus curari desideres, & quibus,
 233. B
Capitis reumatica affectio quanto roborantia
desideret. Et paulatim uacuationem.
 ibidem
Capiti quod malū habitum contraxit fonta-
nellam in brachijs aperire prodest, ibid.
Capiti ab utero recipienti fontellæ cruri-
bis affixæ presentaneum & ultimum re-
medium existunt, ibid.
Capiti irradiationis mō dolore infestato leue
ulcus cadenti ferro illatū, tanquā fidissi-
mū experimentū medetur, maximē si pe-
rierāt eū dolere nobis cōpertū sit. 233. C
Casini uirgo in puerū cōmutata, ideoq; auru-
spicū in suā insula deserta, 245. C. 251. A
Chalybis uariæ præparationes, & utendi mo-
di, 287. 288. 289
Chalybis præparati usus oīb. obstruct. prof-
icius, & de hi plurima uariosq; modos præ-
parandi pro uarijs obstructionū generibus
reperies, 213. C. 214. & deinceps.
Chelidonie succus mammis appositus uteri
sanguinem sistit, 53. B
Clyster in uentris prægnantium dolore com-
modus, 413. C
Clyster lubricans utero gerentibus qualis,
 416. C
Conceptio quid sit, 373. A
Conceptionis tempus quale sit, ibid. B C
Conceptio ex quo sanguine fiat, 374. A
Conceptionis cause, 374. B. 375. A
Conceptus penes quid differat a fœtu. ibi. A
Conceptus signa plurima, 383. A
Concubitus uiri, quibus fœminarum morbo-
prosit, & quibus noceat, 360. A
Condiloma uteri quod genus tuberculi sit, &
quomodo differat à thymis, & in quibus
uteri partibus fiat, 303. B
Condilomatis uteri curatio, ibid. C
Consensus ratio in utero uaria, 148. B
Cordis saltus maioris mali præsignū. 414. A
Cor uirtualiter omnium membrorum naturā
obinet, 392. B
Cor nō opus fuit, ut prius uiueret q̃ cerebrum
sed simul efformantur. Et quare. 378. B
Cucurbitæ suris, aut femorib. affixæ, et scarifi-
cate, quā lo puerperis sint ex usu, 505. C
Cucurbitæ nō umbilico, sed fœmorib. sūt ponē-
dæ tēpore accessionis epilepsiæ, & si ea
ex utero sit, si menstrua defecerint, ibid.

D

Delirium post partū adueniens, 214. B
Diffimilitudo natorum ad parentes, &
monstrorum generatio quibus de causis
contingat, 393. B C
Dolentis partus distēperies corrigenda depōsi-
ta prius plenitudine & humorū copia præ-
sertim uiscosorum, & tenatiū. 233. &
qualis debeat esse alteratio, ibidem, et qui-
bis medicamentis fidei debeat, ibid.
Dolor si alicui parti sit fixus, leui partis usio-
ne ex candenti ferro, tanquam fidelissimo
experimento curatur, 233. C
Dolores uehementissimi ex leuissima uteri
affectione oboriuntur, 256. A
Doloris uteri uariæ cāe. 156. B C. 257. A B
Doloris uteri ex fluat signa. 257. C. ex gru-
 moso sang. 258. A. Ex cohibetur priuatione
 aut humoris acrimonia, aut externa cā. ib.

† † 2 Dolo-

Dolorem vteri sedantia quæ, 258. B C
 Dolentibus vteris quando sanguinis missio
 prodest ex brachio, quando ex talo, & quā
 do purgatio, 250. A
 Dolorum grauissimorum totius corporis, &
 capitis ex vtero differentia, causa signi,
 & curatio, 229. C. & deinceps
 Dolorū triplex cā, triplicē quoq; in cerebro,
 vel dolēte parte efficit affectionē, 231. A
 Dolorib. capitis qua ratione prodest ceratū ex
 thecamahaca, aut carannia, aut similibus
 temporibus appositum, 232. A

Elementa & femina vicem obtinere, et
 quando generent, 3. B C
 Epilepsia post partum adueniens, 214. B
 Epilepsia quid & quō generetur, 288. B
 Epilepsia a duplici causa semper fieri, & de
 his vide pulchra, 286. A
 Epilepsia causa, & quō differat ab apoplexia
 & paralyti, etsi ab eodem humore fiant,
 190. 191. A
 Epilepsia quō sine obstructione cerebri fiat
 ex aura, vel tenuissimis halitib. aut ex so-
 la sensus acrimonia, 191. B
 Epilepsia ex veneno qua rōne fiat, 161. C
 Epilepsia per cōsensum ab utero mille varieta-
 tib. implexa inducit accidentia, & eorum
 plures recensetur differentie, 162. AC
 Epilepsia ex vtero vtiq; fiat semper ha-
 bet habitum caput ferientem, 162. C
 Epilepsia per cōsensū ab vtero signa, 163. C
 Epilepsie ex vtero præsagium, 163. A
 Epilepsia vtero affectis feminis nō oīno cor-
 poris motus sunt prohibendi, 194. B
 Epilepsia ex vtero eadē medentur præsidia,
 quæ suapte natura nata sunt epilepsiam
 efficere, & quare hoc fiat, 194. B C
 Epilepsie ex vtero prodest aqua stillatitia. ce-
 rasorū epota, & aqua hirudinum, ibid.
 Epilepsie ex vtero accensionū aliquando pro-
 dest sanguinis missio ex talo, 195. A
 Epilepsiam seminarum curaturus, oportet ut
 peculiare & individuales earum condi-
 tiones consideret, 195. B C

Epilepsia in vtero gerente femina, quomodo
 curanda, 195. C
 Epilepsia ex vtero quæ ex menstruo sangui-
 ne redundante fit, curatio, 196. A
 Epilepsia ex vtero, quæ fit ex menstruo sangui-
 ne redundante, medicamenta expurgantia
 vsualia parum prosunt, 196. A B
 Epilepsiam producentes flatus, quæ discutiant,
 198. A B
 Epilepsius ex redundantib. mensuris, in qua
 puuita, vel crassi, ac visci humores redū-
 dant, quando alia medicamenta non pro-
 sunt, stibij vsus confert, 197. A
 Epilepsia ex utero fontanella altero, uel uiro
 que crure ad aperta, maximum præsidium
 est, 197. C
 Epilepsia affectis feminis quibus rē edijis ca-
 put debeat tutari, 198. C. 199. C
 Enaporationes ex iure pingui galli ueteris ad
 dolores vteri sedandos, quō parētur, 261. A
 Eunuchi nomen tripliciter ab antiquis dictū.
 370. AB

Explū utero gerentib. accommodatū, 419. B
 Exercitiū omnibus partib. obstructis triplex
 præstat beneficium, 212. C. 213. A
 Exercitium moderatum, & continuū ad cor-
 rigendam partis dolentis intemperie pro-
 deest, 233. A

Febrium quodam genus puerperis pecu-
 liare, 508. C
 Febris alba signa, 201. B C. 204. B
 Febris alba quare sic dicatur, cū non necessa-
 rio femine sic affecte febricitet, 202. A
 Febris alba qua rōne iūterus albus dici possit
 202. C
 Febris alba quare paratiores sint pulchriores
 femine, 201. A
 Febris alba qua ratione respirationis & pul-
 sus interceptiones efficiat, 203. C
 Febris alba, ut curetur quantūuis suppressa
 sint menstrua, prius ex brachio, quam ex
 talo mittendus est sanguis, 205. B
 Febris alba ex iecoris obstructiōe affecta cor-
 pora, quibus medicamentis, & quo ordine
 purgare

INDEX

- purgare conueniat. 205. C. & deinceps.
- Ficus vteri quomodo curetur. 307. A
- Figura deprauata vteri menstruae priuationis causa. 28. A
- Fistularum natura, & differentiae. 309. AB
- Fistulae signa tam simplicis q̄ duplicis secundū omnes eius differentias ibi. & 310. A
- Fistulis affecta corpora quibus medicamentis debeant euacuari. ibid. B
- Fistula vteri osculum spongia dilatandū, vt medicamēta debite administrentur. ibid. C
- Fistularum vteri callus quando per medicamenta acria, & quando per fractionem, aut ysthionem debeat extirpari. 311. A
- Fistulae ex morbo gallico contractae, validissima fuerunt medicamenta. 312. A
- Fluxum sanguinis a uena rupta statim compescere. 350. C
- Femellae initio praegnationis periclitantur magis, mares vero post primos menses. 415. A
- Femella quae pridie fuerat ipso nuptiarum die in virum commutata. 235. C
- Fecundi vt sint viri quatuor requiruntur. 369. C
- Feminae quae ante 14. annum vel antequam menses fluant, nubunt, vel steriles fiunt, aut debiles, & cum periculo abortus. 359. B
- Feminarum, & masculorum ratio generationis, & in quo consistat cā diuersitatis sexus de qua re variae referuntur, & repelluntur antiquorum opiniones. 380. B. 381. A
- Femina a viro tribus rationibus differt, 9. A
- Feminae sunt viris morbosiores. ibid. B
- Feminarum morbi proprii, & coes. 11. C
- Feminarum temperamentum sanguinis generationi idoneum. 14. B
- Feminae quae menses accelerent, anteuertant, 15. B
- Feminae decem vel nouem annorum grauidae 16. A
- Feminae maiori ex parte mox a purgatione mensium grauidae fiunt. 19. A
- Feminae pingues magis exangues sunt alijs 24. C
- Feminae vtero clausae uiris coire poterunt. 31. A
- Feminae pinguibus ob sanguinis defectū menses supprimuntur, 54. C
- Feminae & viris cōmunia accidere mala propter quid, & virorum propria accidentia. 7. C & 8. B. A.
- Feminae reperiuntur, in omnibus quae natura constant, 1. B
- Femineam virtutem multa habent. 1. C
- Femineam, & masculinam virtutem plures plantae habent. ibid.
- Feminae, & mas generationis animalium sunt principia, 2. A
- Femina quomodo necessaria, 4. C
- Femina quomodo a viro differat. ibid.
- Feminam viro coniungi opus est, vt generet, & quare, 5. B
- Femina quid habeat in sanitate, aut morbis commune cum viro, 6. A
- Femina quid conferat ad generationem, & qua via, 9. B
- Femina qua ratione praestet similitudinis naturae principium, ibid.
- Feminam imperfectiorem esse viro, quo modo concedit Autor. 7. C
- Femina perfectiones habet viro aequales. 7. C
- Femina finis ratione aquae perfecta est ac vir 7. C
- Fetus efformatio quid sit, & penes quid a conceptu differat, 375. A
- Fetus membranae quot sint, & earum dispositio, & usus, 377. A
- Fetus prima delineatio quot diebus perficiatur, & quomodo autorum sententiae de hac re intelligantur, 373. C. 378. B
- Fetus non ab omnibus vteri venis alimentum suscipit, 420. B
- Fetus praestantioris sanguinis partem ad se allicit, 408. A
- Fomenta humida, & inunctiones in praegnantibus fugienda, 413. C
- Fontanellae in brachijs apertae capiti quod malum habitum contraxerit prosunt. 233. B

INDEX.

- F**ontanella in cruribus aperta capiti ab utero
recipienti profunt, *ibid.*
Fontanellæ aut seton quare si diu sint aperta
virilis sterilitatem inferant, 371. B
Formationis fœtus omnia tempora, & quo
modo penes temporum differentias diuer
sas sortiatur appellationes. 376. vsque ad
379.
Formationis maior terminus est 45. dierum,
minor verò 30. dierum, et quare, 539. C
Formatina, & uegetatina seminis facultas eo
vsque durant, quousque corrumpitur, &
in fœtus membra degenerat *ibid.*
- G**alenus reprehenditur, 419. C
Generationis appetitus, & necessitas
vnde, 572. BC
Genitura prima delineatio quot diebus fiat,
377. C. 378. B
Grandulosi tumoris in venis causa, signum,
& curandi ratio, 129. ABC
Grauidationis signa plurima, 383. A
Grauidationis falsa signa, 406. B
- H**æmorrhoides vteri quan' o mori, fi
cus, aut vix formam referant, 313. B
Hæmorrhoidum vteri ratio, 312. BC. causæ
ibidem.
Hæmorrhoides vteri totum in abscondere te
meritas est, *ibid.* BC
Hæmorrhoides vteri sanguinem *ibidem* con
cretum habentes rescindere temerarium
est, sed medicamentis sunt tractandæ, &
quibus, 314. BC
Hæmorrhoides vteri inurere non conuenit et
si immodice sanguis fluat, sed alijs medi
camentis sistendus est sanguis, & quibus
ibidem.
Hæmorrhoidum vteri casole sunt rescinden
dæ quorum tota excrescentia in fungosam
carnem degenerauit, 315. B
Humoris abundantia in mensum fluore, vt
dignoscas, 40. B
Hydrops vteri generatio, & causæ. 262. BC
signa, 263. BC.
- H**ydrops vteri vomitiones medentur, 265. B
Hydrops vteri fontanellæ in cruribus aperta
profunt, 266. B
Hydrops vteri stibium preparatum prodest
ibidem.
Hysterica affectio in genere qualis, 153. B
Hystericorum affectum varietas, 154. A
Hystericorum accidentium varietatis ratio
159. B
Hystericorum accidentium in accessione pro
uidencia, 168. C
Hystericorum accidentium per causas curan
di ratio, 170. ABC
- I**maginationis vis in monstrorum genera
tione quanta debeat censerì, 393. C
Imbecillitas vteri ut pars simplex est, & qua
eas sequuntur affectiones, 350. C
Imbecillitas vteri quatenus pars instrumen
talis est, & eius signa, 251. A
Imbecillitas vteri propriè quid sit, *ibid.*
Imbecillitas vteri duæ causæ speciales, et quæ
251. C
Imbecillitatis vteri signa omnia, 251. C
Imbecillitatis vteri ex calore curatio à san
guinis missio: & auspicanda, vel ex talo uel
ex saluatella dextræ manus, 252. C
Imbecillitatis vteri ex siccitate curatio,
253. B. ex frigidityte, *ibidem*, ex humidi
tate, 254. B
Imbecillitas vteri ex humiditate non curetur
à principio pharmacis astringentibus, &
siccantibus, & quare, 254. C
Impotentes & libidinosiores homines æquita
tionem efficere, quò sit intelligendum ex
plicanturq. Hip. & Arist. loca. 370. C
Infantès quales uegetiores, 430. C
Inflammatiō vteri quid sit, 272. A
Inflammationis vteri causæ, 273. AB
Inflammationis vteri signa, *ibid.* C
Inflammationis vteri curatio somni immo
derantiam prohibet & quare, 276. B
Inflammatiō vtero quando brachiorum veng
secandæ, & quando malleolorum, & qua
re, 276. C

In-

- I**nflammationi vteri quando cucurbitulae scarificatae dorso affixae medentur, 277. A
In vteri inflammatione vomitiones consulit Auicenna, & quare, 277. B
Inflammationes vteri iam suppuratae quo modo disruptionis tempus cognoscemus, & quomodo disruptio procuranda, 280. B
Inflammationi vteri à partu relictae quomodo subueniendum, 216. AB
Inflammatiō vteri à partu relicta si in vlcus degeneret quō tractanda, 216. C. & 217
Inflationes quae puerperis eueniunt siue in pedibus siue in toto corpore quomodo curentur, 514. C
Inflatio vteri quid sit, & quas habeat causas, 266. C. 267. A & signa.
Inflationi vteri expurgantia medicamenta quando noceant, 269. A
Inflationi vteri sanguinis missio quando proficiat, ibidem.
Inflationi vteri cucurbitula scarificata prodest, 270. C
Inflationi vteri quae balnea sint proficua, 271. C
- L
- L**ac cur ultimis mensibus generetur. 440. A
Lac maternum etiam si optimum non sit praestantius censetur quam cuiusvis nutricis, 519. C
Lac primum, quod colostrum appellatur, infanti praebere non debet, quousque expurgetur, 520. A
Lac non corrumpi si ex eodem viro famina rursus concipiat, est qui asserat, 520. C
Lactis generatio quomodo fiat, & ex qua materia, & quo loco, 521. ABC
Lactis defectus refertur ad ea, quae immodice retinentur, ibid.
Lactis defectus cae, & carū signa, 522. AB
Lactis defectus, quomodo curetur, 522. C
Lactis redundantiae causae, 524. C
Lac redundans quō debeat minui, 525. A
Lac reducendus, vt oīno restringatur, 525. BC
Lactis vitiosi signa, & curatio, 526. BC
- L**ac in grumos conuertitur à frigiditate, in ca
 sei verò naturam à caliditatis efficacia,
 527. AB
Lactis concretio quō curetur, 527. C. 328
Lapis in vtero quomodo fiat, vide calculos
 in vtero,
Lapidis vteri signa, & causa, 316. AB
Lapis vteri quomodo extrahendus est, 316.
 C. 317. AB
Lienis inueteratis affectionibus uenae apertae,
 quae ad lienem nigricant maximè prosunt,
 208. C
Lieni valentiora quam hepatis conueniunt
 medicamenta, 209. B
Lieni diuretica, quare prosunt, 209. C
Lienis tumores, & obstructions discutien-
 tia & aperientia vnguenta, & emplastra,
 219. C
Lienis affectionibus non conueniunt copiosae
 sanguinis missiones, 208. C
Lumbrici quare frequenter intestinis, raro ue-
 rò in vtero, & in vima vesica generetur,
 317. C
Lumbricos quare pueri frequentius generent.
 318. A
Lumbrici quare exigui, & eis qui vocantur
 ascarides per similes in vtero generentur,
 ibidem.
Lumbricos aliquando ex intestinis in vteri m-
 migrare, ibid.
Lumbricorum vteri signa, ibid.
Lumbrici vteri non sunt interficiendi potioni-
 bus, sed vterinis clysteribus, 319.
 M
- M**agnetis lapidis vsus iam omnibus vte-
 ri auersionibus, 250. C
Malacca oris ventriculi affectio, 408. A
Mammarum magnitudo, aut paruitas unde
 veniat, 424. B
Mammarum laxitas, & mollietates fatum im-
 becillum insinuat, 424. C
Mammarum tumores qualiter distinguuntur,
 124. ABC
Mammarum fistulosus tumor qualiter signo-
 scatur, quas habeat causas & qualiter cu-
 retur,
 †† 4

- retur, 125
Mammæarum duri, & turgētis tumoris signa
causa, & curandi ratio. 127. A B C
Mammæarum scrofulæ, & duræ glandulæ, quæ
proprie dicantur, 128. B
Mammæarum cancræsus tumor qualis, quas
differentias habeat, & qualem materiam,
145. C
Mammæarum tumores duri, qui mereantur
nomen zaratanes, 138. B
Mammæarum cancræsi tumores duobus mo-
dis fiunt, 239. B (132. A B
Mammæarum scieræsus tumor qualis naturæ,
Mammæarum scirræhosi tumoris causa, ibid.
Mammæarum scirræhosi tumoris signa, & cu-
randi ratio, 133. A B
Maris, & femine speciem in lapidibus repe-
ritur, 3. B
Maris formatio integra 35. diebus, femine
verò 45. 379. C
Mares quare potius generentur quam femi-
na, aut è contra: refeluntur de hac re va-
riæ opinionæ, 379. C
Masculi, & femine generatio quo modo fiat
& sexus distinctio, 85. B
Masculorum generationi quæ uictus ratio sit,
conueniens, 582. B
Mas an femina in utero geratur quibus di-
gnoscatur, 384. B
Mas trimestris femina, quadrimestris motu
habet, 402. B
Materia quibus modis fiat inepta ad veram
similitudinem comparandam, 393. C
Melancholia virg. & vid. qualis, 179. B
Melancholiæ virg. & vid. causa, 180. A
Melancholiæ vir. & vid. signa, 181. B
Melancholiæ virg. & vid. curandi rō, 183. A
Mensium suppressio morboza ab uteri gesta-
tione qualiter distinguatur, 357. A
Mensium suppressio quæ causa, 58. A B
Mensium suppressio, quæ mala, 69. A B
Mensium suppress. curatio ex pituita 60. A B
Menses mouentia qualia, 65. B
Menses mouentia apozemata, 66. C
Menses mouentes trochisci, 68. A
Menses mouentia fomenta, & infesiones. ib.
Menses mouentes aromatatum suffusus, 69. C
Menses mouentes pesti, & infesiones. 70. B
Menses mouentes externæ inuæctiones. 72. A
Mensium suppressiois curatio melancholiæ
redundante, 72. 73. A
Mensium diminutio quid, 77. C.
Mensium diminutionis causa, 78. B
Mensium diminutionis signa, 79. B
Mensium diminutionis curatio, 80. B
Mensium difficultas quid sit, 82. C
Mensium difficultatis signa, 84. B
Mensium difficultatis curatio, 85. A
Menses debitum tempus anteuertentes qui di-
cantur, 87. C
Mensium debitum tempus anteuertentium
causa, & dignoscendi ratio, 88. B C
Mensium qui debitum tempus anteuertunt cu-
randi ratio, 89. A
Mensium remoratio qualis affectis, 91. B
Mensium qui debitum tempus remorantur
causa, & dignoscendi ratio, 92. A C
Mensium remorantium curatio, 93. A
Menses corrupti qui dicantur, 95. A B
Mensium corruptorum curandi ratio, 97. A
Mensium cum morbis amplexus, & prouidē-
tia, 117. C
Mensium corruptorum causa, & dignoscendi
ratio, 95. B C
Mensium cū morbis variis implexus, 118. A B C
Mensium cum morbis implexibus qualiter
subueniendum, 119. 120. 121
Menstrui sanguinis vitium sterilitatis esse cau-
sam, & quomodo dignoscatur, & curetur
356. B
Menstruis fluentibus cauendum est à concubi-
tū ne monstrum generetur, 397. C
Mensis octauus utero gerentibus longe dete-
rior tertio, & quartus sexto, 434. B C
Menses qui deteriores utero gerentibus, &
qui securiores, 435. C
Mensium fluor ante 12. annum propter quid
15. B
Menstrua purgatio nequit sola quantitate pec-
care, 19. C

Menstrua

INDEX.

- Menstrua purgatio propter quid singulis mē-
sibus,* 20. A
*Menstrua purgatio nō equali tempore in om-
nibus mulieribus venit, neque equalibus
diebus durat,* 20. B
*Menstruorum profusio evidens signum est fe-
minam esse viro maturam,* 24. A
*Menstruorum priuationis causæ. 25. & dein
ceps.*
*Menstrua purgatio per digitum minimum si-
nistre manus facta,* 33. A
*Menstrua purgatio in ruborem maxillarum
conuersa,* 33. A
Menstrua purgatio per oculos facta, ibid.
Menstruorum errantium curatio, 34. C
Menstruorum minima profusio quæ dicatur,
36. C
*Menstrua purgatio quo modo dicatur toto ge-
nere præter naturam,* 37. A
*Mensium fluor quam causam habeat, & con-
ceptui esse impedimentum,* 38. BC
Mensium fluoris signa, 37. C. & 38. A
*Mensium fluor per vteri cervicis venas, &
per internas fit, & quomodo dignoscatur.*
40. B
Mensium fluor quæ mala portendat, ibid.
*Mensium fluor si per eclipsim Solis, aut Lune
profluat non admittit curationem,* 40. B
Mensium fluor quando compefcendus, 40. C
*Mensium fluor ex abortu, vel partu peculia-
rem requirit curandi rationem,* ibid.
*Mensium fluori immodico cucurbita iecori,
aut spleni apposita prodest,* 41. C
*Quibus curatur auxilijs. 44. C. & 45. AB.
medicamēta possi t vter admoneri* 46. C
Quando à bile prouenit, quibus compefcatur
47. B
*Mensis fluxus immodicus quando supprimen-
dus sine consideratione ad causam,* 50. A
*Mensium suppressionum tria sunt genera cau-
sarum,* 54. C
*Metalla etiam maris, & sœmina distinctio-
nem obtinere,* 4. B
*Mercur. herba mas, facit vt mares gignatur,
sœmina verò, vt gignatur sœmina,* 482. C
- Mola quid, & ouo gallinarum subuentaneo
proportionē respondet,* 399. A
Molæ vteri plures differentia, 399. BC
Molæ vteri causæ, 400. A
Mola à quibus generentur, 401. A
Molam membranaccam quæ generent. ibid.
Molæ signa, 401. C
Molæ & conceptus differentia, ibid.
*Molæ per tres annos, & plures durare pos-
sunt,* 402. A
Molæ aliquādo animal aliquod representant.
ibidem.
Mola si grandis nimis fiat mortalis, ibid.
Molam quæ à corpore trudent, 403. BC
Mola reiecta quid agendum, 404. A
Mōstrorū generatio qualis. 385. A. 386. A
Monstrorum varia exempla, 386. C
Monstrorum quinque genera, 387. B
Monstrorum causæ, 387. C
*Monstrorum dissimilitudo ad parentes tripli-
ci genere continetur,* 393. AB
*Monstra dissident à parentum natura tribus
modis,* 394. A
*Monstrorum generationi quantum conferat
imaginatio, & quid suspicandum sit si sœ-
mina bruti alicuius formam referentē pa-
riat fetum,* 395. ABC
Mōstrofi cōceptus an sint aliqua sig. 396. B
Monstrorū generatio quō præcauēda, 396. C
*Motus deprauatus vteri triplex; suffocatio,
contorsio, & procidentia,* 240. C
*Mulier absque menstrua purgatione vt possit
concipere.* 23. C
- N
- Narcoticis auxilijs quando vtendū est
in vteri doloribus,* 262. A
*Natura in generatione quomodo progredia-
tur perficiendo per ascensum.* 404. C
Naturæ perfectiones quatuor. ibid.
*Nigri coloris virgines salaces, & lasciuæ
sunt.* 236. C
*Nymphotomia quid ab Antiquis appellatur
& quid re vera sit.* 235. A
*Nymphotomia affectas sœminas Antiqui par-
te prominente rescissa citra distinctionem
cura-*

INDEX.

- carabant, & quare non sit semper facien-*
dum, ibid.
Nymphotomiam symptoma turpitudinis mul-
ti appellabant, 235. B
Nymphaea apud Areteu cuius partis sit mor-
bis, & quis morbus, ibid.
Nymphaea quando scindi debet, ibid.
Nymphaeam, et non nymphotomiam esse quā
Antiqui rescindendā esse censebant, ibid.
Nymphaeam esse affectionem in qua feminas
in viros migrare existimāt, & quid de hoc
sentendum, ibid.
Nymphotomia quod nomen est remedij, pro
affectu ab aliquibus usurpatur, 235. A
Nutrix qualis eligenda, 519. A
Nutricis custodia quō habenda, 520. B
Nutrici menses fluere quare infanti noceat,
ibidem.

O

O besitas preter naturam sterilitatis cau-
sa est, 330. C
Obstructa corpora quare magnas purgatio-
nes perferre nequeunt, 205. C
Obstructionem efficientes humores concoqui
non possunt, & ideo in eis ad purgationē
concocto expectari non debet, ibid.
Odorata per uterum, & fatida iuxta nares
quando conueniunt, 250. B

P

Partus decimestris similatur octimestri,
421. B
Partus indagatur ex motibus infantis in ute-
ro, 447. AB
Picaceus appetitus quia sanguinis utero ge-
rentibus primis mensibus conspurcatur,
408. C
Picaceus appetitus ab halitu sanguinis men-
strui, ibid.
Picaceus appetitus in pregnante maxime pri-
mis duobus mensibus, 409.
Pituita in utero facit defluere fatū, 442. A
Plato uterum tanquam animal vorax motu
animali in omnem situs dimensionem mo-
ueri putat, 240. C
Polipodij appetit. deprauati auxiliū, 409. C
Pregnantis mulieris signa plurima, 383. A
Pregnantium alui vacuationes, quae sistendae
sunt, 417. A
Pregnantium crura inflata, quomodo subue-
niantur, 417. C
Pregnantes cur tempore pregnationis melius
curvè peius se habeant, 430. A
Pregnantes cur pallido calore afficiantur,
430. C
Pregnantium color pallidus semper propter
quid, 433. C
Pregnantes propter quid alienos appetat ci-
bos, ibid.
Pregnantes acutis morbis obnoxiae, ibid.
Pregnantibus deteriore esse morbum ex hu-
more quieto quam ex humore turgente,
436. C
Principium morbi in puerperis quando a die
partus debeat computari, & quando n. n.
505. AB
Procidencia uteri quid sit, 240. B
Prominentia uteri, per procidentiam intelli-
gitur, 240. C
Prouidentia uteri tres species, ibid.
Prouidentia uteri causae, 341. AB
Procidere aliquibus feminis uterum ex coe-
undi desiderio, aut longiore veneris absti-
nentia Aristoteles scribit, ibid.
Procidentia uteri signa, 241. C
Procidentia uteri curatio, 242. & 243. &
244.
Pruritus pudendorum in feminis quid sit, &
quas habeat causas, 236. B
Pruritus pudendorum & symptomatis, tur-
pitudinis in feminis curatio, 239. ABC
Puerperis grauiora mala ex filiarum quā ex
filiorum partu eueniunt, 505. B
Puerperij tempore quando copiosiore opor-
teat excitare uteri purgationem, 505. C
Puerperis quando venam tali scindere con-
ueniat, ibid.
Puerperis quando conueniat hemorrhoides,
aperire, & quare, ibid.
Puerperarum febres, & plures de his Hip. hi-
storia, 507.

Puer-

INDEX.

- Puerperis** quando noxiū humoris purgatio per pharmacū sit ex usu et quare, 506. A
- Puerperis** quibus ex immodica purgatione morbus suboritur, quomodo subueniendū est, 506. B
- Puerperis** purgatione, ut expedit fluente, ali quando cōuenit alia curationis genere uti prout morbus exposulauerit, 506. C
- Puerperarum** febribus sanguinis missio ex ue na tali ad plenitudinem deponendam prodest, 508. A
- Puerperis** febricitantibus vena brachij uel ie coris quando aperienda, 508. B
- Puerperis** febricitantibus purgatio per phar macum quando conueniat, ibid.
- Puerperis** est quodam februm genus peculia re ex purgamentis in utero detentis, & suppuratis. 508. C. huius febris curatio, 509.
- Puerperarum** febres ex purgamentis uteri suppuratis quomodo cognoscemus com munes iam fieri reliquis corporis humori bus, 509. C
- Puerperarum** febres expurgamentis in ute ro putrefactis, quo modo etiam ipsae ab ute ro fluentibus purgationem per alium ex poscant, 210. AB
- Puerperis** alius soluta ocysimè est cohiben da, 210. C
- Puerperis** vomitus accidunt, aut ex noxio ali quo humore, aut ex alimento, aut ex san guine, 511. C
- Puerperis** vomitus qua methodo sistendi, 512. AB
- Puerperis** angina, aut difficili respiratione la borantibus, quando & quare praemeditatio ne sanguis ex brachio mitti debeat, alicuc fluentibus menstruis, 212. C
- Puerperis** pleuritide affectis non primo sta tim accessu sanguis ex brachio mittendus, sed ex talo prius, deinde verò ex brachio, & quare, 213.
- Puerperarum** tussis quò cohibenda, 214. A
- Puerperarum** epilepsia, aut delirium, 214. B
- Puerperarum** inflationes à quibus causis fiat & quomodo curètur. siue in pedibus, siue in toto corpore eueniant, 214. C. et 215.
- Pudendi** virilis mala figura quoduplex sit, et quomodo sterilitatis sit causa, 368. AB.
- Pueri** deterius in plenilunio se habent, & gra uide magis fastidiunt, 410. C
- Pueri** quanto principijs generationis proxi miores sunt, tanto laudabiliorem substan tiam habent, 18. A
- Pul. brio**res feminae quare frequentius quam aliae incidunt in febrem ablam, obstructio nes, aut melancholiam, 201. AB
- Pulsationis** vehementis, quae in arterijs dorsi reperitur, quam causam reddat Aretius, 218. C. 219. AB
- Pulsare** est vehementer mesenterici arterias dum vehementer inflammatur maximè in melancholia hipocondriaca Fernelius cen set & quatenus verum habeat, 219. B
- Pulsatio** conspicua in ventris arterijs duplex est, 219. C
- Pulsatio**, vehemens in arterijs dorsi una è tri bus causis seditur, 220. BC. & 221. AB
- Pulsationem** vehementem arteriarum dorsi quae signa comitentur, 221. C
- Pulsationis** vehementis arterie dorsi ex uen g cāe sibi adherētis plenitudine, aut inflāma tiōe, peculiaria signa, et p̄sagia, 222. ABC
- Pulsationis** vehementis arterie dorsi ex incē sione vicinarum partiū, aut ex obstructio ne p̄sagia, 222. & 223. A
- Pulsationi** vehementi, quae ex inflammatio ne vena uel arterie dorsalis fit, sāguis mis sio ex venis cubiti confert, non semel uni uersa sed partitis vicibus facta, 223. B
- Pulsationi** dorsali quando cucurbitula dorso affixa profint, & quando, quomodo, & quibus medicamentis frigidis corpus alte rare expediat, 223. C
- Pulsationi** dorsaliraro, & lenia purgantia pharmaca conueniunt, & quae, 224. A
- Pulsationis** dorsalis ex nuda distemperie cali da curatio, 224. C
- Pulsationis** dorsalis ex alicuius visceris ob structione curatio, 225. A

PHT

I N D E X

- Purgantia** vterum, 64. ABC
Purgatio quam commoditatem pregnantibus inferat, 436. A
Purgatio per epicrasim humoribus excedentibus debetur magis quam alijs humoribus. 52. B
Pus in vtero contentum aliquando sterilitatis causa est, 360. C
Pustularum scabrarum, quę pudendis mulieribus adnascuntur ratio, 307. BC
Pustularum pudendi curatio, 308. AB
Pustulis pudendi aqua vtilissima, & eius descriptio, ibid.
Putrefactio tanto est maior, quanto substantia perfectioris nature. 18. B
- R
- R** Hagadie uteri quid sint, earum differentie, cause, signa, & curatio, 300. & deinceps,
Roborantia vterum varijs modis confecta, 255. BC
Ruge in ventris cute à partu relicte quomodo auferende, & quomodo ante partum prohibendum est ne fiant, 218.
- S
- S** Aluatella dextre manus aborsum non mouet, 413. A
Sanguis, & semen cum temperate sint nature, dum putrescunt, tam seua efficiunt accidentia, ut sunt hysterica, 158. AB
Sanguinis missio in puerperis, quibus adhuc fuit puerperij purgatio, quando fieri debebeat ex brachio, & qua premeditatione, 212. C
Sanguis in grauidis tribus è partibus prosilit. 419. C
Sanguis in grauidis quando per anostomofim fluat, 422. B
Sanguinis detractio in grauidis similem petit scopum ac etas, 439. A
Sanguis mensium qualis sit, 17. A
Sanguinis detractio in pregnantibus duplici ratione moderatur, 439. B
Sanguinis missio an inedia in grauidis vitanda, 441. B
Sanguinis narum profusiones in viris, idem
- inditium quod feminam menses 15. C
Sanguis mensium mille monstra, & accidentia generat, 17. A
Sanguis mensium in virginibus per quas venas fluat, 22. A
Sanguis mensium purior est sanguine alitioni parato saltim equalis illis, 18. A
Sanguis vna die vltra mensem detentus plus noxie acquirit quam toto mensis tempore. 19. A
Sanguis menstruus in pregnantibus per quas venas fluat, 22. A
Sanguinis fluxum immodice concitare per mensium suppressiones, periculosum. 42. C
Satyriasis persimilis affectio in feminis, & quę sit, 234. C
Satyriasis priapismi, & vterini furoris differentia, ibid.
Satyriasi vera seminas non tentari, sed aliquid ei persimile eis accidere, ibid.
Satyriasis faminarum ab Antiquioribus nymphotomia appellabatur, 235. A
Scirrhus vteri quid, & eius differentie aliquot, 281. AB
Scirrhi materiā quatuor modis fieri, 182. A
Scirrhus vteri signa, 194
Scirrhus vteri sanguinis missio ex hemorrhoidibus commodior est, quam ex alia parte, & quare, 284. C
Scirrhus vteri tumori, quę localia medicamenta conueniant, 285.
Scirrhis tumoribus nullum calfaciens, & siccans medicamentum, etiamsi leue sit, diutius est adhibendum, 286. C
Scirrhus vteri tumori chalybis vsus vtilissimus, & quomodo chalybis preparetur, & plura pulchra de hac re, 287. et deinceps
Scirrhus mammarum tumor qualis nature, 132. AB
Scirrhus mammarum tumoris signa, cause, & curandi ratio, 133. AB
Scirrhis in tumoribus qualiter emolliendum, 134. AB
Semen non magis continet formam viri quam feminę, 9. A
Semen in virginibus grauissima concitat accidentia

Accidentia, 12. C
 Seminis & sanguinis menstrui corruptio an
 fiat in eius strangulatione intra uterum,
 165. B
 Seminis generationis prohibitio, & iam cor-
 rupti euacuatio, 177. ABC
 Semen quantumvis in utero detineatur, &
 putrescat, inflammationem efficere nō po-
 test, 193. A
 Semine a viro in balneū proiecto, feminā su-
 scepio illo in balnei ingressu cōcepisse, prae-
 ter rationem & falsam censetur, 199. C
 Seminis vitium sterilitatis est causa, & quō
 cognoscatur & curetur, 257. B
 Semen est animatum anima vegetatiua, non
 in actu secundo sed in actu primo, 395. B
 Seminis virtus a parente transmissa indiget
 et ad fetus formationem matris virtute, q̄
 simul cogat, quae non tantum virtus ma-
 tris seminis est, & quae sit, 375. B C
 Semen quod in vasis spermaticis fit, penes
 quid differat a semine, quod conficitur in
 testibus, 361. B C
 Semib. quare puellae detumescat, & tēto
 cesset, statu per intestina excreto, 394. B
 Sentiens anima quo tēpore in fatu educatur
 de potentia materiae & quo tēpore anima
 rationalis introducatur, 380. A
 Senatū in ossi de articulationib. prius adhi-
 bendū q̄ emplastra consolidantia, 192. C
 Sexus differentia penes quid verē attendatur
 381. C
 Sexus distinctio probatissima ratio, & eius
 exempla, 2. A
 Sexus distinctio omnibus reb. 2. B
 Signa quibus distinguuntur accidentia prae-
 gnantium accidentibus virginum in men-
 suum suppressione, 59. C
 Similitudo in sexu vnde prodeat, 9. C
 Similitudo penes qd debeat attendi, 387. C
 Similitudinis tres modi, ibid.
 Similitudo in specie quomodo ex facultate
 formatiua seminis proficiscatur, & quō
 formatiua facultas, cum de genere natu-
 ralium sit, disponere materiam possit sibi
 subiectam ad suscipiendam sensitiuam for-
 mam, 388. A B
 Similitudo individualis natorū ad parentes a
 quib. causis proficiscatur, & q̄ sit causarū
 rō. 388. & 389. & 390. deinceps.
 Similitudinis in sexu ratio, 362. B C
 Situs vteri vitiosus sterilitatē efficit, 355. B
 Spiritus genitiuus quid sit, 361. C
 Splen nulla cā citius obstructione, aut scirrho
 afitur, quam menstruis, vel haemorrhoi-
 dibus suppressis, 208
 Splenis affect. copiosas sanguinis detractiones
 minime ferūt, vide lienis affectiones.
 Sterilitas foeminarū quid sit, & quō vterus,
 quatenus generationis instrumentū est, tri-
 plex vitiorum genus patiatur, 422. C
 Sterilitas quadruplex species, 323. A
 Sterilitatis in genere cause, 232. B C
 Sterilem aut fecundam esse foeminam, quae
 in licet experimenta, 324
 Sterilitas ad foeminam ne, aut ad virū sit refe-
 renda, quomodo probatur, 235. C 236
 Sterilitati aut fecunditati, quae vtriusq; con-
 iugis temperatura sit aptior, tēperata ne,
 an distemperata, 327. B C
 Sterilitas quō ob vitium partium genitalium vtri-
 usque coniugis proveniat, 328. C
 Sterilitas ob vitium seminis quō contingat.
 326. B
 Sterilitas etatis ratione, aut iunioris, aut se-
 nioris, 326. C
 Sterilitatis causa est obesitas nimia, aut gra-
 cilitas, 330. C
 Sterilitatis morbosae quatuor cause, 335. C
 earum signa & curationes, 339. C
 Sterilitati ex vteri morbosae frigiditye quan-
 do conueniunt suffitus, & quando euapo-
 rationes, & quando pesaria, & alia reme-
 diorum genera, 245. B
 Sterilitati morbosae ex frigiditye, humiditate
 & flatibus in utero contentis remediū ex
 perimento confirmatum, 351. A
 Sterilitas morbosae aliquando fit ob adnascen-
 tem membranam ante vteros, 352. A
 Sterilitas ad tempus, 359

I N D E X.

- Sterilitatis eius feminae, qua iam semel concepit, causa aliquando est pus in utero contentum,* 393. C
- Sterilitatis causa in aliquibus feminis est semel peperisse,* 391. A
- Sterilitatis virorum causa,* 394. A
- Sterilitas virorum, vide virorum sterilitas.*
- Stibij preparati vsus vteri hydropi prodest.* 299. B
- Strangulatio vteri quis affectus,* 191. C
- Strangulationis uteri differentia,* 191. A
- Strangulationis uteri differentia ab alijs affectibus,* 192
- Strangulationis uteri causa,* 193. A
- Strangulationis uteri, & eius causarum signa,* 199. C
- Sudores quomodo parentur pro mensis floris distractione,* 43. A
- Superfetatione differentie & cause,* 384. C
- Suppressionis mensium cause,* 58. A B
- Suppressionis mensium curatio,* 90. A B
- T
- T**emperatam viriusq; coniugis naturam fecundissimam esse, secundam quoq; immoderatam utriusq; dummodo non sit distemperantia in extremo, & uehemens, 537. C
- Temperamentum, seu calor influens uirtutes obtinet particularium temperamentorum omnium partium totius corporis.* 391. C
- Tempus triplex ad munia naturae,* 448. A
- Testium calidiorum aut frigidiorum signa,* 332. A
- Thymus uteri quid sit,* 305. C
- Thymum uteri Tarsecum uocauit Auic.* ibid.
- Thymorum uteri curatio,* 306. C
- Tussis puerperarum quo curanda.* 514. A
- Tussis an ab halitu, suppressioni alui mensis, an a capitis defluxu ueniat,* 415. B
- V
- V**acuationem debere fieri per conuenientem regionem, & cui natura immititur, quo sit intelligendum, 510. A
- Valnea in mensis fluore sunt suspecta.* 41. A
- Varietas accidentium hystericorum unde oritur.* 149. da 149
- Varietatis accidentium hystericorum in genere causa.* 159. A
- Vena humeraria in grauidis secunda.* 440. C
- Venenum cur in feminarum uteris diu recedatur.* 149. A
- Venenum triplicem corpore noxae modum infert, secundum quod per uenas, arterias, aut nervos inducit noxam.* 191. C
- Venerem excitantia auxilia, alia seminis abundantiam praestant, alia ipsum, quod iam est genitum prouocant, alia flatum generant, erectioni pudendi uirtutis idoneum.* 365. C
- Venerem excitantia quando ex pudendi uirilil ignauia proficiuntur, uaria remedia.* 365. C. 369. 367
- Vegetatiua facultas feminis quo tempore incipiat operari in formatione fetus omnino ignoratur.* 379. C
- Vene sectio, in puerperis, quibus adhuc purgatio fuit quando & qua praemeditatione ex brachio debeat fieri.* 212. C
- Ventriculus quare ex utero tot symptomatum differentias patiatur, cum causa una sit, halitus nimirum ab utero ad uentriculum transmissus.* 226. B. & 227. A
- Vermium generatio in utero.* 317. C. & uide lumbrici.
- Verrucarum uteri differentie omnes & earum descriptiones.* 305. A B
- Verrucarum uteri cause.* ibid.
- Verrucarum uteri curatio a totius corporis prouidentia debet incipere, & quo.* ibid. C
- Verruca uteri quo excidenda.* 306. A
- Verruca uteri quibus medicamentis urenda & modus ustionis candenti ferro, quo faciens.* ibid.
- Verrucarum uteri curationi pinguis & laxa pharmaca conuenire.* 307. A
- Viduae minus quam uirgines molestantur.* 13. A
- Vinum quando & quare nutriti, interdendum.* 502. C
- Vinum rubrum chalybeatum quibus mensium fluoribus prodest.* 42. B
- Virginum peculiaria accidentia.* 12. B
- Virgines propter quid obstruantur.* ibid.
- Virginalis affectio quomodo a partu comparatur.*

I N D E X.

- retur. 228. C
Virgineus morbus quare sic appelletur, & quare et dicatur febris alba. 201. A
Virginei morbi signa. 204. C
Virgineo morbo affectis quo ordine debeat mitti sanguis. 205. B
Virgineo morbo ex hepatis obstructione affectis quò aliquando præhabita purgatione expediat sanguinem ex saluatella, & aliquando ex talo mittere. 207. B
Virginei morbi cum lienis obstructione cause & signa peculiaria. 208. A B
Virginei affectus cum lienis obstructione curatio. ibid.
Virgineus morbus ex meserei obstructione obortus penes quid differat a melancholia hypochondria ex eadẽ oborta cã. 211. B
Virginei morbi ex meserei & uentriculi obstructione curatio. 211. C
Virgineo morbo chalybis preparati usus commodissimus, & quando ab eo ordiendã est curatio, & quando non. 212. B C. & 213. & deinceps.
Virgineo morbo affectis tripliciter prodest exercitium, & qua lege eo sit utendum. 212. C. 213. A
Virgines grandiores factæ difficulter concipiunt. 356. C
Virg. & uid. melancholia qualis. 176. B
Virg. & uid. melancholia causa. 180. A
Virg. & uid. melancholia signa. 181. B
Virg. & uid. melancholia curandi rō. 183
Viri quib. de cau. steriles reddantur. 393. A
Viri quatuor rebus ad fecunditatẽ indigent. 396. C
Viri quatuor de causis steriles fiunt. 386. C
 370
Viris quare sterilitatem inferat uisio uel uenarum sectio retro aures. 371. B C
Virorum sterilitas ob totius corporis intemperamentum, uel nimiam obesitatẽ. 398. C
Virorum sterilitas ob alicuius membri principis insignem noxam. 396. B
Virorum propria accidentia. 6. C
Virum esse sēmina calidiorem quò est intelli-
gendum, & qua ratione fiat. 8. A B
Virtutem actiuam & passiuam habent plantarum plures. 1. C
Vlcerum diuersitas sumitur in utero à causa ab accidentibus & à loco. 236. A
Vlcerum uteri cause secundum omnes eorũ differentias. 293. B
Vlcerum uteri & causarum eorũ signa omnia. 364. A
Vlcerũ uteri uniuersam curationẽ indicationẽ quo loco cõplexus fuit Hip. 265. C
Vlcus cuiusq; loco sit, duplicem habet ad curationem indicationem. 269. C
Vlcerũ uteri cũ distēperie curatio. 267. C
Vlcerum uteri cum humorum fluxione curatio. 167. C
Vlceri uteri cum dolore curatio. 268. A
Vlceris uteri erudentis curatio. 278. C
Vlceris uteri sordidi curatio. 268. B
Vlceris puris uteri curatio. 266. C
Vlcera uteri quę degenerauit inflammatio à partu relicta, quomodo cognoscenda, & curanda. 210. C. & 217
Vomitus conferunt auersioni uteri, quę fit uersus inferiora, & quare. 250. A
Vomitus in puerperis quibus de causis fiat, & quomodo curandi. 511. & 512
Vomitus auersioni uteri quando conueniat. 210. A
Vomitionibus prægnantium quomodo subueniendum. 312. B
Vtero gerētis mulieris pluriã signa. 483. A
Vterinus furor medius est inter affectus uteri, ut pars similis est, & ut pars instrumentaria. 233. C
Vterini furoris natura partim pertinet ad appetitum naturalem uteri lēsum, partium ad cerebrum, quod uterum in consortium trahit. ibid.
Vterinus quid sit. 234. A
Vterini furoris morbi causarum, & symptomatum consideratio. ibid.
Vterini furoris morbus intemperies est, & quę. ibid.
Vterini furoris distēperies in ea parte residet
 in

- In* qua niget coeundi appetitus, & que sit, 151. B C
 & quo appetitum excitet, 152. B
Vteri furoris ad famem caninam, & situm 153. B
 insatiabilem collatio, 154. B
Vterinum furorem committatur relictum ce- 155. B
 rebri facultatum error, 156. B
Vterinus furor ponere quid differat à fœmi- 157. A
 narum satyriasi, 159. A
Vterini furoris causæ secundum eius differen- 159. 237
 tias, 159. 237
Vterini furoris signa, 159. B
Vterini furoris curatio, 159. C. & 158
Vterus varijs modis à propria sede dimoue- 160. A
 tur, 160. A
Vteri situs & alligatio, 160. B
Vteri motus naturalis, & præter naturam qui. 160. C
Vteri gestatio à mensium suppressione, quali- 161. A
 ter signis distinguatur, 161. A
Vteri alba purgamenta que dicantur, & qua- 162. C
 lis sit affectio, 162. C
Vteri varius fluxus, 162. A
Vteri fluxionum causa, 162. B
Vteri fluxionum dignoscendi, & distinguen- 163. A
 di ratio, 163. A
Vteri fluxionum à qua parte prodeant di- 164. A B C
 gnoscendi ratio, 164. A B C
Vteri fluxionum qualis diuersitas & natura 165. A B C
Vteri fluxione presagium, 167. A
Vteri fluxionum curandi ratio, & nū à toto cor- 168. B
 pore fiat dignotio & medela, 168. B
Vteri fluxiones licet urinam mouentibus ali- 169. A
 quando inueniuntur, id tamen cautè efficien- 169. A
 dum, 169. A
Vterus q̄ habet naturam & compositionem 169. C
 & quibus morbis afficiatur, 169. C
Vteri structura, 169. A
Vteri situs, 169. C
Vteri quantitas, 169. A

T A B V L A E F I N I S.

Z Aratanes qui tumores in mammis di- 168. B
 cantur.



L V D O V I C V S M E R C A T V S.

De communibus mulierum Affectionibus.

LIBER PRIMVS.

B

De Sexus differentia.

Cap. I.



OEMINAS in omnibus natura constantibus reperi-
ri, mille modis testatum esse apud omnes Philosophos
haud difficulter quivis reperiet. Nam cum per genera-
tionem, & novam rerum propagationem cōtinuo suc-
cessu species conservationem nanciscantur: ex neces-
sitate naturæ prodit, fœminas esse in omni genere neces-
sarias ad ipsius naturæ perfectionem. Generationē ete-
nim esse actionem in substantia, à substantia, & ad sub-
stantiam asseruit Empedocles, & inficiabitur nemo.

Quamobrem habere, & efficientē, & effectiōem, & effectum, & ex quo fit, &
in quo fit necessum sanè erat. Atqui cum ea omnia idem & vnum præstare non
possit: ob id decuit naturæ perfectionem, & maiestatem omnia hæc, & diuersa,
& præstō cuius generationi esse. Actionē. n. & passionem in omnibus rebus à
seipsis vna ratione, & propter eundē finem inesse, erat impossibile, licet in ali-
quo rerum genere id reperiri ex necessitate naturæ oportebat. Quamobrē con-
venientissimum fuit in ijs, quæ generationi erant profutura aliquid esse, q̃ in
se conciperet, aut generaret, aliquid verò, q̃ in alio. Quod sanè ex rerū omniū
natura educta ratione facillè probari potest, ex cuius nimirum aptitudine ad
agendum, aut patiendum. Nā sunt inter ea, quæ natura constant, plurima, quæ
virtutem tantum passiuam habent, & omnino fœmineam naturam referūt. Ad
quorum generationem cælum virile robur tantummodo præstat. Huius con-
ditionis sunt animalia, & plantæ, q̃ citra semen generantur ex apta materia, vir-
tute cœlestiū corporum concurrente. His etiam accedunt alia, quæ in se virtu-
tē habent actiuam, & passiuam, natura sua id exposcentem: nihil. n. aliud perfe-
ctius plantæ habent, q̃ generationem, & ob id hoc naturæ beneficio fruuntur
plantæ, quæ semen habent, ne in officio deficerent. Quamobrem conuenienter
omni tēpore, comites habent virtutem actiuam, & passiuā generandi, ut etiam

A omni

omni tpe generarent: siquidē id solū erat illis vitæ munus, & ea perfectio. Item A
sunt p̄dictis pleraq; perfectiora habētia qdē virtutē actiuam, aut passiuam s̄m
sexum, mas qdē actiuam, fœmina verò passiuam. Itaq; ex patiendi, aut agēdi po
tentia euidenter constat necessū esse, sexus differentiam constituere. Verū
quia est aliquod vitæ opus nobilius in animalibus (quibus proprior est huius
sexus distinctio) q̄ generatio, cui vita principaliter dirigit: ideo omni tpe sexus
masculus fœmineo decebat coniungi, vt plantis, sed solū tpe coitus, quo v
num ex mare, & fœmina fieret (sicut in planta omni tpe fit) eò q̄ oportuit ea dis
iuncta esse, ad altiora intellectus ministeria. Verū qn̄ generationē fieri opus
est, commisceant, coeantq; necessarium existit, vt ex ambobus, seiunctis ac co
pulis, vnum tandē animal fiat. Nam generationis aīalium principia marē, ac
fœminam esse (illum, vt motus, & generationis originē; hanc verò, ut materiā
præstet) ex Arist. li. 1. de gen. anim. c. 2. & li. 2. c. 1. multis rōnibus probatum su
perest, quoniā q̄ generatur interim dum fit cā generante eget proxima, vt effe
ctum attingat; sic etenim, semen viri necessū erat aliqua parte recipi, vbi ope
ri incumberet ad qd̄ tanq̄ commodissimum locum fabrefecit natura vterum. B
Fuit proculdubio apud oēs, tū philosophos, tum astronomos, & sapientissimos
alios viros, tam euident, & probata distinctionis sexus rō; vt nulli dubiū esset,
potissimam fecunditatis rerum oīum cām, in sexus distinctione sitam esse. Li
cet Arist. li. 1. de gene. anim. c. 20. & ultimo, non semel scribat, marem ac fœmi
nam nō separari in herbis, plātis, arboribus, & virgultis: quod item astruit li. 4.
de histor. anim. c. 11. Alij tñ naturæ rerum scriptores, hisce plantis, aut alijs re
bus, quibus, maior vis est, masculi nomen ac titulum assignant: quibus verò mi
nor, fœminæ, vt patet ex Dioscor. li. 4. c. 5. & Theophrast. lib. 3. de histor. plan. ca.
10. & Plinio lib. 21. cap. 21. & Galeno lib. 9. de simplic. Sed specialius idem Pli
nius lib. 13, cap. 4. Arboribus, inquit, immo magis omnibus, quæ terrā gignit,
herbisq; etiam virunque sexum esse, diligentissimi naturæ indagatores tradūt.
Quod & ipse innuit lib. 16. cap. 33. dicens, hederæ esse duo genera, scilicet, ma
rem, & fœminam, vt reliquarum herbarum. Quod etiam ex Beato Basilio, &
Ambrosio li. Hexameron, homilia 5. euidenter constare arbitror. Sicut ex Theo
phra. lib. 1. cap. vlt. & lib. 3. c. 9. Sic Aegyptij, & sapientes astronomi vetustam C
quandam superstitionem de sexu signorum Zodiaci apertē profitentur. Nec du
bium quidem est apud prædictos viros; cum quadraginta octo imaginum cele
stium, aliæ præ se ferant nomen, & vestigiū fœminæ; aliæ verò, maris: iuxta cō
gressus eorum fecundam, aut sterilem fieri rerum omnium, quæ celi imperio
gubernantur naturam, & sortem. Nam nisi masculus masculo, aut fœmina fœmi
neo sexui adhæreat, aut fortē eundem intueatur: rerum productiones cessare, &
congressus fieri steriles, illis esse compertū reor. Verū si opposito ordine mas
fœminæ, aut fœmina maris congressum consequatur: fecunda, plenaq; esse eo tē
pore, ex influxu exorta omnia. Neque dissimili rationē viri philosophi, omniū
rerum prima principia, & elementa in mixtorum confectione, vicem quoque
maris & fœminæ gerere, tanquam firmissimum existimarunt: mixtionis omnis
ignem credentes parentem esse, & autorem: terram verò, matrem. Sic Plato in
Timæo, mundū ex his duobus elementis, veluti ex parentibus constare, euiden
ter affirmat. Est proculdubio ignis omnium actionum autor, ac vir: terra verò
veluti

- A veluti susceprix, & receptaculum, matri iure optimo assimilata, & ea nomine ex philosophorum oīum decreto gaudens. Verum, quia leuissimū corpus grauiissimo non solum non coherere sua sponte potest, sed proprio genio dissidere semper & distare conatur: hinc proculdubio periclitari rerum oīum principia necessum erat, ni esset aliquod vinculū, quo mundi parentes coherere, & adinuicem misceri possent, vt fecundi ex coniugio facti, rerū propagationes magis perficerent. Cui sanē operi prouidit natura duo alia elementa adiungere, quorū interuentu, & mundus esset solidus, vt Plato ait, & vterq; patens congressu alterius, generationi acquiesceret, vt ambobus sic iunctis, fecundū coniugium fieret. Itaq; quemadmodum vniuersa hæc elementorū sphaera, quæ ex quatuor elementis constituitur, se hēt veluti quædā materiei massa, & moles, q̄ corpus cœleste effingit, & format: ita cætera elementa si igni comparentur, habent se tanquam materia, ignis verò velut forma eorum est, & figulus, qui tanq̄ vir attemperatis oīum viribus, vberriam prolem ex terra matre, fecunda ex adhæsit viri facta, producat. Quod ex necessitate naturæ quoq; probauerit Hip. li. de Dieta, dicens. Quicquid igitur in aliud corpus ingreditur, non augetur, quicquid verò in fœminā, augetur, si ea quæ ipsi congrua sunt, contingant. Et paulò inferius subdit rationem, & modum generationis masculi, & fœminæ, referens vniuersam huius rei rationem ad calorem, & frigiditatem: nam eodem lib. paulò inferius inquit. Ex omnibus aut masculi calidiores sunt, & sicciores, fœminæ verò humidiores, ac frigidiores: propterea quod ab initio vtrique in talibus geniti sunt, & à talibus augetur. Præterea, ad eū creuit sexus diuersitatis indigentia, vt et in mixtis adhuc anima carentibus fecundissima natura quodammodo vestigium fœminæ delineauerit. Quis vsquam capere pōt, lapides esse quosdā, qui fœminarum more conceptus in alueis quibusdā, quibus intus scant, progignunt: iij; crescentes ex humiditate quadam in alueis contenta, abrupto lapide in lucem prodeunt? Fertur quidem tales fuisse repertos, in quorū sinibus lapillos quosdā inesse alios cōcretos, alios glutinoso luto p̄similes, alios verò crassioris aquæ naturā referentes. Quid quæso poterit esse aliud, q̄ inter lapides et quosdā esse fecundos, & fœminis p̄similes, q̄ in se generent: alias verò steriles. Pari quoq; rōne chemicæ artis professores publicè fatentur, metalla et parētes habere alios, præter terram, & Solis virtutem. Existimant quidem argentum viuum, Mercurium ab ipsis appellatum, auri & argenti esse progenitorē, nō solum in ijs, quæ ipsi chimica arte imaginantur fieri posse: verū natia sorte in terra ipsa ex certa quadā massa, quæ matrem & fecunditatem æmulatur. Et ea certitudine id cōpertum esse existimat, q̄ factitantes ex certis quibusdā simplicibus, materiæ, seu matri illi quid p̄simile, existimant Mercurio permixto metalla illa in aurum posse degenerare. Ij verò vtri, qui de re rustica, & plantis accuratè disputarunt, non minori conatu, multis rationibus probarunt, plātas tantò esse fecundiores, quantò aut vtriusq; sexus sunt participes, aut (si altero tantū gaudent) dum disiunctas esse contingit, & per se steriles, virilibus plantis adhærent, vt mutua fecunditate luxuriēt, & fructus pariant. Sic Theop. li. 3. de Hist. plant. c. 12. disiunctim plantarum sexus annumerat, recensens ex plātis quasdā esse masculas quasdā fœminas. Item li. 1. de cau. plantar. c. 9. quærit, cur fœminæ magis quàm masculi augeantur. Pari quoq; ratione cap. 28. eiusdem lib. refert,

A 2 in

in arborum genere fœminas longè fecundiores esse, quamquam minis calide A
quàm masculæ sint, & masculas, crispas, hirsutas, densiores, & tortuosiores esse:
sicut fœminas proceras, molliores, fecundiores, & enodes. Apud alios quoque
viros passim quiuis reperiet, ex plantis quasdam fuisse fœminas appellatas, alias
masculas, illaq; esse fecundiores, quò proprius masculis implantantur, sterilef-
que fieri, si longis interuallis distita sint. Verùm quòd in alijs plantis vterq; se-
xus cohæreat, ex ratione superius à me adducta patere satis arbitror: siquidem
constat, necessum esse aliquid obtinere, quod vtriq; sexui correspondeat, si for-
cundæ, & sui similes generatrices, erant futuræ. Animalia verò longè præstan-
tiori, & euidentiori rōne constat, sexibus esse disincta, quemadmodum passim
in omnibus conspicitur. Ea tamen diuisit Arist. lib. 4. de hist. anim. c. 11. & li. 1.
de Gen. anim. c. 1. in tria potissima genera: quorum vnum cōtinet animalia, quæ
sexus dissidio distinguuntur, in quibus mas, & fœmina seortum existunt: alterū
verò ea complectitur, quæ nullo sexu participant, qualia sunt, quæ vitam stabi-
lem degunt, aut omnino testa integuntur, & saxi, ac lapidibus fixa inhærent.
Inquit. n. Arist. lib. 1. de Gener. anim. c. 1. Quæ autem non gressilia sunt, vt testatū B
animalium genus, & quæ saxi adhærentia viuunt, quoniam natura simili plan-
tis constant, hinc vt in illis, sic in ijs mas deest, & fœmina, sed similitudine, pro-
portioneq; nomen sexus accipiunt. Quo et modo plantas quasdam vtroq; sexu
constare est intelligendum: vt optime hoc loco Arist. aduertit, aut potestate, vt
lib. 1. de Plantis. Sed ex animalibus huius sortis esse credidit Arist. lib. 4. de Hist.
anim. c. 11. anguillam, & piscium plures, quos ipse loco citato apertè refert. Vl-
timum autem genus vtroq; sexu gaudere asseuerat li. 1. de Gen. anim. c. 1. Ex an-
guium verò, inquit, quædam marem, & fœminam habent, ut sobolem eiusdem
generis procreent: præterquam q̃ hermaphroditos non paucos fuisse repertos,
constantī doctissimorū viutorum consensu reperimus. Quibus omnibus procul
dubio constat, quanti vsus naturæ fuerit, in maiori omnium rerum parte, marē
& fœminā distinxisse. Fœmineum sexum viris societate stare coniunctū, nō vnio-
ne, abundè cenfeo superius esse probatum. Nunc verò super est probare, cōmi-
sceri adinuicē necessarium esse. Quod sanè eleganti quadam rōne probat Bea-
tus Thom. p. 1. q. 92. art. 1. quo loco inquit. Necessarium fuit fœminam fieri, idq;
in adiutorium viri: nam fœmina ad generationem adiuvat. Quod vñ probare cō C
tra asserentes, fœminam fuisse necessariam ad alia opera simul cū uiro perficien-
da. Verùm fœminā solum operi generationis fuisse deditam viro, ex eo probat,
quia vir solus non sufficiebat ad generationis opus perficiendum: & consequē-
ter cū sit generationi aptus, eget adiutorio. Talis quidem erat fœmina, ergo ne-
cessaria. Ex quibus, generationis operi necessariam fuisse fœminam, probat. Nā
quæ natura constant animalia, ex semine genitali, & sanguine menstruo cōsta-
re, est necessum: hæc autem à mare fœminaq; suppeditari oportebat; in quibus
hæc principia erāt necessaria, quemadmodū in animalibus, ac præsertim in ho-
minibus; in quibus ex alterutro solum omnis ad generationem apta potentia
emanare, erat impossibile. Quamobrē necessū fuit, nō solū potētia differre, sed
& partibus corporis, quibus procul dubio mas, & fœmina dissidēt: alias quippe
partes mas forma, & situ discretas, ad generandū, alias fœmina obtinet. Ob id p-
fecto cū, & facultate, & munere quodā atq; officio mas, & fœmina dissideant,
& ad

A & ad oēm quidē officij functionem, & materia, & effectiuo principio, & ministerio opus sit: hac sanē ratione necesse est, in procreationis munere marem, ac fœminam conuenire, vt alter materiam, instrumenta, & efficaciam simul ad generationis munus idonea, alter affectiuum principium subministrat. Ideoq; ad procreationem partes aliquas esse idoneas, easq; inter se diuersas, quibus mas a fœmina differat, opus est. Nam licet (vt rectē Arist. aduertit lib. 1. de Gener. anim. cap. 2.) de toto animali mas, & fœmina dicatur: non tamen quauis sui parte potentiaque idem mas, aut fœmina est, sed certa quadam virtute, ac parte. Ob idq; separata atq; discreta cū generandi munus explere nequeant: coniungi ea oportet. Maris itaque, ac fœminæ coniunctione ad procreationem necessariū est opus. Quapropter constat (vt Arist. refert lib. 1. de Histor. anim. cap. 18.) optimē dixisse Empedoclem, nimirum, maris ac fœminæ quasi symbolum esse, totum verō à neutro perfici, nec ex utroque eadē secedere: ob id alterū alterius, coitum, ac copulam desiderare, quod materiam fœmina, mas principium motus præbeat. Sed coniugij huius efficacissimam omnium rationem affert Arist. lib. 2. de Gener. anim. cap. 4. nimirum, quod animal sensu à planta differat, neq; fieri posse, ut uel facies uel manus, uel alia quæpiam pars sit, nisi anima sensualis, insit, aut actu, aut potentia, & aut aliquatenus, aut simpliciter: & subdit. Erit. n. vt mortuus, aut pars mortui, cūque mas semen genitale proiciat potentia animatum, vt Gal. affirmat lib. de semine, sensualisq; animæ pars sit efficiens (vt ex Arist. verbis constare arbitror) fieri sanē non potest, ut ex se ipsa fœmina animal generet, sed uirum, cum quo congregiatur, desideret: cuius sanē societatem auidē concupiscat. Atqui cū adhæsu, coituque generatio procedat (quod sine maris & fœminæ coniunctione perfici nullo pacto potest) necesse proculdubio est, ab utroq; materiam quandam emitti, in qua illorum vis, & potestas contenta tertium quidpiam generet. Attulimus quidem causas omnes, cur ad procreandum mare, & fœmina sit opus, neque alterum sine altero generandi munus explere possit: quod mas, & si gignendi habeat efficaciam, locum tamen, in quo conceptus formari effingique possit, minimē habet: fœmina verō & si idonea ad conceptum continendum, & formandum loca habeat, principio tamen destituitur. quo fit, vt neuter sine altero perfectum edere fetum possit. Quibus iam euidenter constat, necessariam fuisse sexus in omnibus rebus, ac præsertim in animalibus, & potiori adhuc ratione in hominibus, distinctionem ob adductas à me rationes, & plures alias, quas breuitatis studio præmitto.

De affectionibus utriq; sexui communibus & cuiq; proprijs. Cap. II.

IN omni quidem generatione cū generans sibi simile generare ex intentione nitatur: sit multis rationibus natos parentibus esse similes. id enim est, quod generans intendit. Quod profectō illis accidere constat vno ex tribus modis: in forma nimirum, aut in specie, aut in sexu. Atqui licet generans id omne proculdubio nitatur: non tamen semper consequitur, quia plerumque in aliquo, aut pluribus ex necessarijs vel deficit, uel nequit, quod intendit. Quæ si exactē perpenderit, constabit euidenter quid in sani-

A 3 tate

tate, ac morbis cōe habeat fœmina cum viro, quid verò vnusquisque proprium A
ac peculiare, siue in ijs, q̄ s̄m naturam sunt, siue in ijs, quæ præter naturam acci-
dunt, obtineat. Sic specie simile genitum efficitur, vt ex Aristo. constat, & ex Ga-
le. li. 2. de semine, ex matre, seu ex materia: nam quod producit, leonem esse,
equum, aut hoīem ex materia fieri fatentur, seu ex matre. Quod intelligendum
esse cenſeo (vt inferiùs latiùs monstrabo, quemadmodum refert Bea. Tho. Sum-
ma contra gentes cap. 95. inquit enim; Ratio igitur determinatæ speciei cōſiſtit
in hoc, q̄ natura cōis in determinato gradu entis collocatur. Et quia in rebus
ex materia, & forma compositis, forma est quasi terminus, id autem, quod ter-
minatur per eam est materia uel materiale: oportet quòd ratio generis ſumatur
ex materiali; differentia verò specifica, ex formali: & ideo ex differentia, & ge-
nere fit unum, sicut ex materia, & forma. Et sicut una, & eadem est natura, quæ
ex materia, & forma constituit: ita differentia non addit extraneum quandā na-
turam super genus, sed est q̄dā determinatio ipsius naturæ generis. Vnde patet
quod accidit generi, & differentia, vt determinatio quædam, quam differentia
importat, ex alio principio cauſetur, q̄ natura generis: ex eò q̄ natura, quam ſi-
gnat diffinitio, est composita ex materia, & forma, sicut ex terminante, & termi-
no. Qua igit̄ rōne constat genitum esse matri ratione materiæ simile in genere, B
quod Arist. & Gal. in specie, lata ſignificatione intelligunt: siquidem species in
forma contineri, & ab ipsa terminari dictum est. At fœmina eam materiam præ-
stat, & cum quadā agente facultate, ex qua, virtute utriusque seminis fœtus for-
mari oībus esse compertum reor. Nam cū uirtus formatrix seminis fœminei
ſit designatam materiam contracta, ab illa recipit ut producat speciem ſimilem,
rōdentem tñ certis diffinitisq; affectibus, & proprietatibus eius indiuidū, un-
de decissa est. Cū enim ſit uis corporea informatrix reſidua in parentis mem-
bris, & ſui ſimilitudinem teſtibus inducat: neceſſario inducet ſimilitudinē non
ſolum actus, & formæ, in qua ſpecies conſiſtat, ſed & materiæ, & qualitātū cor-
poraliū, in quibus ſimilitudo hæc intelligitur. Similitudo uerò, quæ in for-
ma reperitur in genitis, ex utroque ſimul ſemine agente, & mouente adinuicē
alterum, proficiſcitur. Vnde ſit, ut diuerſa facta motione ſuperantis naturam, &
formam ſequatur in totū, aut in partem, iuxta victoriæ ſeminis rōnē. Qui uerò
deſiderat de ſimilitudine copioſiora audire, legat caput de monſtruoſo concep- C
tu lib. huius operis 3. Tertia uerò ſimilitudo, & quam huius cap. inſtituto con-
ducere exiſtimo, ſit in ſexu, cuius latē meminimus li. 3. cap. de cōceptu, paragra-
pho de maſculorū generatione: quæ proculdubio temperiem totius coniuncti
ſeminis ſequitur. Ob id igitur dum totum coniunctū ad calidum inclinauerit,
maſculum fieri, unanimi oīum Medicorum conſenſu conſtare arbitror, ſin mi-
nus, fœminā: qualiter autem hoc dogma ſit intelligendum cap. de maſculorum
conceptu, ſcriptum reperies. Nam in ore eſt oībus philoſophis fœminam eſſe
maſculo frigidiorem, ideoque in ſiniſtro uteri ſinu, ut ex Hip. lib. 4. Apho. 48. &
6. popu. parte 2. 44. conſtat genitam, ſicut marem in dextro: itē, eam genitalia in-
tus recluſa habere, marē uerò extra prominentia. Eſſe uerò uiros fœminis cali-
diores multis rationibus, & locis apud Gal. & Hipp. probatū inueniēs: quippe
referunt id ita factū eſſe ob fœminæ imperfectionē, quam ex frigidityte conij-
ciunt. Nā ce. tum eſt calorem eſſe omnium actionum potiſſimum instrumen-
tum,

A tum, quo fœminæ earentes imperfectiores actiones perficiunt. Referunt etiam huiusmodi imperfectionem ad officium: quippe nullo prorsus modo generationi apta fieret fœmina, nisi plurimo sanguine abundaret, qui vberem suppeditaret generationi materiam: is quidem copiosior sit, ubi tantum caloris subfit, quantum plurimo sanguini gignendo sufficiat: quod sanè fit, dum fœminam uiro frigidiorē esse contigerit: nam aliter licet plus gignant, æqualem tamen copiam dissipabunt. Atque has esse imperfectionis fœminarum rationes ferè omnes philosophi existimant. Quas porro, & si veras esse censeam, non ob id existimo fœminam esse uiro imperfectionem. Nam omnis naturalium rerum perfectio (præter formam, quæ eandem constituit speciem in utroque sexu) ex fine naturæ intento quærenda proculdubio est. Atqui cum ea beati Thom. sententia superius probatum sit fœminam uiro esse coniunctam generationis, & propagationis speciei gratia: sequitur proculdubio, prædictas rationes fœminam æquè uiro esse perfectum, potius quàm contrarium probare. Nam, & frigiditatem, & formationis membrorum diuersitatem, generationis melioris gratia tributam inficiabitur quidem nemo (præsertim habitu respectu ad finem) & ob id æquè perfectas esse iudicandas. Itaque, si nec forma, nec materia, neque perfectione finis differre, omnibus sit in confesso: constabit igitur, neque perfectione. Nam qua ratione virum si natura frigidiorē effecisset, aut genitalia introuersa, eum monstruosum, & imperfectum existimarem: eadem proculdubio, & fœminam, si calidior esset, aut alia figura efformata genitalia haberet. Itaque, si uiro accedit perfectio ex calore: fœminæ quidem, ex frigore: atque si illi quoque oportebat genitalia inesse prominentia, fœminæ quidem, intus recondita. Quibus sanè rationibus moueor, ut credam, habito respectu ad finem fœminam esse æquè perfectam uiro. Secus autem se res habet in alijs actionibus, in quibus mihi non est dubium, uiro esse aptiorem, & perfectiorem fœmina. Quod si rursus aliquis arguat fœminæ imperfectionem, eò quod ex communi omnium philosophorum consensu constet, fœminam fieri præter institutum generantis, esseque aliquid deficiens, & occasionatum: huic quidem dicemus verum esse, fieri præter intentionem agentis particularis, at fieri iuxta intentionem uniuersalis naturæ ad opus generationis ordinatam, & ob id nullam hac ratione subire imperfectionem. Præterea licet virtus, quæ est in semine prima intentione feratur ad generationem masculinam: tamen si illud, aut ex defectu materiæ, aut ex quauis alia causa euenire non possit, fertur secundario ad fœminæ generationem, tanquam ad id, quod primo intentioni est propinquum. Ob idque constat fœminam generationi perficiendæ temperamento, & instrumentis esse æquè perfectam. Ex ante dictis constare videtur mares, & fœminas conuenire forma, materia & temperamento, utriqueque sexui communibus: quamobrem necesse fuit, ut utriqueque quosdam acciderent morbos, qui sanè ex specie, ex materia, & ex temperamento illo, quo conueniunt, euidenter communes proficiuntur. Nam ex animali, potentia communes vir, & fœmina fortiuntur affectu, tam in potentijs interioribus quàm in exterioribus: in illis quidem deliramenta, amentia, stultitia, & memoria uarios defectus perpetiuntur: in his verò, & paralyses, & apoplexias, & stupores, & conuulsiones, in quouis sensuum alia penè innumera accidentia, quæ utriqueque sexui esse communia inficiabitur profecto nemo. Vitia verò materiæ utriqueque esse communia ex ipsa rei natura, & ijs, quæ accidunt euidenter constans licet

morbi non sint materia vitia, sed materiæ formæ, cum hoc tamen vitia, q̄ parti
 bus suboriuntur ex similium crassitie, tenuitate, raritate, & densitate substan-
 tiæ, necnon ex abundantia, aut defectu, vel nimia ipsarum partium mole, aut di-
 minuta, vtriq; sexui esse communia norunt profectò omnes. Simili quoq; ra-
 tione cum ex huiusmodi simplici materia instrumenta vtriq; sexui communia
 natura efformauerit: in eisdem cōmunia vitia subesse necessum quoq; erat. Sic
 actiones in vtroq; læduntur ex uitata cōformatione, magnitudine, numero,
 coniunctione, & similium partium vnione. Cōsimiles etiam vterq; sexus pa-
 titur affectus ex communi viuientium temperamento: nam licet fēminā à viro
 quodam modo differre temperie dictum sit, cum hoc tamen communi quodā
 temperamento conuenire philosophis omnibus compertum est, eò nimirum,
 q̄ vtriusq; quatenus viuētes sunt, commune est, & ob id etiam quòd omnibus
 alijs conueniant. Ex quo sanè communi dono communia quoq; vitia prodire
 compertum, & necessum est. Quamobrem vterq; varios temperamenti totius,
 & partis morbos pati rationi videtur consonum. Sic febres omnis generis am-
 bobus esse communes euidenter constare arbitror, sicut alios innumeros affe-
 ctus, quos ex naturæ vnitate, & reliquis in quibus conuenire dictum est, illis
 accidere comperimus. Verum cū mares sexu esse à fēminis distinctos dictū
 superius sit, eo ipso, quo differunt, nō dubito affectus ipsi accidere proprios, &
 peculiare. Sic in iumento, & pudendo varijs morbis vexari solent, quibus fēmi-
 nas carere cernimus. Atqui præter certum Priapismi modū, & alia vitia ex pecu-
 liari temperamento oborta, viro etiā peculiare subsunt effeminationes, coeun-
 di impotentia, sterilitas, & ad virorum munia ineptitudo. Præterquā quòd ad-
 huc in communibus morbis diuerso, & peculiari modo, ac fēminæ ipsæ, affi-
 ciuntur. Inquit. n. Hipp. lib. 6. Vulg. par. 7. loquens de fēminarū morbis. Nequa-
 quam similiter, & viri morbis corripiuntur. Pari quoq; ratione in libris ferè
 omnibus de morbis vulgaribus plures reperiuntur morborum constitutiones;
 in quibus longè diuersa accidentia viris succrescebant, ab ijs quæ fēminis acci-
 disse refert Hipp. Ex quibus constare censeo, viros sua propria, & peculiaria pa-
 ti vitia, non solum in ijs omnibus, in quibus à fēminis dissidere cognoscimus,
 sed, & in cōmunibus: nam qua ratione sua cuiq; sanitas est, sua etiam uiuēdi rō,
 eadem procul dubio peculiare morbos obtinere necessum erat; quos sanè bre-
 uitati consulens prætermitto, ne videar scribendi institutum transgredi.

Refert quidem Fabius fēminas multorum morborum esse participes: quod
 quidem censeo, antea Hipp. dixisse, qui lib. de Morbis mulierū hæc refert ver-
 ba, de hydropē loquens. Periculosa verò sunt velut dictum est, & plerunq; acu-
 ta, & magna, & intellectu difficilia, eò q̄ mulieres participant morbis, & aliquā
 neq; ipsæ sciunt quod ægrotant, priusquam morbos experiantur à mensibus,
 & seniores factæ fuerint. Tunc autem, & necessitas, & tempus ipsas morborum
 causas docent; & qñq; non cognoscentibus ex quo morbo ægrotent, morbi in-
 curabiles fiunt, antequam doceatur rectè medicus ab ægrotante ex quo morbo
 ægrotet. Verentur. n. narrare, etiam si sciant, & præ imperitia, & ignorantia tur-
 pe sibi id esse putant. Sed, & medici simul peccant non exactè causam morbi per-
 contantes, sed velut viriles morbos sanantes. Et multas noui iam ab huiusmodi
 affectionibus correptas: quare statim causam exactè interrogare oportet, multū
 enim


A enim differt muliebrum morborum, ac virilium curatio. Ex quo loco euidenter conflare arbitror, feminas, & varijs morbis, & diuersis à virorum affectionibus frequenter corripì, & ob id diuersam exposcere medendi rationem. Prodit quidem huius diuersitatis ratio ex diuerso sexu, quò sunt à natura còstitutæ: à quo sanè omnes, peculiaris, & proprij morbi còditio principiū sortitur. Idq; tribus potissimum rationibus, quibus à viro differre censemus. Prima quidem ex ortu ac principijs generationis, cum femina ex virtutis actiue debilitate, ut Beatus Th. euidenter docet, p. 1. q. 92. art. 1. ad 1. ac similiter pp aliquam materiæ ineptitudinem, vel et pp aliq transmutationem ab extrinseco, nimirum, flantibus australibus ventis, vt q. 99. art. 2. ad 2. Quod etiam ex Arist. mente lib. de animalibus refertur: inquit, n. lib. 4. de Gene. ani. c. 6. Sunt, n. feminae sua natura debiliores, frigidioreq; & sexum femineum quasi lationem naturalem, & detrimentum esse putandum. Ob id quidem necessum erat, plerunq; ex natiua sorte illis inesse peculiarem quandam apparatus, peculiaribus et morbis idoneum; q; diuerso modo à viris frequentiusq; ex innata imbecillitate corripere. Nā licet vtrunq; semen pariter habeat in se vim gignendi hominem, ut latius inferius. Deo fauente maximo, sum probaturus, quoniā in semine est solū forma hominis, eo modo, quo superius dictū est, cuius mas, & femina equaliter sunt participes: nō est tñ in semine forma feminae, potius q; maris, quoniā mas, & femina, forma non differunt, sed solo sexu: mas, n. femina calidior est, ex quo calore certum quandam perfectionis modum philosophi arguunt, & propterea mas à perfectioribus principijs debet gigni. Atqui cum, vt dictum est, perfectio hæc non possit sumi à substantiali forma: necesse est, vt sumatur ab accidenti aliquo, nempe à primis qualitibus, qbus illa vñ ad efformanda nature opera. Quāobrem dū semen calidius, concoctūq; probè est, masculum fieri contingit: dum vord frigidius, & malè elaboratum, aut feminā, aut nihil efficit. Qd Arist. dixisse comperimus lib. 4. de Gen. ani. ob idq; constat ex innato principio, & habitu feminas esse non solū viris morbosiores, verum, & peculiaria sibi habere vitia, cōadiuantibus duabus causis, quas mox referam, quarū rōne vitii aliquod signatim contrahunt. Secūda porro causa ex tēperamēto natiuo à primis principijs cōtracto, sortē nanciscit. Cui et tēperamēto peculiare accidere morbos oportet. Nā qua rōne feminas, & sanitate frui, & peculiaria, ac feminea munia obire cōperimus huius particularis tēperamenti beneficio: eadē profecto erat opus peculiaribus quoq; affectibus, eodē tēperamēto uitiatō, aut quoquo modo mutato, corripì. Tertia verd, & ultima causa proficiscitur ex diuersafiguratione partiū, quibus et, & euidentius femina à viro dissident. Quod pulchra quadā smā dixerat Arist. lib. 1. de Gener. ani. c. 2. per hæc uerba. Mas aut, & femina inter se differunt ratione, q; facultas utriusque diuersa est, sensu aut partibus quibusdam discrepant. Et subdit paulò inferius. Sed cum facultate, & munere quodam hæc distinguantur, ad omnē aut officij functionē instrumēto opus sit, instrumentaq; facultatibus partis corporis accommodantur: ad procreationē quoq; & coitum partes aliquas esse accommodatas necesse est, easq; inter se diuersas, quibus mas à femina dissidet. Nā, & si de toto animali mas, aut femina dicatur: tamen non quauis sui parte, potentiaq; idē mas, aut femina est, sed certa quadam virtute, seu potentia, & parte, sicut, & nūm cernendi, gradiēdiq; ob-

tinet.

tinet. Partes verò eiusmodi sunt fœminæ vteri, & vuluæ: maris, testes, & collis A
 in oïbus sanguine præditus. Itaque potissima causa diuersitatis sexus est, diuer-
 sa genitalium structura, & sedes. Quapp li. 1. de Hïstor. anim. cap. 19. solo vtero
 masculum à fœmina dissidere idē autor testatur. Qua etiam genitalium diuersi-
 tate non solum sexu dissidere comperimus, verum, & animalium species inter
 se diuersitas esse, ex diuerso genitalium situ, & diuersa positura, ut apertè testa-
 tus est Arist. li. 1. de Gener. animal. ca. 3. inquit enim. Testes, & uteri, aut vuluæ,
 non pari ratione in omnibus sanguine præditis animalibus sunt. Iam enim (vt
 primùm de testibus dicam) alia omnino testibus carent, ut pisces, & serpentes.
 dixerat enim lib. 5. de Hïstor. anim. cap. 5. Testes igitur neque pisces habent, ne-
 que vllū aliud genus, quod careat pedibus: & subdit eo loco. Et hac in parte
 meatusq; tm̄ geminos femini genitali perferiptos obtinent. Alia habent quidē
 testes, sed intus lumbis adhærentes, qua renes continent: cuius sanè generis cre-
 duntur esse anes. Alias itē recenset ea parte genitalium posituras, quibus, & fœ-
 minam à mare, & animatorum species dissidere cognoscimus. Neq; dissimili ra- B
 tione uterum bipartitum esse idē autor testatur lib. 3. de Hïsto. anim. ca. 1. me-
 lioris nimirum, & copiosioris generationis gratia. Refert quoque eodem lib. j.
 de Gener. cap. 2. diuersam uterum obtinere sedem, ut testes, in diuersis animato-
 rum speciebus: verum in oïbus intus reclusum esse & custodiæ fœtus, & melio-
 ris coctionis gratia: præterquam q̄ etiam fœminis testes intus reconditos con-
 cesserit natura, maribus uerò extra pendentes. Ex hac igitur genitalium uarieta-
 te in situ, ac figura, et fœminis succrescere varios affectus, ipsisq; peculiare mi-
 hi certè est compertum: itaque ex hac cā, & sexus dissidium, & affectuum pecu-
 liaritas proculdubio prodeunt. Caterum non id unica rōne fœminis accidit,
 sed varijs: nam uterus, & partes omnes genitales, quibus fœminæ sexu à mari-
 bus distinguuntur, varios possunt progignere affectus, quos uiri ne gustare
 quidem vsquam possunt. Ex quo fonte, & distemperantiæ omni gena uarieta-
 te, & uitio et eorum munerum, quæ harum partium temperamento natura exe-
 quitur: item ex excrementis, aut humoribus, quæ ex naturæ errato in his parti-
 bus supersunt, tot solēt oriri uitiorū genera, ut uix usquam aliquis uel maxima C
 diligentia numerare ea possit. Idq; dum fœminarum vterum, & verenda uelut
 partes simplices consideramus, tribus potissimum occasionibus morbos illis
 succrescere contingit: una quidē, ex distemperie, qua frequēter frigidiores, &
 calidiores, humidiores, aut sicciore extra manifestā cām, aut internā, q̄ homi-
 nibus sit cōis, sed noua quadam, & mirabili ratione cōspicimus; ac rursus dum
 sic affectæ sunt, à cōibus auxilijs, & hijs, quæ alijs huius fortis distemperamen-
 tis prodesse solent, plurimum offenduntur. Altera uerò (præter frigus, aut calo-
 rem, quem oēs ferē, aut præcipuas corporis partes ex prædicta causa persentiūt)
 ex uitio actionum naturalium, quæ fœmineis partibus insunt proficiscitur. Quæ
 quidem causa dum uterus perperam naturalia munia exequitur, mille mor-
 borum sortibus vniuersum fœminarum corpus premit: quas specialius inferius
 monstrabo. Hinc enim prodeunt muliebres fluxus, hinc uteri hydropes, hinc
 obstructions, ac totius corporis alienus à naturali color, aut insolita impotētia
 & frequenter ex hoc naturalium potentiarū uitio prodit fœminas ineptas fieri
 munis fœminarū exequendis, ut mox docebo. Vltima quidem causa, qua, &
 peculia-

A peculiare, & p̄ uarietate incognitos affectus feminas frequēter pati conspici-
mus, ea sanē est, q̄ ex defectu, aut copia excrementorum, aut humorum à vitio
facultatum naturalium factorum, principium sortitur: nam ut hæc uaria esse
possunt in propria natura iuxta distemperiei uarietatem, in uarios nata sunt
efficere affectus, etiam si excrementa, aut humores, qui supersunt nullo uitio
afficiantur. Verū cū eō miseriæ femina deuenit, ut aliquid horum corrup-
tionem aliquam, aut uitium aliud subeat (cū hoc habeat proprium id, quod
præter naturam est, ut tam sit uarium, & dissimile, ut incomprehensibile penē
sit) tot prodeunt morborum monstra, ut nullus cognoscere, aut distinguere a-
damus possit, ut cap. de hysteris affectibus sum probaturus. Secunda mor-
borum series, quos peculiarius feminas pati cognoscimus, ex eo sanē prodit,
quod uterus (præter actiones naturales, quas ut simplex pars perficit) pars sit
corporis instrumentalis, & organica, multis sanē in generationis opere officiis
dicata. Ob id quidem ex uberrimo hoc fonte, & in situ, quem mille modis mu-
tat, & in omnis figuræ conditionibus, ac partibus omnigena uitiorum sorte fe-
minas corripī comperimus. **B** A quibus porro uitij quæ symptomata prodeant,
quantumque à uirorum symptomatis dissidentia credere haud facile possis. Itē
ex uteri structura prodit menstruationis, & conceptus officio assistere: ex quo
quidem ministerio in mensua purgatione uaria uitiorum fors producitū,
atque etiam in sterilitate, aut conceptione, iūdem in conceptus formatione, re-
tentione, partu, purgatione, lacte, aut lactis defectu. Quæ omnia, & pleraque
alia feminarum natura, & fors, ex sexus proprietate peculiariter patitur. Quæ
sanē, ut præsentaneum auxilium ex nostris laboribus suscipere possint; specia-
lius, & diligentius expendere oportet.

*De affectionibus, quæ feminis omnibus sunt communes; ac de alijs, quæ cuique femi-
narum sorti peculiare existunt. Cap. III.*



C VCSQVE porro dictum est, qua lege feminarum affectus
à uirorum affectionibus natura dissident; ac dictum etiam est
quæ uitia feminarum naturæ sint propria, & peculiaria, facto
dissidio inter uirum, & feminam. Superest quidem nunc do-
cere ex eis uitij, quæ feminis propria esse diximus, quæ sint
omnibus communia, quæ uerò quibusdam propria, & pecu-
liaria, Censeo quidem semellas, ante menstruationis tempus suos pati pecu-
liares affectus, etiam si toto eo tempore, ab exortu nimirum usque ad men-
struationem maiori ex parte communes cum uiris perferre morbos constet:
omnibus tamen ab hoc tempore commune esse ex menstrualī purgatio-
nemille affectibus corripī, siue nupta, siue innupta, aut uidua sit, dum-
modò utero non gerat, elseque illis hoc malum commune, donec ætate se-
niores factæ, natura ab huiusmodi necessitudine immunis, sponte hunc san-
guinis fluorem cohibeat. Quo etiam tempore multigena humiditatis al-
bæ, aut alterius coloris uacuatione, misere uexari solent. Itaque his duo-
bus affectibus mira uarietate ludentibus feminae omnes donec plurimum con-
senescant, affici in communi assolent. Verū licet alios affectus ipsas quan-
doq;

doq; corripere conspiciamus: nihilominus tñ cum id rarum sit, censemus eos, A
 non esse ita cōes, ut possint frequenter oībus fœminarum statibus accidere. Nā
 cum menstrualis purgatio fœminis sit natura indita: sit profectò, ut vitia, q̄ in ea
 contingere possunt (q̄ plurima quidem sunt) oībus quoq; cōmunia sint. Quam
 sanè uacuationem si fœminæ alicui natura denegauerit, non minus multorum
 morborum causam existere censemus, q̄ dum improspere prorumpit: qđ mul-
 tis profectò modis fieri contingit. Namque, aut menses illis supprimuntur, aut
 immodicè profluunt, aut diminutè, aut cum accidentibus grauioribus solito,
 aut demū inordinatè, & uarijs alijs modis, quibus ex naturali uacuatione præ-
 ternaturalis sit & morbosa. Pari quoq; rōne cōis fœminarū sexus frequentissi-
 mē albis uteri purgamenti corripitur, cum uterus, aut prauè conficit sibi cō-
 missum atimentum, aut susceptat a toto corpore vitiosum, & crudum sanguinē,
 uel testes tenuius generant semen, & minus probè q̄ par est, continent. Itē men-
 ses decolores, aut uarij coloris prorumpunt, ita ut ex officio mēstruationis hæc
 etiā oīa vitia fœminis accidere conspiciamus. Et ob id necessum profectò est B
 conijcere, hæc mala omnibus esse cōmunia; quippe re uera uiduis, uirgini-
 bus, & nuptis frequentissimè hæc omnia accidere constat, ita ut nulla ætas, nul-
 lusue fœminarum status immunis ab huiusmodi uitijs, quæ ex menstrua purga-
 tione cessante uel prauè fluente prodeunt, reperiatur, nisi utero gerat. Quo etiā
 statu id aliquando accidisse constat, ut suo loco latius sumus dicturi.

Virgines uerò (id exposcente sexus, & status natura) peculiāres sibi habent
 affectus, uarios, multipliciq; naturæ, & fortis. Nā primò fœmellæ ante purgatio-
 nis tempus præsertim instante iā iā purgatione, obstructionibus, & febre alba
 corripiuntur, idq; iuxta optimam rōne: nam cum meatus illi, per quos sanguis
 prorumpere nititur, non sint ex usu, neq; à natura satis aperti, sit facillè ut redun-
 dante sanguine repleantur, obstruanturq;. Sic. n. dixit Hipp. lib. de Natura mu-
 lier. Iuenculas humidiores esse, & multo sanguine refertas. Et lib. de Gen. re-
 fert, illis esse angustas uenas: Præterquam q̄ sanguis, qui menstruationi parat,
 crassior est, & paulatim congeritur in uenis uteri: quibus angustioribus ex na-
 tura existentibus, nil mirum si protinus obstruantur. Ex qua sanè occasione, p- C
 dit uirgines decolores fieri, & febribus quibusdam lentis frequentissimè corri-
 pi. Quod si omnino defecerint, & debitum tempus transgrediantur prædictæ
 purgationes, ætate eas exposcente, euidentiores fiunt febres, & maiores obstru-
 ctiones, quæ non solum uterum ipsum obsident, uerū, & membra ipsa nutri-
 mentalia, & uiscera ferè oīa: quorū deinceps consensu, aut principaliora men-
 bra afficiunt, aut in maiora mala paulatim fœmella deducitur. Cæterum si men-
 struus ille sanguis, q̄ præternaturā retentus abundat, putredinosam aliquā qua-
 litatem acquisierit, euidentioribus, ac efficacioribus febribus deinceps misere
 correptas conspiciamus. Sicut si citra putredinē uitium aliud hmoi sanguis con-
 trahat: capitis doloribus importunis, uentriculi extorsionibus, uentris tormini-
 bus, lassitudine, & alijs plerisque morbis corripitur, obseruatione certissimum es-
 se existimo. Præterea factis iam natu grandioribus etiā si menses prorumpāt
 (dum castè ac pudicè uiuant) ex retento semine uaria, & grauiissima symptoma-
 ta accidere frequenter conspiciamus: nam plerunque uirginibus grandiori-
 bus grauiora symptomata euenire refert Hipp. libro de Natura mulie. quippe
 cum

A cum semen turgat, & uterus genituram exposcat: facile ex seminis vbertate, & excrementorum copia, quam uterus trahendi avidus undiq; allicit, in omnigenam morborum varietatem decidunt, & modis affectionum exquisitissimis corripuntur. Quæ omnia proculdubio graviora ipsis superueniunt, si fortè contingat semen ipsum corrumpi, aut alio quouis modo (vt latius proprio huic rei dicato cap. sumus dicturi) fœdari contingat. Hinc enim tot epilepsiæ monstra, hinc cibi fastidium, hinc deprauatarum rerum appetentiæ prodeunt, sicut dolores, & lassitudines, ac alia penè innumera mala, quæ pudicis virginibus, ac religiosis accidere quotidie videmus.

B Prædictæ ferè sortis sunt feminae, quæ viduæ cum sint, & viro orbatæ, castæ, & religiosè viuunt, præsertim si antea pepererint: quibus ab eisdem causis, licet non æquè efficacibus ob meatuum laxitatem ex uiri accessu, aut partu factam, eadem ferè succrescunt accidentia. Inquit enim Hippocr. lib. 1. de morbis mulierum. Fluidas autem ipsas facit purgatio illa, quæ fit à partu: quo fit, vt minus quàm virgines molestari soleant. Quas tamen maiori ex parte corripere assuescunt mœstitiæ, mœrores, melancholicæ affectiones, aut articulares affectus, & huius census alia multa, præsertim hemicranici dolores, aut uteri subuersiones, & denique hysterici appellati affectus. Nam sæpe tam graue damnum succrescit ex assueta vacuatione relicta, quantum ex ea, quam natura appetit, si cohibeatur. Et ob eam causam dictum est, viduas castas, & pudicas finitimos pati affectus ijs, qui virginibus accidunt: licet, vt dictum est, non sint ita graues. Dimitto etiam hac in parte morbos, quos cum viris communes habent, proficiscentes tamen à causis nuper dictis: quorum quidem suo loco meminero.

C Reliquæ verò feminae, quæ viro vtuntur, præter dictas affectiones, quas sæpissimè gustarunt, alias quasdam habent proprias, & peculiare: nam quædam steriles existunt, aliæ licet concipiant, frequenter abortiunt. Item aliæ etiam utero gerentes, aut sanguinem singulis mensibus fundunt, aut vomitibus infestantur creberrimis, aut cibum fastidiunt, aut alium à natura alienum appetunt, & exequuntur, aut mille alijs accidentibus oppressæ conspiciuntur. Præterea dum fœtum statuto tempore in lucem edunt, aliæ cum grauissimis symptomatis, pleræque difficulter, quædam secundam sibi retinent. Item alijs accidit, aut immodicus uteri fluxus, aut diminutus, vel tormina, & grauissimi cruciatus. Alijs verò lac superabundat, plerisque deficit. Nonnullis autem superfoetationes contingunt, & falsæ imprægnationes: quibus omnibus, & multis alijs hoc fœminarum genus passim corripitur. Quapropter horum omnium prouidentiam ediscere conuenit, ut cuique iuxta affectus, & accidentium naturam utile, & debitum auxilium dicare possimus initio sumpto à menstrua purgatione.



FOE MINARVM affectus (non solum eos, qui præter naturã sunt sed eos etiã qui naturales, & ingeni existunt) qui enarrare, & docere studuerit, hoc sibi persuasum primò habeat, rem grauissimã, & quæ paucis, ijsq; doctissimis conceditur, humeris suis imponerita vt rei difficultatem veritus, & pertimescens Hip. à dijs exordiendum esse censuerit, & iuxta optimam rationem consuluerit principio lib. de nat. mulier. Atqui si quis rem diligentius mente euoluat, quantò magis nos docet, qui sacrosanctam Christi redemptoris nostri religionem, maximo Dei opt. max. beneficio, & misericordia profiteamur, ad Deum ipsum recurrere, & supplices in sancto Domini timore eius diuinum auxilium in quauis re implorare: præsertim cum de me magnificè nihil sentiam. Ob id igitur diuina misericordia fauete, & beatissima Virgine Maria, & omnibus Sanctis gloriosa intercessione adiuantibus, rem quamq; aggrediar, etiamsi difficillima sit.

Et feminarum equidè officio constat, necessum esse (si cõceptioni, & formationi fœtus, materiam sunt præstaturæ) tantum in ipsis redundare sanguinis, quantum alendo fœtui sufficiat naturæ. Et ob id sagacissima rerum omnium magistra natura, temperamentum fœminis præstitit copioso sanguini gignèdo idoneum: denegauit autem id, quod resolutioni erat aptum, præstatura eam temperiem maribus: ita vt quod ipsi plus sanguinis generare ex propria natura, & caloris vbertate nati sunt, frequenti & maiori ipsius dispendio ex vitæ studio, & innato calore psoluerent. Quocirca fœminæ copiosiore sanguine abundant, quæ nec ex caloris vi, nec ex vitæ instituto par est generationi dispendiũ. Docebat sanè naturæ ministeriũ, fœminã esse lege hac efformatã, quippe quæ futura erat generationi fœtus sedes, & seminis receptaculum, ac materiæ fœtui efformando, alendo aptum domicilium. Quamobrem rationi consonum est, si plus quàm sibi sanguinis erat cõsectura, aliquid eius superesse, & redundare, quod nisi pellat, necessum est in mille morbos procidat. Hinc autè decretum est naturæ melioris gratia, statutis quibusdam tẽporibus, quod sanguinis superest, per uterum innoxie excernere: tum vt ei loco (ad quem tẽpore concentus præstatura est eundem sanguinem) assuescat, tum verò, vt à superfluo per commodum regionem corpus vindicare possit. Quem sanè sanguinem hac lege, & natura excretum, menstrua Medici, & Philosophi omnes nuncupare soliti sunt, principio tñ ab Hip. accepto, qui lib. 1. de mor. mul. id expressè primus omnium protulit, dicens. Sanguis menstruus exit interualli victimæ iugulata sanguini similis rubens. Cuius verbo vñs fuit etiam Arist. lib. 7. de Hist. ani. c. 1. dicens. Fœminis etiam per id tẽpus exurgunt vbera, quod fratrare dicitur, & quæ menstrua vocantur, erumpunt, quod sanguis, quasi recens occisi animalis est. Quo loco etiã fœmellas adseruare iubet, & eisdem menses albos proficere refert. Neque eadem ratione credendum est, vini paris omnibus animalibus menstrua succrescere, etiamsi id ab aliquibus insinuaturn videatur: nam ferè omnia animalia id materiæ, quod superuacuum est, aut in corporis alimentum vertunt, aut in corticem, squammam, aut pennarũ frequentiam, pillos vrinasve multas, & crassas

fas

A
 A fas commutant. Ob idq; (vt Arist. refert lib. 6. de Histor. anim. c. 20.) mulieribus inter feminas, uberior euenit huiusmodi purgatio, equabus minor, & adhuc parciore vaccis, alijs, autem ferè insensibiliter profluit; nulli quidem ut mulieri, ut idem autor refert eodem lib. 18. Scribit quoq; Gal. de menstrua purgatione, lib. de Venæ sectio. aduersus Era. hæc verba. Mulieres cunctas natura singulo mense euacuat, sanguine superfluo foras effuso. Et subdit docens quos præstet usus huiusmodi superabundans sanguis. Muliebre enim genus, vt quod domi ageret, neque vehementibus laboribus exercetur, aut sub claro Sole viueret, ac ob vtraq; hæc multitudinem humorum coarceuat, ipsam euacuationem plenitudinis tanquam remedium naturale obtinere opus habebat. Et unum istud naturæ quidē opus est, alterum uerò purgatio post partum contigens existit, licet & fætura ipsa species sit euacuationis. Nā ex sanguine uteri cōceptus nutrirī solet. Tum uerò postquā editus est fētus, generatio lactis in mammillis, vacuatio hæc quoq; est plenitudinis parua. Indiderūt enim prisce illi medici huic vacuationis generi nomen à propria substantia quidem, sed ab accidenti, nimirum, quoddam singulis mensibus eius excretionem natura moliatur, ita ut sine præter naturam, siue natura supprimatur, minimè desinat menstruus sanguis dici. Ex his proculdubio arbitror haud obscurum esse qualis sit menstruorum ratio, & natura, & quale fuerit eius purgationis principium, & naturæ decretum in eadem excitanda. Verum vt exactè perpendere possimus (cognita simul quæ secundum naturam est vacuatio) qua via, quibusve modis menstrualis fluor præter naturam fieri possit: operæpretium duxi, primum, quo tpe profluere ex naturæ lege teneatur, secundum, qualis sit eius sanguinis substantia; tertium, tempus, & rationem congestionis, & expulsionis perihodicæ; quartum uerò, & vltimum, qualis sit locus in quo aggregatur, & per quem secernitur, explicare.

B
 C
 Tempus igitur huic purgationi idoneum præfinire vnum certum, ac determinatum minimè potest: nam id profectò euariat feminarum natura, & educatio. Constat etenim quasdam esse inter feminas, quibus, & carnis mollities, & meatuum laxitas tanta inest, vt mirum non sit, ante duodecimum annū menses prorumpant. Item aliæ sunt hirsutæ, graciles, & paucò sanguine, & carne præditæ, vt et post decimum quartum, aut quintum annum menses protrahant, præsertim si viarum angustia adiungatur. Item casta, & pudica educatio, & à viro- rum consortio aliena remorari menses assolet, sicut lasciuia, & venereis imaginibus plena anteuertere. Nam id tēpus natura huic purgationi dicauit, in quo femina viri accessum, & amant, & perferre citra damnum possunt. Ob id profectò Arist. dixisse constat lib. 7. de Hist. anim. c. 1. feminis per id tempus exurgere vbera, quod fratre dicitur, & quæ menstrua vocantur erumpere. Et subdit. Sed menses tunc plurimi fiunt, cum iam vbera ad duos digitos prominent, & vox eodem tempore puellarum mutatur in grauiorem. Et paucis interpositis subdit. Fit etiam, vt per id tempus custodiri præcipuè debeant, maximè. n. ad vsum rei venereæ incitantur, cum hæc incipiunt. Deniq; prouida natura dum feminarum corpus cognoscit conceptui esse idoneū, mox menstrua pellit, signū alioqui, quo feminas viro esse aptas cognoscimus. Qua etiam ætate prodit Hip. sanguinis è naribus profusiones maribus, puellis uerò menstruorum eruptiones contingere. Cui consimilem sententiam li. 4. sermone. 4. ca. 4. Aetium retulisse

lisse constat. Qua profectò rōne (licet vt ex Paulo constat li. 3. c. 60. plerisq; pur- A
gatio mensū contingat circa decimumquartum annū, paucis citius circa deci-
mumtertium, aut duodecimū, non paucis aut tardius quatuordecim annis) con-
stat vltra id, quod frequentius euenire solet, quibusdā anno vndecimo menses
profluere: quas ob id censeo breuioris esse vitæ. Quod si autoribus fides tribue-
da sit, constat ex multorū testimonio, plures fœminas vīas fuisse vtero gestare,
dū tantum nouē, aut decē essent annorum: quibus liquet, etsi maiori ex parte
decimoquarto, aut decimoquinto anno menses prorumpant, nullū esse illis p-
finitum tēpus. Nā quibusdā atas maturius prouenit, vt q̄ vndecim, aut duode-
cim annorū spatio circumscribatur, alijs verò quindecim annorum curriculum
non sufficere certum est. Quare optimè dictum esse Hip. censeo, ætatē ab ætate
differre, & naturā à natura: qñquidē id tempus, quod vni est pueritia, alteri
adolefcentiam esse patet. Itaq; postq̄ abundantiorē sanguinem, q̄ p cuiusvis
fœminæ corpore necessum est, natura procreauerit: menstrua moueri tunc inci-
piunt. Quæ proculdubio aliqñ ex cocto perfecteq; consummato sanguine pro-
rumpunt, nonnunq̄ verò ex crudo, & subalbido, præsertim in delicatioribus B
iœ mellis, q̄ potius purgamenta vteri menses iam iam minantia, q̄ menstrua ap-
pellanda esse censeo. Cuius sanè excrementi meminit et Arist. li. 1. de Gen. ani.
c. 20. diuidens menstrua purgationē in albam, & rubram, illam quidē fœmel-
lis, hanc verò perfectis iam fœminis propriam. Nec satis certè est nosse, quo tē-
pore menses fœminis prorumpant, nisi nouerimus exactè qua ætatis parte de-
finant; nam hoc et maximi est momenti ad dignoscendos fœminarū affectus.
Desinunt fœminarum plerisq; mēstrua quadragesimo, aut quadragesimoquin-
to anno; quæ si præterierint, mirum non est, si sexagesimum attigerint. Licet ra-
ro fœminas à quadragesimoquinto vterius fœcundas esse contingat: rarò prin-
cipium, & finis menstruationis, & emissionis seminis fœcundus esse pōt. Quod
ob id fecisse naturā censeo, quia fœtus procreandi, & conficiendi calor in cor-
poribus idoneus amplius reperiri non pōt. Et qua rōne ante quatuordecimū
annum (quia caloris paucitas fœtui efformando impedimento est) fœminis mē-
strua non præbuit natura: eadem quoq; proculdubio supprimit senioribus iā
factis. Id quod eleganti paraphrasi docuerat Hip. li. 2. pop. par. 3. tex. 33. dicens:
Donec ossa solida fiunt mensium circuitus est, q̄ ante hæc fiunt, grabia sunt, la- C
boribus octimestriū germana, & primipararū. Qua inia recenset menstrua du-
rare donec ossa durescant: hoc est in senectute, ac si ante hæc tēpora subsideāt,
& supprimantur. (sic ego interpretor sequentia verba) laboribus octimestriū,
& primipararū germana succrescunt accidentia. Tēpus porrò durationis mē-
sium, seu dies, quos purgatio ipsa occupat, perdiscere quoq; vtilissimum duxi-
mus: nam in hoc quidē plurium morborum rationem sitam esse comperio.
Quod apertè docet Arist. lib. 7. de Histor. anim. c. 2. & 3. asserens quibusdam
breui tempore, hoc est biduo, vel triduo profluere. Quod fœlicius existimat
esse, quàm si diuinis purgatio protrahatur: nam aliquibus sex, septemve
dierum spatium occupare solet. Quæ verò ab his deficit purgatio, aut ean-
dem excedit, morbosa est: nam fœminæ maiori sanguinis copia luxuriantes,
ad quoque septemve dies protrahunt purgationem. Quæ autem sangui-
nem crassum, copiosumque habent, & venas exiles, adhuc ad plures. Quod
proprio

A proprio c. latius sum probaturus. Atq; hæc de temporibus purgationis dixisse
 sit satis. Institutum secundò fuit differere qualis sit natura, & cōditio sanguinis,
 quem ad menstruam purgationem in fœminis colligit singulis mensibus natu-
 ra. De qua re veteres, & neoterici varia protulerunt: quorū multi existimarunt,
 menstruum sanguinem, omnino perniciosū, & inimicā substantiā constare. Qui
 in suā opinionis cōfirmationem frequens experimentum adducunt, quo fa-
 cile probari potest, fœminas, & tpe menstruationis ab agitatione fœdissimi san-
 guinis, & dum menstrua supprimuntur, grauissima pati accidentia, & varia. Q-
 rationi putant esse consonum, ex vitio sanguinis illius præter naturæ instituti
 retenti. Quibus etiam astipulatur Plin. qui lib. 28. c. 7. mille monstra continge-
 re ex menstrua purgatione proficere: tantum deniq; deterrimam esse mēstruo-
 rum substantiam docet, vt dum prorumpunt, maris concubitum perniciosum
 efficiant, segetes marcore perdant vermiculos, erucas, scarabæos, & alia noxia
 animalcula interficiant. Apes item fugari, tenellas plantas ex toto deuastari, ac
 flores quoq; arescere menstruantis fœminæ contactu fatetur. Item lina, cum co-
 quuntur nigrescere, accidereq; innumera alia mala, quæ lib. 7. c. 15. idem autor
 refert. Mustum etiam ex fœminæ menstruantis adhæsu acescit, steriles fiunt ta-
 ctu fruges, fructus arborum ocysimè decidunt, exuruntur hortorum plantæ,
 moriuntur inserta, hebetatur etiam speculorum fulgor, & eboris nitor, æs quo-
 que, & ferrum rubigine protinus corripuntur. Sed quid opus est multis, quan-
 do quidem ipsamet fœminas, à quibus is sanguis profluit, innumeris, & grauissi-
 mis malis frequenter corripì videmus? Quibus veluti firmissimo argumento
 probari potest quantum veneni obtineat huiusmodi purgatio. Quod etiā pro-
 batum reperies ex Columella lib. 1. 1. Rei rusticæ c. 3. ex Solino quoq; in Poly-
 histore c. 4. & Aeliano lib. Historiæ animalium, c. 8. quo loco de campe uermi-
 culo loquitur. Et autor ille Geoponicon lib. 10. c. 77. auctoritate Democriti: atq;
 iterum lib. 12. c. 20. auctoritate doctissimorum Medicorū. Illud tātum dixerim,
 quod ex legibus Zabrorum, mulier, qui menses fluxerunt, præcipiebatur sola
 domi manere, cremabanturq; loca, in quibus pedem suum posuerat: neq; is tā-
 tum pollutus erat, qui cum ea loquebatur, sed si ventus ex ea super mundum
 quempiam transisset, is quoq; polluebatur: quod etiam ex Moses Aegyptij de
 creto testatum reperio. Plures item sunt peritissimos Medicos, qui licet non ne-
 gent, aliquando menstruam purgationem esse perniciosā, cum hoc tamen as-
 serunt, multorum morborum remedium eidem inesse sanguini. Referunt nāq;
 podagras, strumas, & parotidas, panos, sacros ignes, furunculos tractatu men-
 struantium mulierum liniri: sicut ex gestatione portiuncula vestis ita infectæ,
 tertianas, quartanasve febre curati: comitiales etiam morbos, ac rabientes sana-
 re illitu. Vitiosum quoq; sensisse Arist. multò ante, constat lib. 3. de Hist. an. ca.
 19. referens eum, qui statis circuitibus profunditur, genus esse quoddam san-
 guinis vitiatum, & quasi agrotans: est. n. repurgatum à puriore sanguine natu-
 ræ beneficio, præsertim decrescēte aut silente Luna secretum. Ob idq; decretū
 est Medicis, mēstruo suppresso tot mala fœminis succrescere necessum esse. Cui
 sententiæ astipulatur Gal. lib. de Tumor. præter naturam verbis expressissimis.
 Medicorum tamen maior pars existimat, sanguinem menstruum esse quantita-
 te solum, & copia vitiosum. Cuius sententiæ Gal. fuisse creditur. Ac si quis etiā

B Hippo.

Hipp. legat lib. 1. de Morbis mulierum reperiet, menstruum sanguinem his ver-
 bis depingere. Sanguis mēstruus exit interuallis, victimæ iugulatæ sanguini si-
 milis, rubens. Ego autem multis rationibus asserere cogor, sanguinē mēstruū
 esse ex propria natura partem sanguinis puriorem ea, quam seminarum altio-
 ni seiungit ipsa, aut saltem ei æqualem. Nam quemadmodum alterum nostræ
 generationis principium, semen nimirum, ex reliquijs vltimi, & optimi alimē-
 ti ipsa elegit, & adseruat: ita profectò oportebat, alterum, nimirum sanguinem
 menstruum, purissimum quoq; seligere. Ratio etenim euidentis id conuincit, si
 quidem fœtus in utero, & iam editi infantes certo quodam vitæ spatio eò plus
 caloris innati, & purissimi, ac humidi substantifici, & laudabilioris substantiæ
 habent, quo magis principijs generationis proximi sunt. Si igitur hoc verū est,
 vt Hipp. & Gal. ac omnium medicorum decreto euidenter constat: rationi con-
 sonū uidetur, nostræ generationis principia, pura, sincera, laudabiliora, & opti-
 mæ substantiæ esse. Nequit. n. quod imperfectioris naturæ est, materiam præsta-
 re perfectiori. At generationis principia, constat esse semen, & sanguinem mē-
 struum; ergo esse naturæ perfectissimæ credibile erit. Præterea ob id decreuit
 natura provida, lac ex menstruali sanguine conficere, vt simile esset alimentum
 fœtus principijs, quibus constat. Quapropter feminis lactantibus denegauit
 menstruam purgationem, vt fœtui idoneum subesset alimētum: sed lac esse pu-
 rissimam substantiam, & ex simili factam inficiabitur nemo. Quod his verbis
 probauerat Gal. lib. de Venæ sectione aduersus Erasistr. una si quidem, & lactis
 & menstruorum substantia est, amborumq; (ut quispiam dixerit) riuorum fon-
 tes communes venæ sunt. Quod profectò euidenter constabit, si fœtum crassio-
 re alimēto alas: nam protinus marcescere, aut deterius se habere cōperies. Itaq;
 si euidenti, & quotidiana demonstratione constat, infantes puerulos præstatio-
 ris, laudabiliorisq; substantiæ, & caloris, quam matris substantia sit, oriri: cur ē
 credibile non erit, alimentum intra vterū sumpsisse ex purioris sanguinis par-
 te? Sed eadem est substantia, & natura illius alimenti, ac mēstrui sanguinis; er-
 go perfectissimam esse, rationi consonum videtur. Nec valet in contrarium ad-
 ducta ratio de malis, quæ ex menstrua purgatione feminis ipsis, & plerisq; alijs
 rebus accidere videntur. Nam si quis rem diligentius, & penitus consideret, ob
 id profectò maiore in sanguine menstruo perfectionē arguet. Rō huius rei est,
 quia prædicta accidentia ex menstrui sanguinis natura succrescere credendū
 nō est, sed ex cōcepta putredine: quia quod res aliqua purioris, & pfectioris est
 naturæ, & substantiæ, eò, dū putrescit, & corrūpitur, grauiore cōcipit putredinē,
 & maius vitium. Quod in semine corrupto in eisdē feminis haud raro solet acci-
 dere. Præterq; id euidenter constat in corporibus hominū, & aliorū animan-
 tiū, dū corrūpuntur: nā quod perfectior est hoīs natura, eò grauius putrescit, &
 fœtore, ac vitio ingenti conspurcatur. Quod et latius probabo c. de Hystericis
 affectibus. Itaq; vitiosum esse sanguinē mēstruū, & veluti veneni naturā sape-
 re, aliunde prouenire non pōt, q̃ ex præstantia, & puritate sanguinis; quē, cū pri-
 mū à natura separatur, corrumpi necesse est. Nam cū subitò, & affatim neq; sepa-
 rari à reliquo sanguine, neq; excerni possit; sed paulatim, & sensim in vteri ve-
 nis ad statutum à natura terminū congregetur: fit facilè, vt ibidē per integrum
 mensis spatiū citra corruptionē esse non possit. Tenuissimam nāq; & syncerissi-
 mam

A mam substantiā facillimē alterari erat opus, ita ut qđ in dies aggregatur, in dies quoq; uitii contrahatur; ac dū menstruationis tpe prorumpit, uitiosum quoque fiat, & accidentia, quæ retulimus, mille modis pariāt. Nec ob id profectō credē dū est hmoi sanguinē semp, & in oībus uitari, sed in ijs tm, in quibus diu immoratur, & improbē expurgari contingit. Plus. n. afficitur dum una die vltra mēse regulari, & adseruari aliquo mō coniectandum est. Sic profectō neque oēs feminae, et si menstruantes sint, segetes urunt, neque uermiculos interficiunt, aut speculum frangunt uel maculant: sed hæc mala ex solūm feminae faciunt; quibus, aut improperē procedunt mēses, aut deterrimum inest temperamētū, uel morbus aliquis, in quibus sanē uenenum fieri, & sibi, & alijs mirum non est. In reliquis uerō purus, & integer sanguis in uteri uasis adseruatur ad prægnationis tēpus, si fortē acciderit prægnantes fieri. Qua proculdubio rōne constat feminas maiori ex parte concipere mox purgationē prægressa: nā sanguis, qui ante purgationē in utero colligit præter quā quod geniturā uitiat, ineptissimus qui dē est, ut alimentū possit præstare, aut fetum reddit imbecillum, & morbis obnoxium. Quocirca mox à purgationē ex sanguine denuō collecto, anteq̃ uitium contrahat, feminas concipere, ut plurimum contingit: Nec ex eo putandū est alterius esse naturæ sanguinē menstruum, & alterius eum, quo fetus alitur, ut Fernelius arbitratus est: nā utrumq; eiusdem esse sortis, facillē probari potest. Primò, quia per easdem ferē uias natura in uterum transmittit sanguinem menstruum, per quas fetui alimentū subministrat. Quo fit ut credendum non sit aliū sanguinē transmittere ad purgationē, & aliū ad alitionē. Præterq̃ q̃ huic uisui excogitauit natura, in feminis maiorem fabrefacere sanguinis copiam, nimium, ut superesset fetui conueniens alimentum, quem sanguinem dum usui necessarius non est, singulis mensibus natura expellit. Ex quo rationi uidetur consonum eiusdem esse conditionis, licet uitio ob moram contracto dissideant. Secundò, quia nō est ueritati consonum, quod natura unius finis gratia preparat, esse diuersæ naturæ, & rōnis. Si igitur, & menstrualem sanguinem, conceptui, (si forte accadat) parat; & eum, qui ad fetus alimoniam in utero iam colligit, unius finis gratia in eum locum mittit: credibile esse uidetur non differre conditionē, & naturā. Tertiò id etiā confirmatur, quia lac, & sanguinem menstruum eiusdem esse sortis, & naturæ scimus, & correspondentiā adinuicē habere; ergo utrumque esse alimentū materiam erit uerum, atq; ex consequenti eiusdem rōnis, & naturæ. Argumento quoque est, neque prægnantes, neque lactantes menstrua purgationē sedari; quia in utrūq; conuertitur in fetus alimentum: unde constabit eiusdē esse naturæ. Sed expendant quoque alterius opinionis fautores, menstrua purgationē non posse sola quantitate peccare, sed qualitate et uitio maximo: idq; ob rationes à me adductas. Censeo tamen illud uerbum, sola quantitate peccare (quod aliquod Gal. refert) non esse intelligendum, de eo sanguine, qui singulis mensibus per uterum excernitur, quippe eum uitari mille rationes, & argumenta probant, sed de ea sanguinis portione, quā natura singulis diebus ab uniuerso sanguine separat, ut paulatim in utero collecta menstrua efficiat purgationē. Qui porrò sanguis nullo uitio conspurcatus, sed sola copia exuberans in uterum à natura transmittitur, fetui alimentum

B 2

futurus,

futurus, aut in ijs, quæ vtero non gerunt, sanguis menstruus. Itaq; sanguis, quæ A natura ad vterum transmittit ex propria conditione purus est, laudabilis, sola copia exuberans: is verò, qui singulis mensibus per vterum excernitur, ob moram, quam ibidem contrahit, & ob tenuitatem, & puritatem substantiæ ocysimè vitiatu qualitate, & copia alienus prodit adhuc in foeminis optimè temperatis.

Tertium propositum fuit docere, quæ fuerit potissima causa periodicationis huius menstrui sanguinis in mulieribus. Menstruam purgationem ideo appellati hanc euacuationem opinor, quæ frequentius singulis mensibus fluat. Sunt et qui flores eandem purgationem vocant, quia antecedit fructum foetus in vtero gestaturi, sicut flos in arboribus fructum præcedit. Multi rursus appellantur tempora, eo quod statis temporibus prodeant. Qualis verò fuerit ratio huius periodicationis ordinisq; non satis apertum est, propterea quod autores non constat in vnicâ eademq; sententiâ, neq; certè (si verum fateri velim) lex vna, neq; vna ratio signari potest, quæ naturam cogat statuto tempore id moliri. Nam etsi legem semel statuerit natura ipsa, peruertit nunquam nisi alterata, aut mutata: cū hoc B tamen, licet in foeminis decretum sit naturam semper in vterum certam quandam purissimi sanguinis portionem transfundere, neq; viæ sunt æquali semper modo expeditæ, neq; rursus sanguis ipse, qui colligitur, eiusdem naturæ est, neq; in eadem copia, ut statuto tempore fluere teneatur. Quapropter etiam si natura semper sanguinem congreget: non tamen ob viarum, & sanguinis vitium, menstrua legem semper seruare potest. Vnde constat frequentius singulis mensibus hunc sanguinem profluere; aliquñ, tertio quoq; mense, & in alijs alia seruata varietate pro indiuiduæ conditionis ratione. Ex quo, illud Arist. li. 7. de Hist. ani. c. 2. figmentum esse censeo, videlicet, ob id sexum foemineum esse Lunæ tributum, quod ipsa crescente, huiusmodi sanguis in eis colligitur, & crescente imminuitur, & purgatur: nam id aliter fieri euidenter compertimus. nam si verum esset, omnibus foeminis eodem ferè tempore menses prorumperent. Luna nimirum decrescente. Ego autem hac in re arbitror legem esse naturæ impositam, ut semper sanguinem illum in vtero adseruet, donec ex onere, aut alio irritamento ipsa ad expulsionem gliscat. Verum quoniam id, quod quotidie C accrescit, neq; eiusdem est naturæ, & rationis, neq; viæ semper æqualiter expeditæ existunt: ideo mirum non est, si præter legem naturæ inditam, citra ordinem conetur ipsa illum sanguinem expellere; & aliquñ anteuertat, aut remoretur, ob ea, quæ sanguini inesse diximus vitia. Nam tenuior aliquando est, nonnunquā crassior, sæpe syncerus, sæpissimè alijs humoribus permixtus, ita ut iuxta rationem confortij aliorum humorum menstrualis sanguis tempus lego naturæ statutum euertat. Argumento quoque est, menstrua purgationem non semper æquali tempore in omnibus foeminis durare: quippe inæquale est durationis tempus, prout foeminæ habitus, rarior, densiorve fuerit, aut sanguis crassior, vel aquosior, ut latius paulò inferius docebo.

Quartū verò, & vltimum propositum est monstrare per quas vias sanguis in vterum dilabatur, & per quas etiam ab eo prorumpere soleat: nam multis profuere modis, viris doctis, & peritis conipertum esse censeo. Dubitatum hac in re est, an sanguinis menstrui separatio, ac disiectio à reliqua ipsius sanguinis copia

A pia sit huius tribuenda. Cui diximus, vniuersam huius rei rationem pendere ex naturae lege, & instituto, quod vsum propagandae speciei non ignoras sanguinem separat optimū, idque perpetua diligentia curat, quae per venam cauiam descendente peculiariibus eiusdem ramis huic operi dicatis, in diuersas uteri partes transmittit. Nam partim ad uteri collum seu ceruicem, partim ad ipsius corpus, & capacitatem: in quorum partium venis immoratur, donec tempus purgationi aptum instet, aut fetus gignendo alimentum praestari possit. In quo sane opere silentio praetermittere nolui, utrum nullam edere peculiarem actionem, sed vsum tantummodo susceptioni commodum praestare: non enim trahit menstruum sanguinem, cum ab eo alimonia suscipere non possit: ob idque natura semper illuc transmittere sedula diligentia curat. Neque oportebat utrum trahere, ne quod sanguinis foeminae esset utile, & necessarium, etiam allicere: sat enim est quod huiusmodi menstruum sanguinem natura ipsa ex abundantia utero, aut fetus largiatur. Quod sane opus trahenti potentiae committitur, erat periculosum: sed abundantiae, & vbertati totum negotium reseruauit, ut natura nimia copia luxurians quod superest unum transmittat, parsimonia vero affecta, sui gratia id totum adseruet. Ex quibus euidenter constat, sanguinem in utero non colligi ui facultatis tractoriae, sed natura quod inundat transmittente: alioquin neque conueniens neque ad tempus expulsio fieret. Verum si quis dixerit, utrum in gravidis fetus alendi gratia sanguinem allicere: intelligat vellim, tractionem illam non esse uteri munus, sed fetus. Nam quicumque ex orificijs, quae uteri acetabula dicuntur, seu venarum ora, semen utero conceptum attigerit, statim alimentum per eadem ad se trahit. Ut aperte Gal. docet lib. de Semine cap. 4. & 7. Dilabiturque sanguis in uteri cauitate, ut singulis mensibus expurgari possit, per varios, & diuersos canales in diuersis ipsius uteri partibus dilatos. Nam ex caua uena descendente, quae in venarum innumeras propagines dissecatur, duplices in uterum conductus inferuntur, quidam, ex ultimis eius diuisionibus, ex quibus, & vesica & rectam intestinum, & partes his vicinae alimentum susceperant. Qui postea in ipsius uteri ceruicem seu collum, in parte nimirum eius interiori desinunt, sanguinemque menstruum in virginibus ac praegnantibus foeminis profundunt: etiam si alijs quoque per easdem partes prorumpere possit: Nam cum utrisque uteri os clausum summopere sit, aliunde menstrui purgationem provenire raro contingit. Quidam praeterea ex altiori venae cauae trunco proveniunt uenarum ductus, qui in uteri corpus inserti, in eius cauitatem desinunt, praestaturi foetus alimentum, & foeminis ferè omnibus sanguinem menstruum. Ex ramo namque illo venae cauae, quae deorsum perreptat, ut testibus, vesicae, utero, & plerisque vicinarum partium alimentum impartiat, duae disseminantur propagines: quarum alteram Siluius epigastriam appellat: quae rursus sursum ascendit, & alteri, quae in mammas inseritur, occurrit: altera uero propago ceruici vulvae inserit. Quae deductione constat consensus uteri cum mammis. Quamuis aliter, iudicio nostro, intelligenda sit huiusmodi uenarum communio, ut alibi exposuimus. Ad hac igitur posteriori propagine interdum fluit crassior sanguis, non aliter quam per haemorrhoides. Qua de causa multi, eam purgationem, quae per has venas fit, ad uteri haemorrhoides referunt: alij uero, ad veram menstrui sanguinis purgationem: per quas virgines, & grauidas purgari aliquando contingit: Quod in gravidis necessarium videtur ob arctissimam iliam colli uteri astrictionem, fetus

B 3 conti-

Pregnantes
si mensura
prodeant
ex uenis
uicis uen
prodeant

continendi gratia, à natura instructa. Ex quo profectò naturæ artificio euiden- **A**
 ter constat non protinus abortire grauidas, quibus ex utero gestationis tēpore
 sanguis profilit: nam si ab exterioribus (quas primo loco retulimus) prodeat,
 innoxie frequenter profluit; si uerò ex interioribus, ut q̄ & foetui adherent, &
 illi alimentū præstant (eisi non oēs, sed quæ in lateribus uteri sunt, ut optimè ad-
 uertit Vesalius) raro foetus statuto tēpore in lucē editur. Est itaq; uerò similis in
 ijs, quibus sanguis fluit, & non abortiunt, sanguinem per uteri cœuicis uasa ex-
 cerni, potius q̄ per acetabula dicta, hoc est, per ora uenarum, quæ in uteri cœui-
 tatem desinunt: per quæ sanè, & alimentum trahitur, & foetus in uolucra fiunt.
 Quod Gal. li. i. de Semine, c. 6. rectè explicuit, dicens: statim in uolucra fieri, so-
 lasq; eas partes superesse perforatas, per quas sanguis, & spiritus à uenis, arterijs
 quæ maternis transmissio fieri possit: ob idq; profectò iudubitatum est abortus
 præfanguium, dum ab his uenis sanguis prorumpit. Cuius contrarium euenisse
 millies constat ijs, in quibus menses toto ferè gestationis tempore fluunt: quia
 menses ueri non erumpunt, sed à foetu in uterum trahuntur. Sanguis tamen p
 cœuicis uenas innoxie, dum redundat, excernitur. Ut optimè etiam aduertit **B**
 Moses Aegyptius particula 16. 19. quod etiam sanguine fluente ex aliquibus
 interiorum (ex eis nimirum, uenis quæ in utero vacuæ, & immunes à foetus mi-
 nisterio supersunt) fœminæ non semper abortiant, uerissimum est: sicut in eisdē
 menses quoq; diu per eas partes profluere. Ut suo loco latius probabo. At utri-
 ginibus conueniebat non expurgari per uteri interiores uenas: periclitarentur
 enim ex concreto sanguine non penetrante hymenem membranam intra uteri
 sinus dirumpi, uel grauissima accidentia, uel mortem perpeti. Quocirca raro
 accidit non purgari uirgines per uteri cœuicis uenas. Quam differētiam, eiusq;
 rationem paulò inferius latius sum probaturus.

simili modo
virginibus

Prætereo consultò in hac parte longius disputare, ac docere menstruæ pur-
 gationis mensuram: nam uanum esse omnino existimo, incertam esse cōiectu-
 ram, quæ illi regulam, & mensuram certam assignare uelit, cum differat corpus
 à corpore, & natura à natura: sicut & inter se uitæ institutiones, tam eæ, quæ ad
 victus modum, q̄ quæ ad exercitia pertinent. Quamobrem purgationis quanti-
 tatem cuiq; proficiam ex conferentia, & tolerantia potius metiri oportet, quā **C**
 omnibus, & singulis à iquam communem, & propriam præscribere. Quamq;
 non latet me Hip. depinxisse li. i. de morb. mul. moderati menstrui quantitatē.
 Inquit. n. Moderati uerò sunt menses prodeuntes in omni muliere, si sana sit, ut
 duarum heminarum Atticarum mensura secedant, aut paulò plures, uel pau-
 ciores, atq; hæc, aut duos, aut tres dies. Verum ut constet meæ sententiæ ueritas
 quoad incertitudinem mensuræ, subdit paulò inferius. Longus autem tempus
 aut breuius, morbosum, & sterile est. Coniectare porro oportet, mulieris cor-
 pus inspiciendo, & interrogare collatione facta ad priora, an semper morbofa
 uiuat, aut non. Si enim plures, paucioresue dies, quam solent, prodeant; aut ipsi
 plures, aut pauciores fuerint, morbofi sunt, nisi natura ipsa morbofa, & sterilis
 fuerit. Si uerò hoc fuerit, & ad salubriorem statum transmutetur, melius est.
 Quibus uerbis constare arbitror, ad cœritudinem quantitatis, antiquam cōsue-
 tudinem, & propriam cuiusque naturam considerandas potius esse, quam men-
 struorum copiam.

A De fœminis, quibus menses nunquam fluxerunt. Cap. 5.



ON pauca inter fœminas sunt, quibus (etiam si iam conce-
nuerint) menses tamen fluxere nunquam: quarum nonnul-
lae visae sunt concipere; aliae verò steriles omnino permane-
re. Verum, modo hoc, modo illud accadat, quasdam ex eis
conspicimus, & prospera, & inculcata ualitudine frui; plu-
rimas uerò mille affectionibus premi, omnes tamen, ablatam
ex toto obtinere uteri actionem, quatenus ipse dicatus est his excrementis ex-
cernendis. Expendere autem seorsum unumquodque horum membrorum,
causasque ad vnguem exequi: uile, & multis usibus necessarium fore duxi.
Primo igitur loco subeat in examen, qui fieri possit fœminam non menstruan-
tem non concipere. Cuius dubitationis ratio in promptu est: nam si menstrue
purgationis potissima causa in fœtus vsum, & gratiam à natura dirigitur, con-
stat, dum deficit, conceptum fieri non posse, quoniam caret natura, ea sangui-
nis redundantia, qua præstatura est fœtui alimentum. Cui dubitationi respon-
demus in medium adducta Aristo. sententia 7. de Histor. anim. cap. 2. quæ se ha-
bet in hunc modum. Nonnullæ etiam dum profluunt menses, concipiunt, po-
stea concipere nequeunt, quibus vulua statim à purgatione comprimitur. Et
postmodum inquit, Conceptus mulieribus à profluuiio menstruorum sua na-
tura contingit, & quæ his carent, steriles magna ex parte consistunt. Verum
fieri potest, ut aliquæ etiam sine eorum affluuiio concipiant, videlicet, quibus
tantum humoris colligitur, quantum ijs, quæ purgantur, restare solet post pur-
gationem: quamquam non tanta copia est, ut foras possit effluere. Alibi etiam
hoc idem asserit, dicens. Impossibile est concipere sine menstruorum excreme-
to, quod aut redundans foras profluxerit, aut intus satis sit. Ex quibus locis con-
stat quàm difficile sit credere fœminam utero posse gerere menstruis caren-
tem: licet aliquando contingat. Sed, ut clarior doctrina euadat, dicimus etiam
menstruorum defectum duobus modis posse considerari, uno quidem, dum
fœmina natu grandior facta, omnino mensibus caret: quam proculdubio con-
cipere contingit rarò, etiam si tantum sanguinis eidem insit, quantum alijs,
quæ concipiunt, post menstrui purgationem superest: eò quod natura non
solum ad fœturam progignendam prærequirat sufficientem in fœmineo cor-
poreo sanguinis copiam, sed etiam exposcat eiusdem debitam quantitatem in
uteri uasculis, requiratque ora vasorum, quæ in ipsum uterum degenerant,
patentia, ut ab eisdem instillet id sanguinis in uterum, quod inuolucris effor-
mandis sufficiat, ac etiam peruia, & libera uia ad alimenti delationem. Qui-
bus omnibus, quæ proficua, & necessaria sunt fœtus formationi, carere hu-
iusmodi fœminas necesse est: præterquàm, quòd rarò contrarium accidere con-
stat, & Galeni principijs non uidetur admodum consonum. Secundo modo
fœminam menstruis carere, & posse concipere existimamus, dum ante debi-
tum menstruationis tempus viro concumbit. Quod aliquando contingere
uidimus. Nam etsi semel natura mensurum sanguinem in mense excernat,
sæpius tamen, ac diu eundem in utero, & venis ei proximis congregat, ita ut
mirum non sit, si ante tempus menstruis dicatum, fœmina ex adseruato huic

B 4 vlu

vsui sanguine concipere possit. Omitto breuitati cōsulens plures feminas, quas **A**
 dum nouem, decem, vndecim, duodecimve essent annorum, concepisse men-
 struis nōdum incipientibus, viris doctis, & grauissimis compertum esse video.
 Quod profecto haud innoxie fuisse factum credendum est: nam statim habet
 natura huic ministerio tempus, quod quæ antequirit, nō citra damnum faciet.
 Quandoquidem menstruum profusio, certissimum, & euident signum est, fe-
 minam esse viro maturam. Vt ex Gal. apertissime constat lib. de dissectione vul-
 uæ; quæ parte ex intempestiuo viri accessu sterilitatem, & varia mala succresce-
 re docet: etiam si, ut dictum est, aliquando huiusmodi feminas concepisse visū
 sit. Secundò diligenter expendisse oportet quæ sit potissima causa, propter quā
 plures feminas innoxie viuere citra menstruum affluxum cōspiciamus. Cu-
 ius difficultatis gratia credendum est, duplicem esse in genere defectus men-
 struorum causam: alteram toti corpori communem, alteram uerò soli utero pe-
 culiarem. Illa quidem ijs feminis; quæ inculpate degunt, propria est; hæc autē
 ijs, quæ laboriose viuunt, peculiaris. Prima sanè est naturalis totius corporis te-
 peries, & substantia, partiumq; omnium configuratio. Quæ omnia cum alicui
 feminæ insunt æqualia, ita ut cuiq; membro pro dignitate, & natura, habito re-
 spectu ad totum corpus, insit ea configuratio, substantia, & temperies, quæ cum
 alijs membris conveniat iuxta corporis, cuius sunt partes, naturam, & condi-
 tionem: necessum profecto erit quoduis membrum trahere, conficere, & expel-
 lere quod sibi proficuum forte nescit. Ex quo inferitur, feminas huiusmodi ha-
 bitu præditas superabundante hoc sanguine ex natua sorte carere, præsertim si
 solidæ sint carnis, exercitio dedite, & calere abundantiores; quas viragines nū-
 cupare, haud ab re fuerit. Atq; cum ex communi corporis temperie, & cuiusq;
 membri propria constet parum, aut nihil in corpore redundare, idq; facile per-
 insensibilem halitum vi caloris digeri, & vterum et robusta cōstare natura, ita ut
 nihil superflui admittat: fit quidem facile, ut cum neq; corpus transmittat, neq;
 vterus susceperet, feminas menstruis carentes innoxie viuere cōspiciamus, etsi
 quibusdam senectute adueniente visum sit, articulares affectus & paraplexias,
 aliq; accidentia euenisse. Quod si compositio hæc, & temperies feminæ cui
 inest, optima sit, & sana: cum hoc tñ sexui, & speciei morbosa, & præter naturam
 institutum existit: & ob id, utcumq; menses nō fluant, morbosum esse existimo. **C**
 Quibus accedunt hæc feminæ, quas Aetius recēset li. 4. c. 5. 1. Refert. n. pingues
 à natura feminas magis esse reliquis exangues, minimasq; obtinere uenulas:
 quod fit, ut sanguinis nihil supersit præterquam, quod si quid eius abūdet, ocys-
 sime in pinguedinem concrefcit. Inquit. n. idem autor. Quo modo ergo purga-
 buntur, quæ neque sanguinem, neque venas amplas habent. Annumerat etiā
 graciles feminas, in quibus nihil penitus abundat ob gracilitatem, quæ ex diu-
 turno affectu contracta nihil superflui habet. Quod intelligendum est de graci-
 litate, quæ ex morbo facta, connaturalis reddita est: nam aliter menstrua solum
 ad tempus supprimit, non semper. Secunda verò causa, quam soli utero conue-
 nire diximus, ob id morbosa est, quia etiam si naturalis sit, dissidet tamen mul-
 tum ob eam uterus ab alijs corporis partibus temperie, cōformatione, aut situ:
 ita ut licet corpus sanguine menstruali abundet, vterus tamen ex natura impro-
 bē constitutus suscipere ipsum, aut expurgare nequeat. Accidit. n. frequenter
 vterum

femina quæ
 do viro ma-
 tura

quæ femi-
 nae uita
 menstruum
 affluxum
 innoxie ui-
 uant.

A utrum ex nativa constitutione ea temperie, aut figura vel situ esse efformatum, ut officio proprio uti minimè valeat: quò fit, ut redundans ille humor multarum calarum auctor existat. Neque huic damno obstat vitium esse naturale nam ex eò id mali etiam præstat, nimirum ut curari minimè possit. Est profectò hæc differentia inter vitia naturalia toti corpori communia, & ea, quæ alicui parti propria existunt, quòd illa salubritatem impedire minimè possunt, hæc verò nequeunt nisi in salubria existere. Exemplo est corpus proportionale infra mediocre paruum, aut supra id magnum: nam neutrum dum proportio inter omnia membra adservatur, erit morbosum, aut deforme, etiam si parvum, aut magnum sit. At verò corpus quodvis, cui aliquod membrum magnitudine, aut parvitate ab aliis nulla servata proportionis lege, dissidet, morbosum censeri iure optimo debet, licet cætera membra innoxia sint: cerus enim alterum, quod alterum excedit, brachium, aut oculum, actionibus officere est necessarium. Sic uterum (etiam si ex nativa constitutione id vitium contrahat) dum dispari temperie ab ea, quæ pro corporis ratione illi erat proficua, afficitur, aut figura immoderatione à reliquo corpore dissidet, menstruorum morbosam retentionem, ac periculosissimam proculdubio efficit. Atque hi sunt modi, quibus dispari forte feminæ menstruis carentes afficiuntur.

Est igitur morbose menstruorum privationis causa multiplex (ut dictum est) cuius contemplationem præmittere oportet, si recta medendi ratione uti velimus. *Causa.* Prima est uteri temperies nimis calida, quæ superassatum ibidem sanguinem, ineptum fluxui reddit: quem eadem in parte immorantem in uteri scirrhum, cancerum, aut alios tumores præter naturam degenerare haud raro conspiciamus. Deinde cum uterus plus sanguinis suscipere nequeat, fit facillè, ut per uniuersum corporis habitum inundet, ac vitiosus factus, in varios affectus degeneret iuxta corporis apparatus, & nativam conditionem: quippe in aliquibus degenerat in cutis fistulas, in alijs in gravissimos articularum dolores, plerisque autem in varias, & multigenas epilepsie species, quibusdam verò in gravissimos capitis dolores, aut vitium aliquod cordi, aut ventriculo infensum. Proficiscitur quidem hoc intemperamentum aliquando ex nativa conditione, nonnunquam verò ex gravissimo aliquo morbo, quem femina in pueritia perpessa fuerit. Quod quidem malum alijs ex siccitate evenit, alijs quidem ex prava uteri figura, ut inferius latius sum monstraturus.

Dignoscitur autem causa hæc ex frequentissimis, & gravissimis uteri doloribus, quales feruidus sanguis aliquo loco inclusus efficere solet, ex totius uteris ardore, ex purgamentis uteri, quæ simillima sunt colliquationi rubræ, fetide, item ex substantia acris, & erodentis humoris: quibus frequenter uteri os, & pudenda exulcerati contingit. Quippe in his feminis non ex toto uterus clauditur, ut nihil percolari possit: sed citra ordinem, & menstruam periodum huiusmodi purgamenta non quidem innoxie exeunt. Dignoscitur id etiam ex partium genitalium ardore, aut squallore, & gracilitate, ac veluti tensione, & duritie. Quibus item paribus inest pilorum crassorum, & nigrorum maxima copia: necnon, & gravis odor veluti carnis adustæ. Quod profectò vitium frequentissimè in cancerum degenerat, & in maligna ipsius uteri ulcera. *Signum.*

Curandi

CURATIO. Curandi verò methodus, & ratio, duplex est, altera, quæ vterum præcaueat A
ab his malis: nam cum iam dictorum aliquod præest, peculiarem requirit curandi rationem, quam reperiēs proprio c. lib. sequenti de vteri affectionibus: altera rursus quæ superabundantem sanguinem minuat, & in utero iam contentum sensim, & leniter discutiat, & attemperet, quod præmittere in hac curatione necessum esse censeo. Victus primò huiusmodi fœminis is optimus erit, qui frigidus cum sit, parcus etiam, aut saltem quantitate modicus existat: hoc quidē ut avarior facta vniuersi corporis natura, minus aut nihil in uterum transmittat: illud verò, ut & sanguis frigidior factus vstioni sit ineptior, & sensim, ac paulatim uteri temperiem mutare possit. Ob id pullorum carnibus, arietis, aut vituli uti est opus, & ex oleribus quæ frigida sunt admiscere, & eisdem seorsum uti, ac malis granatis, arancijs, & quæ consimilis fuerint naturæ. Bibant aquam radicibus scorchiōneræ, aut hordeo, aut saccharo decoctam. Somnus sit aut moderatus, aut moderato paulò breuior: Exercitium sit partium tantum superiorum, quale fœminis uitam agētibz sedentariam proprium est. Iræ, & animi perturbationes arceant, & frequentem deambulationem. Locus habitationis sit temperatus, aut temperato frigidior, irroratus semper frigidis asperginibus, & olfactui gratis. Verum licet in hmoi fœminis rarò, aut nunquam menstrua mouere tentandum sit, saltem medicamentis id ualentibus, ne maior fiat, aut sanguinis ad uterum attractio, aut efferuescentia, & vstio: erunt tamen huic vsui apta phar-maca omnia, calidæ naturæ. Cum hoc tamen sanguine missio per convenientē regionem, nimirum per tali uenas bis terve in anno menstruum euocare est necessum, tum ut uterus nitatur successione eius, quoad euacuatur, aliquid etiam expellere: tum verò, ut si quid nimium obinet, sanguine detracto ad meliorem statum reducatur, hac. n. ratione uentilatis illis partibus minus exute, ut sanguis ibidem contentus. Quod si diffuescere naturam ab utero uoluerimus, vtilissimū fore censeo ex dextra, aut sinistra saluatela, vel ex vtraq; semel, aut vis sanguinē interposito eodem modo tpe, extrahere. Atqui cum in his corporibus rōni consonum sit, plurimum fœculenti, & adusti sanguinis redundare, idq; propè vteri partes: vtilissimum esse censeo ineuntibus vere, & autumnō hæmorrhoides excitare, sanguinemq; per eas effundere. Quod si adhuc spurcissimum, aut plurimum sanguinem per corpus inundare cognouerimus: mollioribus frictionibus B
(præsertim superiorum partium) & frequentioribus aquæ dulcis temperatè calidè balneis uti necessum erit: tum ut ad vterum transmittere natura diffuescat euocata ad partes cutis extimas: tum verò ut ibidē redundans sensim, & placidè per halitum digeratur: tum et ut uteri ardor mitior factus vrere sanguinem deinceps desinat, & si quid eius continet, insensibiliter pellat. Præstabit quoq; nō mediocri cōmodum apozematum frigidorum vsus, qualia sunt quæ conficiuntur ex aquis stillatius frigidis, aut decoctis cum syrupo rosarū, portulacæ, borraginis, & cichorij: quæ et gratiam epithymata hepatis adhibita præstare solent. At vteri maxima habenda est prouidentia, ne eius vitium in aliquod grauius degeneret: & ob id curandum est humidis, reperiatis, & lenissimis, medicamentis eiusdem vias dilatare, referareq; uasorum oscula, ut liberè sanguinis aliquid exire possit, aut saltem eius calor attemperari, & in meliorem habitum, si natiū fuerit vitium, mutari. Quapropter primò vētrem inunges in ima eius parte oleo viola- C

ceo

Adeo septies aqua rosacea loto, & lacte muliebri admixto: idem præstabit oleum amygdalarum dulcium aqua et hordei elotum, & oleum cucurbitæ, ac rosa.

Quod si compositis uti uolueris, facile erit ex prædictis oleis unguenta, aut linimenta conficere, adiectis axungia anatis, lacte caprilo, butyro uaccino, cum succis portulacæ, ramentis cucurbitæ uiridis, aut foliorum uiolarum cum modica cera. Præstat item ceratum ex eisdem rebus conficere, cui femina assuescat, quod tanquam peculiare præsidium, & minus importunum probo. Ex usu quoque sunt foci ex dulci aqua mediocriter calida, aut temperata, præsertim si in ea feruerint lactucæ, portulacæ, & uiolarum folia, necnon & papaueris folia, & cucurbitarum ramenta, ac lenticula palustris. Eundem et usum præstant infusiones, & euaporationes, quas ex temperatiori aqua prædictis rebus decocta fieri necessum est. Quod si uelis simul attemperare, uterum & eius uasa reserare, commodum quoque erit, decoctis prædictis addere capillorum ueneris comam, aut mercurialis pugillum, uel artemisiæ modicum, præmunito tamen prædictis euacuationibus prius corpore. Confert non minus clysterium refrigerantium usus, præsertim cum femina ita dormitum: nam hæc optimè uteri intemperiem citra ullum incommodum corrigere nata sunt. Cuius census plura reperies lib. nostro de auxiliorum indicatione.

B Siccitatem, si ex diuturnis pueritiæ febribus, aut obstructionibus contraxerit uterus, ita ut collapsis, aut corrugatis meatibus sanguis profluere non possit, cognoscens haud difficulter ex præcedentibus affectionibus, ex totius corporis macie, ex partium externarum gracilitate, ex pudendis partibus gracilibus: quas in uirginibus crassas, prominentes, & carnosas esse compertum est. Item quia huiusmodi feminae ne minimum quid per uterum excernunt, imbecilles sunt, languidæ, & leuissimis laboribus defessæ. Item procedente morbo partes externæ crassiores redduntur, ueluti quodam malo habitu affectæ, utero nihil suscipiente ex partibus nequeuntibus uitiosum illum sanguinem conficere.

C Curabis hanc siccitatem, & menstruam purgationem fortasse prouocabis humectiori facto utero, sanguineque ad ipsum euocato. Illud quidem efficies non solum cibus, & potibus humectioribus, & optimi nutrimenti, sed balneis frequentibus ex dulci aqua confectis, inunctionibus ex oleo uiolaceo, amygdalarum dulcium, sesamino sepius lotis, & resumptiuo unguento, & ex eo etiam quod conficitur ex prædictis oleis, ex mucilaginis psyllij, seminis citoniorum, limaciarum cum modico oleo liliorum alborum, aut cerato ex eisdem confecto. Prodest etiam clysterem ex prædictis oleis injicere, aut iuribus pingnibus, præsertim si fiat ex extremitatibus hædi, capreoli, aut ex decocto colearum. Item ex butyro, ex lacte, ex decocto althææ, maluarum, & ex succo portulacæ cum oleo amygdalarum dulcium, aut sesamino. Sanguinem fortasse uocabis ad uterum frequentibus deambulationibus, eis tamen, quæ lassitudinē non afferant: item frictionibus moderatis supra uteri regionem factis, nam ijs auxilijs calor moderatus in eadem parte excitatur, quibus partes collapsæ dilatantur, ut alimentum, & sanguis menstruus eodem etiam colore, & frictione euocatus, facile subire uasa possit, & in uterum deinceps prolabi. Vacuationes omnino in hoc affectu fugere oportet, alienæ quippe sunt à corpore siccitate laborante.

Men-

Deprauata figura Menstruis frequentius feminae carent ob vteri deprauatā figurā: praesertim **A**
 si ex natua conformatione proficiat. Vt Gal. aduerit lib. 3. de causis sympt. c. 4. Nam qua ratione monstruosam conformationem in membris exterioribus factam frequenter conspiciamus: eadem prorsus in interioribus idem accidere solet. Sic vterus deprauatam si sortiatur figuram, mirum non est, si proprijs munis probè fungi non possit, praecipuè si, aut vasculis, aut foraminibus careat, aut perperam, ea habeat figurata, aut à debito loco auersa, aut vtcumque contorta, ita vt sanguis, quem natura in uterum defert, prorumpere minimè queat. Quod non raro ex diuturna obstructione, ex casu, ex ictu, aut alio quouis accidenti euenire quoque potest. Cuius affectionis causas nosse difficile non est, si quis primò expendat priuationem praedictarum causarum: nam si nullum earum signum affuerit, rationi cōsonum videtur vitium omne in partium deprauata figura situm esse: praesertim si femina in ceteris sana appareat, optimi coloris, & boni habitus, & cum hoc accidentibus infestetur grauissimis, venteris tumore, dolore, tensione, & grauitate. Quod si figuræ vitium ex antiqua, & inueterata obstructione, ac ferè natua facta prodierit, facilius adhuc id posse dignoscere sperabis: nam viscerum obstructorum propria, & peculiaris existunt signa. Quorum meminero cap. proprio de vteri obstructione.

Cutatio. Hanc autē cām, diuersam à praedictis exposcere curationem notissimum est. Nam in eadem nullis medicamentis vterum tractare oportet, neque ullam eius habere prouidentiam, eò qd sit ex ijs, quæ ex natuo vitio alioqui irreparabili, prodit. Sed omni ingenio curandum est, redundantem sanguinem aliò transferre vel imminuere, antequam, aut in vitiosum degeneret, aut in morbum aliquem prorumpat. Ob idq; tutissimum in his feminis est, ter quaterve sanguinē, singulis annis extrahere ex brachijs quidem maiori ex parte, aliquando uerò ex talo, uidelicet cum vterus ex vitio, aut copioso sanguine ibidem redūdante, affectum contrahit aliquē. Atque ea ratione cauendum semper est, ne in vterum irruat sanguis, eodem (ut dictum est) extracto, & retracto per brachiorum uenas. Quod si femina (licet sanguine abundet) viribus careat, ita ut nequeat harum vacationem frequentia proferre, curandum profecto est, alijs auxilijs copiam minuere, nimirum victus parsimonia, ac frequentioribus exercitijs, quibus parum sanguinis generetur & si modicum quid redūdat, exercitij viribus euanescat. Auertere etiam sanguinem à partibus internis ad extimas proficuum esse, ipsa rei natura docet. cui vsui molliter vniuersum corpus perficere oportet, praesertim summo manē, singulisq; diebus: nā praeter id, qd frictio mollis ad extimas partes humores allicit, discutit etiam eorum non minimā partē. Idem quoque beneficium praestare cognoscimus aquarū dulciū balnea modicè calida, aut tepērata: quibus fortasse maiore redundantiam humorum resolutionem moliri poterimus: quæ quidē auxilia in feminis, quæ viro vtiuntur, prodesse, mihi non est dubiū: praestat ēt non paruum vacationem viti accessus. Verū in virginibus, & castis ac pudicis viduis ea sufficere non posse experientia comperimus. Quamobrem praedictis auxilijs addere oportebit ea, quæ virtutem habeant sanguinem alio trāsferendi, vt natura ab vtero dissuescat, & copia quodā modo minuat. Cumq; tū in sanguine ad vterum transmittendo semper innitatur natura ex insita sibi lege, necessum profecto erit per partes vicinas deriuationem

A uationem moliri, ne dum ad distantissimas retrahere conamur, tantum vterus suscipiat, quantum generandis alijs morbis sat sit. Quocirca in naturalibus vacuationibus suppressis, antequam in morbum aliquem degenerent, tutius, & cerius erit praesidium, per vicina deriuare: ut quod ex naturae lege ibidē trāsmittitur, per proximum regionem excernatur. Sic in huiusmodi faeminis, aut haemorrhoides excitare, aut fongiculas cruribus aperire, indubitātū extitit semper auxilium, milleq; experimentis comprobatum.

Ceterum si ex inueterata obstruptione, & ferē natua facta malum oriatur, non erit ab re praeter auxilia, quae nuper diximus, aliqua vtero adhibere ex ijs, quae obstruptionibus auferendis proficua sunt. Quod item obseruare fas est in ijs faeminis, quibus instante, aut incipiente primitus mēstruo, ex graui aliquo symptomate, aut animi pathemate in totum suppressum fuit. Quorum omniū latius meminero cap. de vteri obstruptione.

B Verū quia rarō Medicus accersitur, nisi dum à praedictis causis iā aliquod graue accidens suboritur, qualia sunt, quae frequentissimē accidere solent: necessum est nosse eadem mitigare. In qua re duo potissimum animaduertat lector; primum nullam esse aliam potiore subueniendi rationem, quam ad causae principium deuenire, eidemque semper innitendam cessante menstrua purgationis redundantia, aut vitio, protinus mala ab his proficiscentia subsident. Secundum quod licet necessum sit aliquando posthabita causa ob imminens periculum, eadem accidentia mitigare, & alijs auxilijs uti, quae longē sunt à praedictis diuersa, iuxta accidentia naturam, & varietatem: cum hoc tamē ab optima scribendi ratione alienum mihi videtur, eorum haec in parte meminisse. Praesertim cum institutum sit, vnicuique seorsum proprium caput dicare; vt paulō inferius reperies.

De ijs, quae clausa habent genitalia, & vterum.

Cap. 6.

ALIO quoq; vitio (etsi rarō) affici faeminas conspiciamus: quippe nonnullae genitalia, & os etiam vteri perforata non habent, sed omnino, aut maiori ex parte clausa: qui affectus graecis phimosis dicitur, & quae huiusmodi affectum patiuntur faeminae Attritae appellantur, etiam à Gal. lib. 3. de cau. symptom. cap. 4. Albucasis yerō lib. 2. Methodi, barbara lingua Alratice nuncupauit. Aetius autem peculiare caput huic malo dicauit, de vtero non perforato inscriptum. Quod sanē vitium cum vniuersum ferē faeminae vsum auferat, peculiarem praerequirat diligentiam, praesertim cum praeter vsus commoditatem, quam interdicit, grauissimorum morborum soboles existat. Cuius affectus natura in deprauata membri configuratione sita est, in ea specie, quae ad occlusos meatus refertur. Fateamur quidem Graeci, & Arabes omnes quotquot huius mali meminerunt, faeminas

nas tribus modis posse claudi, vno quidem in pudendialis, siue labijs: altero vero in ipso pudendi sunt: tertio denique circa vteri ipsius osculum. Sic enim inquit Auic. 2. 1. 3. tract. 1. cap. 4. Clausura est, cum per os matricis eius descendit aliquid, quod prohibet coitum ex re addita lacertosa, aut panniculosa forti, aut est illic incarnatio ab ulcere, aut creatione, aut illud quod est inter os vuluæ, aut os matricis est secundum unum, & eundem horum modorum, aut est super os matricis eius, quod prohibet impregnationem, & exitum menstruorum ex panniculo, aut incarnatione ulceris, aut quod est eis simile, aut meatus non est inuentus in creatione, ut accadat uirgini, cum incipit menstruari, ut non inueniant menstruorum meatus propter aliquam harum causarum. Ac postquam has omnes differentias adduxit, subdit præfagium, & inquit. Quare accidunt ei dolores, & ægritudo magna. Si ergo non ingenietur ei, redit sanguis, & denigratur mulier, & præfocatur, & moritur. Refert etiam paulò inferius curationem non contemnendam.

Causa.

Hoc profectò vitium, cuius parui insit, ab altera duarum causarum proficisci comperimus, aut ab exulceratione, utcumque fiat, si in eadem parte præcessit, cuius labra coaluerunt, uel callo obducto induruerunt, aut à tumore aliquo in scirrhī naturam indurato, aut carne aliqua in eadem parte superexcrecente: quibus aut partes illas coalescere, aut coniungi, & foramen, seu meatus naturalem occludi est necessum, ut ex Auicenna paulò ante retulimus. Secundo autem ex naturæ defectu, & monstruosa conformatione proficiscitur, quod aut materiæ ubertate, aut naturæ uitio in prima fœtus formatione effingitur, adnascēte prædictis partibus carnosa, uel membranosa aliqua substantia, aut factis ex toto occlusis, & citra foraminis aliquod uestigium, aut si uestigium existat, addita tamen membranosa aliqua tunica, qua uniuersum foramen protegitur. Quā quidē membranulā fert Sauonarola aliquā ex panniculo femur cooperiente fieri. Sed longe distinctius Paul. li. 6. c. 72. causas & rationem huius mali exequitur, dicens. Genitales mulierum partes clauduntur interim ex natura interim ex accessorio morbo quodam præcedente, aliàs in imò, aliàs in alis, sæpe etiam in medio spatij, idque aut secundum naturam, aut ex obstructione. Quod autem foramen intersepit intercluditque, vel caro, vel membrana est, sed specialius causas recenset libro tertio, cap. 73. Quo etiam in loco præfagium, & dignoscendi rationem adfert, ac leuem quandam curationem, quam ego etiam suo loco referam.

Dignosio.

Dignoscendi verò ratio, præter affectus notitiā, quæ manifesta est ex mensium perpetuò defectu, quo dissidere à mensium suppressione cognoscimus, & ex tumore & dolore partium pudendarum ad vterum mensuribus confluentibus, & ibidem detentis (quo à deficientibus mensibus distare scimus) non vnica est: nam primum docere oportet qualis naturæ sit causa, deinceps quo in loco ex ijs, quæ retulimus, existat. Causam igitur fuisse solutam unitatem (cuius extrema coaluerunt, aut callum contraxerunt) præcedens vulneris occasio haud obscure monstrat, veluti ictus, casus, vel ab aliqua re sciindente, cõtundente uel percussio. Tumore præter naturā, aut carnem supercrescentem facile ostendit sensus partis: necessum enim est, si quid intercidit inter ea, quæ naturalia sunt, & cõtigua esse tenentur, protinus sentiri, tanquā quid extraneum, & à natura alienum partibus super-

A superadditum. Scirrhum, & induratum tumorem cognoscere etiam, ex præcedente inflammatione, ac dolore, & ex partis duritie. Verum si natuum fuerit vitium, ex priuatione prædictorum signorum perdiscere promptè poteris: nam his deficientibus rationi consentaneum videtur, ex natua sorte vitium proficisci. At non ita facile distingues qualis sit affecta particula, videlicet, quæ illarum trium partium (quas superius retulimus) clausa sit. Quod in virginibus, & feminis, quæ viro orbatæ sunt, aliter quam per visum speculo immisso perdiscere minime poteris: in alijs tamen, quæ viro accedunt, affecta sedes facile dignoscitur, ex defectu nimirum alicuius actionum, quas, & pudendum, & uteri collum præstare habent. Præbent namq; hæ partes hos vsus, videlicet, viam ad conceptum, coitum, & sanguinis menstrui exitum: quare, ea femina, cui pudendi labra tunica intercluduntur, prædictis munijis destituta est. Nam cum coire non possit, neq; item concipere, neq; menstrua purgare. Verum si viro uti possit, cum hoc tamen menstruam purgationem non pellat, sed ocysime semen à viro ejaculatum decidat, haud leue est argumētum pudendi sinum clausum esse. Quod si in ipso uteri ostiolo femina idem vitium patiat, concipere ne utquam poterit, bene tamen menstruam suadere purgationem: quoniam, ut superius probatum est, in uirginibus, & prægnantibus menses profluere per venas, quæ in uteri collum delinunt, optime possunt. Itaque non inconuenit feminam esse clausam, & viro vti, ac menstruis probe purgari, dum in uteri ostiolo vitium præfuerit: sed concipiendo apta minime quidem erit. Atque sunt signa, quibus clausas feminas nosse, haud difficile erit, & quibus clausiōis locum distinguere promptè poterimus.

Cum propria huic affectui curandi ratio chirurgis magis quam medicis usu veniat, non est mihi in animo, in eadem plurimum immorari: sat erit medendi rationem in genere cuiq; causarum propriam docere. Si prius dixerō Paulum, lib. 6. c. 72. ad ascisionem reduxisse uniuersam eius curationem. Sed lib. 3. c. 73. specialius hæc scripsit. Loci muliebres circa ipsorum os clauduntur uel ex præcedente exulceratione, uel in scirrhum durata inflammatione. Curabuntur infessibus, qui emolliant ex hydraleo, & scenugraci decocto, consimilibusq; cataplasmatis, & pessulis. Porro inquit, Si malum inueterauerit, suffumentis, vaporibusq; ijs, qui ex aromatibus conficiuntur, utendum erit. Iam verò soluit hoc vitium, cum nil aliud sit, quam vuluæ ostioli astrictio, pessulus ex hyssopo, nitro, resina, & terebenthina. Sed ad medendi methodum iam accedo. Præcedens igitur vlcerus, cuius ratione partes callum contraxerunt, aut coaluerunt, nouare iterum oportebit, ut separatis partibus, quæ coaluerunt, adhibita deinceps maiore diligentia, antequam partes congrua cicatrice obducantur, separatè coalescant; quod fit in strumento quodam ad uirilis membri similitudinem efformato: confecto quidem ex lineis filamentis, inspersis verò puluisculis, & medicamentis, quibus inducendæ cicatricis uis insit: qualia diximus lib. 2. de Indicatione præsidiorū. Verum si callum partes vlceris contraxerint, abscindi scalpello callosam substantiam medendi ratio postulat. Deinde, eisdem medicamentis leuem cicatricem inducere, quæ nulli partis officio impedimento sit. Quod si utrius aliqua pars ex ijs, quas retulimus, in tumorem inducuerit, mollibus medicamentis rem agere primò oportebit, quibus, & tumor mollior factus, facilius per insensile halitus

ope

opere soluentium axiliorum euanescat, partiumque meatus subinde referen-
 tur, dilatenturque partes ipsæ, quantum proprijs ministerijs opus fuerit. Præ-
 mittenda tamen sunt cataplasmata, & encatismata emollientia, quæ parantur
 hydræleo, & senugræci elixatione. Cui etiam vsui deseruiunt pelli, suffitus,
 lotiones, & pleraque alia, quæ cap. de vteri scirrho, & inflammatione docebo.
 Solent etiam melicerides, & atheromata, & steatomata in ipsis partibus adna-
 sci, & prædictas clausuras ferè efficere. Quæ omnia dum cognouerimus, faci-
 le prædicta methodo curari possunt. Fæminis verò, quibus ex prima conforma-
 tione hæc vitia insunt, nullum aliud inuenies tutius, & vtilius præsidium, quàm
 scalpello tunicam, quæ foraminibus antestatur, per medium scindere. Cuius ope-
 ris rationem docuit optimè Arabis Albucasis: in cuius foramen immitti iussit
 instrumentum illud virili membro persimile, quod ibidem diu immorari per-
 misit, donec cicatrice inducta, partes non amplius coalituras cognoueris. Do-
 cent autem paulò latius huiusmodi curationem autores non pauci: nā Tbeo-
 dorus Priscianus peculiari diligentia id conatur docere. Sed diligentius ad-
 huc Moschion medicus quidam græcus. Quod etiam docuisse visus est Aetius
 libro quarto, Sermon. 4. ca. p. 96. quò poteris adire; si pluribus verbis opus ha-
 beas. Curandum quoque est in quavis causa, ne quid menstrui sanguinis, si for-
 tè in vterum decedit, cui via præ occlusionem non erat, vel pauxillum quidem
 temporis ibidem maneat: nam dum concrefcit, grauissima soler accidentia in-
 ferre. Et ob id maxima diligentia vterum abluere sequenti die ab vteri apertio-
 ne conuenient.

De mensruis per locum non naturalem erumpentibus.

Cap. 7.



VSTISSIMAM meritò, Hippocratem appellasse natu-
 ram censeo, eamque eruditam esse, quamvis nondum aliquid
 addidicerit, tatum: nam quis naturæ maiestatem, & diligen-
 tiam non mirabitur, si attento, peruigiliq; animo eius opera
 intueatur? Quæ profectò non solum in efformandis corpori-
 bus augendis reficiendisq; sedula diligentia innititur, sed
 incredibili etiam sollicitudine ea præcauet, curatq; ne quid mali, quantum
 in se est, ipsis accadat? Quod sanè opus, vt consequatur, quæ non tentat? bone
 Deus, quibus nō innititur? quæ non consequitur aduersus omnem expectatio-
 nem? Eius proculdubio dignitatis, & efficacix sunt naturæ opera, vt eandem
 meritò artem diuinam appellauerit Plato. Atqui (vt interim alia, breuitati stu-
 dens subiceam) quantam illi menstruorum purgatio curam impenderit, ad-
 miratione dignum esse arbitror. Quam si iamiam instantem cognouerit, præ-
 cauens grauissima mala, sollicitè expellere curat. Quòd si loci naturalis oblita,
 aut fortasse impedimento alio præpedita, onus excrementi persentit, citra vl-
 lam moram, locum, per quem sese ab onere liberet, querit, & qualiscunque
 sit, sibi efficit, naturalem, ei que assuescit. Ac licet ex eo fæminas steriles effi-
 ciat, præcauens maius periculum, id patienter fert. Contigisse id naturæ bene-
 ficium (ne dicam vitium) fæminis, non rarò conspiciamus: nam dum errabun-
 da onera

A da onere pressa natura menses pelleret conatur, si aut scopo aberret, aut illi naturalis locus obstaculo quouis sit denegatus: in quibusdā per nares copiosissimo saepe sanguine effuso, menses agit, in alijs verò per eos. Nec mirū profectò id esse debet, siquidem Hip. 3. apho. 32. refert. Mulieri sanguinem vomenti mēstruis erumpentibus solutio. Ex qua snia infero haud esse difficile naturam turgentem, & errabundam per consimiles regiones menstruum purgationē pelleret: quippe facile deferretur menstruus sanguis ad os, aut ab ore in vterū. Per cāuam. n. in stelechiam, & ex ea per venas Meserei, si multus sit, in duodenum, ac ieiunum, ex eis in pilorū, & per ventriculū vomitu rejicitur. Sed quod maiore infert admirationē, id sanē est, quod nos iam ter vidimus, videlicet, per minimum manns digitum, & per anularē sinistrae manus singulis mensibus sanguinē profundū, non copiosum, in religiosa quadā fēmina, cui natura menstruā purgationem per vterum denegauerat. Alteri quoq; certò accidisse scio, rubore quodā facto in altera maxillarum singulis mensibus naturam purgationem menstruā denegasse. Cognouimus et aliam, cui vnoquoq; mense sanguis licet modicus, per maiorem osculi sinistri angulum fluebat. Plures item sunt, quae per sanguinis sputum à menstrua purgatione natura immunes fecit. Ac ne videar tempus in historijs contere, certum est huiusmodi affectionem esse symptomata in genere excretorum praeter naturam consistens, idq; quatenus ad particulam à toto genere huic vacuationi alienam, pertinet. Quamobrem id vitium reuerendum est in facultatem excernentem, cuius munus in corpore est, aliena pelleret: quam porro facultatem totius corporis intelligere oportet, non vteri, etiam si huic operi dicatus à natura fuerit. Quod profectò symptoma non raro contigisse arbitror ex eiusdem facultatis robore, & prouidentia: nā cum ob ali quod vteri vitium, aut venarum, quae in ipsum desinunt, ora cæca esse natura cognouerit, gnara huius ministerij, aliam quaerit regionem, qua inuenta, incolumem tuetur fēminae sanitatem, quam alioqui ocysimè casuram cognoscit. Hanc nosse Medicus praeter omnibus tenetur distinctionē, ne fortè causam ignorans, curationem ubi opus non sit, teneret, aut eam praetermitteret, quam consequi non esset difficile. Quocirca primò nosse & diligentia distinguere oportet, an natura errans id accidens efficiat, an melioris gratia coacta id molietur: nā hoc profectò, aut impedire, aut pervertere, aut vtcunq; alterare nefas est: illud verò sensim, & leniter permutare vtile & necessarium.

C Dignosces aut, hoc an illud sit ex fēminae habitu, ex cōferentia, ex symptomatis, q̄ natura in vtroq; casu mouet: nam dum id melioris vsus gratia moliet: circa accidentia, q̄ maximā inferant molestiam, mouet; & boni habitus praest fēmina: quinimò vacuatione pmissa, si quid mali antea perpessa fuerat, libera euadit, tandem optima fruitur sanitate. Ad quod et non leuem coniecturā praestat vterum singulis mensibus quodammodo turbari, signum profectò euidēs, quo monstratur naturam vterum aggredi, vt per ipsum, menstruum excernat: quem cum impedimento aliquo ineptum perferit, deserit, & vt valens ad consuetum locum regreditur. Quod cū Medicus cognouerit, auxiliares manus adhibere non curet. At in alijs fēminis, in quibus ereans natura vitiosam hāc purgationē molitur, inquirendum est quali sint habitu praeditae, qua fruuntur sanitate, quibus praemantur accidentibus, quouetempore. Nam si valetudinaria fēmina

*per minimum
manu digi
tum et per
anularem
singulis men
sibus san
guinem po
tenter, ser
uatisse &
tatur o
item ex o
culi angulo*

Dignatio

C

mina

mina fuerit, si frequenter conqueratur, praesertim dum purgationis instattem pus, quo praetereunte leuari minimè conspicimus: nulli dubium esse arbitror, erroneam esse illarum naturæ actionem. Cuius causas inquirere deinceps oportebit, & iuxta earum rationem cuiq; curationem ascribere.

Causa.

Solet sapientissimè natura hæc vitia mouere vehementissimo aliquo animi pathemate, aut mentis turbatione, distracta, irritataue potentia, praesertim instantibus, aut fluentibus mensibus: quæ etiam occasione perturbata, & erronea quoque efficit munia. Nam quantum possint animæ passiones nemo ignorat: sunt enim qui mortem inferre posse fateantur: quod etiam malum ab externa aliqua occasione proficisci comperimus. Prodit item id vitium à uehementissimis partium superiorum doloribus, uel earundem grauissimis malis, quibus naturam euocari per easdem partes, dum superflui aliquod obtinet, mirum non est. Item, id malum saepe efficit partium superiorum imbecillitas uteri, & partium inferiorum robur, quo renuunt superflui quicquam recipere: quapropter coguntur partes supernæ, & iecur per aliam partem id expellere. Quod si per hæmorrhoides, aut per urinam naturam menstruum purget, minusve sanè uitiosum existit, ceterum conceptui obstat.

Dignotio

Primas causas dignoscere faciliè ex ijs, quæ præcesserunt, fideli à laborante accepta relatione, præcesserit ne aliqua prædictarum causarum, uelut ingens timor, aut alia mentis vehemens turbatio, uel quæuis alia externa causa, quæ ualidam in mulieris corpore turbationem efficere possit. Quod non minus causare poterit intempestiuus frigida potus, qui clausis infernis meatibus supernam regionem petere naturam cogat. Sic crurum, aut capitis lauatio instantibus mensuris, sic etiam esus, aut usus aceti. Quarum omnium nouitiam diligens medicus faciliè à fœmina accipere poterit. Quod si nihil ex his præfuerit, interrogare oportet, doluerint ne uehementer, aut diutius quondam partes superiores, aut graui aliquo malo affectæ fuerint. Quæ sanè omnia diligenter examinata præuidere oportet, & ex eis, quæ præcesserunt, uel tunc affuerint, habita certa coniectura, iuxta id, quod potissimam mali causam esse cognouerimus, medendi rationem instituire oportebit.

Cura.

Si qua in re facta diligenti prouidentia curationem aggredi oportet, in ea profectò est, in qua aduersus naturæ motum est pugnandum, etiam si motus à lege naturæ absit. Nam, & naturam cogere contrarium institutum efficere, & humorem aliud euocare, & præter naturali uacuationi disponere, magni momenti rem esse dubitabit certè nemo. Atque cum hæc sint opera, quæ necessariò Medicus exequi tenentur, ut quid utile efficere possit: necesseum proculdubio est diligenter, qd agere, aut præmittere in curatione hac opus sit, prius considerare. Quà obrem huiusmodi fœminas curandas suscipere formidandum est, nisi dum grauius periculum speratur ex accidentibus, quæ quotidie crescunt, quàm ex uiolentia in naturam illata. Erit igitur primum curandi principium redundantem sanguinem demere, eundem euocando ad imas partes, factis ex talo uacuationibus, adhibitis cucurbitulis fœmoribus, & suris, & coxis etiam, quandoq; scarificatis.

In quo profectò opere, eo tpe magis initi oportet, quo accidentalis alicuius gratia eo

Atia eo utitur: utrunq; tamen vsus præstabit sanguinis euocatio, & extractio p hæmorrhoides. Nani dum in animo est solum ad uterum euocare sanguinem, oportebit potius supernas partes quodammodo refrigerare, ac dēfarc: infimas uerò calfacere, & humectare, ac aperire. Verum quoniam illud fieri commodè nequit (nisi aut per brachiorum frigida lauacra, capitis etiam & faciei, aut per priuationem exercij earundem partium: quapropter interdicere oportet in huiusmodi fœminis cantum) tentandum quidem frequentius est frictionibus, deambulatione lauacris, balneis naturalibus, aut calidis arte paratis, inunctionibus, fomentis, infellionibus, pessarijs, clysteribus uterinis, quorum capit. de prouocatione menstruum meminero. Vnum tamen habet tanquàm peculiare præsidium hoc mali genus, nimirum, frequentium balneorum naturalium usum, eorum præcipuè, quæ sulphurea sunt; in quæ fœmina summo manè ingrediatur, ibidemque debito tempore immoretur, dummodo balnei aqua tantum uteri, & iecoris regionem pertingat; quo tempore eiusdem fœminæ superiores partes (ne calidissimo aeris balneo etiam dilatentur) flabellare, attemperareq; commoto leuiter aere oportebit. Cætera uerò, quæ hic desiderantur, reperies cap. citato, & lib. nostro de indicat. præsidiorum capit. de prouocandis suppressis fluxionibus.

De mensuris superfluis.

Cap. 8.

QVANTAM Hip. in artifice ad affectuum curationem prærequirat diligētiā, nullius eorum, qui eius scripta curiosè euoluerint, ignorabit inquit. n. lib. de Morbis (docens quæ sunt perito Medico, ne in curatione aberret, expendenda.) Primum quidem, à quibus omnes morbi hominibus fiūt, deinde uerò, qui morbi necessariò, ubi facti fuerint, aut longi sunt, aut breues, aut lethales, aut non lethales, aut aliquam corporis partem mutilent, aut non mutilent, & qui postquam orti sunt, dubij sint; an mala ab ipsis sint euentura, an bona; & à quibus morbis ad quales transitus fiant; & quæ per fortuitum successum Medici ægrotos curantes faciunt, & quæ bona, aut mala ægrotantes in morbis perpetiuntur, & quæ importunè, aut dicuntur, aut fiunt à Medico ad ægrotū, aut ab ægrotō ad Medicum, & q̄ exactè fiunt, aut dicuntur in arte, & quæ recta in ipsa, & quæ non recta, & quod ipsius principium, & finis, aut medium, aut aliud quid eius modi demonstratū; quod rectè habet, ut in ipsa sit, aut non sit; & quæ parua, & magna, & multa, & pauca; & q̄ oē in ipsa vnum est, & omnia q̄ vnum; & quæ fieri possunt, intelligereq; ac dicere, & si opus sit, neq; intelligere, neq; dicere, neq; facere; & quod facilitas in ipsa sit, & quod difficultas; & quod opportunitas, & quod intempestiuitas; & quibus alijs artibus similis sit; & de corpore quod calidum sit, aut frigidum, aut siccum, aut humidum; & quod forte, aut debile, aut densum, aut rarum, & quæ multa pauca fiunt, aut in melius, aut in peius; & qd̄ honestè, aut turpiter, aut tardè, aut citò, aut rectè, aut non rectè; & quod malum supra malum fieri necessum est. Optimum esse duxi ad verbum trāscribere.

re Hipp. dictum, ut quisque intelligat, quod sit difficile curationem quamuis aggre-
di, quando haec omnia diligenter nosse, necessarium esse aperte fatetur. Quibus
si adhuc addideris sexus differentiam, clarius proculdubio cernes tam esse dif-
ficile in foeminis curationem optime moliri, quam esse Medicum. Quippe ut Hipp.
fatetur lib. 6. Popul. par. 7. diuersi in foeminis reperiuntur morbi, & diuersa, ob
id necessaria illis est curandi ratio. Hoc sane diximus, ne quis illotis (quod auit)
manibus existimet foeminatum affectus curari posse: sed cautior, & diligentior
ex rei difficultate factus, facilius quae difficultia sunt, consequi possit.

Ad institutum igitur accedendo, optime Hipp. dixisse constat lib. 5. Aphor.
text. 57. Si menstrua plura fiunt, accidunt morbi; & si non fiunt, ex utero morbo
contingunt. Nam frequentissime conspiciamus foeminas ex fluxu mensium ad
tantam peruenire immoderantiam, ut uel pereant, uel in grauissimum aliud ma-
lum prompte affectus degeneret. Quod etiam lib. 1. de Morb. mul. Hipp. hac ver-
borum serie dixerat. Si menses plures quam oportet, prodeant, & crassiores, nimirum
corpore natura fluído, & osculo uterorum prope pudendum sito, & ad haec
multo cum uiro coitu utatur, & conuiuetur semel, aliquando multi descenden-
tes, & affatim prodeuntes os uterorum impetu suo magis dilatant; & si ad haec
non incidat vasorum euacuatio, sed rursus multus accesserit calor, & os amplius
faciunt, & corpus, utpote muliere conuiuante, & voluptatem consuetudinem-
que viri consecrante facili fluxu ad uterum etiam calor defertur, & decolor e-
rit, quandiu sic habuerit. Subdit quoque idem autor multo plura, quibus com-
prehendit vniuersam ferè huius morbi rationem. Verum quia, ut Hipp. refert,
grauis est affectio haec, & quae plures alias aspicere solet (ut etiam Moysen Ae-
gyptium particula 16. text. 18. dixisse constat) ob id necessum est, eius naturam
& causas admissim expendere.

*Affectus
menstrua.*

Est igitur menstruorum fluio, ut Gal. docet lib. 6. Popul. parte 1. com. 7. quan-
do menses plures, aut copiosiores fuerint, quam solent. Multi uerò definiunt,
esse quando ultra consuetum tempus purgationis magna copia effluxerit. Alij
autem aliter diffiniunt: nimirum, cum fluunt immodicè, & praeter modum,
peculiaris naturae, aetatis, aut uiuendi institutum, aut praeter statas periodos,
hoc est, si bis in mense repetat. Nec credendum est, adductam Hippocr. men-
suram lib. de morb. mul. omnino veram esse, & certam. Inquit enim, Men-
struam purgationem moderatam esse, quando per biduum, aut triduum ex-
cernuntur sanguinis ferè duae heminae atticae: verum hoc verum fuisse arbitror
illis temporibus quando, & victus ratio temperata seruabatur neque ita otio-
erant debita mulieres. At nostris temporibus quum plurima in illis reperia-
tur diuersitas (siquidem aliae ad quinque vel sex usque dies purgantur, aliae ad
octo etiam, & aliae copiosissime atque aliae parcius) naturarum, & consuetudi-
nis quoque diuersitatem inspicere opus erit. Sed ut rem paucis complectar, exi-
stimo cuiusque foeminae naturam, aut statum quoquo tempore fuerit, confide-
randum esse, ut ab his sumpta ratione, facile metiamur quantum sit immodicū,
quantumve modicum. Nam ea verè dicitur menstruorum redundantia, cum
purgatio naturalem modum excedit: at is modus existimandus est penes foeminae
consuetū fluxum, aut penes sanguinis conditionem, aut iuxta id, quod in abortu
excerni solet, si foemina abortierit, aut si pepererit, iuxta debitam partus naturalis
copiam.

A copiam. Quòd si medicamenti alicuius ora venarum aperientis occasione sanguis profluat, vires quoq; medicamenti extimare oportet, & quantū ipsas fluxio superauerit, tantum ipsam esse immodicam consiciendum est. Quibus etiā adiungere oportet, quod Gal. docet lib. de diff. sympt. videlicet, si prædicta vacuatio fiat ad animalis commodum, aut incommodum. Quod si vsui proficua non fuerit, immodica & inutilis existimanda est, præsertim in prægnantibus, quibus raro, aut nunquam utilis existit.

Est quoq; necessariū expendi, si cuiusnā sortis sit hæc affectio, q̄ cenſeo reducendā esse ad symptomatū genus, quod in se cōplectitur ea, q̄ immodice excernuntur. Atqui licet quibusdā (vel ex Gal. mente) visum sit, hanc solam vacuationē ex sanguinolentis non esse toto genere præter naturā, quia menstrualis purgatio ab hac lege excipitur: ego quidē existimo menstruā purgationē dū naturæ modum non excedit, excipiendā esse ab ijs excretionibus, q̄ ex sanguine factæ toto genere præter naturā dicuntur: sed qñ naturæ modum excedit, ita vt immodica fiat, mihi non est dubium, quin et toto genere præter naturam sit, quemadmodum & cæteræ oēs. Nam si loci cōmoditas, & naturæ consuetudo, ac vsus eam vacuationem, naturalem efficiant, hæc quidē non possunt immodicam sanguinis excretionē secludere, quin toto genere præter naturā sit: quæadmodum fluxus sanguinis narium, si quidem per utrāq; partem id, quod vsui naturæ necessarium erat, præ cunctis humoribus, libere excernit. Vtunque tñ sit, ab eo morborum genere profici censemus, quod in mala figura, seu partis conformatione situm est: nam ex meatuum naturalium præter naturali amplitudine vitium id proculdubio prodit, nisi ex soluta vnitæte aliqñ accidat. Itaq; necessum est, figuram retentioni sanguinis idoneam vitiatam esse in eo affectus genere, q̄ ampliores, q̄ par sit, meatus in se complectatur. Fieri aut tales meatus non vno modo contingit, sed plurimis: nam aut vasa, quibus incumbit sanguinem continere rumpuntur à re soluente, & dilaceranteve continuum, aut aperiuntur per propria foramina, & extremitates, aut exeduntur ab humorum malitia, & acrimonia. Dū verò vasa aperiuntur, si magna sint Anastomosis affectio appellatur: profluit. n. in his multum sanguinis, & confertim. Verū si parua sint, appellatur Diapedesis, in qua fertur per resudationem sanguinē proflire, sicut etiam in utroque vasorum genere contingit, proflitq; sanguis sensim & paulatim. Cum autem vasa exeduntur, Diæresis nuncupatur.

Occasionē & symptomati, & morbo plurimæ præbent causæ: quas à plerisq; *Causa.* autorū variè traditas reperies. Ego tñ eas oēs trimemari quadā diuisione hac in parte cōplectar: p̄ter causas externas, seu euidentes velut est ictus, casus immodicum exercitium, calor immodicus, vehemens animi perturbatio, balneorum inordinatus vsus, præsertim crurum, aut frequentes ligaturæ, frictionesve, vteri quoq; rhagadia, aut vlcus, vel virilis membri excedens magnitudo, laboriosus partus, aut abortus, vel ipsius vteri hæmorrhoides immodicè fluentes: quæ oīa peculiarem requirunt medicī diligentiam, & nos paulò inferiùs eorū curationem docebimus. Sunt igitur in genere, internæ causæ numero tres; quarum prima, ad vteri & corporis vires refertur: secunda, ad humorem, seu sanguinē fluentem; tertia verò, ad vterum ipsum. Prima rursus causa subdiuiditur, nam sanguis profluit ex naturæ, robore, & efficacia, quibus corpus à nocuis humo-

ribus immune reddit. Cuius meminit Gal. li. 6. de loc. aff. his verbis. Sed accidit
interdum foeminis muliebri vocatum profluuiū, vel vtero haudquaquam affe- **A**
cto, cum videlicet, vniuersum corpus per ipsum expurgatur, quemadmodum
interdum per renes quoque euacuatur. Ac docet et eadem parte, qua lege curari
debeant. Contingit item fluor ab ipsius impotentia & languore, ita ut humorē
sibi commissum continere non possit, vel hiantibus vteris, ut expresse docuit
Hip. li. 2. de morb. mul. his verbis. Si vteri praeter naturam hiant, menses plu-
res prodeunt, & viscosi, & frequenter, & genitura intus non manet. Et paulo in-
ferius subdit. Si os vterorum hiant amplius quam in mensibus solet, menses ita fiunt
plures, & deteriores omnes, & liquidiores, & per longius tempus. Patitur autē (in-
quit) haec maximē, si quid in ipsa corruptum computruerit, accompectum fue-
rit; quaedam verō et ex partu patiuntur, aliae etiam aliter. Quibus sententijs eorū
stat facultatem vterorum contentricem, cui munus est vterum corrugare, & co-
primere, languidam quandoque esse, & ob id officio continendi minime posse
fungi. Secunda quoque causa alias duas sub se complectitur, siquidem humor, aut
ut quantitate peccans, tanquam graue onus deponitur a natura (cuius mali me- **B**
minit Hip. li. 1. de morb. mul. his verbis. Quibus corpus plenum fuerit, his me-
ses plures prodeunt. Scimus non raro plerisque contingere iecore nimium san-
guinis progignente, sequi per vterum exonerante citra aliquod damnum fieri, etiam
si nimium fluat) aut ut qualitate ab eadem alienus rejicitur, velut tenuis, mor-
dax, calidus, acris, salus, puridus, venenosus, frigidior mixtione feri factus, &
alijs huius census vitijs conspurcatus. Sed tenuioris meminit. 6. pop. par. 1. tex.
6. dicens: Muliebria aquosis mulieribus plurimum notantur, cum aut non celeri-
ter eant, intumescunt, immorari. n. intelligere oportet, diu durare. Haud dissimi-
li ratione tertia causa in plures alias degenerat, nam vterus retentioni ineptus effici-
tur, quia rarus, mollis, laxus, patentiorve factus, vel asperitatem aliquā in se co-
tineas, qua nequeat undique claudere, & foramina coercere. Ad quod et causam vterū
hiantein reducere oportet saltem quatenus pertinet ad eius figuram, non ad po-
tentiam, quae in primo causarum genere sita est. Sic. n. dixit Hip. li. de natu. mul.
Si vteri praeter naturam hiant, & menses plures, quam oportet, prodeunt. Quo- **C**
etiam lib. inquit. Si laeuigati fuerint vteri, & menses plures fiunt, & deteriores,
& humidiores, ac frequentiores.

Quibus praemissis expendendum est, qua nam ratione, quaevis causarum aliquae ex
praedictis morbis efficere in utero habeat, aut ipsum in corpore succrescere. Ape-
riuntur quidem meatus, laxiores facti, aut vi aperti, aut exesi, disruptave vasorum
substantia. Laxiores porro fiunt, & imbecilla redditur contentrix facultas ex ea
distemperies, quae cum calida, & humida nimis sit, robur & firmitudinem vteri dei-
cit: quod et ex frigidityte, & nimia humiditate inundante fieri frequenter con-
tingit. Aperiuntur. n. vteri oscula vi & impetu facultatis expellentis, quae turgens
praenimio pondere irruit in parte sibi huic muneri a natura dicatam, & per co-
suetum locum in consueto more onus deponit, iuuante totius corporis firmitu-
dine, aut praestante vberissima sanguinis copia iecore: quod ita contingit esse ca-
lidum, & sanguificū, ut citra ullam legem in vteri venas sese exoneret praecauens
maiora mala. Cuius operi principium frequenter praestat sedentaria, otiosaque vita
& crapulis dedita. Exeuntur, disrumpunturve vasa remordenti, & acri, mo-
do

Ado in corpore praesit, ut est humor huius naturae in corpore genitus, modo extrinsecus occurrat, ut pessarium acre, vel quoduis medicamentum causticum, aut acre, cui insit exedendi potentia: id quod contingit ab ijs, quae disrumpendi vires habent, qualia esse creduntur, quae mox retulimus. Vitiosus item humor est, si uteri uasa non admodum à propria natura dissideant, excernitur irritata facultate praemordicatione, & acrimonia, aut ipse egreditur, quia tenuior factus sua sponte profluit non relictantibus vasorum oculis per Diapedesim in minoribus vasculis, aut per Anastomosim in eisdem, & maioribus; vel exesa parte, per quam liberè possint profluere. Vterus quoque vitiosus efficitur praelaxitate, mollietate, aut apertione ab inundante humiditate: qua quidè occasione etiam si sanguinis vitiosus non sit, sanguinem multum, & inordinate profluere haud raro contingit. Dignoscet autem, & morbum, & occasionem, si primitiuas causas primò ex relatione expendetis: quippe laboriosus partus, & abortus, ictus, calusve, aut medicamentum exedens, vel quid aliud ex ijs, quae superius retulimus signis proculdubio non egent. Pari quoque ratione vacuationem aliam ex ijs, quae ex sanguine fiunt, suppressam fuisse, femina ipsa patiens narrabit, si diligenter quaesieris.

*Dignoscitur
femina
signis.*

B Primò tamen siue interna, siue externa causa, sit disquires què morbum efficiat: nam si per Diapedesim sanguis profluat, eum sensim paulatimque instillare cõperies, ac tenuiorem, & aquosiozem, qualem ad resudationem necessarium esse oportebat. In Anastomosi verò, uberiùs prorumpit sanguis, ita ut ex copia facile distinguere possis per maiorum vasorum oscula, aut per plura ex minoribus sanguinem profluere. Cui et adiungitur sensus quidam doloris, aut levis mordicationis. Diacresim quidè cognoscet, si ex procatactica fiat causa, ex repentino copiosoque fluxu praecedentibus causis cõtinuum soluere, dilacerare, aut rumpere ualeat. Quod si ex humorum acriorum, exedentium, & mordacium erosione fiat: id euidenter constabit ex dolore fluxui adiuncto, qui levis profectò est, sed molestus. Costabit et ex sanie, ex uirulenta excretionem, & grauius olente, quae sanguini admixta profilit. Ex lentò et motu in principio, ex maiore tamen praecedente exesione, & aperto foramine. Cui accedit aliquando concretum sanguinem suppressum, ac de nouo paulo post profluere.

C Dignoscitur quoque ex labiorum, & gingivarum scissura à vaporibus inde ascendentibus facta. Sanguinis maximam copiam, & uirtutis robur monstrant conferentia, & tolerantia, & corporis ipsius cõsistentia, & habitudo. Nam uiuidior, coloratiorque reddit femina, ac praesentit ab alijs affectionibus leuamen, neque et si multus fluat sanguis, uirum iacturam degustat: quae etiam ostendit imbeus sanguis, qui profluit. Verum si ex suppressa aliqua uacuatione profiliat, res ipsa seipsam indicabit. At si iecoris robore, & sanguificandi efficacia profluat, pari quoque ratione cõferentia, & tolerantia monstrabunt: quippe hepaticam dysenteriam ex praedicta causa feminis saepe proficiuam toto iuuentutis tempore perstantem haud raro cõspeximus. Quod si uteri imbecillitate, aut nimia apertione, laxitateue sanguis profluat, feminae ipsius habitus, ac dispositio monstrabunt facile, nam, & decolor, & marcescens, fastidiosa, contracta, & imbecilla protinus reddet, ex quibus haud multò post, non leuia subsequetur mala. At si humorum uiuo hac affectio contigerit, totius corporis habitum inspicere oportet: nam similis efflorescit in cute color ijs humoribus, qui in corpore uagantur. Item excrementa, & sanguinem ipsum inspicere oportet, nam & color, & calor, frigidaque cõsistentia, odor, substantia, & ea, quae sibi admixta

C 4 sanguis

sanguis deuehit, facile cuius humoris redūdātia sublit, monstrabūt. Et cuius sen A
 seris prēdominium, eum iudicabis cām fluxui prēstare: nā si sanguinem linteo
 exceptum inspexeris, discēs in medio rubram apparere maculam, & in circui-
 tu eius humores qui redundant notos esse. Hoc tamen vnum velim animaduer-
 ti, quod si humor vt acris, & mordax irritata natura pellitur, citra dolorem, &
 molestiam circa lumbos, & vterum, aut pudendum ipsū expelli usquam po-
 terit. Si verō solum ut quid alienum, & inutile natura reiiciat, citra molestiam
 subsequetur fluxus. Præterq̃ quod à rebus leduntur adstringētibus, & si fluxio
 supprimatur venter intumescit, quasi in vtero habeat mulier, & membra fiunt
 laxa, & mollia, & fœmina velut deiecta, & mille effectiōibus plena. Reperies
 etiam legem, & rationem cognoscendi idem cuiusq̃ humoris in nostra metho-
 do, q̃ gratia dignoscendorum affectuum conscripsimus. Quod si vlcus mali cau-
 sam præstiterit, cognosces id ex pure, ex sanie, ex fœtore, ex dolore, & alijs ēt,
 quæ vlcus ostendere nata sunt. Atq; cum medendi rationem non nihil euariet
 sanguinis fluor per ceruicis uteri uenas, aut eiusdem membri internas: ob id no-
 scendi rationem docere quoq; decreui. Quam sanē distinctionem nosces, eo q̃ B
 si ex uteri penitioribus partibus prodeat, sanguis prosilit niger graueolentior,
 & grumosior; ex ceruice verō rubicundior, & fluidior, & mali quoq; odoris, li-
 cēt non quantum ex abditiori loco.

*Præsa-
gium.*

Sperabis ab hoc affectu, nisi diligenter præcaueris, grauissima, & irreparabi-
 lia mala: nam succedunt huic fluxu morbi, & sunt tabes ab exsiccatione, hydro-
 pos ex frigidityte. Quæ mala præter Hipp. retulit etiam Gale. lib. quinto de lo-
 cis pa. & 3. Aphor. 57. quibus etiam addidit, & vitiatam coctionem, & inappe-
 tentiam, syncopin, & fœdum colorem. Veretur quidem Gale. fluxuum præfer-
 tim ex vtero consuetudinem adeo, vt id ex toto præcauerē lib. 4. de locis affe. cō-
 sulat; quod quicūq; fluxus firmatus plurium morborum causa sit: nam vtraq; il-
 lius immoderantia dum perstat, grauis est, & periculosa, siue plurimum, seu pa-
 rum effundatur; consueta quippe in totum supprimi per difficile est. Itaque ex
 hac in modica vacuatione corpus frigidius, siccus, & mille accidentibus vexa-
 tum sapissime euadit. Quod si per Solis aut Lunæ eclipsim menses profluant, ra-
 rō curationem admittunt, teste Apuleio Platonico, quia oscula uasorum occal-
 luisse iam constat. Cum hoc tamen credendum est, minus hæc omnia accidere, C
 quam in hæmorrhoidum fluore.

*Cura-
ratio.*

Nec temerē quemuis fluxum supprimere oportet, sed primò huic negotio le-
 gem exquires aptam lib. 1. nostro de Auxiliorum Indicatione. Sed interim eos
 fluxus ex ijs, quos retulimus compescere teneris, qui aut à procacatrica orien-
 tur causa, aut ab humorum vitio, aut vteri morbo aliquo, vel eiusdem impoten-
 tia, aut magnitudinem, dispendij uitalis spiritus minantur: ceterum non pari le-
 ge, aut diligentia. Nā qui ex abortu, aut partu supersunt, peculiare prærequirūt
 sistendi rōnem, q̃ sanē reperies proprijs. c. de Partu aut Abortu laboriosis. Qui
 verō prodeunt icu, casu, aut medicamento, exedenti, uel calore, aut frigore im-
 moderatis, uel alia cā, q̃ rumpendi vel dilacerandi venarum ora uires obtineat,
 ocysime supprimendus est; nulla alia facta diligentia, q̃ sanguine misso ex bra-
 chio, q̃ tum fat sit reuulsioni efficiendæ: à qua ijs, quæ astringuntur, aut aggluti-
 nant, vtere, iuxta partis disruptæ situm, & naturam; frictionibus ēt, ac ligaturis
 super-

A supernis partibus factis, victu quoque parcissimo, ac quiete imperatis. Verum si aut ex iecoris vbertate, vel sanguinis maxima copia sanguis fluat, cauendum est, ne natura, legitimum morum præpediamus, sed parcissimo refrigeratque victu præmissio, totum negotium est naturæ committendum, ni timueris ex vberissima vacuatione maiorem spirituum resolutionem, quam par est, subsequituram. Quo quidem tpe ne immodico impetu natura ruat, sanguinem mittere, & utcumque immodicam copiam imminuere; necessum erit, perspectis semper viribus, ne labantur adeo, ut vacuationem deinceps perferre non possint; sic. n. omni arte sanguinem minues, & habitum dissipabis, cauens ne balneis utaris, quamuis autores consulant, suspecti. n. in hac affectione ne mihi videntur. Quod si aut vteri laxitate impotentiaue, aut humorum aliena qualitate sanguis immodicè fluat, maturo opus est consilio, ne plus minusve comprimās, quam rei natura exposcere videatur. Quapropter cuiusque harum partium seorsum meminisse oportet, ut res magis innotescat. Huius autem fluxionis curationem orditer Hipp. lib. I. de Morbo. mul. inordinatè, sed cum hoc remedia aliqua consulit non omnino contemnenda: quæ si quis expendat, frugis esse comperiet. Sed ad curandi methodum me confero. Quare diligenter legat illud caput, qui in hunc locum inciderit.

B Si verò ex feruido, & æstuante sanguine fluxus concitetur, primò uictum institues refrigerantem, qualis ex pullorum carnibus assis parari solet, aut elixis lactuca, scariola, cucurbita, & agresta: quibus etiam in cœna uti erit necessum, citra carnis usum, cuius vice amygdalato, aut amylo uti poteris. Potus sit aqua chalybeata, aut ordeo decocta, vel mastiche suffumigata. Exercitium omnino interdicitur. Somnus sit moderatissimus. Aer maiori ex parte ad frigidum verges. Quo quidem in affectu vsui erit proficuum bis, semelue sanguinem extrahere ex basilica, aut saluatela dextræ manus, præsertim per frequentia interualla, & paulatim, ut minori virium dispendio distractio fluentis sanguinis fiat. Prodest quoque cucurbita iecori, & aliquando spleni affixa, qua maior fiat ad superna reuulsio. Serapijs etiam, & apozematis frigidis utendum est. Cui negotio utilitatem præstat syrupus granatorum, rosarum, acetosæ, rosarum siccarum, borraginis, & papaueris cum aquis plantaginis, capitum rosarum, uel acetosæ. Quæ ite præstat usum aqua chalybeata, aut ex eisdem herbis decocta, uel mastiche suffumigata. Poteris et in femina boni habitus, & mediocris roboris, frigida potum porrigere, aut dilatoribus syrupis solito frigidioribus uti. Quod si diu his præmissis affectus persistit, coniectandum profecto est, feruorè, & calorè sanguinis tueri biliosum aliquem humorem, quæ fieri ex diuturna sanguinis effervescentia, credibile est, et si à principio non apparuerit. Quæ protinus rhabarbaro infuso, aut myrobolanis cum aqua borraginis, aut plantaginis purgabis, uel cassia cum modico rhabarbaro, aut syrupo ex infusionibus rosarum rubearum cum prædicto rhabarbaro. A purgatione tamen porriges hordei decoctum cum saccharo, aut aquam chalybeatam cum saccharo rosaceo. In quo sanè casu, raro purgatione est utendum, & per maiora interualla: nam tenues humores facile ad maiorem feruorè excitantur. Partes uerò circa uterum, neque utrum ipsum, villo medicamento tractandas esse arbitror, ne quod feruidum est, ui astringentium ibidem præter naturam institutum immoretur, & grauioris affectionis causa existat. Corpori. n. & sanguini solum prouidendum est, non uis per quas fluxio sit. Hoc tamen unum in hu-

in huius mali curatione prouidere oportet, uidelicet, ne eximata parti prope
 A uterum frigida auxilia frequenter adhibeantur: nam sapissimè maiorem solent
 concitare fluxionem. Argumento sunt menstruantēs feminæ, quibus in subu-
 culis, quas recentes, & mundas induunt, vberior sanguinis copia prorumpit:
 quippe illis protinus fluūt denudò menses, etiam si cessasse videantur. Quocirca
 & in hoc casu, & in plerisq; similibus, id obseruare plurimum oportet. Quod
 et de ijs, quæ frigida toti corpori ex multorum consilio adhibentur, intelligi p-
 cipue velim: nam hæc sunt, quæ facta in uterum reuulsione, maiorem concitāt
 fluxum; illa uerò, quæ prope uterum compressis humoribus, tumorem efficiūt.
 Quod si ex seroso, tenui, fluxili, & aquoso sanguine affectus concitetur, curabis
 diligenter exquirere sit ne ob iecoris languidam potentiam, an q̄ sanguis non
 satis expurgatus sit à renibus. Et reducto prius iecoris temperamento, in me-
 lius, aut renibus deobstruētis, uel purgatis ea lege quam nos docuimus lib. de
 præsidiis. Indic. c. de sistendis fluxionibus, & lib. 2. ca. de aperientibus, quo facto;
 quia in hoc affectu (adiuncta sæpe est Anastomosis, aut Diapedesis, crassius quo
 dammodo porriges alimentum, optimæ tñ substantiæ, ut est gallinarum caro cu
 B niculi, perdicum, arietis, & uituli. Profunt quoq; gallinarum, aut caponum he-
 pata, & extremitates, præsertim in cœna, amyllum, & oua sordilia, & quæ consi-
 milem obtinent naturam. Potus is optimus est, quæ in prædicta causa diximus:
 vinum tñ interdices omnino, nisi humor pituitosa, aquosa, frigida ve exutērit
 naturæ, aut vires defectæ: quo tpe vinum ipsum nigrum, & astringens proficiū
 est, præsertim si chalybeatum sit, & prædictis aquis summè dilutum. Parcior tñ,
 & moderatior potus is indulgēdius est, ne aquosior factus sanguis vberius fluat.
 Nec alienum est ab affectionis natura, aquam mastiche suffumigare, aut leuiter
 incoquere, aut infundere, aut aquam pluuialem porrigere. Sic etiam affectis
 longiorem consules somnium, moderatum exercitium per interualla quidem
 finaliter nullum. Frequentiores per uniuersum corpus imperabis frictions, &
 ligaturas. In qua sanè re Paulus, & Aetius consulunt, eas femoribus esse adhi-
 bendas: quas omnino timere iubeo, nam promptius menses euocare habent, q̄
 sistere. Quarum loco, Hipp. consil. 5. Aphorismo. 50. vtendum est, nimirum, cu-
 curbitas mammarum radicibus affigere: quæ si non profuerint, proderit saltem
 C fluxum sanguinis narium excitare. Quod vī rationi esse consonum, & ab Hip-
 etiam non alienum. Aerem quoq; huiusmodi feminæ semper habitent tempe-
 ratum, ut corpus, & humores ad mediocritatē facile perducas. In quibus raro,
 aut nunquam sanguinem detrahes nisi per cucurbitarū scarificationes sub alis,
 & in scapulis, quæ serosos humores euocant, & rursus (vt experientia docuit)
 efficacius diuertunt: quod est et Aetij consiliū. Deniq; vtendum est omni diuer-
 sionis genere, p̄terq̄ in femoribus, ut Auic. consulit fen. 2. tract. 3. lect. 3. Licet
 ipse consulat ibidē cucurbitulas apponere in loco, qui est inter vtrasq; (ut eius
 verbis vtar) anchas. Quod sanè consilium non est oīno aspernandum. Purgare
 aut in hoc affectu contracto ex prædictis humoribus, frequentius ex usu esse cō-
 perimus: nam cum tota ratio fluxus dependeat ex tenuis; & serosi humoris mi-
 scella cū sanguine, ex usu tibi erit eūdē ab huiusmodi uitio expurgare; q̄ postea natu-
 ralis factus, ipse sua spē subsidet. Quos q̄ de humores nullo alio medicamento
 securi, & cōmodius purgari cēseo, q̄ frequētū rhabbari vfu, aut diluto, aut in
 puluerem

A puluerem redacto, aut leuiter torrefacto cum corticibus myrobalanorum, & modico agarico; quem aqua lactis dilues, aut saccharo rosaceo admiscebis. Verum si facta per debita interualla purgatione, adhuc fluxio non quieuerit; iterum ad ea, quae diuertendi vires habent, te conferes: inter quae potissimum est remedium, saepius ante prandium uomitum ciere, ceterum vomendum non est, sed solum id tentandum. Sic etiam non minus diuertunt sudores, quos mouere consulit Auicenna cum decocto asari, apij, & rubear. Ego autem cum radice Chiriae tutilis eos moueri existimo. Vtunque tamen sit, caute id efficere oportet, & per interualla.

Cum autem huiusmodi humores comitem ut plurimum sibi habeant Diapedesim, aut Anastomosim praemissis quae mox diximus; quorum vis est humores alio transferre, aut minuere: omni arte curandum est uenarum oscula recludere, & humores crassiores, motuique ineptiores reddere. Fit hoc per epota, per deuorata, per apposita utero, aut vicinis partibus, aut per ea, quae in ipsum immissa idem beneficium praestant. Quae potius sumpta prosunt, varia sane reperies: eligam tamen ex eis, quae mihi selectiora, & vsui utiliora esse videntur. Vtuntur quidem fere omnes Medici in hoc affectu, posca (iudicio nostro) licentiosius quam par sit: quippe cum particula, quae in hoc affectu praecipue efficitur vterus sit, isque membranosus, nervosus, & omnino aceto inimicus existat, facile constat id citra damnum fieri nequaquam posse; etiam si aceti potum consulerit Auicenna li. 3. Fen. 21. Tract. 3. cap. 4. Ratio desumpta censeo, & mihi semper pertimescendum visum fuit. Quamobrem nisi in biliosissimis feminis, & in ijs, quae nullam ex aceto perferunt noxam, hoc ego praesidio libenter non utetur, si quidem ad manum semper est quo vi possis, praemissis, ante omne auxilium, quae modice siccant, quemadmodum Haliabas consuluit; etsi mihi magis arrideat haec eadem alijs admiscere. Sunt autem haec, cuminum torrefactum, spica, squinantum, thus, & similia. Verum in principio per se, aut praedictis admixta, praebere ex vsu est decoctum ex aqua chalybeata, aut pluuiali, confectum ex poligono, leuistico, myrto, pyro, pruno, ulmo, quercu, rubo, aut ex fructibus omnium: ex radicibus etiam nymphaeae, symphiti maioris virentis, aut exsiccati. quibus addere poteris santhalam omnis generis, malichorium, balaustrum, rosas, flores cydoniarum, aut cydonia, pyra acerba, & austera, dactylos, nuces cupressi, gallam immaturam, glandes cum cauliculis, rhu, riles, oxyacantham, vitam omphacitidem, semen vuarum, & plantaginem siccam. Ex quibus pro feminae conditione, & promptitudine ad ea quae offeruntur, facile eligere poteris quae utiliora, & gustui gratiora sint. Verum utunque decoctum confeceris, adde saporis, & utilitatis gratia, ex syrups eundem usum praestantibus, quem volueris. Sunt autem hi, syrupus myrtilorum, de rosis siccis, de cydonijs, cum alijs, quos ex succis praedictorum simplicium cum saccharo facile conficies; si diligenter rem tractare voles. Quibus sane addere non nihil poteris ex puluere margaritarum, ex bolo armeno, terra sigillata, cornu cerui, santhali, mastiche, thure, tragacantho, gummi, succino, lapide hematites, corallo, coagulo leporis, hedii, vel cerui, & cunctis vltis, & ex arboribus, aut fructibus supradictis etiam aliquid. Quippe ob id vberiore silua scripsit, ut facile ubique possis parare, ac ne tibi usquam materiae huic rei necessaria desit. Praeter quae omnia, consulit Auicenna loco paulo super-

superius citato, potū lactis porrigere, in quo vel infundat scoria ferri, vel ferrū ignitū sæpius extingatur. Quod et Rasiū & Arabes alij consuluissē videntur. Cauendum tñ est ab hoc præsidio, vbi humoris vitiosi aliquid redundare cognouerimus, vel malignam febrem subesse. Portiones verò, quas huic vsui probatas apud probatos autores reperio, scribere non recusaui, & eas etiam, quas fidissima obseruatione proficuas habeo. Prima sanè recipit boli armeni 3.ij. coquito in aqua chalybeata, & facta colatura, laboranti porrige 3.ij. Secunda recipit scoriæ ferri crematæ, & in aceto extinctæ, & subtiliter puluerizatæ, lapidis hæmatitæ triti. ana. 3. s. Syrupi myrtillorū, & rosarum. ana. 3. s. aquæ plantaginis 3.ij. fiat potio. Tertia recipit trochiscorum de carabe. 3.ij. dissoluatur in modico vino, & copiosa aqua plantaginis, ac potui detur. Sed præter hæc, & alia nō pauca, quæ passim reperies, probatū præsidium est. 3.ij. gummi Arabici, aqua plantaginis dissoluere, & additis guttulis vini austeri potui præbere. Est quoque peculiare præsidium, puluis, qui ex corticibus radicū mori conficitur, cum astringenti vino, aut aqua chalybeata exhibitus. Verū licet hæc omnia, & pleraq; alia quæ breuitati consulens præmitto, sint suapte natura huic malo proficua: non sunt oībus sceminis æquē gustui grata; quod non solet esse minoris momēti in mulieribus curandis, quā quoduis aliud consilium. Ob id profecto vsui esse vtilius, & gustui gratius censui semper, & experimento confirmatum reperi, ex prædictis decoctis, ex succis (qui prælo exprimi facillē possunt, & simplicibus, quæ nuper retulimus) ex potionibus, & ex oīum ferè astringentium sylua stillatitiis aquas depromere, quibus auxilium promptius exequimur citra vetriculi, aut partis alterius offendiculum. Quapropter tanquam peculiare subsidio huiusmodi stillatitijs aquis vti consulo, q̄ & citius permeant, & promptius sese in uniuersum corpus, & humores inserunt, & insinuant. Ego autem tāquā præstantissimum auxilium maximè probo stillatitiū hunc liquorem: quem sic extrahere poteris. Confice panem ex farina hordei, orizæ, & ex amylo, quē probè confectum ac recenter coctū projice in libris septē aquæ chalybeatæ, quibus adde rosarum rubearum siccarum. p.ij. succi plantaginis lib. i. consolidæ maioris virentis, & conquassatæ. 3.ij. caudæ equinæ. m. j. carnis pyrorum agrestium, & citoniorum. an. 3.ij. portulacæ. m.ij. boli Armentū. 3.ij. balauftiarum, & santholorum omnium. ana. 3. s. Quæ omnia per alembicum instillantur, & in stillationis sume. 3.ij. & s. cui adde syrupi portulacæ, aut rosarum. 3. s. & laboranti summo mane porrigē.

*Qua de-
morantur.*

Facessit frequenter tñ negotium hæc sanguinis fluxio, ut nō solum quæ possumus, sed quæ non possumus laborantes, & assistentes expostulent. Quapropter si quæ potant non prosunt, uti quoq; ijs, quæ deuorantur, frequenter cogimur: quæ sanè non indistinctè, & vtcunque administrabis, sed cum maiore dāni partem in maiori humorum parte, ac in iecore ipso, & partibus prope ipsum existere, compertum sit. In quibus necessarium est diu immorari medicamentum, si aliquid est effecturum. Sunt quidem huic vsui non pauca medicamenta, eligam tñ quæ mihi probatiora videntur. Primum sanè conficere poteris ex saccharo rosaceo uetustiori, quem iterum dissolues in aqua plantaginis cū bolo Armeno, aut margaritis præparatis, vel puluere succini, aut corallorum, & bolum conficies. Itē ex eadem conferua conditum parabis hac forma. Recip. confer-

A conferuæ virentis, rosarum. ʒ. ij. seminis plantaginis. ʒ. ij. coralli rubei, pulueris corallina. an. ʒ. j. lapidis hamatites, & gummi Arabici, an. ʒ. f. misce, & fiat cōditum, cum frustulis auri: scoria item ferri tenuissimè trita, & aqua rosarū unius diei spatio macerata, igne deinde siccata, pondere ʒ. j. exhibita, sterilibus, aut religiosis mire opitulatur. Confert aliud medicamentum, qđ recipit ouorum recentū adustorum, thuris, mastichis an. ʒ. j. margaritarum, coralli rubri preparati, carabe, an. ʒ. ij. lapidis hamatitæ, & smaragdi preparati. an. ʒ. f. farina ordei sine furfuro. p. ij. albumina quatuor ouorū, aquæ chalybeate qđ sufficiat, vt fiant duo panes, donec in puluerem possint redigi: cuius pulueris porrigere poteris vsq; ad ʒ. f. Parabis et aliud, quod recipit carnis citoniorum vino rubro decoctæ. ʒ. iij. pulueris spodij, sanguinis draconis, cornu cerui vsti, thuris, acacia, & gummi tragacanthi. an. ʒ. f. lapidis hamatitæ preparati. ʒ. f. misce, & summo mane porriges vsq; ad ʒ. ij. ac mox succi polygoni. ʒ. f. aquæ pluuiialis. ʒ. j. Nec sunt etiā minoris momētū trochisci de carabe, de spodio, de terra lemnia, & alia etiā, quæ superius retulimus. Ego tñ dum humores sunt scorsi, & plurimum tenues, præmissis quæ sanguinem ab eorum spurcitiā vindicent, conditum hoc conficere, quod recipit, Pelliculorum interiorum, quæ adherent nucleis anellanarū siluestrium. ʒ. ij. terræ sigillatæ, trochiscorum de carabe, pulueris leporis vsti, & conchularum vstarum, thuris, mastichis, an. ʒ. f. succi mille folij. q. f. vt fiant pillule, quarum tres numero mane adhibeto. Quod si succum mille folij cum saccharo adhibueris, non minùs prodesse poteris, quam præstito quouis præstantissimo auxilio. Idē facit succus radicis philipendulæ, aut caro eiusdem radicis, pondere. ʒ. j. Sed inter omnia auxilia id tibi fidissimum reperies, adhuc in desperatis sanguinis fluxionibus nimirum. ʒ. j. pulueris corticis radicis mori singulis diebus vetriculo ieiuno cum vino nigro epota. Item puluis ex corticibus granatorum acrium, & ex auribus leporis combustis cum saccharo. Sunt et quæ coagulum leporis proficuum alioqui auxilium, porrigunt, quo tamen consulo ne vtaris, nisi prius correxeris absynthio, mentha, aut myrtho: nam alioqui plus damni inferes. Inter hæc autem medicamenta ex vsu esse solent narcotica, quæ non vtunque, & in cautè administrabis, sed cum plurimum necessitas præpollet, & alia non profecere. Inter ea verò quæ sumuntur, confert requies, magna, deinde athanasia, demum philonium maius, aut romanum, nisi facultas imbecilla extiterit: quorum vsum eo tempore proculdubio interdices.

Cum præter sanguinis vitium et ex vteri anastomosi, aut diapedefi sanguis profluit, non sat est, quæ hucusque diximus administrare, ni peculiarem vteri pui dentia habeamus ijs, quæ uenarum oscula, & poros recludere possint. Nam frequenter cōtingit, etiamsi sanguinis uitium arte, & diligētia compescuerimus, impetu delationis, & loci comoditate, & nimia apertione, crassū adhuc, & naturale sanguinē profluere. Atque etiamsi pessarijs, & multis alijs ingenijs medicorum nonnulli hoc vitium corrigere nitantur, ego tamen, innitēs decretis prisco rum in hac re, parū pessarijs fiderem, mō ab vteri ceruice, modò ab vtero ipso sanguis profluat: vis. n. pessariorum alstringens, rarò ad aperta vasorum oscula peruenire poterit. Quamobrè per vterina clysteria, ac per suffitus hoc uitium corrigere hac in parte conabor. Cum hoc tñ, quia alijs etiā præmissis, pessaria, aliquid cōducere possunt, melioris, & copiosioris doctrinæ gratia nō erit ab re

ex ijs

Quæ in
uterum
infun-
duntur.

ex ijs quæ superius diximus pessaria cōficere. Immittere primo in uterum per A
metranchitā (uterinum appellatum clystere) poteris uinum dulce cum cortice
maligranati decoctum, succum et sanguinariæ, plantaginis, consolidæ maioris
aut aliquid ex supra dictis decoctis cū pulueribus boli armeni, sanguinis dra-
conis, & aliorū, q̄ mox retulimus. Succum quoq; stercoreis asinini, & sumptum
& in vterum immissum plurimum prodesse fertur. Cui consimilem uirtutem
præstat succus burse pastoris deuoratus, aut in uterū iniectus. Maiori uerò effi-
cacia (ut ex Gal. lib. experimentorum constat) sanguinem sistit, si in uterum in-
fundas hoc præsidium, quod recipit, mucilaginis ex gummi Arabico, & tragacā-
tho cum aqua plantaginis. ʒ. iij. succi plantaginis. ʒ. ij. cuius et partē potui p̄be-
re poteris. Sed inter alia pleraq; quæ in uterū immitti possunt, unum mihi ha-
beo peculiare subsidium, quod recipit, succi polygoni. ʒ. iij. mucilaginis gummi
cōis extractæ in prædicto succo quantum sufficiat, ut citra impedimentum in-
fundi possit, aquæ capitum rosarū sapius chalybeatæ. ʒ. iij. amyli. ʒ. j. misce & in-
funde. Ad ea et quæ in uterum immitti possunt, reduces faciliè suffragia, quæ B
mille modis parare poteris. Caterum quæ magis probo, conficiuntur ex masti-
che, pice, thure, ladano, ranis cōbustis, ungula mulæ, ungula odorata, coriario-
rum segmentis, galis per infundibulum euaporantibus, rosis, uuarum passariū
acinis, & ex alijs, quæ haud faciliè his similia inuenies. Ferunt etiam nō medio-
eris autoritatis uiri, saluæ suffitum menses immoderatè fluentes, & oē mulie-
bre profluium sisti, licet bibita, & apposta ipsos euocet.

*Vt ad
momen-
da.*

Vnguenta quoq; cerata, & emplastra huic usui non parum proficua parari
solent, q̄n cætera auxilia mali uehementiam frenare nequeunt: dummodo eis,
si frigida fuerint, plurimum non innitaris, nisi calidorū aliquid permiscueris,
p̄ interualla quidē, ac repetito exhibita. Primò itaq; id conficies, & uteri regio-
ni parti sui anticē, & posticē applicabis, quod paratur ex porci stercore additis
pulueribus rosarū, & farina uolatili, donec ad formam cataplasmatidis reduce-
ris. Aliud aut conficitur ex oleo myrrhæ, nenupharis, citoniorum, an. ʒ. ij. succi
plantaginis, linguae passariæ, & caudæ aquinæ: an. ʒ. j. coquantur ad consum-
ptionē succorū, quibus adde coralli rubei, seminis plantaginis, myrtillorū, ce-
rusæ, boli armeni, & pulueri concularū, q̄ portantur ex B. Iacobi ad e, an. ʒ. ij. ce-
re. q. s. ut fieri possit unguentum. Aliud pubi, & luminis apponendū, recipit ex
citinis, ex gala, hypocistide, bolo armeno, stercore caprino, an partes æquales:
ex colla, q̄ fit ex pellib. bouis dissoluta in posca. ʒ. j. olei citoniorū, & myrtillo-
rū, ana. ʒ. j. & s. lento igne fiat emplastrū molle. Poteris et aliud conficere cata-
plasma ex uitellis ouorū cōquassatis, ex gypso, puluerib. thuris, mastichis, aca-
tiæ balaustiorū quantum sit satis, ut efformet cataplasma. Nec minoris momenti
est emplastrū, quod conficitur ex carne citoniorū, & pyrurum agrestium, quæ
uino rubro austero satis ferbuerit cum pulueribus p̄dictarū conchularū, cor-
nu cerui usti, boli armeni, gummi arabici, & farina oryzae. Verum quia sepe
malū eo miseriæ deuenire solet, ut ne maiora quidē prodesse uideantur, nō est
ab re alio uti præsidio, in quo maior insit cōprimendi efficacia: hoc aut recipit,
boli armeni, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, an. ʒ. ij. thuris, mastichis, myrrhæ,
an. ʒ. j. pilorum leporis combustorum. ʒ. ij. acaciæ, hypocistidos, ana ʒ. i. seminis
acetosæ, seminis plantaginis, seminis portulacæ, citoniorum, ana ʒ. j. i. quibus
adde

A adde omphacini, & succi plantaginis. an. ʒ. vj. bulliant lento igne ad succi cōsumptionem, ac mox adde cerā quod sufficiat, vt fiat cerotum. Huic quoque præfidiū generi reduci facile possunt encathisinata seu infusus, quæ parati faci-
lia sunt, aliquo ex supradictis decoctis, aut succis leuiter calfactis. Atq; hæc de Anastomosi seu Diapedesi ex tenui, & fluxili humore procedēte, dixisse sit satis.

Necesse proculdubio est in hac curatione interim dum hæc administratur, per interualla, & statas periodos corpori, & humorū motui prouidere, partim purgationibus repetitis, partim frequentibus distractionibus, ea lege, quam in prima huius capituli parte adduximus: quorum etiam medicamentorum meminisse hac in parte, utilissimum fore censeo. Verū si flaua bilis, quæ præ nimio calore, atque mediocri acrimonia, quæ naturam ad motum excitare habeat fluxus concitetur iuuante vasorum raritate, & anastomosi, prouidendum, statim est, post victus institutionem, quæ nimis frigida non sit, ne ventriculus, & cetera viscera, quæ ocysimè affici in hoc affectu, ac labefactari solent, frigiditate nimia ledantur: ob id moderatione vtendum est, & aliquando ad frigidum inclinandum, subsistendum tamen. Aerem frigidiorē reddere oportet, somnum conciliare omni arte, quietem, & animi etiam tranquillitatem. A quibus quā celerrimè flauā bilem purgare oportet, & vniuersum sanguinis impetum alio transferre, ac bilis ipsius calorem, & acrimoniam compescere, crassioresq; & motui ineptiores reddere, & meatus angustiores, & fluxui minis paratos efficere. Purgabis verò flauam bilem (accepta prius leui occasione attemperandi eius calorem, & acrimoniam syrupo rosaceo, borraginis, acetosæ; de agresta, & similibus) infuso rhabbari, decoctione tamarindorum cum corticibus myrobalanorum, & syrupo solutino rosarum; idque non semel, sed bis debito interposito spatio, ea lege, quam superius adduximus, ne eadem sepius repetere videar. Quibus præmissis vacationibus, aut inter vnam, & aliam qd rectius esse arbitror, ex altera, aut vtraque saluatela sanguinem detrahes, pensatis tñ prius laborantis femina natura & habitu. Quo facto ex re erit, per interualla pulueris rhabbari. ʒ. iij. cum saccharo rosaceo, mane, bis, terve citra diurnū intermissionem præbere: quod esse præstantissimum auxilium frequenti experimento constat, & vacuandæ flauæ bilis nō nihil gratia, & causa comprimēdi, roborandive partes internas, & viscera oia, ne promptè sanguinem defluere permittant. Quo sanè auxilio iterato, interpositis aliquibus diebus, vti erit necessum, si rem ex voto cedere desideras. Quatenus verò ad sanguinis diuersionē pertinet, eisdem poteris ingenijs uti, quæ in præcedenti causa didicisti, hoc uno addito, quod si diu fluxus perstiterit, deriuationis gratia hæmorrhoides hirudinibus aperire erit proficuum. Nam coniectabile est, sæculenti etiam sanguinis aliquid superesse, quod alterius mali principium præster, & præexistēti robur addat. Verū præcipuè hoc præsidio vti oportebit deriuationis gratia, & vterotero fluxu excitato, facile præexistens subsistat.

At fluentē flauam bilem, & motos etiam ad vterum humores frenare nō erit difficile, si quis exactè expendērit, qualia medicamēta huic vsui pficua existāt: non enim quouis astringentium indiscriminatim vti poteris, sed solum eo, quod cum hoc qd astringat, refrigeret quoque, & attemperet, admixtis etiam alijs, qd leniendi, & acrimoniam, ac mordacitatem obtundēdi vires habeant, ne flauabile
intem-

*Humo-
rū & cor-
poris pro-
uidētia
De fla-
uabile.*

*Quæ epo-
sa flauā
bilem fra-
nent.*

intempestiuè impedita, ac detenta, maius facessat malum. Quamobrem potui
 datam proficiam esse censeo stillatitiam aquam, in qua hamatites confricetur,
 donec ipsa aqua rubescat: lac etiam asinae, cremor eondri, aut ptisanæ, syrupus
 de agresta, & rosarum uiridium, ac fliccarum; syrupus borraginis, buglossæ, de
 succo acetosæ, de papauere, cum decoctis ordeï, plantaginis, lactucæ, solani, si-
 deritis, poligoni, simphiti, rosarum, papaueris, aut cū aqua, q̄ pluries extinxerit
 ignitū aurū: ex quibus, & alijs eiusdē naturæ, stilloticas aquas cōficere poteris,
 & varias parare potus differentias. Quæ sanè auxiliij forma frequētius vti in hoc
 affectu necessum est, potius q̄ solida, aut ex fliccis pulueribus confecta: reuēt. n.
 hæc, & fortasse exacerbabitur magis id genus medicamentis natura peccantis
 humoris, etiam si dum fluxus indicatio vrgentior est, ea, q̄ ab humore p̄stat in-
 dicatione, necessum sit aliquid eorum medicamentorum, q̄ superius retulimus
 his potibus admiscere. Quæ omnia frigida adhibenda sunt: nā, & frigida potus
 proficius etiam est, quippe qui solus hemorrhagiā omnem sistere habet. Qui-
 bus et potationibus addere poteris (dum prædicta indicatio præualuerit) aliqd
 quod uorando ingeratur, & eundem vsum præstet, uelut est opiātum, qd̄ reci-
 pit, confervæ rosarum antiquæ. ʒ. j. confervæ simphiti. ʒ. f. trochiscorū de cara-
 be. ʒ. j. boli armeni. ʒ. ij. sanguinis draconis. ʒ. f. syrupi de rosis fliccis, vel myrtullo-
 rum qd̄ sufficiat, ut fiat opiata. Eandē quoq; gratiā p̄stat illud, qd̄ recipit, simphi-
 ti, & carnis cydoniorū saccharo conditorum. an. ʒ. f. confervæ rosarū antiquæ.
 ʒ. j. trochiscorum de spodio, & de terra sigillata. an. ʒ. j. pulueris diamargaritonis
 frigidi, & diapapaueris albi. an. ʒ. j. syrupi cydoniorū quod sufficiat, ut fiat opi-
 ata. Cuius q̄titas exhibenda est magnitudinem fabæ cum aqua plantaginis. Item
 aliud conficies, quod recipit. confervæ rosarum, ʒ. ij. pulueris coralli rubei. ʒ. j.
 pulueris electuarij de gemmis sine speciebus, aut margaritarum. ʒ. ij. cum aqua
 rosacea fiat conditum. Præter quæ et vñ proficua esse experimento constat ca-
 taputia Mesues de bdellio, trochisci oxiacanthæ, sigillum lemnium, trochisci
 de vulgari electro, de spodio, corallus sumptus cum succo granatorum, philo-
 nium item persicum, pondere. ʒ. j.

*Quæ in
 uterum
 missam
 flavabi-
 lem com-
 pescunt.*

Quæ in uterum huic vsui immittenda sunt præter astrictiōem, ut de epotis
 retulimus: frigida quoq; esse conuenit, cum hoc quod lenem, & mulcebrē sub
 stantiā nacta sint. Huius census sunt clysteria, quæ ex lacte asinino, & modico
 plantaginis succo parari à multis solet; & ea etiam, q̄ ex cremore condri, aut pti-
 sanæ; ex aqua decoctionis ordeï, & orizæ torrefactorum, & ex sanguinaria, &
 consolida maiori cum rosis, & syrupis rosarum, aut myrtillorum. Possunt etiam
 huic vsui adhiberi aliqua ex ijs, quæ in præcedenti causâ diximus, uelut est il-
 lud, qd̄ recipit mucilaginis ex gummi arabico, & tragacantho cū aqua planta-
 ginis chalybeata, aut aqua ex ordeo decocto, y per instillationē detracta. ʒ. iiij.
 succi plantaginis. ʒ. iiij. Id quoq; beneficium præstat pessarium (incredibili qua-
 dam efficacia) confectum ex lythargiro, bolo armeno, & albumine oui. Verum
 quia in huiusmodi causâ concitari sæpe solent grauissimi dolores, ob id cogi-
 mur frequenter ad narcotica cōfugere, ut superius diximus: in quæ usum cōfi-
 cimus uterina clysteria ex aqua uel succo portulacæ, sanguinariæ, plantaginis,
 & solani cū modico philonio persico, aut (qd̄ magis probo, ni dolor, aut fluxus
 vehemētior ex uteri sensibilitate factus fuerit) ex collirio albo Rasis appellato:
 quibus

A quibus addere poteris trochiscos de carabe, spodio, & de terra sigillata; quibus prudente uti conuenit, ne aut sterilis fiat mulier, aut aliud uitium contrahat, præsertim si imbecilla facta fuerit. Cui est prædictorū generi adiungere par est suffitus rosarum, myrtilorum, & earum rerum, quas frigidas sine maxima astringitione esse diximus. Verum suffitus biliosa causa prædominante non debent fieri ex re plurimum cremata, sed uehementer calfacta; ita ut aliquid ex ea citra uisionē euaporet. In qua sanē causa placent magis encatismata, quæ fieri possunt ex astringentibus aqua chalybeata elixis, cum his quæ modicè leniant.

Exterius autem mirescenda quoque est bilis acrimonia, & calor medicamentis, quæ præter astringentem, refrigerandi etiam idonea sint, ueluti est unguentum, quod recipit olei myrtini, nenupharis, & citoniorū, ana. ʒ. ij. succi plantaginis, uel linguae passerinæ, aut semperniæ. ʒ. j. coquantur ad consumptionē succorū, quibus adde coralli rubei, seminis plantaginis, myrtilorū, cerusæ, & boli armeni, ana. ʒ. j. ceræ quod sit satis, ut fiat unguentū, quo renes, & prope os pubis femina inungatur. Vtile quoque huic usui erit illud, quod recipit, succi lenticulæ palustris, consolidæ maioris, & agrestis, ana. ʒ. j. olei citoniorū, nenupharis, & rosarum, ana. ʒ. ij. coquantur ad consumptionē succorū, & adde sanguinis draconis, trochiscorum de carabe. ana. ʒ. j. aceti cocleare unum, & ceræ quod sit satis. Vel inungere etiam prædictas partes non erit ab re unguento rosaceo, aut refrigeranti Galeni, præsertim si eis miscueris nonnihil terre sigillatæ, pulueris cornu cerui uisti, coralli, rosarum, myrtilorum, seminis plantaginis, aut acetosæ, & aliarum rerum quarum superius abundè meminimus.

Quæ exterius adhibenda sunt.

B Monitū tamen uelim hac in parte lectorem, ne interim dum hæc adhibet, omnino à purgantibus pharmacis, aut leui aliqua sanguinis detractio, uel diuersione, & ab alijs auxilijs, quæ superius præmittenda esse diximus, subsistat, sed prout uires tolerare uisum fuerit, aut morbum exposcere hoc, illo uel præsidio uti erit necessum, cauentes tamen ne nimia auxiliorum copia, & naturæ opus præpediamus, & tardium, ac molestiam feminis inferamus.

C Vltima porro causa ex ijs, quas huic malo principiū præstare diximus proculdubio est ipse uteri affectus, qualis est uenarum excisio, aut disruptio à te solvente continuū facta, uel ab humore mordaci exedente, & acri excoriata. Quo tempore considerandum est, an urgeat magis fluxionis impetus, quæ affectionis natura, nā quum uera curatio sit per causæ ablationem, tunc in hoc malo ea curatione utendum est, cum fluxio nimis non urgeat, quod in menstruis non urget, donec ut Auic. refert uires, quodāmodo concidere uideantur, ac si id acciderit causa post habita fluxui intendendū est, sin aliter uera curatione utendum, quæ sit per morbi uenarū, aut uteri ablationē. Sic profectò ubi ex intrinseca uolentia uasis disruptio acciderit, aut ex subita, & magna animi passione (nam à laborioso partu, uel abortu proficiscentis suo loco latius meminero) instituta parca uictus ratione, quiete, sanguine misso semel, aut bis, uel ter, si mulier boni habitus fuerit: exterius quidē ac per uterum adhibenda sunt, quæ agglutinandi uires habent. Cui usui in uterum immittere oportet albumen oui fortiter agitatū p

Ex diuisione uasæ.

D se

se solū, uel cum pulueribus gummi arabici, & tragacanthi, amyli, aut plantagi-
 nis. Præstat idem beneficium succus sanguinariæ, uel succu radicis philipendu-
 læ, puluis quoque earum radicum, & rhu, balaustiorum, & consimilium in præ-
 dicto oui candido, aut decocto, uel succo aliquo ex prædictis in uterū immif-
 fus. Quod si disruptio uenis cœuicis uteri accidat, aut ex hæmorrhoidibus uteri
 profluat, pessarijs ex prædictis rebus confectis, & bolo, aut farina uolatili, uel
 terra lemnia rem agere oportet. Sed maiori efficacia confert pessus, quod reci-
 pit triseræ, miclotæ, athanasia, an. ʒ. s. hypocyttidos, acatiæ, boli armeni, sangui-
 nis draconis, radicum consolidæ maioris, arnogliffæ, gallarum, an. ʒ. s. mixtis
 fiat pessus, ad cuius pensum ex supradictis simplicibus, & ijs, quæ paulò infer-
 rius referam, facile cuius, uel mediocriter exercitatio erit, plura alia huic usui
 proficua effingere. Sic & iniectiones profunt ex decocto fragariæ, cumini, bur-
 sæ pastoris, cornu cerui, lysimachia, myrrhi, nymphæ, glandis corticum balau-
 stiorum, uuis passis, additis pulueribus mastichis, thuris, myrtillorum. Sed ma-
 ximè in hac causa prodest iniectio, quæ recipit foliorum plantaginis, poligo-
 ni, agrimoni, scolopendrij, quod cetrach officina uocant, myrrhi, lentisci, uel
 summitatum rubi, an. m. j. decoquantur ex aqua ferrata, aut in qua plumbum
 feruens extinctum fuerit, & decocti excipe. ʒ. iij. syrupi de rosis siccis, uel rosa-
 rum. ʒ. ij. olei rosacei omphacini. ʒ. j. misce: & proijce. Quod etiam præsidium pa-
 rabis ex stillonica aqua ex sero, & prædictis herbis, ac pyro syluestri, & uiridib.
 lentibus cum saccharo, aut syrupo rosaceo, si postea candens ferrum in ea sepe
 extingatur. Partes quoque supernas frequenter perfricere oportet, uinculisq;
 ligare, item syrupis, & apozematis uti, quæ & sanguinem densent, & motū co-
 hibeant, quorum materiam abundè dixisse censeo.

Sed multa quidè sunt, quæ deuorata, aut exterius adhibita peculiari quadā
 efficacia sanguinè ex aliqua harum causarum proficiente sistunt, ueluti sunt
 trochisci de terra sigillata, de carabe, seu acatiæ, hypocyttidos, cornu cerui, pro-
 dest & bolus armenus, corallum puluerizatum, puluis consolidæ maioris, floru
 citoniorum margaritarū, mumia, & myrtillorum cuiuslibet. ʒ. j. cum uino, uel
 aqua ferrata, uel decoctione corticum granatorū, radicum nenupharis, uel suc-
 co sanguinariæ, plantaginis, uel portulacæ. Verū si sanguinis profusio ulterius
 pergat, aliquo ex prædictis liquoribus dissolues athanasia. ʒ. j. s. Præstat & puluis
 picis naualis, uel peonia, aut cinis corticum ouorum quantitate. ʒ. j. item cinis
 stercoris caprini. ʒ. j. cum aqua pluuiali. Cōfert syrupi myrtini. ʒ. j. aquæ planta-
 ginis. ʒ. j. s. succi stercoris afinini. ʒ. j. Præstat et non minorem gratiā id medica-
 mentum, quod recipit conseruæ rosarum. ʒ. j. syrupi papaueris. ʒ. s. pulueris co-
 ralli. ʒ. j. margaritarū, & trochiscorum de carabe, an. ʒ. s. terræ lemnia. ʒ. ij. mi-
 sce, & fiant boli deaurati. Ex quibus non pauca poteris conficere, quæ non so-
 lum huic causæ, uerū & reliquis, causa semota prodesse poterunt. Exterius ue-
 rò cataplasmata adhibenda sunt, qualia conficiuntur ex albuminibus ouorum
 cū pulueribus rosarū, myrtillorū, thuris, & mastichis, cū gypso et subtiliter in
 puluerem redacto, & alijs plerisq; quorum uberrimam copiam reperies facile
 lib. 2. nostro de indicatione præsidiorum. Cæterum peculiariter utero sic affe-
 cto conferunt uaria auxilia, quæ hucusque retulimus, sed peculiariter fots, q
 paratur ex decocto caudæ equinæ, lentisci, foliorū myrti, pyrorum, prunorū,
 sym-

A symphiti, corticum interiorum quercus, rosarum, virgae pastoris, bistortae, & gallarum cum aqua pluuiali, uel feriata; cuius est per infundibulum euaporationes prodesse possunt, sicut suffumigia hoc modo parata. Excipe colosoniae. 3. ℥. spodij, boli armeni, papaueris nigri, hioscyami. an. 3. ij. conuascentur, & super prunas posita suffumigium excipiat. Ungere est uteri regionem antè, & retrò utilissimum est, unguento quod recipiat, olei myrtini. 3. iij. olei mastichini, succi plantaginis. an. 3. ij. sumach, myrtillorum, hypocystidos, terrae sigillatae, boli armeni an. 3. ij. ℥. spodij, rosarum. an. 3. j. ordeï usti. 3. ℥. cera quantum sit satis. Est autè aliud unguentum huic uel pretiosum, nonnullis tanq̃ secretum habitum, quod recipit corticum medianorum castanearum, & est arboris glandium, myrtillorum, gallarum, corticum fabarum, corylorum, uuarum immaturarum, glandium sorbarum siccarum, mespilorum immaturorum, radicum chelidoniae, foliorum pruni syluestris. an. partes aequales, contusa coquantur in aqua plantaginis, & post colaturam accipe olei myrthini quantum uis, in quo conueniente cera quantitate dissolue, postea in praedicta decoctione laua saepius innouata coctione, uel ex decocto accepta ad unam lotionem sufficiente quantitate, & factis sufficientibus lotionibus accipe corticum castanearum, quercus, & arborum gallarum, partem. j. cineris ossium cruris bouis, seminis myrtillorum, corylorum, uuarum immaturarum. an. partem mediam, fiat puluis subtilissimus, cuius accipe partes duas, trochiscorum de carabe partem. j. & fiat unguentum cum oleo, & cera super praedictis. Conficies est aliud non minoris momenti, quod recipit acatiae, hypocystidos, terrae sigillatae, trochiscorum de carabe, colosoniae. an. 3. ℥. fiat puluis, quem succo plantaginis admisce addito modico aceto, & fiat emplastrum. Aliud parare poteris, quod recipit pulueris cornu cerui usti, papiri combustae, limaturae ferri praeparatae. an. 3. j. pulueris corticum glandium. 3. ij. misce, & cum albuminibus ouorum, & modico aceto confice emplastrum. Vel sic aliud confice, excipe mastichis, olibani, mumiae, sanguinis draconis. an. 3. j. facto puluere, efforma cataplasma cum albumine oui, succo artemisiae, & cauda equinae. Praestat non minus emplastrum ex lubricis terrae, thure, & albumine oui factum. Item succus urticae graecae in bombace ventri appositus. Expendat tamen hac in parte lector; duplici motu ratione tot astringentia auxilia me adduxisse, quamuis certum sit, ijs fluxibus, qui ex diruptione fiunt, propria esse, quae agglutinandi potentiam habent pharmaca, tum ut aliis fluxionibus astringentium subsit uberrima copia, & ex hac parte medicus exquirat: tum uero, quia maius saepe facessit negotium fluxio, quam continui soluta unitas, & ob id astringentibus praestò esse oportet, ne ex nimia profusione maius aliquod damnum subsequatur, praeterquam quod fluente sanguine agglutinari ulcus non potest, & ob id necesse est primo fluentem sanguinem compescere.

Quod si fluxio ab exesa vena proficiatur, longè diuersa ratione curandi methodum instituire oportet. Proficiscit enim hoc malum ab exedenti, vitioso, & acri humore, qui sensim abrasis vasorum tunicis viam foramenq̃, quo proficiat, sibi parat. Quapropter triplex erit in uniuersum curandi ratio, prima, quae cacochimiam, seu uitium humorum respiciat: secunda, quae factam exesionem curet: tertia uero, quae fluxui prouideat. Iuxta primam indicationem victum ea lege primo instituire oportet, qui sufficiens sit vitiosum humorem attemperare, &

Ex uena exesa

meliorem deinceps conficere. Cuius rei gratia alimentū optimi nutrimenti, & **A**
 glutinosae substantiae eligere oportet, quo paulatim, ac frequētius vti erit neces-
 sū. Est aut huius naturae auis domesticarū caro, iuscula, amyliū, panatela ex iure
 aut lacte amygdalarū confecta. Itē ex oleribus, lactuca, portulaca, borrago, &
 scariola. Praestat quoq; eundē vsum ius, aut caro extremitatum capreoli, arietis,
 porcellorū, aut agni. Cui ēt vsum is potus eligendus est, q̄ parē ex aqua, in qua
 saepius aurum extinguat vel ex decoctione radicū buglossae, vel admixta stil-
 latitia ex portulaca. Curandū itaque, vt is humor in corpore ex alimentis suc-
 crescat, q̄ praexistētī sit omnino contrarius, tum ut ceteros corrigat, tū verò ut
 vlceri curando ac renutriendo, lentore, & bonitate sit idoneus. Corrigimus quo-
 que p̄existētē humorē syrupis, & apozeimatis, non quidem astringentibus pri-
 mo morbi accessu, ut in p̄dictis causis, ne partibus fixius adhæreat humor, vehe-
 mētiusq; erodat; sed ijs sanē, qui attemperandi leniendi, & mitescendi humo-
 rū acrimoniā, nim habent. Cuius modi est syrupus buglossae, borraginis, rosa-
 rū, granatorū, portulacae, & papaueris. Inter quos peculiari quadā dote p̄po-
 letis, q̄ ex portulaca conficit, & ijs oēs, qui parant ex macilaginibus, & cremo-
 re ordeī, & alij consimilis naturae. Sistit quoq; fluxū, & humores mirē corrigit **B**
 mucilago cytoniorū dissoluta aqua capitū rosarū uel plantaginis, aut ablutio-
 nis, boli armeni. Confert itē aqua ex ablutione amyli, boli, aut terrae sigillatae cū
 cōserua rosarū. Quibus, p̄culdubio frenatū humorē leuibus medicamentis, sed
 electorij per epicrasim purgare oportet, tū ne cōferta vacuatione intestina dy-
 senteria periclitent, tū verò q̄a huius conditionis humores hac purgatione gau-
 dēt magis, ut rursus paulatim corpus mīoribus renutriatur. Purgabis igit rha-
 barbari infuso, infusis ēt corticibus myrobalanorū in succo granatorū, aut in a-
 qua lactis, uel succo portulacae. Itē proficua erit huic vsui manna, casia, syrupus
 infusionum ē rosas hispanis. Confert item succus rosarū extractus cū aqua infu-
 sionis rhabbari ad formā largioris syrupi cū saccharo redactus. Renuit ēt fe-
 rē oīa huiusmodi femininarum corpora sanguinis detractionē, tū quia affectio
 suapte natura id interdicit, tū quia huic humorū vitio, & corruptioni semper
 uirēs adiungunt debiles. Quocirca (vt consuluit secunda huius affectus indica-
 tio) diuersionibus ad distantes partes factis, vitiosum sanguinē ab affecto lo-
 co distrahere oportebit superiorū partiū frictionibus, & vinculis, & cucurbi- **C**
 tis ēt frequēter scapulis adhibitis citra vllam scarificationem. Quibus omnibus
 primitus factis, licebit syrupis, & potionibus ex ijs, quae modicē astringunt quā-
 tum sit satis, ut humores firmiores, fluxuique ineptiores reddantur, admiscere;
 quae quidem ex eis, quae superius diximus, facile colliges. Consulit verò tertia
 huius mali indicatio, ulceri seu exesioni venarum prouidere: primo ijs medica-
 mentis, q̄ foramen obstruendi uires habeant, qualia sunt emplastica oīa, sola,
 aut cum agglutinantibus admixta. Quem vsum praestant bolus armenus, terra
 sigillata, puluis farinae volatilis, amylium, mucilagines omnes, & gummi, vel
 succus portulacae: quae omnia aqua chalybeata plantaginis, aut capitum rosa-
 rum dissoluta in vterum id immissa summopere profunt. Quippe eisdem ob-
 turato foramine, natura (cui id munus incumbit) ex optimo sanguine, carnem
 citra fluxus impedimentum conficere potest, partemque renutrire. Id
 etiam p̄dicta pharmaca praestāt beneficium, vt si quis adhuc humor acris, &
 mordax

A mordax ad affectum locum confluerit, minus possit exesione efficere: nam & impediunt suo lentore, quominus fiat, & humoris vitium corrigunt: certum etiam est, & fidissimum experimentum, radice philipendule. 3. j. singulis diebus in ovo foruili sumpta incredibili efficacia sanguinem omnem sistere, sed maxime ex utero. Sed efficacius praesidium facies, si serapium cum saccharo ex succo eiusdem radice confeceris, cuius laborans cum dormitura est. 3. j. sumat. Paribus item externis, ex praedictis medicamentis varia confici possunt. Sed vsui probatum magis mihi est id, quod conficitur, ex albumine oui fortiter, agitato, & pulueribus gummi, tragacanthi, aut arabici, boli armeni, & sanguinis draconis. Item aliud conficitur ex succo bursae pastoris, & farina tritici, vel amylo, igne leuiter spissatis. Aliud quoque facile, & vtile parabis, ex farina volatili, modico gummi, & albumine oui: necnon, & emplastrum, diaphœnicon appellatum. Ex quibus omnibus additis, quae modicè astringunt (praesertim si vitium humoris iam correxeris) non erit difficile varias pharmacorum effingere formas huic vsui proficuas. Verum omni causae praevalenti ferunt prodesse succum chelidoniae mammis appositum: de quo creditur vteri sanguinem vehementer sistere. Quod etiam referunt de moro, & eius fructu. Sicut succus oleae vuluae in panno admotus. Quibus praemissis, si nihil profuisse cōpertum sit (quauis existente causa) narcoticis uti oportebit, & quae somnum concilient: qualia reperies abundè lib. nostro. 2. de auxiliorum indicatione, cap. de anodynis. Quibus in hoc casu cautè est vtendum: nam suspicari oportet frigidiorē esse fœminam, quàm vt possit narcotica tuto ferre.

Quod si fluxus ex suppressa aliqua vacuatione suboritur, praeter prouocationem antiquioris fluxus, eisdem omnino praesidijs iuxta morbi, & humoris rationem uti liberè poteris, sicut, & alijs plerisque, quae apud barbaros experta habentur: quorum magnam siluam reperies apud Sauonarolam.

De menstruorum suppressione.

Cap. 9.

C **I**MMVNES esse à menstrua purgatione fœminas, multis modis contingere posse, est compertum: quippe, aut aetatem nondum nactae sunt conuenientem, aut senectute iam contabuerunt, si quidem statutum habent menstruationis principium, & finē: ita vt nec anteuertere, nec tardare salubriter alicui fœminarum datum sit. Item alijs, vt dictum est, menses deficiunt ex natua quadam structura huic vacuationi omnino inepta, licet familiaris, & genuina: plurimis, quia grauidae factae sunt, aut laboribus, ac ruralibus exercitijs deditae, conuenientem & superabundantem sanguinem conterunt, & consumunt. Alijs quidem menses supprimuntur morbo: alicuius causa interuentu, quae morbo prius excitato in hoc symptoma prorumpit, à quo postmodum mille alia suboriri comperimus. Sed antequam ad peculiarem affectum huic capiti dicatum, descendam, opere praeuium duxi docere, menstruam purgationem cum actio sit alicuius potentiae, & partis, tot posse pati lesionum differentias, quot quauis alia corporis pars. Nam aut ex toto aufertur uel diminuitur, aut

D 3 mille

mille modis vitiatur. Verum de his duobus vltimis vitijs singularem diligentia A
sum acturus: de primo verò, qui varias, & graues habet causas, tantum hac in
parte agere, nobis est in animo. Est igitur mensium suppressio symptomata de
genere eorum, quæ retinentur immodicè, pertinens quidem ad abolitam om-
nino actionem, quam sanè alicui facultati propriè reducere est perdifficile, nisi
abusiue; eò quòd sæpissimè accidat, fœminas menstruis carere facultatibus ex-
pultrice aut retinente minimè affectis. Cum hoc tamen vniuersam huius sym-
ptomatis naturam illis, vel earum alicui referendam esse censeo, modò vitium
insit in vtero, modò aliunde proveniat, vtcunque enim sit, contingit aut ipsis
omnino otiâibus defectu materiæ menstruorum, aut nequeuntibus ob aliquè
morbum munus sibi commissum perficere. Cuius affectionis adamussim memi-
nisse Galenum constat lib. 3. de causis sympt. Morbus tamen, à quo prædictæ fa-
cultates vitiantur, nec vnus est, nec vni cuiquam parti dicatus, sed multiplex, &
diuersus iuxta naturam causæ, quæ natâ est hunc affectum excitare. Vtcunque
tamen sit, actionem hanc vitari contingit, aut facultate expultrice vteri ex mor-
bo in temperamento partis labefactata, aut obstructione meatuum, quos huic B
vteri natura fabrefecerat. Vltimo item facultas vitatur, aut (vt rectius loquar)
otiat, à morbo per consensum, sibi præstita non operandi occasione ob defe-
ctum materiæ. Quæ sanè culpa rei jcienda est in totius corporis, aut alicuius me-
bri vitium, cuius minus sit, vtero sanguinem impartiri, morbum, vtero aut eius
facultatibus minimè patientibus.

Quale
causa.

Causas verò huius affectionis ad vnguem narrare, & exquirere nullus eorū
qui id opus tentarunt, absoluit: tam enim variæ sunt difficiles, & abdite, vt vi-
rum non sit si neque nos etiam eas omnes complecti valeamus: conabor tamè
methodo, & ratione id opus aggredi. Tribus itaque causarum generibus
contineri huius mali causas omnes, compertum esse reperio eruditis, & præ-
stantissimis in hac arte iuris. Primum quidem faciliè ad vniuersum corpus re-
duces; secundum ad sanguinem ipsum; tertium verò, & vltimum ad uterum,
& uasa illi subseruientia. Præstat porro huic affectioni corpus causam, nimi-
rum, quia ad uterum non pellit sanguinem: quod verò non pellatur, causa est, C
aut penuria, aut auersio, aut immodica abundantia. Nam cum nimis sanguine
plenum corpus est, sibi vias obsecat, ne ad inferas sedes delabi possit. Penuria
verò constat, dum solito factum est obesius. hæc etenim corpora paucissimi san-
guinis esse monstrat uenarū angustia: quæ licet natua nō sit, sæpe pinguedinis
& carnis mole talis efficitur, & pinguedo ipsa, in quâ maior pars sanguinis cō-
crescit, ac degenerat. Et quāuis suppressio mensiū ex hac causa suborta rarè in
affectū prorumpere assuescat, tamen qua steriles omnino reddit fœminas, cōsi-
deranda quoque hac in parte est. Corpus etiam ex diutino aut graui morbo, vel
inedia gracile, ex carne, & exangue factum huius affectus, sæpe fuisse principiū
frequenti obseruatione est compertum. Hoc dixerim, ne quis intrepidè curatio-
nem his ita existentibus aggreditur. Item defectu optimi sanguinis id quoque
accidere constat, in ijs præsertim fœminis, quæ malo corporis habitu labo-
rant: in quibus etiam si plurimum deprauati, aut semī confecti sanguinis re-
dunder, ad uterum tamen nihil transmittere curat natura. Nam tantum ei par-
ti committit, quod vtile generationi esse ex instituto cognoscit, nisi errās. Illud
verò,

potius corpo-
ris culpa ne-
quea supponi
necesse est
vel penuria
vel auersio
ne, vel abun-
dantia nimis

A verò, cū vitiosum potius, & excrementosum sit, q̄ in quanto peccans, transmittēre non laborat. Quò fit vt menstrua huiusmodi fœminis omnino deficient. Alijs quoque non efflorescunt, si menstruis minantibus, aut erumpentibus, laborioso alicui totius corporis exercitio, vel alicuius partis se dederint. Veluti cantraticibus frequenti experimēto contigisse conspiciamus euocato ad superiores partes sanguine. Sicut alijs repulso, frigidi alicuius accessu, vt contingit ijs, quæ incauta viuēdi rōne seductæ crurum lauacris prædictis temporibus vtunt, aut se se pedibus manibusq; in aquā immergunt, vt sæpe mulierculis seruituti additis accidisse visum est. Quod etiam fieri ex timore, mœsticia; & alijs animi perturbationibus mihi non est dubium. Sicuti sanguinolentæ vacationis interuentu, mō per hæmorrhoides, per nares, aut per os fiat. Idem quoq; efficit sudor largus, aer calidus, & repentinus frigida potus, labor, & ea omnia, quæ vtcunque siccandi vel comprimendi corpus vim habent, velut febres, aut morbi alij acuti, sanguine densato, resolutio, vel nimis vsto efficiunt: pari rōnes res se habent in virginibus robustis exercitatis, & nimis calidis fœminis in quibus, & superabundās, & vtilis ēt conteri sanguis. Sanguinis ēt fluxuri vitio suppressionē fieri, nemini dubiū arbitror. Fit aut huic purgationi ineptus dum crassus lentus, copiosus, aut parciore iusto efficitur. Præ crassitie. n. consueta vasa, ac foramina permeare nequit. Præ lentore moueri non potest, quia partibus, & venarum tunicis atq; oculis adhærens expultrici vel vehementer operanti resistit. Sic dum copia abundat, se ipsum impedit, vtiq; præ plenitudine ad vasa recludit. Quò fit, vt permeare libere minime possit. Dū verò parce in uteri uasa congeritur, et si in toto corpore redundet (nā hic non loquimur de paucitate, quæ in toto corpore inest, sed de ea tū, quæ in vtero reperitur) cū naturam non grauet, minime ad excretionē accingitur. Vt frequentissime contingit in splenis, iecoris, aut meserei obstructionibus, à quibus menses supprimuntur. Et ob id totum corpus pletoricum efficitur, etiam si præ sanguinis paucitate in vtero, menses ab eo non prosuant. Morbi quoq; qui vtero ipsi accidere solent, frequentissime mensium suppressioni causam præstāt. Quippe aut morbus fit in propria uteri substantia, aut ob eius intemperamentum, aut fit in vasis vteri per quæ sanguis purgatur. Quoad primum huius diuisionis membrum, constat Gal. 3. de sympt. cau. c. 8. & 5. Aphor. 28. optime dixisse, cum referat difficulter purgari fœminas quæ uteros habent densos, & duros, mō id à natura, mō ex casu proueniat. Sic temperatura frigida, aut sicca, vel ex his composita, facile in id vitium fœminam defert: quod probauerat Hippo. li. de locis aqua, & aere. Pari prorsus ratione vteri uasa id vitium moluntur, dum aut nimis arcta sunt natura, vel aliqua occasione angustantur. Itaq; quæuis prædictarum causarum vterum disponere nata est propria vi, vt uel non suscipere, vel non transmittere possit. Non suscipit quidē ob venarum affectionē, modò ex frigore densentur prædictæ venæ: modò siccitate excaleant, & contrahantur. Vtcunq; tū hæc causæ operentur, ad meatus ipsos obstructos, aut compressos reducere, proculdubio æquum est: quos quidē inflammatio vteri, vel partium vicinarum comprimere nata est, obstruere uerò, vel immodica sanguinis copia ibidē congesta, vel sanguis ipse crassius, aut humor alius viscidus, & crassus etiam osculis, & tunicis venarum adhærens, vt ex Gale. colligitur facile comm. 2. in lib. de Humoribus, & lib. 3. de sympt. cau.

c.4. & lib. de Differ. sym. c. vlumo, & lib. 6. de lo. patien. c. 4. Vteri verò inflammationem dupliciter hac in parte intelligere oportet, eam nimirum, quam mox diximus, tumorem videlicet durum, dolentem: aut inflammationem, hoc est, incensionem. Cuius latè meminit Hipp. lib. de natu. mulie. his verbis. Si uteri inflammationi fuerint, menses omnino non prodeunt, aut prauis, & paucis; & cum ieiunia est, vomitus ipsam corripit, ubi uerò quid ederit, uomit cibos, & dolor inum ventrem, ac lumbos habet, & animi deliquium inuadit. Venter aut aliquando durus est, & inflatur, ac magnus fit, & putat se in venere habere. Si verò contigerit plenitudo illa, uacua fit. Quibus verbis, & alijs, quæ sequuntur, euidenter constat huius inflammationis Hipp. meminisse, non tumoris præter naturam. Præterea eandem suppressionem molitur uteri retractio, aut contorsio; uel deprauatus situs, qui aut ex morbo, aut partu superest, ut et ex Hipp. lib. de nat. mul. constare uidetur, & lib. de mor. mul. per hæc verba. Postquam igitur mulieri, quæ non peperit, occultati fuerint menses, & uiam foras reperire non potuerint, morbus fit. Hoc autem contingit, si uterorum os conclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudendi pars contracta. Et paulò inferius subdens harum affectionum rationem, inquit. Fit autem hic morbus ijs maximè, quæ angustos uteros habent, aut ceruicem ultra pudendum sitam. Si. n. horum alterum fuerit, & mulier viro non miscatur, & venter magis quam oportet euacuetur, ab hac affectione uteri obtorquentur: nec. n. humidi in se ipsis sunt, utpote muliere non coeunte, & amplitudo ipsis spatiosa est, utpote cum venter magis uacuus existat. Item addit paulò inferius. Hæc igitur causa est, ut ipsi sint conclusi, nimirum, à venere abstinente muliere. Quibus sanè causis altera accedit, uteri nimirum frigiditas, quæ ipsum & sanguinem spissum reddit, & expellentem facultatem languidam, & sui muneris oblitam. Dimitto consultò hac in parte idem uitium posse efficere induratas cicatrices, uteri pinguedinem, carnem supercrescentem, & pleraque alia, quæ Hipp. recenset lib. de nat. mul. & alibi sæpe.

Cum passim in feminis, quæ uiro utuntur, menses dum grauidè fiunt, supprimantur quoque; diligenti cura expendendum est num uterus coeperit, an ex causis morbosis menses cohibiti existant, ne nobis usquam decipi turpiter accidat. Nec par est dignoscendi ratio in uirginibus, ac in reliquis: quippe in uirginibus suppressus sanguis per uenas errabundus uagatur, & eò magis obstructiones, febres, & coloris mutationes molitur. At in corruptis, in uterum frequentius irruit, quò fit, ut hydropes, & alia uterina mala, quæ paulò inferius recensabo suboriantur. Ex quo et prodit prægnantes in cibi fastidium, nauseam, uomitum, picam, & reliquas uentris affectiones prolabi. Virgines verò, licet eis menses supprimantur, minimè, aut rarò hæc patiuntur. Ratio proculdubio est, quia maior existit consensus ab utero ubi sanguis ille colligitur, ad uentriculum, cui propriè prædicta symptomata competunt, quàm ex uenoso genere, in quod irruit in uirginibus suppressus sanguis ad uentriculum ipsum. Et ob id prægnantibus illa accidunt, uirginibus uerò minimè. Sunt id monstrantia generalia signa non pauca: quorum primum docet Hipp. 5. Apho. 39. dicens. Si mulier, quæ neque concepit, neque peperit, lac habet, menses ei deficiunt. Cui coniecturæ accedit insolita corporis grauitas sine lacte in mammis, cibi fastidium, & horror inæqualis, dolor lumborum, colli, sincipitis ad oculum radices, præcipue si diu

A si diu suppressæ sint: febres et aliqñ lentæ, & tumores in utilibus inflammatorijs
 vrina quoque agrè redditur quibusdam, alijs omnino supprimitur, urinæ etiā
 nigricantes cum rubra sanie tanquam fuligini mixta, cum lotura carniū re-
 cens mactatarum. Quibus accidit lac in mammis frequenter repertum, iuxta
 Hipp. decretū. Ostendit adhuc clariū idem autor signa quædam lib. i. de mul.
 morb. quibus certiores facti, possimus suppressionem ueram ab uteri gestatio-
 ne distinguere, & rursus prælagire quæ mala hac rōne ijs fœminis succrescere
 possint, inquit. n. Tercio mense incipit suffocationē sentire, & horrores, & lum-
 borum dolores qñq; etiam febrem. Quod si suppressio perseveret, præter hæc,
 obdurefcit uenter, urina copiosior mingitur, cibi fastidium, & uigilia aduenit,
 ut et strideat dentibus. Et si adhuc retineatur, quinto mense his omnibus, & ma-
 ximè doloribus urgebatur grauius. Sed sexto mense insanabilis morbus red di-
 tur, qui antea curari poterat. Et cum hoc anxia sit, & animo linqitur, pituitam
 vomit, sit magna uexabitur, dolebunt partes uentris, & pectinis, febris accedet
 supprimenturq; excrementa alui, atq; vesicæ; spina dorsi dolore uexabitur, &
 quasi balbutiet. Post hæc aut intumescunt crura, pedes, venter, & urina minuit
 rubra, sanguineaq; & dolor totum occupat corpus, maximè collum, spinam, &
 inguina, atq; sic moriuntur, scilicet ex hydropē. Quam sanè sniam si quis sedula
 diligentia intueatur, multa perdisceat, quibus facillè conceptum à mensium sup-
 pressionē distinguet. Cum hoc tñ experimento frequentissimo nobis est cōper-
 tū, plures fœminas ex ijs, q̄ utero gerunt, oīno his simillima accidentia perpeti,
 ita ut q̄ tumuis diligens sit Medicus, id distinguere nequeat, præsertim si mulier
 ex ijs sit, quibus menstrua prædeunt feculenta, fetida, aut alia quauis deterrima
 qualitate fœdata. Quod profecto rōni, & obseruationi innitentes haud rarò dis-
 stinximus. Nā licet finitima sint utriusq; affectus accidentia, in ijs tñ, q̄ utero ge-
 runt, color uiuidus, qualē tpe sanitatis obtinere solebant, perseverat, hilares sū
 persunt fœminæ, & nihilo, aut q̄ parçissimè in animi conditionibus mutata. Cu-
 ius contrarium omnino in mensiū suppressione reperit. Itē dū fœmina utero ge-
 rit, ex prauis accidentibus ea, q̄ superueniunt, primis tñ mensibus durant, cre-
 scente verò fetu subsident omnia, & res apertius conspicitur. At in uera mensiū
 suppressione contrario: nam primis mensibus nulla, aut q̄ leuissima acciden-
 tia insunt, procedente verò suppressione in immedicabilē affectū (ut loco cita-
 to Hipp. testatur) & mortē sæpe degenerat. In qua sanè suppressione præterea, q̄
 passim succrescere uisuntur mala, uerendū est ne id, qd lib. i. de mor. mul. Hip.
 præfagit, aliqñ accidat. Inquit. n. Quibusdam suppurati fiunt menses, ubi per
 duos, aut tres menses moram cōtraxerint. Hoc aut maximè fit, si à febre fuerint
 combusti: & subdit. Signa uerò sunt, si suppurati fuerint, dolores. n. incidunt in
 pectinē, & pulsationes fortes, & contactum non substinent. Qua sanè in re dixe-
 rat paulò superius, menstrua sex mensibus retenta curari non posse. Cognita igitur
 suppressione, causas ad unguē nouisse tenemur, si recta medendi rōne uti
 uelimus. Sic primò uniuersum corpus huic affectioni consentire dignosces ex
 signis plenitudinis, quibus corpulentior, pulchrior, rubicundiorq; fœmina ap-
 parerit: item si oberior iusto facta fuerit, uel si morbū diutinā perpeffa, uel inedia:
 nā id ex interrogatione facillè innotescet. Malū quoq; corporis habitū uel solo
 intuitu cognosces, ut cōijcias sāguinis optimi defectū, suppressionis fuisse cau-
 sam.

causa
 tum di-
 gnosco.

sam. Externam frigiditatem, ex potu aquæ aut lauacris, vel frigido aere eadem A
 lege perdisces: sicut præcessisse copiam sanguinis vacuationem, sudorem, labo-
 rem, uel quamuis animi affectionem. Sanguinem esse crassum haud difficulter
 cognosces, si temporibus, quibus scēmina purgari assueuerat, labores, ac dolo-
 res in lumbis, ac partibus prope uterum persentiebat, cum hoc tamen parū ex-
 purgabatur. Aderit et corporis mollities, somnus grauis, & profundus, color cor-
 poris albicans cum uenis eminentibus, & uiridus, ac subnigris, præsertim quæ
 crura pertingunt. Pulsus is erit rarus, vrina aliquā multa, & tpe mēstruationis,
 aut pauca, aut suppressa, sæpe tenuissima. Aliquā colliquantur ex utero humi-
 ditate quædam crassa, mucoribus persimiles, præsertim, si tenacis humoris ali-
 quid sanguini adiungatur. Pituitosum uerò, melancholicum, uel alterius depraua-
 tæ conditionis humorē ed dignosces, quod pituitoso redundante, frigus ad
 fundum uteri ab ipsa percipitur, stupor, tardus mensium, & eorum albicantiū
 descensus, uenus neq; appetitur, neq; delectat. Cōmunia quoq; sunt melācho-
 lia signa, pter fluorē pituitæ: cōtraria uerò melācholiæ ex bilis uisione crassa-
 tæ: nā aderit ueneris appetentia, & celeris seminis excretio, labra sicca, ac sæpe B
 scissa, & mensiū fluor cum morfu, & erosione. Sanguis quoq; dum fluebat, aut
 secta nunc uena exceptus linteo, aut arena umbra siccatus, colore albedo pitui-
 tam, flauo bilē, fusco melācholicū humor significat. Quorū est snia Hip. Mulie-
 ri menses decolores, neq; per idē sæpe tps uenientes purgationem indicāt esse
 necessariā. Cuius quidem rei si quis plura signa exquirat, reperiet facile lib. nō-
 stro de præsidiorum indicatione in methodo dignoscendi. Multum tñ sangui-
 nis superesse cognosces extensione, dolore, totius uentris grauitate, ac lumborū
 quæ oīa euidenter attestantur, uterū multum sanguinis suscepisse, ita ut præ di-
 stensionē, & grauitate cōprimi ad expulsionē non possit: potissimū si accedat si-
 tis, capitis, dolor grauatiū, splendore rubentes iuxta oculos, & sanguinis spō-
 tanei uomitus, aut fluxus per nares, quibus eadē affectio sæpe uel Hipp. testimo-
 nio lib. 5. Aphor. 32. subsistit, & monstrat. Parum sanguinis uterum susceperat
 multa sanē docēt, primū, nulla uentris grauitas adest, neq; dolor, aut tumor, ita
 ut femina nil in ea regione se persentire referant. est tñ totū corpus decolor, ie-
 cur obstructū, mesereon, uel splen, quorū uitio nihil in uterū cōfluit, qd excer- C
 ni possit. Aderunt et in partibus superioribus uitiosæ plenitudinis signa, ut co-
 lor pallidus, subniger, uel alicuius humoris cū sanguine redundantis specimē
 referens. Uterū esse cicatrice, aut carne aliqua supercrescente oclusum, uel cō-
 tortū, aut alia morbosa figura affectū, q̄ præcesserunt ulcera, aut laboriosus par-
 tus, uel tumor aliquis præter naturā, qui præfuit, aut adhuc induratus uiget, eui-
 denter, facta interrogatione, monstrant. Obstructionē uel cōpressionē uasorū
 uteri haud difficulter cognosces ex defectu signorum, quæ hucusq; retulimus.
 Præsertim si tpe, quo natura assueuit menstrua promouere, dolores molesti, in-
 quietudines, & uterina alia accidentia succrescunt. Quibus accedit lenta febricula,
 à iunioribus alba appellata, capitis infestissimus dolor, præsertim prope
 inciput, totius corporis confractio, & ueluti impotentia ad motū, ac si moueri
 femina cogant, protinus lassitudine maxima corripuntur, dolet interius ca-
 put, & ipa uehemēter pulsan, cibi fastidiū illis accidit, & animo frequētissimē
 delinquit. Verū quia uasa, quæ in uterū ocludi possunt, uaria sunt, uariūq;
 si tum

A situm obtinent, eius diuersitatis quoq; providentiam ediscere conuenit, ut tutior, certiorq; euadat curatio. In qua quidem rescito, si uasorum menstruis seruiuntum obstructio sit, prædictis signis facile dignosci, uerum si obstructio uasa etiam spermatica attingat, uteri suffocationem sibi comitem habere mēstruorum retentionem. Si uero in orificijs cotylidonom minus damni utero eueniet, nisi dum femina conceptura est. Nam vel non concipiet, vel facillimè alimenti defectu abortiet.

Ex quibus fit proculdubio, qd si hæc purgatio præter naturæ institutū suppri- *Præsa-*
matur, mulieribus innumera accidentia, & grauissima mala succrescāt, ut Hip. *gium.*
testimonio probari potest lib. 5. Aphor. 57. cum scribit. Si menstrua plura fiant, accidunt morbi, & si nō fiant, ex utero morbi contingunt. Quorū malū qdā utero propria existunt, & pleraq; uniuerlo corpori communia. Nā primò sterilis efficitur femina, itē uteri strangulatione vexatur, scirrhusō tumore et, canceris, erysipelate, & aquositate repletur, ac flatibus, & ulceribus prauis gtalescunt
B pter modum. Item mulieres nonnullas in uiros degenerasse historijs esse proditū reperio. Cuius et Gal. meminit. lib. 3. 1. op. 29. Adde, partes, quæ in cōsensum veniunt, caput primū, ut ex Hipp. constat. 6. Popu. 1. & oculi, & uentriculus, demū iecur, unde hydrops aliquando sequitur, & innumera alia mala, q nullis plerūq; auxilijs cedere uisuntur. Ut uteri suffocatio, nunc in latus, nunc ad superna ipsius peruersio, sæpissimè cum diutina est, indicat frigidā corporis cachexiam, q calorē extinguat. Hinc difficiles respirationes, tussis, oculorum, capitis, & aliarum partium dolores, & in virginibus febris alba, & variæ obstructionem sortes prodeunt. Præterea hanc affectionē esse curatū difficilem, euidēti ratione constat, vel ex eo, qd uterū sanguinem menstruum ad se non trahat, quia sic mille rationibus prouidit natura. Atq; cum suscipere (cum uniuersum animantis corpus, vel eo abundat, vel nōscit profuturum esse, ac necessarium) tantum teneatur, deficit natura ab uteri ipsius ministerio, opere alioqui in omnibus actionibus necessario, quod præcedit oēm naturalem vacationē. Et cum vacuare, quod suppressum est, in animo sit, deficiente uirtute tractoria mirum non est, si vacationem difficulter moueamus, quia naturam non habemus ad miuiculantem, qd non trahat humorē, quem extrahere medicamentis nitimur. Nec credendum est oīno uerum esse Hipp. testimonium lib. de morb. mul. quo refert suppressionem ultra sex menses perstantem incurabilem esse. Nā id difficulter fieri potius quam impossibiliter est credendum, cum idem Hip. li. 4. pop. scripserit fuisse ancillam cui per septennium fuerant suppressa menstrua, tandem redeuntibus ipsis, ad pristinum statum restituta fuit.

Haud temerè huius effectus curationē aggredi oportet, nā sæpe tanti est momenti id ediscere, ut incantis mille in laborantibus succrescat accidentia, qd potius manufacta, qd ui morbi oborta esse credendum sit. Sic profectō ijs, quæ latent etiam si menses habeant suppressos, minimè auxiliares manus porriges. Neq; ijs, quibus laboriosa uitæ ratio innata est, quia ex suppressione nihil mali persentiunt: non tenetur uiuentibus: pinguibus, à morbo diuturno confectis, neq; adhuc ijs, quibus euenit ante solitum tempus, quo natura ad excretionem sese componere assuevit, neque uirginibus, & alijs eiusdem census. Tūc uero
prouo-

*Curan-
di ratio.*

prouocant potissimū, cū graua incidunt incōmoda, aut minant accidentia, qđ A
 lipothymia videlicet, vertigo, deiecta appetentia, tabes, fēdi colores, hydrops,
 difficilis respiratio, dorsi & lumborū dolorifica grauitas, articulorū cruciatus,
 nephritis, ventris tormina, & id genus alia ostēdunt. Quōd si iā curare tētaueris
 nō vt rudis plebecula, aperiētib. & incidētib. vt fors tulerit, aut vtcunq; ex talo
 sanguine misso, id obsecro facies, sed p causā, & morbi, quē excitant, dignitate
 & ratione: nam sic mihi non est dubium, quin optimē curationem moliaris.

*Si vitio
 totius cor
 poris.*

Primò quidē si ex corpore vniuerso vitium hoc oriri conspexeris, mox in me-
 moriā reuocabis obesas fēminas macrefacere, si velis menstrua prouocare, ex
 tenuatas impinguare, & optima viuendi rōne moderari; victu nimirum vberio-
 ri & optimi nutrimenti; sicut eas quoq; q̄ malo corporis habitu laborāt, in me-
 liorem commutare. Quæ verò ex nimio exercitio hoc inalo affectæ sunt fēmi-
 næ, quiete & otio ad munus naturæ consuetum reuocandæ sunt, tēperandæ ve-
 rō, q̄ ex calore resolutæ, & squalidæ supersunt, aut frigidum & spissum habitū
 contraxerunt. Quo ēt attemperamento languidam expultricem in pristinū sta-
 tum reduces. Quōd si ex dolore auerti sanguinem ab vteri vijs contingat, protin-
 us ipsum mitigare opus est, ac si id non profuerit, vtere Hipp. consilio, qui lib.
 de nat. mul. hæc refert verba. Si menses omnino non fiant, si quidem præ dolo-
 re id contingat, primum ventrē infra purgato, deinde medicamentū, à quo san-
 guis ex vteris purgatur, apponito. Postea intermissa die vna, aut altera, rursus
 id à quo sanguis purgatur, apponito. Reliquo verò tpe corticē crethmi in vino
 tritum bibat. At purgationem ex mercuriali esse summē proficiuam, vt ex eiuf-
 dem testimonio constat, censeo. Verū si auersione ex repulso à frigiditate am-
 bientis, vel retrocessu ex aliquo vehementi animi affectu malum suboriat, om-
 ni ingenio menstruum sanguinē ad inferas sedes euocare oportet, frictionibus
 nimirum, vinctulis, lauacris, cucurbitulis, balneis, deambulationib. quibus po-
 tissimum vti conuenit dum sanguis vomitu, aut per nares excernitur, p̄sertimq;
 sanguine frequenter, sed in paruissima quantitate extracto p venarū tali sectio-
 nes, aut p scarificatas cucurbitulas. Quo casu localia vtero adhibere poteris, qua-
 lia paulo inferius recensēbo, q̄ & partes dilatent, & sanguinem ad vterū euo-
 cent, nisi ad anum fluxio sanguinis conuertat: eo. n. tpe, neq; trahentia, neq; topi-
 ca tutò adhibebis; oīa. n. non minus ad intestina, q̄ ad vterum trahere nata sunt.
 At si immodica sanguinis copia communes vias lædat, quominus liberè ad in-
 feras sedes permeare possit, sola sanguinis detractio sine alterius auxilij ad-
 miniculo, menstruum ex hac causa suppressum euocabis: non quidem, ut vul-
 gariter fit, uenis tali protinus incis: nā ē duobus malis alterum facilē subsequi
 est cōpertum, nimirū sanguine copiosius euocato, immodicam mensiū fluxio-
 nē; q̄ cohibere deinceps difficulter poteris, corpore ad partē scissam pellente to-
 tā plenitudinē, excitabis; aut maiorem obstructionē sistere subito sanguine ad
 obstructa uasa. Quamobrem consilium Gal. in mensium puocatione prolatum
 quo præcipit uenas tali incidendas esse, non est intelligēdum perstante totius
 plenitudine. Cuius profectò rōne Aetiū dixisse censeo, internā cubiti uenā esse
 secandam in mensium prouocatione. Quam etiam sententiā Matthæus de Gra-
 di protulerat. Itaque redundante in toto corpore sanguine, vt obstructionem

in

A in vtero, aut vicinis partibus efficiat, à distantissimis partibus ab ea, q̄ affecta est, aut obstructa, sanguinem reuellere, & euocare oportebit, vt Actij est consiliū. Verum redundante sanguine in vtero ipso, aut in toto corpore pp vteri ipsius obstructionē, à venis tali sanguinē commodius extrahes, vt Gale. docuisse constat: quod sanē facies tribus quatuorve diebus ante p̄finitum mēstruationis tēpus. At uerò sanguine sufficienter missō, & victu tenui instituto quātum sat sit, consule, fœminam modico vti exercitio, lenibus, sed longiusculis frictionibus vinculis, & alijs externis p̄sidijs, q̄ sanguinem ad inferas sedes euocare habent velut est viri etiā accessus, in nuptis. Docebo tñ paulò inferius nonnulla auxilia, q̄ huic vsui proficua erūt, qualis cucurbitula est, suris, femoribus, & coxis affixa, & scarificata. Maximè in albis, & crassioribus fœminis, in quibus vt Gal. consultit promptius euocantur menses suris scarificatis, quam venis scissis.

*Leur. rat. p. Sc.
mis. c. xi*

Quodd si sanguinis fluxuri vitio suppressio fiat, quale sit vitium primò distinguere oportet: nā si ad vterū non confluerit, id profectò erit, vel quia aliò trāsfertur, vel quia corpus sanguine caret: vtrunque tñ corrigere antea docuimus. Verum superest in hoc causarū genere, plurimum sanguinis in vtero congregatū considerare, qui sanē p̄copia vterū ita distendit, vt comprimi ad expulsionē minimè possit. Qua qdē cū existente, nullum aliud utilius, neque tutius p̄sidiū adinuenies, q̄ copiosum sanguinem extrahere apertis malleolorum uenis. Memini me legisse apud Gal. curandam suscepisse fœminam, cui mēstrua iam diu defecerant, & nihil p̄stantibus alijs auxilijs, sanguine ex vena tali copiosè profuso sanitati restituisse, etiam si ex carnis, & contabefacta primo accessu apparet. Quamobrē in huiusmodi fœminis sanguine, & per tali scissionē, & p̄ scarificationē in femoribus, ac suris, extracto, mēstrua medicamentis prouocare, tutum & utile sepe existimaui esse p̄sidiū, dummodò calfacientia ualida nō sint, in hac uel in quonis crasso humore, nē nimis excoctus ac resiccatus humor fluxui ineptior reddatur. Quibus p̄missis, frictionibus, lauacris, frequentioribus balneis, & uinculis, ac motibus, sanguinem ad consuetū locū mouere oportebit. Pessarijs itē, & insersionibus vti tutò poteris, & modicis inunctionibus, ex oleo liliorum, alborum de semine lini, & amygdalarum dulciū. Ex quibus et tepentibus cum decocto mercurialis, matricariæ, & pulegij fomentum parare poteris, quod vtero adhibens, idem beneficium p̄stabis, p̄sertim si ex eadem decoctione euaporationē quoq; susceperet fœmina, quantum sat sit, ne vterus maiorem calorem moderato persentiat. Fugiendum porrò in hac cā est ab ijs medicamentis, q̄ menses vehementer mouere nata sunt: nam hęc plus sanguinis ad plenum uterum trahent, quā quodd ex eò qui ibidem continentur, excernant. Verum si rei ipsius necessitate ad id deuenire cogaris, vacuabis primò sufficienter, & vterum ipsum, & vniuersum corpus, ne eisdem medicamentis maior humorum copia ad vterum confluat, & pressius ipsum comprimat, quā par sit. Quod frequenter vsu venire solet.

*Si fiat
sanguinis
visio*

C Verum. n. verò si sanguis tam is, qui in venis vtero proximis, q̄ qui in toto corporis ambitu cōtinetur, crassior, tenaciorq; factus fuerit, aut quouis alio vitio conspurcatus, ita ut fluxui ineptus fiat, ei qdē prouidendū est. Damnauerat, quippe Hipp. menses decolores. 5. Aphor. 36. dicens. Mulieri menses decolores, neq; semper secundū idem tēpus venientes, purgatione indigere significat. Ex

*Si ex huius
more p̄
tuitio*

qua

qua sententia sic infero rationem. Si menses, qui decolores fiunt ex adhæsu vel A
 miscella pituita, melâcholia, aut flauæ bilis crassioris, in hac suppressionis spe
 cie curari necessario debent expurganti medicamento, multò profectò rectius
 eandem erit curandi ratio, ubi ob eorundem humorum admixtionem suppri-
 muntur, siquidem eadem ferè est vtriusq; affectionis natura, saltem quatenus
 ad humoris conditionem pertinet. eòq; ab eadem medendi methodo auspicari
 curationem opus erit. Quamobrem peculiarem oportet instituire curandi rō-
 nem iuxta ideam humoris, quem cum sanguine redundare cognouerimus. Sic
 pituitosus humor viscidus, & crassus existens, sanguini admixtus, cum eundem
 reddat fluxui ineptum, videndum profectò est, qualem in artifice requirat dili-
 gentiâ, anteq̃ ad obstructionis curationem accedat. Inquit. n. Hipp. li. i. de mor-
 mul. Si uerò omnino nō procedunt præ morbo, aut crassi, & viscosi, aut gluti-
 nosi fiunt: primū igitur, ventrem purgare oportet sursum, ac deorsum, deinde
 vteros subduētio medicamento, à quo sanguis purgatur, atq; ita quiescere, &
 potandum dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Qua porrò methodo præ-
 habita, initium curationis sumere oportet. Primò igitur fœminæ institues cali-
 dum, extenuantē, & incidentē victū, non plurimi nutrimenti: quē sumere, nus-
 quam fœminæ concedatur prius, q̃ sese exercitio dederit. Utatur porrò auū car-
 ne, præsertim montanarū, q̃ tenerā habeant substantiam, iusculis itē, calidis spe-
 ciebus, & aromatibus conditis. Bibat uinum odoratum, tenue, & sufficienter di-
 lutum aqua cinnamomi, corticum citri, capillorum ueneris, anisi, fœniculi, vel
 Indicæ saxifragiæ, aut ex radice chinæ decocta. Somno utatur parcissimo, exer-
 citio copiosiori. A cibo otiosa sit, ne quid crudum in maiora uasa transmittat.
 Quòd si huic causæ, totius quoq; frigiditas accesserit, à purgatione leui vniuer-
 sum corpus semel in die frictionibus concalfacies: à quibus in lecto quiescat, vel
 parū dormiat. Humore quoq; pituitosum (pmissis melle rosaceo, oxymelite,
 syrupo de radicibus sine aceto, uel cū ipso, si fœminæ uterus pmiiserit, de menta,
 de artemisia, de hyssopo, de pulegio, de origano, de calamintha, & id gen^o alijs,
 cum decoctis matricariæ, pulegij, fœniculi, apij, graminis, oreoselini, asparagi,
 rusci, & rubi; quibus aliquid odoratum uel ex diacalamento adijcere poteris.)
 purgabis primò, medulla casie fistulæ dissoluta decocto chamædryos, glycyrrhize,
 vuarum passarum, polipodij, & adiati, pōdere. ʒ. j. Cui adde syrapi de ra-
 dicibus cū aceto. ʒ. j. Ex vsu ēt est agarici. ʒ. ij. zingiberis. ʒ. ij. Salis gēme. ʒ. f. diluā-
 tur sero caprilo addita oxymelitis simplicis. ʒ. j. quibus p linteū mediocris cra-
 situdinis percolatis uti, ieiuno vētriculo poteris, exhibitis ex colatura. ʒ. ij. & f.
 iuris gallinæ. ʒ. ij. uti ēt poteris vulgaribus medicamētis, ut agarico, turpeto, ele-
 ctario indo maiori, diaphenicone, & alijs huius cēsus, q̃ robustioribus fœminis,
 esse pficua cōperies. Ex pulpa casie fistule, & ʒ. ij. agarici, bolū vtiliter cōficiēs:
 quibus aliqn nō citra maximā vtilitatē hieræ simplicis Gal. ʒ. f. addere expediet.
 Eūde vsū pstat pilulæ ex. ʒ. ij. agarici, & p̃dictæ hieræ. ʒ. j. cōfectæ. Quòd si vali-
 dioribus idigeas, fetidis, de sagapeno, aggregatiuis, ac de agarico utaris, si fœmi-
 næ robur permiserit, aut suspicio de visceris alicuius calore nō adsit. Ad eūdem
 sanē vsū cōficere poteris tabellas, q̃ recipiūt rosarū rubearū, zingiberis, cinna-
 momi, an. ʒ. ij. santhalorū alborū, & rubeorū. an. ʒ. j. hermodactylorū. ʒ. ij. turpe-
 ti. ʒ. ij. & f. diagridij. ʒ. j. masticis. ʒ. f. sacchari li. j. dissoluāt oīa ī liquore stillatio
 arte-

A artemisia, & confice p̄dicto usui tabellas, quorum. 3. iij. summo manē porrigere poteris. Immunis facta sanguinis massa (ut aiunt) ab humoribus crassis, & uiscidis, tentandum est sensim, & paulatim ex uenis tali sanguinem extrahere, aut scarificatis cruribus, sc̄moribusve. Quo facto, summa diligentia curandum est, residuum humoris paulatim in scindere, & extenuare, ut sanguis fluxibilior factus ad uterum descendat, per ipsūq; prolatur: quod sanē ante purgationē & sanguinis detractionem, nefas esset. Parantur aut̄ huiusmodi auxilia ex hydromelite confecto ex decocto cinnamomi, corticis cassiæ fistularis, croci, aristolochiæ rotundæ, calami odorati, corticis radicum capparorum, costi, dictami, radicum tormentillæ, radicum eringij, foliorum lauri, origani, polij, zingiberis, calamenti, thymi smirni, seminum rutæ syluestris, dauci, masturtij, hyssopi, nigellæ, anisi, & baccarū rutæ, uel q̄ utilius uidetur ex aliquibus ex his. Ferunt quoq; brassicæ decoctum cum dulci uino haustū mulieribus menses ducere, & semen hortensis apij cum uino albo potui datum, ac cepa cōmanducata cum uino, itē & raphanus cum melle comestus, idēq; fertur de satyria, feniculo, thymo, uel eius seminis decocto, & de rore et marino, & florum aridorū leucorij, decoctū mirū in modum prodesse ferunt, idēq; de decocto bellis hortensis, & de semine urticæ. Placuit hæc oīa scribere, ut faciliē eligere possis, quæ iuxta affecti corporis conditionem magis proficua esse cognoueris. Præter quæ omnia (corpore purgato, & ante diamidium mensis) utilissimum est, uomitum aliquando mouere, maximē si uentriculus pituitæ copiam præstiterit.

Quibus p̄missis rōni consonum est conijcere, uterū uasa ex prædicto humore obstructa esse, q̄ p̄fecto maiorem in artifice requirunt diligentia, ut qd̄ frequentius accidat, & difficilior curet. Primò itaq; p̄uidendū est in obstructione ex crasso, uel ex quouis alio humore aborta, sanguinis plenitudinē, q̄ in ijs subesse necessum est deponere iuxta eā, q̄ cognouerimus plenitudinē, apertis malloolorū uenis, qd̄ fieri p̄ partitas uices tutius, & cōmodius esse, q̄ semel, & confertim existimo. Sed docere hac in parte mihi est in animo, qua nā rōne sectiones p̄dictarum uenarum menses euocent, si quidem li. 2. ad Glau. c. 2. Galen. ab utero deriuare refert. Quā rationē securus li. 13. meth. in uteri inflammatione eadē secare iubet. Sunt etenim diuersa deriuare ab utero, & p̄ ipsum purgare. Si quidē nihil aliud est, menses mouere, q̄ sanguinem ad uterum euocare, & repleri uteri uenas. At deriuare, tantū est inanire repletas vteri uenas, non p̄ uterum ipsum, sed per scissam uenam. Quæ sanē opera, cum inter se contraria sint, harum uenarum sectiones efficere nequeunt. Ratio proculdubio stat in hoc, q̄ negari non pōt, quin uenæ tali sectæ sanguinē a supernis ad inferiores partes alliciant, qui non magis ad uterum, q̄ ad ani uenas dilabitur. Quo fit, ut et Gal. docuerit lib. de sanguinis missione, uenas crurium secare, si hæmorrhoides p̄uocare uelimus. Quamobrē euocari ad inferas sedes sanguinem p̄ huiusmodi uenarum sectiones cōperies, quemadmodum utero existente pleno, ab eodē deriuare, ac sæpe dum parum sanguinis, aut in utero, aut in corpore abundat, menses ipsos incipientes suppressere. Verū dū copiosior est, uel ibidē impactus, nō deriuat quidē, sed ad uterū reliquum sanguinē allicit, & præexistentem mouet. Qui sanē motus nulli dubium est, quin per consueta loca prorumpat, & menses appareant: nam inflammationes, in utero, uel in aliis uasculis, quæ menstrua-

tioni

tionem destinata non sunt, uel in eisdem, sed summè plenè, fieri contingit. Et ob id talo scisso potius deriuationes, quàm mèsium prouocationes fiunt: licet modo dicto utrumque fieri possit, seruata tamen præhabita lege.

*De ijs
quæ vic
tum pur
gant.*

Præterea hoc auxilio facto, ad repetitas purgationes te conferes; quas p epigrammā appellant, ex minori q̄tate eorum medicamentorum factas; q̄ superius retulimus. Præter quæ, eum vsum frequenter mihi præstiterūt pilulæ ex rubea tinctorum in puluere redacta cum modico agarico, ita ut ex .3. j. agarici, & altera prædicti pulueris, formentur octo pilulæ: quarū singulis diebus duas porrigere oportebit. Alias item conficies ex chalybe præparato, & diacurcuma cum agarico, & pulueribus calamenti, thymi, & dauci, aut ex solo agarico, myrrha, & diacurcuma cum pulueribus aristolochiæ, corticis casia, & calami odorati. Quæ et vsum præstant confectæ ex eodè chalybe, & rubea tinctorū cū modico succo artemisiæ. Profunt quoq; mastichinæ cū pauco turpeto, ita ut ex .3. j. pilularū de mastiche, & 3. f. turpeti fiant sex pilulæ; additis puluisculis supradictis: quarum unā singulis diebus summo manè laborans denoret. Secundò poteris singulis diebus, tertio, uel quarto quoq; die, bolū huic usui maximè proficuum præbere, qui conficitur ex diacartamo, diacurcuma, pōdere. 3. f. pulueris rubiæ. 3. ij. pulueris squinanti, nigellæ, & cinnamomi. an. 3. f. & cū modico syrupo de artemisia, conficiatur duo boli: quorū alter summo manè, alter verò sequenti die eadè hora sumatur, ac desuper bibat femina. 3. f. aquæ artemisiæ, uel graminis. 3. j. Consimilem medicamenti formā conficies ex cōserua rosarū persicarū cum modico agarici, uel ex theriaca, & modica cōserua, aut ex fermento, & saccharo; qđ probatum multis est. Item ex pulueribus sape dictis, & 3. ij. electarij diapheniconis, aut indi maioris, aut ex chalybe pparato, melle rosaceo, & p̄dictis pulueribus ad formā boli redactis. Probatissimi. n. comodi, & efficacis sunt pilulæ, q̄ cōficiunt hac lege. Recip. aloes. 3. iij. cū succo sabinae forment pilulæ, xx. Ex quibus iij. immediatè ante prandium tertio quoque die porrigito. Quodd si solidius medicamentum parare uelis, tabellas faciliè ex eisdè medicamentis, & alijs, quæ paulo inferius recensebo, cōficies cū aqua artemisiæ, & saccharo, q̄tū sit satis: post q̄ oīa exercitio utēdū est, quippe sola hac lege, prodesse poterunt citius. Sed utiliora, p̄tiosioraq; multò, conficies pharmaca potui idonea: nā hæc, ut q̄ minùs in uētre immorentur, citius in affectū locū eunt, & p̄ptius usum p̄stant. Primū inter omnia obtinet locū agarici dilutum, tertio quoq; die exhibitū, factūq; ex aqua cinnamomi, rubiæ, & pimpinellæ cū modico croci. Nec minoris est usus is, qui conficitur ex hydromelite parato ex aqua origani, calamenti, pulegij, & artemisiæ: q̄ postea bulliat cum. 3. j. & s. optimi turpeti: cuius, facta colatura, sumat. 3. iij. Eiusdè est efficacis decoctum radicū diureticarum, in quo, anteq̄ refrigeretur, maduerit per diē integrū radicis ireos uiridis. 3. j. cui facta colatura, adde pulueris sabinae, cinnamomi, squinanti, & betonicæ. an. 3. j. bulliant iterū oīa lento igne, & colentur. Cuius decocti summo manè. 3. ij. cū saccharo aut melle porriges. Cōficies faciliè aliā chimica arte p̄ instillationē in balneo mariæ extractā, ex pari uini, & aquæ q̄tate, q̄ lib. iij. cōpleat; quibus adde agaraci trochiscati, turpeti optimi, & cartami. an. 3. iij. theriacis magnæ. 3. ij. artemisia uirētis, & pimpinella. an. m. j. radicū i eos, & ebuli. an. 3. j. radicū diureticarū. an. 3. vj. pulueris cinnamomi. 3. ij. cōtūdatur oīa, & per balneū mariæ

A maris instillatione: cuius instillationis cum iure pulli potriges. 3. j. aut. 3. j. & f. His itaq; medicamentis, & alijs, quæ passim reperies, & si prudens sis, effingere poteris, crassos viscidosq; humores, vel ex parte adhuc obstructa educere paulatim poteris. Quibus uti oportet per intervalla, & repetitas vices, ne aut naturâ plus iusto defariges, aut eam medicamentis assuescere nimium cogas. Quod si & sanguinis missione, & his purgationibus usus fueris, nihilq; cum hoc prosis per pharmaca mentes ducentia, per lauacra, balnea, iniectiones, suffitus, & pessaria tentandum est inceptum opus perficere. Quorum omnium seorsum meminisse, vtilissimum, & claritatis gratia necessarium esse duxi.

Itaq; inter unâ, & aliam purgationem ex ijs, quas modò retulimus, præmissis tamen aliquot (donec superflui humoris tam in uniuerso corporis ambitu, q̃ in ipso, utero contenti, aliquid excreuisse compertum habeamus) alijs auxilijs utendū esse consulit rei ratio, ut & humores expulsionem præparètur, & ad inferas sedes deuehantur, & meatus occlusi aperiant, laxentq; partes & huic ministerio propiores fiant. In quo sanè opere efficiendo nil commodius, q̃ ea medicamenta, q̃ mentes mouet comperies. Quorum vsus haud cuiq; cognitu facilis est. Licet enim mentes mouentia nuncupentur; non ob id credendum est, omnibus causis suppressionem efficientibus proficua esse, sed tamen, aut crasso sanguini, aut obstructo ob eandem causam utero. Et ob id Gal. inter medicamenta mentes mouentia retulit multa, quæ valenter siccant, ac urinas mouent, non q̃ ea huic vsui sint proficua, sed quod obstructionibus auferendis sint idonea. Mentis. n. mouentia calida, sed non valenter sicca esse oportet, ut Gal. refert. 5. Simpl. c. 21. & ideo omnibus alijs affectionibus nulli dubium est, quin maximum damnum sint allatura. Sed nequis intrepidè, & utcūq; adhuc cognita causa eis vtatur (nam multa sunt, q̃ cum ualde urinas moueant, potius mentes auertere adhuc fluentes, quàm suppressos euocare nata sunt) nosse oportet, tres esse medicamentorum mentes mouentium sortes omnes tamen mensibus mouendis idoneas; non quid eodè modo, neq; omnes omnibus suppressionibus, licet omnia essentia tenuitate, & calore magis fluxile sanguinem reddant, & uenarum oscula in uterum, & eius ceruicem desinentia patentiora efficiant, atq; expultricem ualorum uim ad consuetum munus lacestant, p̃terq̃ q̃ substantia quadam proprietate utero amica, & familiaria existunt. Inter quæ sanè mitiora quedam medicamenta reperiuntur, quæ vsui proficua tunc existunt, cum affectus minimè urget, ac fortasse quia plenius est corpus, & eo minus admittet ualentiora, q̃ & uentrem subuertunt, & febres excitant, exulcerantur uterum, si ipsi adhibeantur. Quo tpe, si plurimum necessitas urserit, umbilico, aut utero commodè abhibebis. Quamobrem, q̃ clementia sunt sola, & per se primo adhibebis. Quod si non sufficiant, ex ualentioribus addendū esse aliquid consulit medendi ratio. Primi igitur generis medicamenta, q̃ clementer mentes mouere diximus, sunt ficus passæ, amygdalæ amaræ, cicer rubrū, semē orobi, lupini, phaeoli p̃cipue rubri, lens, radix, graminis, & semen rusci, asparagi, pentaphili, adianthi utriusq; phyllitis, cichorij, intybi, & omne rumicis genus, eupatoriū, brassica, malua, lactuca agrestis, hyperici folia, flores, semina, & oleū qd̃ ex his conficitur. Scdm̃ verò genus ea cōplectitur medicamenta, q̃ mediocriter mentes mouet: qualia sunt radix, folia, flores, semina raphani, raphanitis, apij, chere folij, porri, cepæ, erucæ, nasturtij, gallitici, ocymi, alij, peoniae utriusque

E

meli-

*Medicamenta
clementer
mentes mouentia*

*quæ mediocriter
mentes mouent*

melisophilii, petroselini, anethi, anisi, ameos, carui, dauci, feniculi, leuistici, felleos, saxifragiæ, betonica, meui, leucioru, capparis, radix ireos, rubiæ, aristolochiæ, gētianæ, enulæ, asphodeli, eryngij, absinthij, ite abrotonu, artemisia, calamintha, poliu, organu, pulegiu, plu, asaru, satireia, hyssop, serpyllu maiorana stachis, coniza, schordiū, marrubiū, chamædris, chamæpitys, mercurialis, anemone, vrtica, tlapli, ruta sicca flores sambuci, chamemelli, cariophylli, stachas, et crocus. Cuius est naturæ sūt semina p̄dictoru, & lythospermi, loli, melathij, lauri, & iuniperi. Itē iuncus odorat, calam aromatic, anōmū, cinnamomū, cardamomū, casia, xylobalsamū, spica nardi, costus, cypērus, asaru, zingiber, galaga, nux muscata, piper, eubebæ, moschus, ambra, castoreum, vnguis odoratus, cēlypts, bitumē, sal, nitrū, sulphur, aloes, & ex ipsa hiera Russi, myrrha, & ex ea trochisci: styrax, cētaurū, opopanax, ammoniacū, sagapenū galbanū. Quorū minore dosē, q̄ Aetius propinat, adhibendā esse cenfeo: nam præbet ferē. 5. j. Cuius est census sunt pillule montagnanæ, quæ recipiūt seminis apij, casia lignæ. an. 3. s. musci. gr. xv. trochiscorum de myrrha. 3. j. & s. cum succo apij formentur pillula. Tertium, & vltimum genus horū pharmacotū (quorū. 3. j. cum cyathio vno aquæ pimpinellæ, vel alterius, exhibenda est) ea complectitur, quæ valēter mouere menses nata sunt, vt est elleborus vterq; (cuius non. 3. sed minimum, & non ex substantia exhibendum est) pyretrum, brionia, ciclamini radix, atq; cum cumis agrestis, turbith, staphys, agira, sinapis, siliquastrū, colocynthis, thymelea, thymalorū genera, scammonium, eupatorium, cantharides, fella. Eiusdē quoque naturæ est theriaca, & trisera magna sine opio, & diacalamynthēs. Verum cauere oportet, ne eorū 3. illam indistinctē porrigamus, sed vel in maxima aquæ quantitate projectā, cuius aquæ pusillū exhibeatur, vel eorū minori do si primō exhibita. Ferunt etiā alijs cum oleo de spica tritis, & in rarū linteolū oblongi sacculi mō conformatum intrusis, ac in vuluam profundē pulsīs, & dū licebit exclusīs, menses cessantes moueri poterit, & vterū mira voluptatē refici, ac repurgari, adeo vt hinc facta sit vis nonnullis ad conceptum longo tēpore desperatū. Ex quibus varias medicamentorū formas facillē eligere poteris admixtis tenuioribus, si crassus fuerit humor, & calidioribus, si frigidus, autē contra, si fors tulerit. Quæ oīa recipiuntur per os, aut per collum vteri, per os quidē epota, deuorata, aut in puluere redacta: per vteri collum, glande, pessō, metrachita, suffitu. Quæ porrō noctu non sunt in vtero dimittenda, aut in ipsius collo, ne phlegmonem, aut febrem excitent, vel exulcerent partem ipsam.

Redētes igitur ad pensū, dū materia frigida est, crassa, atq; obstruēs, primo à p̄dictis euacuationibus, apozemata porrigere oportet, q̄ huic vsui hac lege cōficiēs, ex aqua nimirū mulla, ex decocto rubiæ tinctorū, aut calaminthæ cum syrupo de artemisia cōposito. Itē confert syrupis idē cum decocto dictami asari, & pulegij. Præstat quoq; apozema, qd recipit calaminthæ, artemisiæ, pulegij, thymi, an. m. siacori. 3. s. croci. 3. j. bulliāt in lib. vj. aquæ ad consumptionem tertiæ partis, residuū colet, cui addē mellis. 3. iiii. & rursus bulliāt, donec totā euomuerit spumam, cuius decocti bibat. 3. vj. cōfert itē myrrhæ. 3. j. cum aqua mulla, aut castorei. 3. s. cū aqua origani, & pulegij. Itē decoctum sabine cum melle, ceterum in parua copia: asari, & am autiridis decoctū. Sumito deinceps, si plura perdiscere volueris, ex ijs, q̄ in primo genere menses mouere diximus, q̄ magis

calentes
menses mouen
tia

Apoze
mata

A gis placuerint, coquito secundū artē, & facta colatura cum leui expressione, ad
 de ex aromatis, quod sat fuerit, & iterū cum modico melle, & saccharo syrupū
 foliō dilutionē conficies. Et eadē methodo, si diuturnior fuerit suppressio, para
 bis ex ijs, q̄ in secundo, aut tertio genere cōtineri diximus: quibus addere pote
 ris ex syrupis supradictis aliquē. Cuius census multa pharmaca reperies apud
 probatissimos auctores, veluti est illud, qd recipit instillationis ex raphano, fo
 lijs eius, & pimpinellæ. 3. ij. cassiæ lignæ subtiliter puluerizata. 3. j. croci. 3. iij.
 sacchari. 3. j. Decoctum itē ligni Indici cum dictamo. Quod si eadē vino macerē
 tur, & reliqua quæ diximus, non minoris supererit res cōmodi. Sic decoctum
 modicæ sabinae cū artemisia, & pimpinella, & modico cinnamomo. Vinum ē
 Hippocratiū appellatū pstat ex vino albo, vel fuluo cōfectum, dilutum in
 aqua graminis, vel asparagi, apii, petroselini, aut decocto eryngiorum. Præter
 quos potus, alter ē paratū co arificio, quo citius, & tutius possint menses moue
 ri. Recipit aut radicū diureticarum in aceto prius tēperatarum, an. 3. j. radicis ru
 bæ unctorum. 3. f. sabinae, nepetæ. 3. ij. pulegij, artemisie, an. m. f. petroselini, feni
 culi, apii, an. 3. j. seminis endiuie, portulacæ, cucutbitæ, melonum, an. 3. j. & f. flo
 rum cordialium, genistæ, anihos, ana. p. f. decoquant ad lib. j. & colaturæ adde
 mellis, aut sacchari, si biliosa sit fœmina, quantum sit satis, vt fiat zulapium. Itē
 succus raphani syluestris extractus cum vino infusionis asari menses mouere
 fert. Sicut syrupus, q̄ recipit rubiæ tinctorū sabinae. 3. iij. artemisie. m. f. radicū
 fœniculi, & acori, nu. iij. schinanthi, anisi, & pulegij, an. 3. f. gariophyllorū, me
 lisse, buglosse, an. 3. iij. cypri, galangæ, calami aromatici, & fœniculi, an. 3. ij. me
 dullæ passularum. 3. f. cinnamomi. 3. j. fiat secundū artē decoctio, & cum melle,
 & saccharo potui det. Pene facit ē decoctum apii, acori, spice nardi, iunci odo
 rati, mercurialis, carpesiarum cum saccharo sumptū. Itē acori decoctum cū vi
 no albo veteri, vel decoctū cumini, fœniculi, oreoselini, dauci, amii, & cicerum.
 Verū q̄a eo sepe deuenire solet huius affectionis renitentia, & puicacitas, vt ne
 validissima quidē auxilia sufficere queant: necessum subinde est aliquot exco
 gitare, q̄ citra fœminæ dānum maius beneficium prestare possint. Cuius fortis
 esse credunt chimi cæ instillationes, quas gustui esse gratiores, & ceteris longē
 C vtilioris existimo. Atq; inter plurimas, q̄ ex viridib. herbis, aut siccis, sed deco
 cto aliquo infusis melle addito fieri possunt, q̄ maximē mihi pbatissima cēset,
 ea est, quæ ex pane ferē ad fermenti naturā redacto, & mediocriter cocto, & ca
 lido cōficitur: cui ablato cortice, mellis. 3. xij. addantur, pulueris seminis vrticæ,
 dauci, ameos, anisi, & fœniculi. an. 3. j. trochiscorū galliæ muscate, myrrhe, rubie
 an. 3. j. cotulæ setidæ. 3. f. Quæ oīa infundes in lib. iij. infra scriptæ decoctionis (q̄
 recipit phascolorum rubrorū, cicerum rubrorū, an. p. f. seminis iuniperi. 3. j. ra
 dicū rubie, ruscij, raphani syluestris, asparagi, apii, & oreoselini, an. 3. f. chamæ
 dreos recentis. m. j. ameos, anisi, fœniculi, an. 3. ij. Coquito oīa secundum artem)
 deinceps in balneo mariæ stillatium liquorem extrahes: cuius 3. ij. summo ma
 nē laboranti porriges, addito syrupi capillorum veneris, & acetosi de duab. ra
 dicib. vel sine aceto, vel violarum, an. 3. f. Quod profectō p̄sidium maximi mo
 menti esse censeo, præsertim si fœmina parum ante sese exercitiū dederit: quo
 medicamento sumpto lenta etiam deambulatione vtatur, & sequenti die maio
 rem ingerat quantitatem, si ventriculum alterari non perfererit.

*Trochi-
sci pul-
ueres, &
electaria*

Verum ne eisdem medicamentis tedium foeminis parare uidearis, & ne etiā
vni remodiorum generi natura assuescat, ac ideo contemnat, immutare eadem
opportunitum apud viros in hac reperiuntur est consilium, Quapropter ex pulue-
ribus, ac electarijs trochiscos, & bolos conficere poteris: quae, & aequè utilia, &
minus gustui ingrata saepe existunt. Inter quae sanè medicamenta probatū repe-
ries praesidium ex trochiscis de gallia muscata cum aliquo ex supradictis pulue-
ribus. 3. j. Item. 3. j. trochiscorum de myrrha cum aliquo ex praedictis potibus,
aut aqua pimpinellae. Consimilem obtinet vim fermentū magnitudine autella-
nae singulis diebus sumptum: q̄ cū saccharo adhibendū esse cenfeo, addito mo-
dico croco, aut quouis alio ex praedictis pulueribus. Itē. 3. j. & scalaminta tenuissi-
ma cū mellis despumati coclearijs tribus. Idem beneficium praestant trochisci
ex rubia, ex cotula foetida, ex sagapeno, de rasura eboris, cornucervi, & alijs, q̄
ex praedictis simplicibus confici possunt. Itē vi poteris trisera magna sine opio
cū modico vino, theriaca magna, & mithridato. Placentulas quoq; cōficies, aut
rotulas ex supradictis pulueribus, aquis, & saccharo. Præterea incredibili qua-
dā efficacia prodest hiera simplicis Galeni. 3. sex qua formentur duæ pillulae, B
q̄ cum decocto sabinae, vel pimpinellae tertio aut quarto quoq; die sumatur. Cō-
fert & mel, quod ex electarijs de corticibus arantiorum exprimitur cū pulvere
cinnamomi, vel cassiae fistularis, calami aromatici, laeae, eringij, vel smyrnij. Pro-
batā ē apud viros doctos reperiens mixturā, q̄ recipit myrrhā, calamenti mōta-
ni. an. 3. iij. medullae fistularum. 3. ij. rutae viridis. 3. ij. sabinae. 3. f. ex omnibus cō-
tusis cum sufficienti mellis q̄tate fiet confectio, cuius dosis sit 3. l. cū aqua pim-
pinellae. Cui quoq; vsui pillulas conficere poteris, q̄ ualenter menses mouere
natae sunt, & recipiunt, musci, myrrhā, an. 3. ij. stachados, rubrae tinctorum, pu-
legij, corticū citri, piperis longi, corticis cassiae lignae, granorū peoniae, calami
aromatici. an. 3. iij. spicae nardi. 3. j. cū aqua artemisiae fiant pillulae. ii. vij. p̄ drach-
mate, cui⁹ q̄titas sit hebdomada. 3. j. uel tertio quoq; die. 3. j. Prestat et opopana-
cis, aut sagapeni, myrrhā, aut castorei. 3. j. Cui⁹ ego q̄tate, p̄sertim castorei mi-
nuere, & cū succo rosaceo efformato bolo, p̄bere. Præter q̄ omnia reperiens, a vi-
ris doctis pastillos huic vsui probatos, qui recipiunt seminis fr̄ nicoli, dauci, se-
selij. an. 3. j. cinnamomi, acaciae. an. 3. l. seminum melonū, aut cucumeris. 3. f. sac-
chari dissoluti in aqua mellisophila, aut capillorum ueneris, q̄tum sat sit, ut for-
mentur pestilli, quibus farina utatur cū aqua multa. Ad q̄ et medicamentorū
fortem reducit electarium, q̄ ex chalybe præparato conficitur, tanq̄ peculia-
re huius affectus beneficium. Est et non minoris momenti, si pastinacē cōditur
cum melle addito pipere, zinzibere, & gariophyllis: ex quo mel e accipiat labo-
rans. 3. ij. cum. 3. j. pulueris cinnamomi. Maturo equidē consilio opus est ad uten-
dum ijs, & praedictis pharniacis, nam primò fugiendum est à sudoris prouoca-
tione, qui haud d̄fficulte hui⁹ auxilijs moueri solet. Distrahes. n. eō magis san-
guinem, & menstrua fortasse supprimes potius q̄ euocabis. Itē hæc eadem phar-
maca dum indistincte adhiberi cōtingit, frequentissimē in maiores affectus, q̄
fit mensium suppressio, foeminas conijcere solent. Calida namq; sunt omnia, &
sicca: ob idq; potibus uti potius, q̄ siccis, & solidis semper attrisit mihi magis.

*Fomen-
ta, & in
señones*

Verum, quia non sat est medicamenta ea adhibere, quae aduersus causam af-
fectus pugnent, nisi affectum ipsum oppugnaverimus, & corpus ē, utriq; flu-
xui,

A xui, quem intendimus, præparatum habeamus: ob id profectò necessum esse duximus ea remedia excogitare, quæ præterquam quod vsui sunt communia, causam quoque elidunt, & corpus peculiari ratione præparant. Qua in re primum obtinent locū fomenta, & infusiones, quæ manè ventriculo ieiunio adhibenda sunt: ac præsertim circiter dies octo ante tempus purgationi statutum. Primum igitur vtile est, si infideat femina vsque ad vmbilicum in decocto artemisiæ, polij, pulegij, & origani. Item partes illas aqua tepida fauere oportet, vel decocto maluarum, & liliorum, & aliarum rerum, quæ vim habent dissoluendi, & extenuandi crassā, venasque dilatandi, velut est decoctum chamæmali, artemisiæ, mentastri, sabina, origani, calamenthi, apiastri, pulegij, mercurialis, ocymi, & foliorum sambuci. Quod quidem decoctum conficies sumptis singulorum. m. j. artemisiæ. m. iij. radicis valerianæ lib. i. Quibus cōtussis (dempta artemisia, quæ seorsum in sacculo includatur) & ex arte coctis, fomētum varijs modis parabis, modò ex spongia, modò ex vesica, aut sacculo aliquo ex eisdem rebus confecto, & in prædicto decocto madefacto, vinoque irrorato, atque vteri regioni, necnon pudendo adhibito. Cuius etiam decocti vaporem suscipere per infundibulum poterit femina, vel decoctionis sabina, rubæ, acori, & calamēthi. Cui ēt vsui vel fomentum, vel enaporationes cōficere licebit aqua calida spōte ex sulphure nascēti, quæ in hac re maximi esse momēti censeo. Fōtus quoq; vterus est odoratis fomētis, maiorana nimirum, serpyllo, calaminta, chamæmelo, pulegio, artemisia, radice iridis, & similibus in olla decoctis. Confert itē pedes aqua calida immergere, quippe quæ sanguinem deorsum trahit, & ora vasorum aperit, & corpus totum doctissimorum sententia emollescit.

Si qñ vsū aliquem aromatum suffitus in prouocandis mensibus habet, in ea potissimū habet causa, de qua modò differimus, nimirū vbi ex obstructione vel nimia humorū crassorum redundantia vterus non purgatur: quippe in alijs aut nocet, aut nihil prodest. Qua propter cognita, quā prædiximus causæ, capite a suffitus contactu satis præmunito, eū suscipere oportet; nam, & vias referat, & crassos ac viscidos, & tenaces humores attenuat, atq; fundit. Quæ sanè opera suffitus posse efficere, ex Hipp. 5. Apho. 28. euidenter cōstare vī. Tria nanq; comoda ex aromatum suffitu annumerat in commentario Gal. Attenuant quidem crassā, & dissēcant lentā, ex quibus fiūt obstructiones, & aperiunt oscula venarum. Calidum enim cū dissoluat, manifestum est, quomodo attenuet crassā: sic cum diuidat, apparet quomodo lentā extenuet atq; inscindat. Aperit tñ ore venarum, primò excitando ad motū sanguinem; nam feruescens cum impetu fertur, & dū in vapores sanguinē vertit, vapor ipse penetrat, & aperit. Sed & opus id magis facit, quoniā oscula illa bifariam coeunt, & sponte nimirū, & vi ipsa continente glutine quodam, & sic calor trifariam aperit ora venarū, virtutem laxando, & liquando gluten, contrahendoq; substantiā venarū, quæ breuior facta cogitur diuelli, vt sic septē in vniuersum modis calida venarum ora aperiant, & sanguinem fluere faciant. Quodd si cū his adsit acre aliquod medicamentum, vno quidē modo imminuta substantia, altero, excitato impetu facultatis, maiores fiunt effectus. Probauit autē Hipp. hanc sententiam, & expressit qualia sint huic vsui aromata lib. de nat. mul. Ea verò triplici genere continentur, quædā enim sunt, quæ bene olent, suffita non olent, vt violæ, de quibus Hipp.

*Idē bene
ficiū præ
stat: si pa
rū ante
aut post
femina
ligatus se
iungetur
femori-
bus aut
poplitib.
incedat.
Aromatu
in suffi-
tus.*

E 3 non

non intelligit p̄dicta sn̄a. Alia suffita olēt, nō suffita ē t̄ nō oleūt, vt succinū. **Que** A
dā rursus vtroq; modo, vt lignum aloes. Quorum omniū confusa oratione me-
minit Hipp. loco nuper citato. Inter quā recensentur thymbra, aristolochia, ca-
storeum, adiantum, draconium, peucedanū, api, & forniculi semen, rutę folia,
& semen. Alibi t̄n annumerat cyperum, iuncum rotundum, odoratum, calamū
aromaticum, nigellam, sisymbriū, anisum, & cinnamomum. Quibus addi pos-
sunt myrrha, styrax, galbanū, thus, bdelliū, radix aristolochiæ, artemisia gario-
phyllus, ciberū, moschus, trochiscus de gallia muscata, de opopanace, de sagape-
no, de myrrha, & de sabina. Ex quorum omniū sylua facile tibi erit vel simplex
aliquod medicamentū huic vsui proficuū eligere, vel ex varijs conficere sum-
ptis pulueribus cum gummi, myrrha, styrace, aut alio tenaciori pharmaco: ex
quibus pilas cōficies, quarū vna super prunas iniecta, suffumigium præstabit.

*Pess̄i, &
iniec̄tio-
nes.*

Quod si neq; his omnibus debita ratione, & occasione factis, affectio cedere
videatur, accedendū est tunc ad pessaria, & metrachitas: quibus sanē maxima
cum cautione vt̄ oportebit, nā, & exulcerationes in vtero, & validas distempe-
ries, & alia non contemnenda mala passim inferre solent. Conficiuntur aut̄ pes-
saria duobus modis, quā videlicet tantū os vuluæ attingant, nascalia appella-
ta, & quā sese penitus inserant. Nascalia præsidium virginibus est vtile, & ne-
cessariū, nā illā reliquū abhorrent. Paratur verò nascalia puluere aliquo ex ijs,
quos mox referā, bombace excepto, & osculo pudendi adhibito. Pessus porrò
est medicamenti genus, quod in collū matricis inditum suppressos menses mo-
uere natū est. Constat quidem figura terete, longitudine .iij. digitorum, & crassi-
tie digiti vnus, plus minusve prout prudētī medico visū fuerit, est sanē nuptis
vtile præsidium. Fit aut̄ multis modis: primo, ex liquore aliquo glandis forma,
melle aut cera coactū. Fieri quoq; possūt, si receperis mellis cocti. 3. j. cui circū
adde hieræ picræ. 3. ij. euphorbij in puluerem redacti. g. iij. misce, & fiat pessus.
Ex radice quoq; rubee probē cōficitur iniūcto melle, aut felle, & sparsis nigelle
puluisculis. Quibus oib. aliquid odoratum velut galliæ, musci vel ambre adde-
re oportet. Cōficies quoque, ex melle, aut cera additis pulueribus radicis, ireos,
acori, asphodeli, cyperi, caparrorū, aristolochiæ, rubiæ, foliorū abrotoni, arte-
misiæ, absinthij, calaminthę, hyssopi, prasiij, sabinae, nigelle, baccarū lauri, semi-
nis anisi, vrticæ, & trochiscorū de myrrha. **Que** quoque vsum præstant pess̄i, & C
medulla ceruina inuoluta linteo mundo, & apposita: vel ex mercuriali, & tere-
benthina cū modico agarico. Prodest, & succus ciclamini v̄tri illitus. Fieri ē t̄
possūt hęc auxilia ex styrace, laudano, galbano, sagapeno, ammoniaco, bdellio,
& similib. Quib⁹, vt valētiora fiāt, addi ē t̄ pōt. 3. j. aut. g. x. pulpæ colocintidis, scā
monei, aut radicis vrticæ. Alios itē pess̄os, quos maximi esse momēti scio, confi-
cies, si receperis fellis hirci, aut vaccæ. 3. j. asari, agaria, cinnamomi an. 5. j. succi
mercurialis. 3. j. coquat̄ succus cū pauco melle, & simul incorporata reducantur
in formā vnguētī, ex quo pessū cōfice. Itē alios cōficies, p̄sertim pituita reducan-
te, ex trifera magna sine opio, ex theriaca, castoreo cū prædictis pulueribus, aut
alijs eiusdē farinæ, addito pipere, terebintha, vel resina. Quos pess̄os, filio liga-
bis, neque per integrā horam ibidē morari fines, ne aliquod ex sup̄a dictis ma-
lis fortē accidat. Fiet identidē pessus admodum vtilis ex modico mercurialis tri-
tæ, & hiera simplici, & mithridato, cum granijs aliquot moschi. Conficies tamē
alium

A Alium pessum hoc mō, recipe radicis ireos, ciclaminis. an. 3. j. mirrhæ electæ, castorei. an. 3. j. seminis rutæ, melanthij. an. 3. f. ex quibus fiat puluis, q̄ terebenthina exceptus, in pessum degeneret. Ex radicibus et̄ tapfi, maluæ, althæe, iridis, apij, enulæ, feniculi, & alijs cōsimilē habētibus virtutē purgatis a superficie, & illitis oleo liliorū, iasminorū, costino, euphorbij, uel cui incoctæ sint res menstrua mouentes, addito vino, & additis et̄ pulueribus nuper dictis, pessos parare poteris, radices aut̄ primò modicè calfacito, vt emollescant. Ex quibus oib̄s pessis, q̄ tutiores fiunt linteo quod ī tenui indui debēt, vterus vires medicamenti suscipiat, acrimoniā tñ, ac mordacitatē minimè degustet. Sed vsui pficuos quoq; parabis hac lege, resinæ. 3. f. myrrhæ. 3. j. croci. 3. f. styracis, & galbani, vtriusq; 3. f. mellis. 3. j. f. cū coto, aut lana carpta fit pessus. Vel fiat ex melle, myrrhæ, & succo absinthij, belzoino, & oleo irino. Possunt tñ parari faciliores ex ficu arida ad formā digiti extensa, iniuncta, madida, aut mixta aliquo ex p̄dictis medicamentis, uel ex felle, aut succo aliquo. Velim tñ huius loci lectores monitos, ne indistinctē ijs, q̄ diximus, vtant medicamentis: nā cū vteri natura sua sponte faciliè ob loci calorē, & excrementa, distēpericē cōtrahat, exulcerationes, & alia mala necessū est subsequant̄. Cuius gratia summa rei erit mucilagine, aut succo aliquo tēperatos in vterū immittere, ut eorū uis, & acrimonia aliquo mō frenet̄. Nā quātū calida medicamēta mucilaginis, & blandis medicamētis retunduntur, tñ eadē mucilagine vterus emollit̄, p̄paraturq; & ocyllimē, & mitiori adhibito medicamēto facilius cedat, laxeturq; aut ad expellendū irritet̄. Modus tñ vtendi his pessulis est, à leuioribus initiū sumere, q̄ fiunt ex anserino, seu gallinaceo adipe, saccharo ruheo, & pauco croco. Post modū deuenies ad eos, q̄ fiūt ex mercuriali, seu artemisia, ex pulegio, ex maiorana, ex ruta, & sabina. Quibus p̄missis, si vltus poposcerit, ad acriores puenire poteris sensim, & gradatim. Nascalia uerò ex eisde parari possunt medicamētis, gossipio, lana, cera, resina, aut ficu aliqua exceptis, & pudendi osculo adhibitis. At vterinos clysteres degustare virgines fas nō est: caue. n. oportet eas ab huiusmodi p̄sidio, verum in alijs sœminis mille modis parari possunt. Primò, ex succo mercurialis depurato, uel ex decocto rubiæ tinctorū, origani, uel radicū aperiuiuarū, saliuæ, matricariæ, nepetæ, quātitate. iij. x. addita. 3. f. pulueris melanthij. Itē parari pōt ex oleo lilaceo, chamæmelino, laurino, cū decocto calaminthæ, & origani, additis myrrhæ, & croco, cū oleo de styrace. Cui vsui cōsimiles parare poteris facto decocto ex ijs, q̄ sepius hucusque memorauimus. Ceterū hoc p̄ oculis habeto in ijs, q̄ in vterū infundunt, ne diu ibidē immorent̄: sed pessis post vnam, aut duas auferantur horas, iniectiones verò, post duas, aut tres. Mox verò vterum diluere oportet aqua graminis, uel apij, asparagi, petroselini, aut decocto eryngiorum. Mihi tñ arrisit magis maluarum decoctum: nam cum ardor vteri collo, aut utero ipsi faciliè concitetur ex acrim medicamentorū adh̄ esu, mitigare id procul dubio teneris butyro recenti infuso, oleo rosaceo, aut ceraio refrigerante Gal. vel lacte, aut hordei cremore, uel aqua hordei mediocriter calida editis maluis. Profunt, & idonea existūt mēlibus mouēdis vterina clysteria, q̄ hac forma uel simili cōficiēs. Re. roris marini, thymi, valerianæ, sabine an. m. j. sampſuchi, smyrnij feniculi. an. m. dimidiū, fiat decoctū, cuius suue. 3. iij. styracis. 3. j. catholici. 3. f. dissolue, & p̄pe somnū infundito. Vel si magis placuerit, excipe radicū aperiē

tium, rubear maioris. an. 3. j. radici eringij, cyclaminis. an. 3. f. mercurialis. m. j. fa-
binæ parum, spicæ vtriusq; asseri. an. 3. ij. seminis melanthij. 3. ij. f. facta coctio-
ne infunde in vterum cum modico vino. .i. iij. Quod si abstergere volueris, his
addes lupinorum vel fabarum. an. 3. ij.

*Externi
onũctio-
nes.*

Verum quia his oĩbus adhibitis renititur adhuc rebellis affectio: vltimam ei
adhibere manum oportet inunctionibus, & vnguentis, q̃ exterius adhibita præ-
dictis auxilijs opitulentur. Inunctiones quidẽ facito ex oleo liliorum, de casto-
reo, ex succo angelicæ, ex oleo anethi, baccarum lauri, de croco, de vitellis ouo-
rũ, de capparibus. Ex quibus cũ cera, croco, & aliquo ex prædictis pulueribus,
vel theriaca, facillẽ possunt vnguenta confici, q̃ huic vsui proficua esse comperi-
mus: quibus oĩbus vtile proculdubio est mucilagines admiscere. Conficies ta-
men vnguentũ, quod recipiat olei liliacei, & irini. an. 3. j. olei amygdalarũ ama-
rarũ, & capparorũ. an. 3. f. succi rutæ, aut sabinæ, & artemisiæ. an. 3. iij. ladanĩ, &
ceræ qđ sufficiat, vt fiat vnguentũ. Ex succo et mercurialis, rubiæ, & summitatũ,
sambuci cũ oleo capparorũ, & de lilio, addito modico croco, & cera, mirabile
paratur vnguentũ, si interim dum conficit, modicũ vini addatur. Illiniant etiam
imus vter, & lĩbi, oleo de styrace, vel zoino, laurino, & anethino, addita myr-
rha, & galbano. Ceterũ poteris alia effingere ex ijs, quæ nos lib. 2. de indica-
tione auxiliorũ, capite de aperientibus abũdẽ adduximus. Atq; hæc dicta suffi-
ciat de ea obstructione, q̃ ex crassis, & pituitosis humoribus ortum ducit. Circa
quã mirari nõ debes, si plusculũ immoratus fuerim. Nã cũ frequẽtius mēstruo-
rum suppressio ex ea prodeat, cogimur diligentius eam expendere, & curare.

*De atra
bile redũ-
dante.*

Si atra bilis redũdauerit, & ex copia, aut crassitie, & soliditate, sanguinẽ cras-
siorẽ, & fluxui ineptiorẽ reddiderit, aut meatus occluserit, materiã eo tempore
prẽsidiũ mutare oportebit, & in eam, quæ è directo atra bilioso humori rĩdere
possit, commutare, seruata tã vniuersali medendi rōne, & victu et humidiori, &
optimi nutrimenti instituto: sicut frictioibus, ṽnculis, & alijs, q̃ superius di-
ximus cõi lege administratis. Primò itaq; ea cã cognita ex corporis hirsuto ha-
bitu, ex insolita mæstica, & reliquis, quæ prædictum humorem attestari dixi-
mus, sanguinem mittere, ceterum in minori copia, & per longius interuallum,
vis terre oportebit. Idq; ex venis tali, præsertim sinistri cruris, nisi affectio sit in-
eunte vere. In quo melancholiam cum massa sanguinaria redundare necessum
est: siquidẽ crescente sanguine, melancholiam quoq; eius fecẽ crescere rōni est
consonum. Ego tñ circa hoc prẽsidium magnifeci semper in mēsiũ suppressio-
ne ex hac cã concitata, per hirudines ab hēmorrhoidibus sanguinẽ extrahere:
nã in eis venis melancholicũ sanguinẽ redundare magis, quã in reliquo cor-
pore compertũ est. Ob idq; satius erit, ab ea parte, vbi copiosius viget melãcho-
lia, eã extrahere: præterq̃ q̃ promptius eundem sanguinem per proximas ve-
nas ab obstructo, aut pleno vtero extrahere, q̃ per distantes. Cui etiam rōni ac-
cedit, in sanguinis detractioe ex alijs partibus, plus sanguinis esse extrahẽdũ,
si vtero profuturum est, q̃ exigat melancholiam corpus, in quo vereri semper
oportet plurimum sanguinis extrahere. Et ob id eas venas inscindere, quæ ci-
tius, & tutius à parte affecta crassiorẽ sanguinẽ euocent, quales hēmorrhoides,
esse censeo, rationabilius ṽr. Verũ si splenem, aut ipsius obstructionem, cau-
sam suppressioni mēsiũ prẽstitisse cognouerimus, saluatelã sinistra manus
tundere,

*Sangui-
nis detra-
ctio.*

Attendere, commodissimum esse inficiabitur nemo. Hoc tamen in hac re expendas velim, præmissa aliqua melancholiæ purgatione, satius esse sanguinē mittere, quàm ante ipsam. Nam decolores fœminas purgatione sanari magis dixerat Hipp. 5. Aphor. 36.

Purgationē aut redundante melancholia institues semel, aut bis confertim: præparatis tñ sufficiēter corpore, & humore. Quo factō rarius, & paulatim purgatione vtaris opus est: maiori nimirū facta in pparatione diligentia, q̄ in pituitoso humore, vehemētoribus adhuc medicamētis, in minōri tñ quantitate exhibitis, vt capite de expurgatione lib. i. indicationum diximus. Quam legem si seruaueris, censeo te parū posse ab scopo aberrare. Parabis quidem humore syrupo de pomis, de succo borraginis, de epithymo, aut fumariæ: quem dilutiore facies (nā talia oportet esse quæ melancholiam præparant) decocto prunorum, passularum, florum violarū, radicū scorchiōneræ, & buglosæ, seminis maluæ, petroselini, & cinnamomi, demū epithymi, ac senæ decocto. Quibus p plures dies exhibitis, corpus confertim purgabis, nō validissimis medicamētis, sed mitioribus in maiori tñ quantitate. Cuius census sunt cassia fistula in prædicto decocto dissoluta pondere. ʒ. i. vel efformatis ex ea bolis cū puluere foliorū senæ, & saccharo. Prodest. ʒ. j. diacatholici, vel cōfectionis hamec (abiectis scāmoneo, & colocintide) in aqua lactis, vel p̄dicto decocto dissoluta, aut formatis ex eadē bolis cū puluere foliorū senæ, & saccharo: quibus oībus agarici aliquid addere non erit ab re. Prosumt itē cortices myrobalanorū indorum ponderē ʒ. i. luteorū. ʒ. ij. diluant horis duodecim in sero caprilo, & facta colatura, ac expressione adde manne electæ. ʒ. j. & l. aut. ij. epithymi. ʒ. ij. mellis rosacei. ʒ. j. & fiat potio. Facta hac pleniori purgatione, maiori q̄ potueris diligentia curabis, menses ex hac cā detentos euocare: nam ex ea facile in grauissima symptomata dilabuntur fœminæ. Ob id anteq̄ in aliquod prorumpat suppressio præparare, & purgare per epycrasim, seu paulatim humore melancholicum oportebit. Cui vsui præmissis syrups, & decoctis, q̄ nuper diximus, apozematibus alijs utaris necessum est, quæ conficies ex p̄dictis rebus, additis, quæ aduersus melancholiam à viris doctis excogitantur. Cuius gratia hoc decoctū parabis, quod recipit adiaū, florum vtriusq; buglosi, violarum, stēchados, chamædryos, & lupulorum. an. m. f. polipodij. ʒ. iij. glycyrrhizæ, vuarum passarum. an. ʒ. f. terantur parū, & coquantur in sufficienti aqua, & in fine decoctionis adde epithymi. ʒ. f. coletur, & adde sacchari quantum sit satis ad cōciliandam dulcedinem: cuius. ʒ. iij. aut. v. porriges. Poteris etiam facile alios potus excogitare eadem seruata methodo: sed præstat decoctum florum violarum, & adianti, cum passulis sine acinis, & foliorum senæ facta forti expressione: quibus, & rebellem humorem temperabis, præparabisq; & paulatim expurgabis. Nam licet dictum à me sæpe sit, mutas melancholiæ purgationes necessum esse validis fieri medicamentis: id præceptum rarō vsu uenit in fœminis. in quibus vel a leuissimō medicamento ob sanguinem retentum grauissima exacerbantur accidentia: Cum hoc tamen si p̄dictis dilutis modicum ex valentioribus addideris, facta purgatione per longiora interualla, nihil nocebis. Ob id quidem proderit turpeti parum per noctem infundere, aut agarici, vel fortioris. Quod, cum maxima cautione aggreduendum esse consulo, propter superiūs adductam à me rationem.

Pulueres

*Pulue-
res, &
placenta*

Pulueres quoq; & placentulas, ac electaria facile tibi erit cuiq; femina parare, si rebus, quas superius pituitosis corporibus dicauimus, addideris aliquid ex ijs, quæ melancholiam respiciunt, quæ immodicum illorum medicamento rum calorem temperare habeant: siquidem in omnibus ad melancholicos phar macis ea semper sunt adhibenda, quæ modicè calfaciant, & plurimum hume- ctent: Quamobrem cauendum esse censeo à rebus aridis. Ob id profectò ex prædictis pulueribus, & ijs, quæ melancholiam respiciunt, non nihil sumere oportet, & conseruis florum borraginis, buglossæ, aut violarum admiscere. Ex quibus placentas, & bolos cum aqua lupulorum, borraginis, buglossæ, scor chioneræ, vel lactis, & similium parare poteris. Theriacam quoq; plurima a- qua dilutam, aut confectionem alchermes, vel de hyacintho potui dare licebit. Item radices buglossæ, cardus sancti, & similium herbarum saccharo condita- rum. Sic crithinum marinum, vel lupulorum summitates, aut capparorum ca- pita cum saccharo, aut melle, cum modico aceto, & sale condita, incredibilia efficacia prodesse, fertur.

*Balnea:
& in/ef-
fiones.*

Ex eisdem herbis, quas in pituitosa causa parare docuimus, probè instituire balnea poteris, additis maluarum foliis, althææ radicibus, & seminibus vtriusq; floribus etiam violarum, borraginis, & buglossæ, item fenugræco, semine lini, & psyllio, & alijs, quæ humori melancholico occurrere dictum est. Ex quibus, & balnea, & in/effiones parari facile possunt.

Suffitus rarò melancholia existente causa prodesse possunt: exiccant. n. po- tius, indurantque siccum sua natura humorem. Ob idque suffituum loco eu- aporationes esse frequentius suscipiendas, mihi semper arrisit magis, tum quia halitus ille, & vapor facilius humoris duritiem euincit, molliorque tum verò, quia partes facilius dilatantur, & aperiuntur, tum vltimò, quia confici possunt euaporationes ex ijs rebus, quæ melancholicæ naturæ aduerfari magis possunt, quales sunt, quas nuper retulimus.

*Pessus, et
metran-
chita.*

Pessus, & uterini clysteres ex ijs rebus, quas superius diximus, confici pos- sunt, cauentes semper eas, quæ sicciorē habent naturam, & additis, quæ mul- cebrem, & leniorem obtinuerint. Sic prædictis mucilaginēs addere poteris, & portulacæ, vel borraginis succos, vt & pessi, vel clysteres simul humorem me- lancholicum irritent, & mulcebre, ac mansuetiorem reddant.

*Inunctio-
nes.*

Inunctiones eadem lege parabis addito semper oleo amygdalarum dulciū, sesamino, mucilaginibus, & succis, qui vires habeant humoris duritiem frenā di, ac emolliendi. Sic axungia ex vsu est, vel, si femine vterus pertulerit, addito modico aceto.

*De fla-
uabile re-
dundan-
te.*

Arbitror quidem fœminis nusquam posse menstrua, vi caloris, aut calidio- ris humoris supprimi, nisi aut bile crassiori ob adustionem facta, aut calore in- crassante reliquam humoris massam resoluta ab ea tenuiori parte, id quod fa- cile discas ex pallido faciei & totius calore, ex uris amarore, & siti, ex corporis proritu, & inquietudine, & alijs quæ id quoque doceant. Quamobrem hac causa prævalente auxilia omnia, aut frigida, aut moderata esse oportet, & humida: ideoque victus rationem instituire oportet his conditionibus prædi- ram, ac potus paulò largiores, aerem frigidum, & reliqua his consentientia. Quibus institutis ex basilica dextri lateris rationi videtur cōsonum primò san- gui-

A guinem mittere ventilationis præstandæ gratia, ac mox ex talo, vltimo tamē ex saluatela dextræ manus, cuius incisio maiorem iecori præstat refrigerationē. In quo sanè casu plus sanguinis, quàm pituita aut melancholia redundantibus educere oportet minns tamen quàm plenitudine prævalente, cum ob ventilationem omni suppressioni necessaria, tum verò ob refrigerationem. Nam calore aut bile redundante id præstat potissimum sanguinis detractio.

Quod si calor cum bilis flauæ crassioris accessu causam suppressioni præstiterit, refrigerationē maiori opus est, quàm si solus in affectum prorumpat. Quo tempore raro, aut nunquam expurgantibus vti medicamentis licebit, frequentius tamen alterantibus, ijsq; efficacioribus erit necessum. Nam & potius aque, & alia, quæ consimilem corporis calido teporem inducant, frequenter menses mouisse comperimus. Verum si bilis redundantiam cognouerimus, non erit, ab re mox a sanguinis detractioe eam minuere pharmaco seligenti exhibitio. Quam tamen prius preparabis syrupo cichorij, buglossæ, rosarum, & violarum, cum aquis stillatitijs, vel decoctis ex ordeo, violis, cichorio, acetosa, & radicibus scorcionera, adianthi, florum viriusque buglossi, eupatorij, & quatuor seminibus refrigerantibus. Quibus & alijs potibus humore frenato, ac reddito expulsionem idoneo, vti poteris expurganti pharmaco, veluti casia, manna rhabarbaro, corticibus myrobalanorum, citrinorum, & pilulis de aloe lota, ac syrupo de infusionibus rosarum: facta que semel, aut uis pleniori purgatione, ex usu cetero esse, paulatim quoque purgare rhabarbari diluto, tertio aut quarto quoque die in aqua lactis copiosiori facto. Interim tamen ipsam lactis aquam cum saccharo manè porriges cum syrupo violarum, aut quouis alio ex prædictis. Nec ob id cessandum est à vinculis, frictionibus, cucurbitulis, crurium lauacris, & alijs, quæ supra diximus. Quibus accedit cōsiliū Hipp. lib. 1. de morb. mulie. hæc verba proferentis. At verò biliosi si menses prodeant, pusillanimitas incidit, & cibi fastidium, aliàs atque aliàs, & anxietas, ac vigilia, & eructat frequenter, & non vult deambulare, & tristis est, & non videre sibi videtur, timet, & si curetur ex his, sana erit. Si verò tempus processerit, adhuc magis dolebit. Optime vero cum ea agatur, si uomitus biliosus succedat, aut venter turbetur non fortiter, & subeant biliosa, & fluxus succedat ipsi non fortis. Si enim quid ex his forte inciderit in corpus afflictum, periclitabitur. Si verò leniter depurgetur aliquid biliosi, aut totum id, quod molestum est, sana fiet. Qua quidem sententia, & prælagandi, & curandi rationem appositissimè docuisse videtur: quā qui insequatur, & ad vnguem expenderit, reperiet facile per supernam, & præcipue per infernam aluum, & qua lege tuto purgari possint fæminæ hoc affectu laborantes: quo facto ad topica confugies.

Qua in re conferua violarum, vel rosarum, aut borraginis vti erit necessum cum decocto aliquo, aut stillatitia aqua ex ijs herbis, quæ menses mouere naturæ sunt dum remissioris sint caloris, admixtis in instillatione rosis, violis, cichorio, acetosa, ordeo, & similibus: ex quibus cum ijs pulueribus, quos menses mouere posse superius diximus, placentas cum saccharo, & aqua rosacea effingere pfacile est. Quibus manè sumptis cū largioribus ac frigidioribus potibus, agrotas iuuari experimēto comperimus. Cui etiam vsui parare oportet pastillos ex frigidis seminibus cum saccharo.

Bal-

Purgat.
110.Electa-
ris, &
planta.

Balnea, Balnea item ex dulei aqua, aut temperatori facta ex decocto supradictatum **A**
in se- herbarum, hac quoq; causa praevalente maximè sunt ex vsu. Cui balneum hac
ius. methodo conficies, althææ cum radicibus. m. iij. artemisiæ. m. ij. foliorū sambu-
 ci, foliorum salicis, foliorum violarum, polytrici. an. m. j. valerianæ sesquilibra,
 fenugræci lib. j. seminis lini lib. s. artemisia in linteo excepta cum seminibus fiat
 decoctum. Ex quo etiam infusus parari possunt, aut ex prædictis rebus fieri sac-
 culi, qui nuper dicto decocto madidi, calentes, & expressi pudendo adhiberi
 possunt. Aliter quoque hæc eadem auxilia conficies, ex decocto nimirum mal-
 uarum, althææ, foliorum violarum, & chamæmali florum. Quod vsui esse pro-
 ficuum summopere censeo. A balneo verò, aut infusu fœmina sumat pastillum
 aliquem cum cremore seminum melonum, vel cucumeris, addita aqua hordei,
 vel capillorum veneris, aut glycyrrhizæ.

Pess, Cui sanè causæ prædominanti cautè adhiberis pessos, & metran-
chita. chitas, ob rationes à me paulò superius adductas. Pessos tamen conficies ex contusis malua-
 rum, & althææ radicibus, saccharo rubeo, adipe anseris, vel gallinæ cum modico
 hordeo decoctis, omnibus tamen contusis ac simul mixtis, & serico linteo **B**
 inuolutis ad pelli formam reductis: quem ante quam in uterum immittas, oleo
 amygdalarum dulcium, aut sesamino inunges, lacte, aut emulsione seminis me-
 lonum, supersparso aloes puluere. Item metranchitam parare tantum oportebit
 ex rebus, quæ modicè attemperant, & quodammodo menses moueant, veluti
 ex lacte seminum frigidorum maiorum, ex hordei decocto, maluarum, & vio-
 larum cū modico saccharo: ex lacte etiam, ac alijs consimiles vires habentibus.
 Nam calidioribus uti periculo non vacat. Ferunt etiam radicem lilij hortensis
 sub prunis coctam, & oleo subactam, vteroque per linteolum immissam men-
 ses trahere, uterum emollire, & vuluam, ita ut certum sit semen eius vino albo
 tritum ac epotum, celerrimè fetum mortuum educere.

Inunctio- Inunctiones circa pubem, & inguina quoque adhibebis ex oleo amygdala-
nes. rum dulcium, violarum, sesamino, & de cucurbita cum mucilaginibus seminis
 citoniorum, & psyllij. Itè ex vnguento rosaceo, & refrigerante Galeno ascripto,
 addito oleo liliorum, & mucilagine radicis althææ, vel maluæ, facta harum ra-
 di cum sufficienti coctione. Ex quibus cum modica cera, & pauco croco, aut ci-
 tra ipsum, varias poteris effingere inunctionum formas. Ea tamen a viris doctis **C**
 probata est, quæ recipit olei, amygdalarum dulcium, & amararum, ac de cucur-
 bita. an. 3. j. adipis anseris, & butyri recentis. an. 3. iij. ceræ albæ, & ladani, an. 3. j. f.
 fiat vnguentum.

Quod si neque his omnibus affectio cedere videatur, eisdem addere tutum,
 & necessarium est aliquid eorum, quæ menses mouere diximus, paulatim à mi-
 noribus sumpto initio, prout fœminam ferre posse citra caloris exacerbatione
 cognouerimus.

De sup- Frequenti experimento constat, fœminis menses supprimi ex vteri distorsione,
pressione vel retractione ad alienam partem, & extraneam regionem, ita ut vasorū oscula,
mensiu vel occludantur, vel peruersa eorū figura inepta consueto fluxui efficiatur. Quā
ex alijs sanè affectionem curare perdifficile est: noscè tñ poteris ex laborioso partu præ-
uteri vi- cedente, ex ictu, percussioneve, aut casu, vel cōuulsione, quæ dū affuerint, mini-
uis. me sunt cognitu difficilia, id vitiū aliquādo proficisci. Quorum omniū memi-
 nerat

A nerat Hipp. lib. de nat. mul. dicens. Si uteri ad coxam decurrerint, & menses nō prodeunt, & dolor ad intum ventrem accedit, & ad lateris mollitiem. Qua parte iuber sic affectas multa calida lauare: & inter aliqua, quae ibidem recenset, fomenta quoq; parti adhibet, praesertim post purgationem. Conficit quidem fomentum ex feniculo, & absinthio; a quibus iubet digitis uterum ad antiquum suum retorquere, & mercuriali purgare: quae omnia fieri docet, donec menses fluere incipiant. Eis quoq; medebis frequenti exercitio, equitationibus, balneis, aut diuersis corporis uestionibus, vel saltu, vel quouis alio laborioso motu. Alia quippe adhibere praesidia frustra est, & non tutum, praeterquam cataplasmata dorso adhibita, quae uterum ipsum facta prius per digitos emulsione, ad antiquum locum reuocent, & reuocatum firmiter teneant, vt vulgariter obstetrices efficere solent.

B Item si vteri osculum, aut vterus ipse ex frigidityte externi durior factus fuerit, aut spissior, & ob id corrugator, ita ut minimē possint menstrua profluere, ex relatione habito cognitionis principio, curationem institues calorificis praesidijs, suffitibus nimirum, euaporationibus, balneis, inunctionibus, & alijs auxilijs, quae citra vllam euacuationem calfaciendi tantum vires habeant.

Ex frigidityte externa.

Verum si vterus ex cicatrice, aut callo aliquo adnascens ita durus factus sit, solidus, ac foraminibus destitutus, ut minimē possit sanguinem fundere, quae leniter emolliant sunt adhibenda, donec callus emolleat. Interim tamen non erit ab te sanguinem mittere, ne superabundans in aliquod maius malum prorumpat. Qualia autem debeant esse haec praesidia, reperies c. de emollientibus lib. secundo nostro de praesidiorum indicatione.

Ex cicatrice.

Puril quoque ratione carnem supercretescentem excedere est necessum, cum menstrua impedit purgationem, ut lib. secundo paulò antè citato capite de cicatricem inducentibus, reperies. Item si membrana aliqua antesteterit in vteri osculo, vel clausa fuerit femina, qua lege debeat dirumpi capite de feminis clausis facile edices.

Ex supercreta carne.

C Quod si ex tumore aliquo praeter naturam vteri ipsius, vel partis alicuius vicinae mensiuorum suppressio fiat: fugiendum est ab ijs, quae menses euocant. Sed prius tumorem ipsum curare oportebit sanguine sufficienter misso, & adhibitis auxilijs, quae inflammationem ab utero arcant: qualia reperies proprio c. paulò inferius vel tumore quouis duro prius curato, ut proprijs capitibus scriptum est.

Ex tumore.

De mensiu diminutis, ac de mensium stillicidio. Cap. 10.



A V D. secus, quàm in vesica, cum vitiosè excernit vrinam. cōtingunt in mensium suppressione vitia, & symptomata. Nā si cut ischuriam (vrinae quidem cohibitionem) omnino refert mensium suppressio. Sic diabeticam emulatur passionē mensium diminutus fluor, & pari quoq; ratione dysuriam redollet difficilis mensium profusio (praesertim si dolor, & labor ei adiungantur, cuius meminero sequenti c.) nimirum cum menses guttatim, & per lon-

Aff. di. nis m. va.

per longius tēpus prorumpant, affectio quidē, q̄ eis reduci habet symptomatis: A
q̄ in uitiosa, seu corrupta actione facultatis, cui munus illud incumbit, cōsistit.
Morbum sanē eum habet, autōrē, qui ad malā partis figurā pertinere creditur, li-
cet aliqñ figura non sit suapte natura uitiosa, sed respectu humoris tenuioris iu-
sto, aut alterius causae, cui excernendo figura naturalis proficua non sit, et si nō
rarō ex mala temperie prodeat, seu humoris acrimonia, quā dolore, ac morsu
facultatem laceſſat ad frequentem excretionem, ut seq. c. docebo.

*Differen-
tia.*

Contingere huiusmodi affectionē uno ē duob. modis probatum apud uiros
doctos, p̄sertim apud Aetium reperio. Nā aut stillatim profluunt menses indolē-
ter, & citra aliquod aliud accidens, praterq̄ q̄ & diu, aut parum durant, & mi-
nutē prodeunt, aut cū accidentibus & grauissimis symptomatis: his quidē pecu-
liariter mihi est in animo caput dicere, illis uerō hac in parte sermo instituet.
Grauis porrō est affectio, & q̄ multarū calamitarum in fœminis soboles existit,
nā & uiris ingratis reddit, steriles, & aliis plerisq; affectionibus obnoxias. Ob-
idq; diligenter oportebit prauiderē, quominus mala hæc ipsis accidant.

Causa.

Si quis Aetium legat lib. 4. serm. 4. c. 63. huius mali causas ad unguem exp̄s- B
sas reperiet: quas quinque esse species diuersas fatetur: meatuum nimirum an-
gustia una est, tamen diuersimodē contingens, uirium debilitas altera: sangui-
nis multitudo tertia: sanguis ē pituitosus quarta, & ultima sanguis fœculētus,
quibus non erit ab re sextam addere, nimirum sanguinis acrimoniā, & tenuita-
tem, quā uel facultatem perpetuo laceſſit, uel ipsa nolente defluit, q̄ sanē rem
paulō diligentius expendere est necessum, ut quæ frequenter accidat, & diffi-
culter curetur. Primō meatuum angustia diuersimodē contingens, à prædicto
auctore non sine magna rōne refertur. Nā ea meatuum angustia, quæ totalis est
& in oībus meatibus, hæc omnimodā efficit mensium suppressionē, & licet ex
diuersis proficiſcatur causis, non quidem stillicidium, sed suppressionē efficere
nata est. Verum dum ex toto meatus non recluduntur, neq; oēs, sed aliqui, hos
quidem uarijs figuris gaudere nulli esse dubium arbitror. Quippe magis mi-
nusue recludi, non paruā efficit in affectu differentiam. At qui cum ex totum
meatus non recludantur, neq; multum sanguinis defluere posse, neq; ex toto
cohiberi par est. Ex quo constat fluere quidē, cæterum paulatim, sensim, & diu. C
Sed ut mea fert sūa, simplex plenitudo, & utcunq; existens nō præstat huic ma-
lo causam. Nam ea proculdubio oīnimodā efficit obstructionem. Verum si
aliqñ hoc uitium nata est efficere paruā plenitudo id quidem parit, quia ex hu-
morum in æqualitate proficiſcitur, dum ipsi non sint unius naturæ, & conditio-
nis, sed quasdam habeant partes alijs crassiores, & tenaciores: ac ob id nihil mi-
rum, si minori existente plenitudine hoc uitium suboriatur propter humorū
obstruentium inæqualitatem, quam sanē ego censeo huius affectionis esse po-
tissimam causam. Præterea nuper dictis altera accedit, nam in omnimoda uirium
debilitate nihil prorsus excernitur, quia cum id munus sit facultatis opus, ipsa
deficiente necessum profectō est, & actus quoq; cessare. Verum dum aliquid
potest, idq; parum, ac debilitate, agit quidem, cæterum diminutē. Ex quo fit non
nihil ab eadem excerni, parum tamen, ac diu excretum: parum, quia cōfertim,
& subito, cum imbecillis sit, excernere nequit, diu uerō, & sæpe, quia multum
sanguis superest, & ob id paulatim, & sensim excernere cogitur, Quod si ui-
tium

A tium in retentrice reuertere velis; quia sensim defluere permittit quod illi commissum erat, ita ut indeterminatum habeat excernendi tempus, fit quidē, ut paulatim menstruationes efficere cogatur, nisi sanguinis nimia multitudo huic quoque malo causam praestiterit. n. neque vniuersum sanguinē uenē capiunt, neque omnino ocluduntur. Qua propter instillat sanguis, ac ueluti colliquatur, & guttatim exit. Sanguis etiam pituitosus cum fluxui ineptus sit, dum abundat, fluit quidem: uerū tamen fluere nequit: ex quo constat, paulatim, ac sensim teneri fluere. Sic quoque foeculentus sanguis dum praeter modum abundat, ex collata sanguinis tenuiori parte, hos mouet minutos menses: nam cum crassum defluere nequeat, neque tenne omnino detineri, fit facillē, ut instillatim prodeat. Hoc dixerim, ut quis intelligat, qua via medendi rationem in grauissimo hoc affectu aggredi teneatur. Nam si ignoret modum, quo quauis harum causarum operari habet, perdifficile profectō erit non errare.

B Signa uero, quae affectum ipsum in genere monstrant, exquirere, inutile esse cenfeo: siquidem fluendi modus id planē ostendit, ita ut facillē sit cuius, quātuus idiota existat, eum nolle. Cū hoc tñ scito menses, licet fluant, suppressos cense, si lac in māmīs appareat citra aliam cām, & ēt non reddi ad antiquum modum, & quantitatem, ni lac ē māmīs defuerit. Et ob id fēminae, quae lac habent, interim dum habuerint, steriles censendae sunt, & omnino ad conceptum ineptae. Causarum autē dignotio haud ita facilis est, & ob id breui ratione, & manifestissimis signis eas monstrare curabo. Plenitudinem dignosces ex fēminae habitu, ex totius corporis grauitate, & lassitudine, lumborum, ac renū graui dolore, praesertim instantibus mensibus. Ac si qñ plus solito excernatur, leuamen persentiunt. Capite dolent, potissimum parte eius superiore torpent manus, & frequenter crura stupore corripuntur. Sanguis tñ qui excernitur, purus est, & ab omni vitio immunis, tenuis quidem, sed ruber. Facultatem secernentem esse imbecillam, ostendit excretio citra molestiam guttatim facta. Item ab exercitio frictionibus, & caloris auxilijs maior sanguinis profusio, argumentū planē euidentis impotentiae ipsius, siquidem adiuta calore, ad apertis vijs, & commoto humore ab exercitio sanguis uerius profluit. Sanguinem esse pituitosum euidenter ostendit color ipsius fluentis, nam albicans est crassus, mucosus, & lente mobilis, praeterq, q fēmina mollis est carne, alba, & uitae sedentariae, ac crapulis dedita. Quibus adiungitur in huiusmodi fēminis pudendū semper esse murcoribus, & superfluis humiditatibus foedatum, praeterq, q pigrae sunt ad motū, quis aliam actionem, somnolentiae, tēdiose, & alijs ingratissimis conditionibus praeditae. Foeculentum esse sanguinem ex eo cognosces, quia crassus admodum profluit, inaequalis tamen, ex crassis, ac tenuibus partibus cōstans, colore niger, aut alio tetro insignitus fēmina hirsuta est, subnigra, prauis alimentis dedita, mœsta, cogitabunda, malē morigerata, & ultimo si quid sanguinis profluit id certē est, dum per aluum excrementaui excernere nititur. Nam conatu illo, quem natura in expellendis excrementis apponit licet crassus, & foeculentus sanguis existat: cum hoc tamen aliquid excernitur, alio qui uerō nequaquam. Inaequalem esse uasorum figuram ex priuatione praedictorum signorum coniectura facta, uenari poteris. Tenuem aut acrem sanguinem nosces ex mordicatione, & ex ipsius consistentia, ac ex dolore, & exulceratione pudendarum partui.

Neque

*Præfati-
gum.*

Neq; fide dum est huic affectioni plurimum, nam & deterrius feminae sta-
tum monstrat, & deteriore prædicit. Humoribus quidem abundare, & cōsue-
ta vacuatione carere, graue profectò existit, & periculo plenum, quia necessū
subinde erit, corpus in deterius decidere. Ideoq; dixit Hipp. bonum habitū sta-
tim soluere, expedire. Ex quo inferitur longè grauius esse, plenitudinem esse vi-
tiosam, & non solui, præsertim per naturalem, & consuetam vacuationem. Item
dum facultatum impotentia malum oritur, longè grauius est, quia eadem pau-
latim succrescit plenitudo, & corpus minus potens in dies ad propellendū effi-
citur, & rursus ad resistendū eis malis, quæ ex hac causa oriri assolent. Præterea
pituitosam cacochimiam redundare, & expurgari non posse, nemo non veret.
Nam si sanguis sola copia peccans, tantorum malorū causa existit: quantò maio-
ri ratione pituitosa redundantia, ex qua, & malus corporis habitus, & hydro-
pes, & diuturnæ febres, importuni etiam, & graues capitis dolores, distillatio-
nes, & alia huius sortis vitia fiunt. Quòd si sanguis fæculentus fuerit, dubiū nō
est, quin hæc, & maiora mala succrescant. Veluti ciborum inappetentia, depræ-
uati appetitus, pustulæ per totum corpus, melancholici affectus, ac sæpe, si hu-
mor ex calfiat, furores. Vereri deniq; oportet, quauis harum causarum præua-
lente ne ex toto menses supprimantur. Vt cunq; tamen sit, steriles reddit feminas.
*Curandi
ratio.* Eadem omnino ratione mihi visum est, curationem aggredi, ac distinctionem
Causarum. Quippe viarum angustiam corrigere nemo poterit, nisi cognita cau-
sa cōprimente, & coarctante vias ipsas. Sic dum inflāmatio est, peculiare prære-
quirat diligentia, ut c. proprio reperies. Si compressio ex aliquo mēbro disloca-
to, redditus ad pristinū statū remedium est: & sic de singulis causis pro cuiusq;
natura. Sed earum, quæ huic vitio communiores, & frequentiores sunt, curatio-
nem scribā, initio sumpto ab ea plenitudine, q̄ ob id hoc malum efficere dictū
est, q̄ inæqualis existat; dixerim, q̄ ex inæquali constat humorum vitio: ex quo
efficitur fluere quod tenue est, idq; ob crassum obstruens paulatim, & sensim,
ac diu. Quamobrem potissimam curandi rōnem, eam existimo, quæ a sanguinis
missione incipit. Verum neq; tm̄, neq; confertim extrahere conuenit, q̄um ple-
nitude exposcere uidetur, nisi plenitudo grandior extiterit, quo tēpore copio-
sius extrahes, sed minus, idq; ob crassas partes alteram constituentem plenitudi-
nis partem. Ex quo optima ratione medendi ductus infero, necessum esse à san-
guinis missione inscindentibus, & attenuantibus potibus crebrius esse uten-
dū: fugiendumq; ab omni arido medicamento, ne quod in redundantia cras-
sum est, crassius, & durius fiat. Verum potius huic vsui aptos vel nullo negotio
reperies: cui sanè fore proficuum censeo, si feminae uterus id perferre uideatur,
acetosi alicuius syrupi, aut aceti ipsius, vel oximellitidis modicū alijs potibus adij-
cere. Quibus et admiscere non erit præter institutū aliquid ex lenibus pharma-
cis, veluti syrupum uiolearum, borraginis, de portulaca, & alios consimiles. In-
terim tm̄, & frequenter pillulis de aloe uariis oportet, vel alijs ex ijs, quas præce-
denti c. diximus. A quibus, balneis, & in sersionibus rem agere oportebit. Nam
huic affectioni, si usquā alicui summè prodesse possunt: quippe quod crassum
est, funditur, & quod clausum, aperitur. Præstat itē pessarijs ex aloe uti, nā incre-
dibili quadā efficacia sanguinē fundūt, & vias referāt. Qd si ne adhuc quidē his
oibus q̄cūq; p̄fueris: ea parabis auxilia, q̄ crassos humores eligēdo extrahāt. Ve-
rūm

Arum inter omnia, quæ huic vsui aliquid prodesse possunt, nullum penè reperies aliud tutius, aut vtilius, quàm hirudinum vsus, quippe quæ, & copiam demunt & quod crassius feculentiusq; est, mirè eligunt, & extrahunt. Ob id perfectò neq; crurum lauacra, neq; cucurbitulas, neq; scarificationes fœminis sic affectis adhiberem, eo quod tantum habeant distrahere, aut extrahere quod tenue est, crassis humoribus superstitiis manentibus. Vterinos etiam clysteres immittere, maximi esse momenti existimo, præsertim si receperint quæ attenuandi, & extergendi vires habeant. Quorum abunde meminimus c. præcedenti. Sed inter omnia præsidia huic affectioni apta, id semper expertus sum proficuum, quod ex inunctionibus paratur. Inter quas, eas eliges ex ijs, quas superius diximus, quæ vterum emolliant, & humores ibidem contentos attenuent. Veluti quæ ex oleo sesamino, de semine cucurbitæ, liliorum alborum, de croco, & uino albo ferue factis ad consumptionem vini paratur. Alia item conficitur ex prædictis oleis, vel de vitellis ouorum, & theriacæ: quo censu aliàs conficere inunctiones facile est: nec erit profectò ab re in hoc malo chalibis antidotum præbere.

B Verùm si ex facultatis impotentia mensium stillicidium prodeat, curandum est omni arte, aut facultatem irritare, aut eius motum supplere. Irritabitur porro facultas clysteribus uero immixtis paulo acrioribus, ut recipiant fermenti dissoluti in succo mercurialis cum modico, aloë. j. j. Idem etiam fit pessarijs, quæ consimilem facultatem obtineant, qualia præcedenti c. abunde docuimus. Cauendum tamen est omnino in hac causâ à sanguinis detractione, aut frequentî purgatione: sed perpetuo vtendum est ijs, quæ ualenter menses mouere nata sunt, tam per os sumpta, quàm per suffitus, & infusions, & fomenta. Quæ si feceris, scito te uera medendi ratione vsurum.

C Lentam, & crassam pituitâ (quæ sanguinem efficit crassum) si huic malo causam præstare cognoueris: facile quibus extenuare, atq; corrigere, & totam rem agere, ex ijs, quæ præcedenti c. diximus, colliges. Habet tamen id peculiare, dū non obstruit, sed fluxui inepum reddit sanguinem, ut uerè in sciendia, & attenuantia pharmaca desideret, præter victus institutionem, quam eiusdem conditionis quoq; ex postulat. In quo sanè casu præmissis, quæ diximus, medicamentis, & calorificis, atq; alijs, quæ aduersus pituitosum sanguinem, & ad coctionem & alia munia exequenda valere omnibus sunt nouissima, libere vterer, aut ijs, quæ vrinam mouent, vel sudoribus ex ligno guayaco, vel sparta parrela, aut radice chinæ provocatis: aut saltè dilutiori decocto ex his facto cum modico oximellite, quod vsui esse proficuum scio. Quod si neque his affectio quiesuerit, ad sulphurea balnea confugiendum est, quæ miram habent in hac re efficaciam. Vltimo tamè existimo dum affectio plurimum inueterascit, fontanellam in aliquo crurum apertam maximi fore momenti: Tentare tamen ante hæc omnia, paulatinam, & frequentem purgationem oportet ex agarico, & aloë, aut pilulis mastichinis, & alijs huius naturæ. In quo sanè affectu hæc omnia ordine aggredi, tutum & utile esse censeo.

Fœculentum sanguinem, dum in hunc affectum prorumpit, nullo alio auxilio tutius corrigere poteris, quàm proba uictus ratione instituta modico exercitio, ac denique ea uita sorte, quæ omnino præcedenti (quæ talem naturæ præstitit habitum) sit contraria. Verùm tutius huic affectioni medeberis sanguine

F misso,

misso, non ex uena scissa, sed per hirudines hæmorrhoidibus affixas. Quod præsidium in hac causa tanquam peculiare, & maximè proficuum summopere laudo. A quo purgationem instituere oportet ex casta, manna, syrupo ex infusionibus rosarum, aut violarum, ex confectioe hæmec sine scamoneo, & colocintide, dissoluta in aqua lactis, vel in aqua lupulorum. Item maximi erit momenti decoctum foliorum sene singulis diebus, aut tertio quoque die laboranti exhibitum, præsertim si id feceris admixtis aliquibus ex ijs, quæ superius attenuandi virtutem obtinere diximus. Atque hac etiam causa prædominante inunctionibus, & mollissimis euaporationibus uti erit necessum: quale est decoctum florum violarum, borraginis, & buglossæ, & quod ex radicibus altheæ, ac mercuriali parari solet. Pessarijs quoque utendum in hoc affectu est, cæterum mitioribus ex mercuriali nimirum confectis, ex axungia, ficu pingui, & alijs quæ consimiles vires obtinent (quibus addere oportet aloes non nihil) nam uerendum est, ne vehementioribus sæculentus sanguis exasperetur, succedaturve, ac maiora succrescant mala: Talis enim est sæculenti sanguinis natura, ut faciliè in grauissimos affectus degenerare habeat vel leuissimo quodam nocte irritamenti principio. Quod si ex sanguinis acrimonia, & mordacitate affectio suboritur, haud secus curabis quàm vrinæ difficultas curari expostulat, purgato mordaci humore, & attemperato residuo eius, his quæ lenia sint, velut est maluarum, ac seminis earum decoctum, altheæ, & portulacæ: item succus seminis melonum, & cucurbitæ tandem mucilagines, syrumpus, & ex mucilagibus, quem lib. indicationum. 1. cap. de clysteribus scripsimus: sed valet plurimum stillatitia aqua ex maluis, semine earum, altheæ, & portulacæ, ac seminum melonum, & portulacæ, ac ex portulaca ipsa succo extracto, cum sacchato & aqua cucurbitæ, quibus in alembico addes semen lactucæ hyoscyami albi, & papaueris albi. ana. 3. s. corticum fauarum vridium. 3. viij. quæ omnia contundantur. Tandem alijs uti oportet quæ ad prædictam vrinæ difficultatem proficua sunt, & faciliè reperies capitu. de menstrui fluore.

De menstruis difficillimis, & cum grauissimis accidentibus. Cap. II.

*Affectus
minuta.*



INTER diminutas, & stillatim factas sanguinis mēstrui purgationes, nō minus, sed fortassè maius facessit negotiū ea, quæ præter hoc quod minutim, et inordinatè prorumpit, difficulter èt & cum grauissimis accidentibus fit: affectio quidem oīno per similis vrinæ difficultati. Non. n. quauis mensium minuta purgatio stillicidij nomen meretur, sed ea tantum, quæ cum accidentibus, dolore, ac molestia fit. Quæ sanè mala aliquando instante purgatione euire scimus, aliquando verò, iam fluente: prioris memineral Hipp. lib. 2. popu. part. 1. tex. 13. dicens. Ex utero menses quæ iudicationum postridie, ut in lumbos an fœmur, hoc est, iusta veriore illius loci interpretationem, & versionē (& si alij aliter sentiant) dolores lumborum, aut fœmoris postridie in menses desinunt. Nam coniectabile est crassum sanguinem per arctas vias citra ea mala, & maiora prorumpere minime posse, quippe venatum vteri, quæ cum his paribus

A partibus vitium habent consortio, certum est id fieri. Quæ sanè affectio de genere est earum, quæ ad diminutam actionem pertinent, præsertim si excreti humoris consideretur copia. Verum si exercendi modum intuearis, nihil mirum, si ad depravatam excernentis facultatis actionem reduxeris, idq; potissimum si consideres dolores, molestias, & alia accidentia, quæ huic affectio adiungi frequentissimè solent. Morbus præterea, a quo hoc symptomatis genus prodit, neque vnus est, neq; vnicâ habet actiones lædendi rationem. Nam aliquando morbus est in via, putâ obstructio, aliquando soluta vnitas, q̄ aut ulcus est, aut erosio aliqua, nonnunquâ verò vicini alicuius membri dolorosa affectio: quâ ad distemperiem, vel ad solutam continuitatem reducere teneris. Prodeunt quidem feminis sic affectis, menses guttatim quoq; & stillatim, per interualla frequentius, quàm continuè idq; magis citra ordinem, quàm ordinatè. Et utcunq; prorumpant sibi habent comites dolores, inquietudines totius corporis cōfractiones, & alia innumera accidentia, quæ difficulter numerari possunt. Nā quibusdam grauissimi accidunt capitis dolores, alijs animi deliquia, & oris ventriculi morsus, plerisq; ventris inferioris, & lumborum intolerabiles cruciatus, multis quidem conuulsiones: tandem quæuis suum patitur accidens, prout humor redundauerit, aut viscus aliquod imbecille obtinuerit, ita vt facili ex commotione alterari menstruis, erumpentibus possit.

B Nacta est hæc affectio causas quodammodo similes eis, quæ in suppressione mensium reperiuntur, verum minis efficaces, minusque vehemētes, & adhuc minus in eis feminis, quæ pepererunt, quàm in sterilibus, & uirginibus, ut Hipp. prodidisse scimus in iūo lib. de mor. mul. Cuius sanè affectionis ipsum meminisse constat, & cassas quoq; retulisse eodem loco per hæc verba, de vasorum obturatione, quam potissimam arbitratur huius mali causam. Si uerò menses mulieri prodeant, quidem, uerum pauciores, quam cōuenit, utpote osculo uterorum paululum à pudendo emoto, aut nuper concluso, ad hoc ut prodeant quidem, verum obturentur ab ipsis etiam transitus, per quos penetrant, ubi ad uteros descendunt. Moderati sanè paulatim prodeunt sanguine temper osculo perfectè incumbente. Et postquam dies præterierint, quibus purgari solet, & conclusus fuerit sanguis in utero relictus, & alijs menses sub descendentes nō expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauant, & primis mēsis duobus, aut tribus non ualde prodeunt. Postquam autem præterierint plures menses, adhuc magis dolebit, & non habet in ventre. Quandiu sanè sic habuerit, & febris corripit ipsam debilis, & maximè in diebus, quibus purgari solet. Qua proculdubio sententia, Hipp. complexum fuisse huius affectionis principium, ac generationis modum nemo ambiget. Ego quidem censeo non esse, utcunque obturata uasa, sed peculiares huius causas esse inæqualem uasorum uteri obstructionem: q̄ sanè inæqualitas pficiscitur ex sanguine aliquo denso, cōcreto, & coagulato, uel sæculento, cui adiungitur facultas excernens robusta, quæ cum plurimū excretioni innitatur, atq; cum uasa non possint capere crassum illum, & concretū sanguinē, ut liberè profluat: fit facili, ut in extēsiōe uasorum, & partium sensibiliū, graues, concitentur dolores, & guttatim prodeat, sanguis ac fortasse aliquā grumosiū uel densus. Fit etiam ex crasso sanguine, a quo cum excretionis tempore moueat natura ipsum, flatus eleuantur crassi, caligi-

noli, ac densi, qui distendentes vterum, ac partes ei vicinas, cruciatus maximos **A**
 & saeuissimos dolores efficit. Quemadmodum intestinis ex flatu frequentissimè
 accidit. Habet quoq; aliam cām hac affectio, quæ maioris sepe solet esse mo-
 menti, nimirum vlcus aliquod, seu tumore præter naturā dolorosum, vel humo-
 rū in fartorum in vtero, aut ipsi vicinis partibus, copiam; quamobrem dū humor
 mouetur, eadē omnino accidentia succrescunt. Nī vlceras, colētes, aut tumo-
 re affectas partes si vel mediocriter tangas, haud parum lædes: exacerbantur. n.
 & maiorem molestiam contrahent: præterquam quod ex continuo dolore, ac
 molestia nihil mirum, si aliquid partes continuo trahant, quo mensium stillici-
 diū facile fiat. Vltima verò cā iudicio nostro est humorum acrimonia, & mor-
 dacitas q̄ viscidis quod imodo, & crassiusculis humoribus inhaeret. Quamobrem
 quā viscidi, difficulter profluunt, quā uerò acres, & exedentes vel plus iusto ca-
 lidi, dolores, & cruciatus nō leues inferunt. Præterquam, q̄ non minus à tenui-
 bus, acribus, ac mordacibus citra crassitiem fieri id accidens potest, dū conti-
 nuò defluant, & pari quoq; rōne continuo facultatem lacessant ad expulsionē: **B**
 ex quo fieri menstruas purgationes minutas necesse est, quia frequentes, & gra-
 ues, ac dolorose fiunt. Præter has oēs causas, reddit Hippo. rōne laborum, ac do-
 lorum in mēstruis purgationibus lib. i. de morb. mulie. dicens: Ob carniū ra-
 ritatem plurimum trahere ventres in fœminis, quod si ab ipso non cesserit, car-
 nibus impletis (inquit) & calfactis dolor oboritur. Sed ex inequali humorū sub-
 stantia haud raro comperies hanc fieri affectionem, profluit enim quod tenuerit,
 fuerit, intus manente crasso, ac dolorem accidentia non leuia excitante.
Signa. Affectus ipse sese ipsum adeo manifestat, ut nullo indigeat ad sui notitiam si-
 gno: nam stillatim menses fluere, & cum dolore, molestia, alijsq; accidentibus,
 is est affectus. Causas verò signis opus habere certum est. Sic profectò concre-
 tum, & inæqualem sanguinem, aut quemuis alium humorem facile ipse, qui
 purgatur, monstrabit, nam grumosis excernitur: quo excreto dolores tantisper
 leuatur, & postmodum iterum redeunt, & similiter excreto sanguine, aut alio
 inæquali humore iterum cessant. Item dolores multò ante excretionis tempus
 exacerbantur, quasi natura parturiente, nitenteque per angustas vias concretū
 illum sanguinem vi pellere. Quod Hip. dixisse constat lib. de nat. mulie. per hæc **C**
 verba. Si sanguinis grumi in vtero coierint, os ipsorum velut eruo plenum fir-
 & si attigeris, ita habere deprehendes, & menses non fiunt. Verum si ex crasso
 sanguine flatus eleuentur, autores quidem doloris, & accidentium, ex tenui
 dolore prompte cognoscas, & ex eo, qui per internalla repetit, & ad tēpus pluri-
 mum exacerbatur, cessatq; flatu excreto, aut per infernam aluum, aut per os vte-
 ri. Præterea in his menses profluunt cum strepitu, & sonitu, ac murmurio ven-
 tris inferioris: dolores etiam neque alicubi præfunt, sed vndique vagantur, &
 aliquando lumbis, & ilibus incumbunt. Quod si vlcus mali causam præstiterit,
 præcessisse quæ vlcus nata sunt mouere, necessum erit, & præexistens cogno-
 scetur ex pure cum ipso sanguine excreto, vel sanie, cum dolore fixo, & unius
 tantum partis: & menses quidem diutius durabunt vlcere perpetuo lacescente
 & excreticæ facultatē, ad excretionē cogente. Humorū verò acrimoniā, & mor-
 dacitatē cognoscas ex sanguinis excreti dolore, & natura, ex fœminæ habitu, ex
 præcedenti ac præsentī vitæ instituto, ex pruritu partiū genitaliū, & doloris natura,
 nam

A nam veluti vlcerosus est, qui maior, & acrior fit sanguine adhuc fluente, ex oris amaritudine, aut saluginis sensu. Vteri etiam osculum acri madore, ac mucilaginoso, saniosoq; plerunque abundat. Que profecto signa, alijs, quæ humorum vbiq; redundantium naturam monstrant, adiuncta, proculdubio patefaciēt huiusce affectionis causas.

In hoc iustissimo affectu, & qui plures fœminas plerumq; molestare hêt, duplex reperitur curandi ratio, altera quidem, quæ dolores, accidentia, & labores mitigare docet; altera verò, quæ causam ipsam respiciens illidit. Hanc ego qua potero diligentia prosequar: illā vero Aetius optime exequitur lib. 4. ser. 4. c. 63. Dolores quidem (refert) & accidentia mitigaueris, si vnum hoc tantum respexeris, videlicet, viarum apertionem & vasorum laxitatem. Quod intelligas velim grumoso sanguine vel flatu causam præstante. Nam si vlcus, humorūq; acrimonia causam præstiterint, quæ sensum leniunt, vel stupefaciunt: aut acrimoniam retundunt, proficua sanè forent, ni fluxui impedimento essent: qui ob rem quæ leniendi solum vires habent, administrare oportet. Sic vigente dolore

B ex flatu, vel inæquali plenitudine: primo Aetij consilio uti oportet, qui pedum, ac manum extremitates, fascijs ligere iubet. Sic, & fœneri fœmota, ventrēq; inferiorem varijs calfactorijs, imposita lana succida vino, & rosaceo imbuta, aut vesica oleo calido semiplena, vel uas aliquod euaporatorium. Iubet præterea cubiti internam venam secare, si fœminæ habitus permittere videatur, & vena scissā cataplasma ventri adhibet ex semine lini, panæ, & aqua mulsa paratum. Verū si his adhuc adhibitis dolor persistit, in sessionibus utemur ex althææ, seminis lini, fenugræci, anethi, rutæ, ac artemisii decoctis, & spongijs ex eisdē expressis pudendū fouebimus. Hæc quidē, & alia non pauca apud Aetium loco nuper citato reperies. Quæ huc transferre inutile mihi est visum. Præterq; q̄ libro huius operis secundo de vteri doloribus integrum caput reperies. Hoc tñ vnum memoria semper in hac prima curationis parte habeto, vt lenientibus, laxantibus, ac modicè discutientibus uteri, modo cataplasmatibus, modò inunctionis, modò fomenti forma. Ego tñ concreto sanguini, vel flatui censeo proficiuū esse auxilium, vmbilicum, & infernā eius regionem inungere oleo decroco, liliorū alborū, ac vitellis ouorū admixto modico amygdalarū dulcium, quibus addere tanq̄ peculiare præsidium censeo. 3. s. theriacæ, ex qua sola si parum ēt vmbilico apposueris nō parū iuueris, vel si inunxeris p̄dictas partes axungia gallinæ cū butyro, vel si adhibueris p̄dictis partibus decoctū aliqd ex herbis huic vsui dicat̄s, cum butyro, & aliquo ex p̄dictis olei, aut oleo de semine lini, uel sesami nouel si infernā aluū tractaueris succo angelicæ cū modico oleo capparorū, & cera, adiectis uini albi guttulis. Cuius sanè herbe decoctū, ac fomentū tutū, & vtile existit, p̄sertim ex eius semine, ex quo si sacculus paretur, quo fœmina crebrò ante menstruationis tps utatur, proficiuum persentiet. Item si tertio, aut quarto quoq; die, eiusdem seminis angelicæ decocto utatur, cū modico saccharo, aut miua pastinacæ melle confectæ. Cōferunt quoq; & mitigationis, & curationis gratia crurum lauacra, vel saltē pedes diutius calida aqua continere: cucurbitæ ēt suris, ac fœmoribus affixæ, & aliqn scarificatæ. Item hirudines eisdē partibus infixæ, uel hæmorrhoidibus: quas cessante mēstruo, ac pstantibus doloribus adhibere oportebit: quippe deriuatione facta (si ante adhibeas) mēstruum interdi-

cere, solēt. Qd si neq; prodesse videant hęc oīa, theriacā. ʒ. j. vel. 3. ʒ. cū aqua me
 lissā summo mane porrigere oportet, vel mithridati, aut theriacē smaragdorū
 tantū dē cū decocto porulacæ, vel seminū ipsius, vel maluarū. At si vlceris vitio
 affectus oriat, dolorē mitigabis infusis in vterū, q̄ vlceri prouideant. Cui vsui
 aqua mulsā, vel, si caloris sensus adfuerit saccharata cū trochiscis albis Rasīs, p̄
 ficua esse solent. Itē aqua aluminosa, quæ incredibili quadā efficacia huic malo
 subuenit, vel decoctū ordeī cū syrupo rosaceo, aut aqua lactis cū saccharo, vel
 lac ipsū cū pari quantitate aquæ extractæ per lapideū mortariū, vel decoctū se-
 minis plātaginis, aut plātaginis ipsius. Vlcerē tñ existenti ab euaporationibus,
 & fomētis abstinēdū esse rōni est cōsonū. Si verò acris, & erodens humor mali
 cām præstiterit, fomentis, & infusis, ac inunctionibus blādiōribus utendū est.
 Cui vsui plurimū cōfert aqua tepida infusa, vel fomētis adhibita. Itē aqua por-
 tulacæ, & lactucæ. Emulsionēs ēt seminū frigidorū maiorū extractæ aqua per-
 colata lapideo mortario, ac exhibitæ tepentes potui. Inunctiones quoq; ex oleo
 amygdalarum dulcium, ex oleo violaceo, vel de semine melonum, aut cucur-
 bitarum. Quibus inspectis, facile erit viro diligenti plura alia excogitare non
 minus proficua velut est vnguentum rosaceum, aut resumptiuum, & similia.

Secundā curādi rōnē, q̄ cām respicit, exequimur pugnantēs aduersus vnam-
 quanq; veluti si grumosus, cōcretusq; sanguis isq; plurimus fuerit, instituta
 prius victus parsimonia, moderato exercitio, p̄tinus sanguis demendus ex bra-
 chio est. Verū q̄ crassū illud, concretūq; remeare sursum sanguine misso ne
 quit: euocare id p̄ vteri oscuiū opus erit, fomētis nimirū, inunctionibus, & eu-
 aporationibus, itē femorib⁹, ac suris cucurbis scarificatis. Quōd si parū, aut nihil
 fluere videat, hirudines quoq; hæmorrhoidib⁹ apponere, erit vtile, aliter verò
 nequaquā, ne naturæ motū inturbet, ac p̄pedit. At sanguine sufficiēter mis-
 so, vel ad vterū euocato, p̄ter ea, q̄ capite p̄cedēti huic humori p̄dominanti pro-
 ficua esse diximus, theriacē. ʒ. j. vel. 3. ʒ. laborātū porriges cū copiosa aqua, vel de-
 cocto ex p̄dictis. Quæ sanē potio vires habet fundēdi qd cōcretū est, ac tenuādi
 crassum. Ceterū licet in ijs, qui ex denso, & cōcreto sanguine oriunt affectiōni-
 bus cōmune sit medicorū dogma, q̄ inscindūt pharmaca adhibere, quæ acetosa
 p̄culdubio sunt maiori ex parte, vtero hac rōne affecto administrare, minimē
 licet. Ob id alijs rē aggredi oportet, qualia sunt q̄ ex leporino coagulo, & aqua
 graminis cōficiūtur. Decoctū itē chelidonie, cum melle, aut aqua graminis, uel
 capillorū veneris. Vel decoctū chelidonie, vel radicū diureticarū, liq̄ritiæ, vel
 passularū, cui incoquere oportet coagulū leporis, & laborātū porrigere. ʒ. iij. j.
 cū modico syrupo capillorū veneris, violarū, aut de qnq; radicibus. Quib⁹ por-
 rō factis donec affectio subsideat, & mēstruæ purgationis tēpus p̄tereat, curādū
 est reliquo tpe, ne sanguis crassus deinceps futuræ mēstruationi pareat, victu ni-
 mirū extenuāte, modico, sed cōtinuo exercitio, moderatæ uel tepidæ aquæ bal-
 neis: qbus quarto, aut qnto quoq; die vsq; ad umbilicū, aut paulo supra femina
 immoret, adhibito ēt senæ decocto cū aqua lactis, diebus intermedijs. Cui vsui
 ēt p̄stant q̄ attenuandi, & inscindendi vires obtineant: qualia abundē diximus
 capite de mēstruæ p̄uocatione. Qd si summo manē tertio quoq; die leniter vniuer-
 sū corpus fricueris, nihil nocebit. Verū si flatuosa potius materiæ copia, q̄ cras-
 sioris sanguinis affectio suboriat, mittere sanguinem minimē oportet, purgare
 tamen

A tñ, ut preced. c. dictũ est, frequentius cõuenit, quod intelligas uelim dũ ex imbecillitate status non prodeunt, quippe tpe discussorijs magis, q̃ purgantib. uteris) sicut alijs auxilijs, quæ nuper retulimus: quibus admiscere cõuenit discussorium aliquod, ut proximo capite facile reperijs. Tempus aut purgationi idoneũ, id est, quod antestat purgationi mensiũ, octo autem decem dierũ spatio.

B Vlcus, si huic malo causam præstiterit, ocysimè curabis, ne in grauius malũ affectio degeneret, principio curationis sumpto à totius corporis purgatione, à qua primò prodest succus plantaginis iniectus, præsertim si ualde sordidum ulcus non fuerit: nã si sordes adsint, extergentibus erit vtendum, ueluti succo apij cum melle, uel prasij, uel brasicæ. Item administrabis aquã ordeĩ cum saccharo, uel lactis serum cum eodẽ saccharo, uel syrupo rosarum. Sed quod utilius uĩ, est aluminosæ aquæ usus, uel lactis uirginæ cum saccharo. Quod si dolor uehemens sit, & ardor et decoctum ioschiami, uel papaueris cum alijs admiscebimus. Et tandem opiatorum medicamentorum, aliquid immittemus cũ supra dictis succis. Alia quidem huius census reperijs proficua capite huic rei dicato, libro seq. de uteri affect. Verum si acres, calidos, ac mordaces humores sanguini admixtos, id uitium excitare cognoueris, institutis uictu paulò frigidiori moderato, ac optimi nutrimenti, animi quiete, & omni tranquillitate, ex rhabarbaro, antequam menses insint, uis terue purgabis, manna, cassia, aut decocto ex myrobalanis, aut aqua lactis, uel stillonica ex maluis semine maluarũ, altheæ, & cichorio. Interim tñ uti erit necessum ijs, quæ sanguinem attēperent, humorum acrimoniam retundant, mordacitatem compescant, ac serosos humores alio transferant. Quorum abundè dictum est capite de immodico mensium fluere. Scio tñ proficuum esse in hoc malo alijs nihil præstantibus, fontanellam in crure aperire, dum nimia, & habitualis corruptorum, aut utcunque aliter uitiosorum humorum copia ad uterum confluit, corpore uniuerso illuc humores transmittente, aut membro aliquo prauè affecto.

De mensuris, quæ debitum tempus anteuertunt. Cap. 12.

C Requentissimo euentu cõfirmatũ est in plerisq; feminarũ menstruã purgationẽ, licet per interualla repetat, nullum tñ statutum tẽpus hĩre, nullãq; legẽ seruare, sed menstruari ordine peruerso, mō naturæ periodum anteuertere, modoq; ipsum remorari, siquidem q̃ secundum naturã sunt, ordine & unica rōne pcedunt, q̃ uerò pter naturã, uariè, & confusè, nisi causa præter naturam connaturalis, & stabilis quoque ac firma facta fuerit. Quod etiã Platonem in Conuiuiũ, & Gal. lib. de uĩl. respi. dixisse constat. In qua sanè mutatione plerunq; inordinatè procedit natura, aliquando uerò statutis interuallis accelerat, aut remoratur præscriptum sibi institutum. Quam proculdubio affectionem (cuius etiã meminit Hipp. lib. de nat. mul. p. hæc uerba. Si menses constituto tempore nõ fiant, &c.) quia grauissimorum affectuum causam esse, experimento fit certissimum: paulò diligentius expendere in animo est: ac primò eã quæ debitum tẽpus anteuertit, hoc capite exponã. Est quidem affectio hæc de genere eorum symptomatũ, quæ in uitata actione *Qualis affectio.* facultatis naturalis consistunt, eius nimirum, cuius munus est menstruum sanguinem in naturæ vsum, & gratiam per statutas periodos adseruare. Quæ sanè

facultas modo ex proprio vitio, modo damno aliunde sibi illato, a proprio munere aberrans huiusmodi vitiatam actionem promouet, quæ sentio pertinere ad retinentem vteri facultatem, vel ad expellentem, quæ quidem ex eo morbo aberrandi in proprio munere originem sortiuntur, qui vel intemperamento partus, cui incumbit, vel eisdem partis deformi figuræ innititur, & cõsistit, ita vt humorem defluere permittat, aut vt par est probe continere non possit, donec statutum adsis excernendi tempus. Quibus etiam aliquando accedit soluta vnitas, ex acrimonia, aut mordacitate humorum, vel vtcunque aliter facta, proueniente. Que non minorem huius mali partem prestare posse, mihi est compertum, vitio-
so humore in vterum à toto corpore, vel ab aliquo membro transmissio, ita vt ante tempus institutum facultatem laceßat. Cuius etiam affectionis Hip. meminit 5. Aphor. 36. dicens. Mulieri si menses decolores, neq; secundum idẽ tempus semper euenientes, purgationem indicant esse necessariam.

Causa.

Porro lib. 3. de sympt. cau. exepro sumpto ab alui excrementis Gal. causas oēs actionis, quæ debitum tempus anteuerit, trimembri quadam diuisione optimè visus est cõprehendisse. Nā ob materiam, facultatẽ, aut causam sine qua nõ, B
vitium hoc posse fieri, aperta satis oratione monstrat. Primam tñ causam in multo plures subdiuidit, in copiam nimirum, alienam substantiam, tenuitatẽ, humiditatem, calorem, acrimoniam, aut mordacitatem materiæ. Secundam verò reduxit ad facultatis retentricis impotentiam, vel ad expultricis robur, vel irritamentum, maximumve vteri calorem. Causam autem sine qua non, eam esse cẽset, quam ad sensus acrimoniam, & perspicuitatem reducit. Sensus. n. exquisitior causa videtur esse sine qua huiusmodi actiones fieri minimè possunt: siquidem necessum est expultricem irritari, si suo munere fungi debeat, id quod tantò promptius facit, quantò ob exquisitiorem sensum citius afficitur causis, quæ sensum mutare habent naturalibus, vel præternaturalibus existentibus.

*Causa-
tum co-
gnitio.*

Cũ affectus sese ipsum notum faciat ea certitudine, vt demonstratore nõ indigeat: superest causarum tantum dignotionẽ docere: nā eas & varietatẽ non parua & principium curationi prestare certum est. Ob id dignosces humorum plenitudinem ex grauitate totius corporis, & ad motum pigritia, ex ponderis sensu, ex fœminæ habitu plurimo sanguini gignẽdo idoneo, ex vita sedentaria, & otiosa C
ex crapula, ex suppressa alia vacuatione, vel diminuta, ex pulsu magno, cui accedit p. internalla et paruitas, ex vrina rubea, crassa, & multa, ex sanguine ipso sola copia peccante; p. fertim si ab eo excreto leuamen subsequi accidat. Acrimonia, mordacitas, & deniq; reliqua humorum vitia, ex calore, ex erosione, ex dolore p. fertim parum ante sanguinis excretionem, vel dum erumpit facilè percipiuntur, adhibito in considerationẽ fœminæ vitioso habitu, neq; non, & vita p. cedẽti, ac alimentis, quibus vti consueuerit. Id et ostendit sanguinis excreti natura, si tenuis fuerit, dilutus, aquosus, decolor, aut colore aliquo præter naturam affectus. Quod si horum nihil adfuerit, & impetu sanguis præperit, necesse est expultricẽ facultatẽ fuisse irritatam, conijcere. Verum si vlcus, aut alia causa eam excitauerit, ex ijs, quæ cap. præced. diximus, scire poteris. At si ne hoc quidem accidat, sed citra aliquẽ læsionis sensum prorumpat, læsam esse retentricem facultatem conijcies. An verò extemperamento, an ex figuræ aliquo vitio id malum prodeat, distingues ex distemperamenti sensu: qui si nullus fuerit, vitium figuræ esse colligito,

Aligito, & ex ijs, quæ præcesserunt, aut ad sunt. Nam & tumor præter naturam, & inducta cicatrix, vel euerfa naturalis vteri structura ex ictu, casu, aut laborioso partu, vel quouis alio accidenti, haud difficulter cognoscuntur. Quorum oïum ediscere prouidentiam conuenit, quippe quæ non raro fœminis accidere solêt; ex quibus laxiores facti meatus, & patentiore viæ, mirum non est, si sanguinē ante debitum tempus profundant.

Curacionē igitur mensium non debito tpe fluentium instituerat Hip. lib. de nat. mul. aliquo modo citra methodum, & rationē. Quam sanē cōplet ex brassica, ruta, & decocto paleæ ordeï, exhibetq; polypū, & pisces odoratos, id est, cū aromatibus conditos, vt leuis sit cibus, & qui vteros purgare possit. Polypi autē conferunt maximē vtero, & purgatio leuis sit, & flatum pellens. Lib. tamen 2. de morb. mul. aliter huius affectus instituerat curacionē. Cæterum quia in genere vtcunq; tempus debitum peruertat, harum affectionum curacionem tractat: necessum esse duxi, cuiusq; seorsum meminisse, vt quæ maximi sit momēti affectio. Cum. n. frequentissimē visum sit ex ea menstruatione, quæ consuetū præuenire tempus affluescit, immodicum sanguinis profluium succrescere, curandū ob id est, mox à principio in hoc affectu id damnum vitare, præterq̃, quod fecunditati, & conceptui solet esse graue, & certissimum inconueniens, q̃ si quas diximus causas, exactē tenueris, haud difficulter efficies. Nam cognita plenitudine, fœminā pauco victu tractabis, maiori ēt solito exercitio, & moderato sono, & parcissimo potu. Mox tñ à principio sanguinem ex vtraq; basilica, p fœminę viribus extrahes. Idq; non instante menstruationis tempore, sed in medio mense, aut parum antē. Verum si non profuisse videatur, dextræ manus salnatelam secabis, & inde sanguinis, quantum vires ferre visum fuerit, extrahes. Corporis item supremam regionem molliter summo manē perfricabis. Quibus sanē vteris, donec plenitudinem satis esse depositam intelligas. Atq; sic affectis vinum in totum auferes, sicut & coctas aquas, præsertim eas, quæ cū cinnamomū effluuiscunt, imperabisq; chalybeatam, vel deauratam aquam bibere, aut crudam, sed mica panis mediocriter tosti emendatam.

Curatio suboriat̃ ita vt sanguis, vel præ tenuitate defluat, aut præ acrimonia facultatē adhuc secundū naturam existentem irritet: hæc duo primo facies (præterq̃ q̃ sensum retundere, & facultatis expultricis acutiem hebetem reddere, vt paulò inferius docebo, teneris) primū humores corriges syrupis apozematis, & alijs auxilijs, quæ cap. de mensium suppressione diximus (pudet me eadē sēpius repetere) iuxta humoris peccantis conditionem. Nam calidum refrigerabis, acré & erodentem retundes, ac mulcebre, & mansuetiorem reddes ijs, quæ lenia, & mucilaginosa sunt. Optimi quoq; nutrimenti cibarie admiscebis, ea enim & præexistentes succos corrigunt, & utiliores deinceps gignunt. Quamobrē eam uictus rōnem instituere conuenit, quæ optimum sanguinem, & copiosiorē generet. Vtero ēt prouidere oportet mollibus, atq; attēperantibus enematis, quæ sunt, q̃ recipiunt oleū violarum, rosarum, & nēnupharis, decoctū ordeï, malnarum, & florum saccharum etiam & expressionem seminum frigidorū. Caue re tñ tanquam à maximo malo, in huius affectus curacione oportet, ne interim dum menses ordinatiores reddere nitimur, suppressionem eorū moliamur. Nā

& plu-

Curadi
r. 1110.

& plurimum, & vitiosum sanguinem diu continere, præsertim aduersus naturam, quantumvis irritata, impetum, grauissimum est, & maiorum affectionum causa. Ob id cautè procedendum esse censeo, ijs tñ remedijs adhibitis, quæ causam illidant, vteri uerò, aut sanguinis compressionem minimè efficiant. Secundū, quod humorum vitio prævalente proficuum existit, erit quidē corpus, & confertim, vt maior cachochimia pars deponatur, expurgare: & deinceps paulatim, ac sensim, hoc est, per epicrasim quod superest, ne corpus, aut vehementi purgatione lædatur, aut vires labantur, educere rhabbari infusio frequenter exhibitio, nimirum bis, terve in hebdomata, aut infusio, & leui facta ebullitione myrobalarum citrinorum: uel si adustum quid superesse visum fuerit, foliorum senæ. At si iecoris caliditatem huic malo causam præstare conpertum sit, post hæc sanguinem ex saluatela extrahes. Sicut si uteri calida distemperies, causa fuerit, ex uenis tali. Quibus sanè auxilijs fit, vt humores superuacui, & qui mali existunt causa, ad aliam regionem distrahantur, & paulatim citra dysenteriae, aut alterius affectionis grauioris periculum, minuantur, vel generari (uentilatione facta in iecore) definant.

Quod si ex facultatis retentricis vitio, uel instrumetorum laxitate, uel uitiosa alia figura malum hoc prodeat (nam dum ex secernentis irritamento proficiscitur, ut dictum est modo curari debet) prouidendum est facultatum robori per ea auxilia, quæ aduersa sint distemperamento imbecillitatis auctori. Nam si immodicam frigiditatem cum humore adesse cognoueris, facta leui humorum frigidorum ex agarico, & syrupo ex infusionibus purgatione, uel ex catholico cum modico electario indo, uterum curabis calfacere, & roborare calidis, & modicè siccis auxilijs: qualia sunt quæ ex oleo liliorum alborum, chamæmelino, anethino, & ruta ceo conficiunt, præsertim cerati forma cum modico ladano, styrace, & velzeino. Sacelli ex rebus calidis, vel siccis, utiles et existunt, facti ex milio, furfure, chamæmalo: anetho, ruta, matricaria, pulegio, thymo, umbra, & similibus, præsertim ex radicibus, & folijs, ac semine angelicæ siccae. Itē prodest inunctio balsami, aut olei roris marini, uel de styrace, theriaca et emplastri forma umbilico, & inferiori uteri regioni adhibita, proculdubio utilissima existit. Itē cōia emplastra, quæ per matricem in officinis parant, eundem quoque usum præstare solent. Multa quidē alia sunt, quæ distemperie, ac imbecillitatem corrigere possent, sed vereri oportet, ne plus iusto menses remorentur, & ob id horum meminisse sat est: nam ad pensum eorum, quæ diximus, prudens medicus alia facile excogitabit, huic et usui proficua. Verum si distemperies calida fuerit, ea ratione qua humores calidos esse corrigendos diximus, mitescenda est, excepto medicamentorum purgantium usu: sat nam est victu refrigerante instituto, quiete, otio, & animi tranquillitate, aereque temperationi facto, adhibitis et syrupsis: & apozematis, ac temperatis clysteribus caliditatem attemperare. Si tñ diutius perstiterit distemperies, coniectandum proculdubio est, aliquid calidi humoris, aut præesse, aut generatum esse. Quāobrem leuiter corpus eo tempore manna, aut castia, vel similibus purgatione vacuare oportebit, & ea quæ modicè siccant, ac refrigerent, vtero ad corroborationem adhibere, facta inunctione, ex oleo melino, rosaceo vetustiori, vel ex rosis siccis confecto, & alijs, quæ citra vehementem astrictionem temperare, ac roborare uterum possint. Quorum latè meminimus, li. 2. de auxiliorum indie.

figuræ

A figura vitia vel arte emendabis, vel alijs auxilijs eorum defectum supple. Nam vtcunq; debitum tempus sanguinem continere non possit vterus, id protinus corriges: quippe si diu duret, emendare perdifficile, & periculosum est: præterquam si ex tumore, præter naturam affectio prodeat: nam aliter eo tempore curanda, vt capite de vteri inflammatione perleges.

Ite si ex ictu, casu vel laborioso partu partes vtero vicinæ, & vterus ipse laxiores facta fuerint, cataplasmate reficere, ac ad pristina figuram reducere necessum erit. Fiunt quidem ex terebinthina, puluere sanguinis draconis, thuris, mastichis, & consolidæ maioris. Itæ fiunt ex albumine ouorum (si femina calidiori prædita sit temperamento) cum pulueribus rosarum, myrtillorum, balauustiarum, mastichis, & cum farina volatili. Item ex melle, & pulueribus coralli, sanguinis draconis, rosarum, mastichis, myrtillorum, dragacathi, & similibus. Quæ prædicta forma, vel cerati, vel emplastri, cum ladano, & cera conficiuntur, & passim a mulierculis parantur: additis aromatis, & calidis medicamentis, vt si quid frigiditatis in parte receptum est, medelam suscipiat. At si ex immodico, exactiori; sensu ceteris existentibus secundum naturam (anteuertat debitum tempus purgatio, nihil aduersus causas ages: sed omni ingenio sensum curabis hebetiorem reddere, non stupefacta potentia, nam id verendum in feminis est sed retusa sensus acrimonia pinguibus enematis, vel ex lacte, aut oleo violarum lenissimis inunctionibus ex axungijs, oleo sesamino, violarum, & amygdalarum dulcium, sumptis etiam frequenter amylo, vel rebus mucilaginosi, ac pinguibus, & frequenti potu, quippe alijs vti periculo non vacat.

De mensuris, quæ debitum tempus remorantur. Cap. 13.

MENSTRVÆ purgationes remorantur quidem, & tps ipsū pñitum protrahunt, vel atatis cā, cū iamā desinere nitūtur, vel vitio aliquo peculiari vteri, aut corporis totius. Sed primū vitium curatore non indiget, sed p̄cautore, qui prouideat quominus cōsuetus fluxus (et si scdm naturam supprimatur) in podagram, coxendicum dolorem, aliumve affectum, vt frequentissime solet, prorumpat. Facto quidem copiosiori exercitio, & instituto victu pariori, donec, ex toto nobis cōpertum sit naturā destituisse a sanguinis mēstrui generatione, & congestione, vel annuatim, aut bis, terve in anno sanguine misso. Quo facto raro ex mēstruorū suppressione pericula adueniunt. Secus autē ferēs habet, quo tpe natura suppressionē minare vī. Vltimum verò vitium, id nimirum, qd ex totius corporis affectu suboritur, emēdari, satis superq; discēs ex c. de mēstruorum retentione. Verūm dum hæc affectio aliquo vteri, aut humorū ad ipsum defluentium affectu prodit, peculiare quoq; requirit diligentia, & peculiarē et curationē. Est sanē tardā mēstrui expurgatio, affectio de genere corruptarū actionū. Qd si ad imminutā reducere velis, nihil inconueniet, dūmodo intelligas, id malū pertinere ad scernentis facultatis impotentia, munus suū pficere nequeuntis. Idq; quia languidior iusto facta, vel fortasse impedita ex cā aliqua id efficiente, et si ipsa secundū naturam existat. Cui profectō actionis dāno, causam præstat id morbi genus, qd aut in mala figura (siue ex crasso humore ob-

Qualis affectus,

re obstruente, siue ex alia quauis causa prodeat) aut in distemperie existat, mo- A
dò sit sola modo cum materia a fluxu.

Causa. Causas huius morbi easdem numero esse cum ijs, quas diximus præcedentes affectionis causas existere certum est, verum omnino contrarias. lib. 3. de causis sympt. apud Gal. reperies. Quas quidè ad humorum vitia, quæ mox referā, aut ad expellentis facultatis impotentiam, aut vltimo ad sensum hebetem, pari numero facile quibus reducere poterit. Humorū. n. vitia sunt ipsorum paucitas, crassities, acerbitas, & visciditas; quibus accedit siccitas, aut fæculentia. Inquit. n. Gal. lib. 5. Aphor. com. 36. Contingit. n. mulieribus, quæ prauos humores habent, nō modò decolores apparere purgationes menstruas, sed et tps periodi non seruari, siquidem crassiores fuerint humores, & difficilius fluentes ijs, qui secundū naturam se habent, morando, & longius tps expectando. Impotētia uerò facultatis, vel vitio proprii temperamenti, quo in actionibus obeundis fungitur ex frigore abortu, vel instrumenti, quo operatur, ineptitudine, contracta quidem ex figuræ vitio, modò obstructio sit (quod frequentius accidit) modò quoduis aliud figuræ damnū. At sensus hebetudo, q̄ ad cām sine qua non Gal. reducit, facile huic malo causam præstare habet. Nam neq; pondus, neq; acrimoniā (siue naturalis sit, siue ab ea recedens) donec nimia sit, & plurimum à naturali dissidens, persentiscit: siquidem, vt dictū est, oportet expultricem irritari, si suo munere fungi debeat. Id quod tantò promptius facit, quantò ob exquisitiore sensum citius afficitur, tardius uerò, q̄tò minus senserit quæ nōxia sunt. Ob id quidem hebetate existente partis sensu, nihil mirum est, si menses protrahi cōtingat. Cognosces haud difficulter quale sit humorum vitium ex ijs, quæ cum sanguine excernuntur, & ex sanguine ipso; nam præterq̄ quod visui albidior apparebit, erit quoq; crassus, aut viscidus, ita vt difficulter à partibus, quibus adhæsit, separari possit. Constabit quoq; id ex vita præcedenti sedentaria, ex forma vitii crassā quoq; & ex edulij pituitā redolentibus. Quæ proculdubio oīa, fœminæ laborantis habitus mollis, ac plerūq; obesus, colore subalbidus, aut plūbeus facile monstrabūt. Sicut, & sanguis ipse, qui lentè prorūpit & mouetur, ac diu menstruæ purgationes durāt, delinuntq; sæpe in mucos quosdam, ac pituitosa purgamenta. Imbecillā uerò existere facultatem excernentem ex eo col- C
liges, quod et si transacto menstruationis tpe, fœmina molestiam, aut grauitatē aliq̄ persentiat ex sanguine illo præter naturā institutum retento, cum hoc tñ nequit languida facultas ad motum sese accingere, sed diu permittit molestari, donec validiori facto irritamento, tandem in minutam q̄dam purgationē prorumpit. Quod sanè vitium solet et haud rarè contingere retentrice ad modum valente, neq; tpe stato humorem sibi cōmissum præmittente, Instrumentum aliqd vitiatū esse ex ijs, q̄ p̄cesserūt, perdiscere poteris. Nā ex laborioso partu, ex tumore aliquo præter naturā præsentē, aut iam curato, ex prauè et confecta cicatrice, vel ex saltu, aut casu alio, haud difficile est membrum aliqd vtero vicinū, aut subseruiens, aut vterum ipsum dislocari, aut praua alia figura affici. Qd proculdubio in fœminis frequentissimè accidere solet. Sensum porrò esse habentē cognosces facile, quia et si menses diu remorentur, nullam fœminæ in vtero, aut paribus vicinis molestiam percipiunt. Signum sanè euidentē sensum esse obtu- sum: siquidem nec plenitudinis pondus persentit, nec acrimoniæ molestiam.

Maximi

A Maximi, proculdubio momenti erit diligens huius vitij consideratio. Nā facil
 limū esse cōperitur, plus minusve in eius curatione, morbo, tribuere q̄ par sit. *Curādā
 ratio.* Et ob id sedula diligentia curandum est, ne quid horū vsquam curanti accidat.
 Quod profectō facies, si primō consideraueris humores crassos, viscidos, ac lē-
 tos mēstruā purgationē remorantes, exposcere imprimis victum extenuātem,
 maiusculū exercitiū, frequentiores totius corporis frictiones, ac vltimo extenuā-
 tes, calfacientesve potus: quales ex calamēto, cinnamomo, fœniculo, saxifragia,
 pimpinella, adianto, & alijs similibus parari solent. Post quæ cōsiderabis, à quo
 auxilio curationē auspicari oporteat. Nā si sanguinē detraxeris hac humorum
 idea redundante, haud parum offendes: si inscidentibus, & extenuātibz vtaris
 corpore existēte pleno, nō minus lædes: si uerō purgaueris, nihil magis efficies
 sed fortasse deterius quid. Nam plenitudine in corpore iam collecta uerendas
 esse per pharmacum purgationes vnanimi Doctissimorū consensu cōstare arbi-
 tror. Qua pp, vt mea fert inia, supposito his tribus auxiliorum generibus vtē-
 esse necessario: rectā medendi rōnem à tpe, quo vnumquodq; fieri debet, sumē-
 dum esse existimo. Quippe mox facta naturali mensium purgatione, q̄ plenitū-
 dinem deponat, ne opus sit sanguinis detractiōe, & viam suppeditet purgan-
 tibus, auxilijs, circa prædictum periculum curationis principium auspicari o-
 portet. Quo sanē tpe, vt pote corpore ex natura vacuato, quæ humorē inscinde-
 re, extenuare, & abstergere possint, porrigere tutō poteris, quibus collecta men-
 strua purgationē, & instāte, vt non dat. Nam maiores, & pressiores proculdu-
 bio fiēt obstructions, ita vt sæpe ex leui obstructione, aut humore non fluēte
 ob crassitiē, contingat fluere non posse pp integram obstructionem, vi medica-
 mentorū factam. Huic consimilem curationem docuerat Gal. lib. 5. Aphor. cō-
 36. dicens. Possunt igitur, & menses tardi, hoc est, qui post consuetum veniunt
 circuitū purgationē indigere humoris pituitosi, ob quē, & decolores fiunt non
 tū egemus hac sola necessario. Nā & per extenuantem aliquando victum tales
 affectiōes sanabimus. Et subdit. Suffitus insuper aromatum idem facit, & qui
 eandem vim habent pelli adhibiti, epotaq; medicamenta, q̄ inscindūt, & humo-
 rū crassitiē extenuant, quale est, quod ex calamento fit, quo nos assidue vtimur,
 quōdq; sæpius tardantes mensiū purgationes ex ciuit. Nā initium sanationis in
 ipsis est, cū ora vasorū aperire, q̄ pertingunt ad vterum, tunc sanguinem exte-
 nuare. Ac sanē purgatio totius (vt dixi) qn crassi euacuātur humores, tales sanat
 affectiōes. Quibus uerbis breuissimē visus est vniuersam huius mali curationē
 comprehendisse. Cui proculdubio, ut optimē fiat, tempus præstatut mox à mē-
 strua purgatione. A qua sanē ego curationem auspicarer, & mox medicamen-
 ta prædicta porrigerem. Post q̄ quidem purgantibz iterum vi pharmacis tutius
 & vilius erit, ante (inquā) q̄ plurimum sanguinis in vtero, aut vicinis partibus
 succrescat. Cui vsui, agarico, electario indō, modico diaphenicone, uel pilulis
 mastichinis, aut de agarico vii proculdubio poteris. Quo facto (vt ordinē faciē
 dorū proponā) sex, aut octo dierum spacio ante menstruationis tēpus non erit
 ab re sanguinē ex talo mittere, & postmodū ipsum ad inferas sedes euocare cru-
 rū lauacris, frictionibus ligaturis, ac frequēti cucurbitillarū suris, ac femoribus
 appositione: quas rarō scarificare consulo. Nā crassus ille sanguis difficulter p-
 cutis scarificationes, spirauit, & ad euocationē sat sūt reliqua præsidia, qbus sic
 factis,

factis, si adhuc menstrua purgatione protrahi cōspexeris, transacto purgationis tempore, vtile citra dubium erit corpus per epicrasim purgare, & sanguine à pituitosorum, crassorum, ac viscidorum humorum spurcitia liberare. Quod quidem facies sumpta pillula una ex agarico, aut ex mastiche, vel leui agarici, aut turpeti, vel cartami infuso aqua saxifragiæ, graminis, pimpinellæ, adianti, cinnamomi, calamenti, feniculi, aut similium facto: quo tertio, aut quarto quoque die exhibito mirè profuisse comperimus. Sicut corpus exercitio mandare, aut fricare diebus intermedijs, sumpto èt aliquo ex medicamentis, quæ menses mouere simul, & crassos humores attenuare nata sunt. Quorum syluam adduximus ca. de mensium suppressione. Quibus admiscere vtile esse expertus sum, theriacæ vel mithridati aliquid, sicut ventrem inferiorem inungere oleo caparorum, liliorum alborum, de anetho, ac de croco, vel de cinnamomo, si haberi potest, vel confecto ex angelica cuius miram censemus esse efficaciam, adhibitis èt fomentis, uel clysteribus, aut in fessionibus ex decocto fenugraci, chamaemali, anethi, meliloti, feniculi, petroselini, matricariæ, dauci, & aliorum medicamentorum, quæ prædictas vires obtineant. Cui quoq; vsui ego proficuum esse censeo. Galenusque loco citato summo opere commendat, suffutibus aromatum vti, quippe hi humores extenuant, & vias patentiores efficiunt.

At si ex impotentia expellentis facultatis menses vltra statutū tps prorogentur: id primò efficies, vt distemperiem, cuius vitio facultatē labefactari cognoueris, corrigas. Frequenter. n. ex caloris defectu id accidere cōspicimus, vel ex humido uteri madore, quo sensus obruitur, minimeq; p̄sentit ex pōdere molestiā. Quamobrem & calfacere ijs, quæ nuper diximus, vterum oportebit, & præ exsiccare, ac corpus purgare, si humiditatem præesse cognouerimus, adhibentes primò cibum calfacientem, & modicè acrem, ac mordacem, vt irritato quodammodo sensu, ad expulsionem gliscat natura. Quem usum quoq; præstāt euporations ex decocto origani, pulegij, menthastri, siclæ, thymi, nasturcij, & similium. Clysteres èt acres conficies, ex eisdem rebus, & alijs, quæ modicè facultatem laceffant. Quem sanè vsu peculiari quodam dote præstant pessaria uteri osculo apposita, qualia sunt, quæ cap. de mensium suppressione, menses mouere diximus. Verum si ex uitio alio figuræ affectio suboriat, aut facultas inepior facta fit, cerati, emplastris, cataplasmatibus roborandæ est, ijs nimirum, quæ calfaciendi, & firmandi membrum vires obtinere capite præcedenti diximus.

De mensuris corruptis. Cap. 14.



NON solū in mensuris purgationibus vitium inest ex quātitate aucta, uel diminuta, aut ex improbo fluēdi ordine: sed frequētissimè in ipsa excreta substantia vitium quoq; comperimus, nimirum, ipso sanguine fluente, vitioso facto in propria substantia, uel ex miscella alicuius parui succi, cuius rōne menses decolores fiūt, hoc est rubrū, colorē, & naturalem nō seruantes. Quod facillè comperimus, si pallidi fiāt, albicantes, linidi, nigri, virides, aut pluriū simul colorū, id verò pro rōne humoris, q sanguini admiscetur. Quorū recordatus Hip. lib. 5. Aphor. 36. dixisse opinor. Mulieri menses decolores, neque fm idem tempus semper euenientes, purgationem indicant esse necessariam.

Est

A Est proculdubio huiusmodi affectio de earum sorte, quæ ad exiens mutatum pertine- *Qualis affectio.*
re vñr, tertium quidẽ symptomatum genus. Nã cũ sanguis ruber, & naturalis exi-
re teneat, mutatum esse inficiabitur nemo, si eũ prodire conspexerit decolorẽ, aut
prauo alio colore affectũ. Proficiscitur porrò, vt plurimum ex distemperie to-
tius corporis, vel alicuius mēbri præcipui, iecoris nimirũ, aut ventriculi, ac nõ
nunquã vteri ipsius. Quo morbo prædictæ partes affectæ facillẽ prædictos humores
redũdare efficiunt, quæ ad vterũ dilabẽtes huiusmodi cõcitāt affectũ, quo nõ raro steri-
les fiunt fœminæ morbosæ, & viris ingrata, aut mille alijs affectionibus pressæ.

Causæ verò, quæ id malũ excitare habent, eę sunt, quas mox reuulimus, ceterũ *Causæ.*
specialius sunt expendendæ. Prauas, & paucas mensũ purgationes, Hipp. lib. de
locis, aqua, & aere, refert prodire ob deprauatã substantiam potus (& vt ego ad-
do, victus, aut rationẽ uitæ) inquit enim. Ex mulieribus verò primum quidẽ mul-
te steriles fiunt propter quas, quæ duræ sunt, crudæ, & frigide. Purgationes. n. men-
sium non contingunt commodæ, sed paucæ, ac prauæ. Cuius sanẽ rei ratio est, quod
crudæ aquæ in fœminis (& reliqua huius census cibaria, aut alia, quæ prauæ sunt
substantiæ) quæ calorem habent imbecilliorẽ, non coquantur, & ob id san-
guis crassior efficitur. Quo fit, ut non fluat, aut parum fluat. Et quoniam non bene pur-
gatur, etiam corrumpitur sanguis, & menses non prodeunt quales debent. Di-
cuntur autẽ quales nõ debent prodire, cum substantia sunt nimis crassi, aut aquo-
si, colore albi, aut nigri, aut flauī, aut mixti, odore fetidi, qui sunt deteriores ni-
gris ac demum cum egrediuntur cum dolore. Quas oēs differentias adamussim
recenset iterũ Hipp. lib. de nat. mul. dicens. Si vteri pituita impleri fuerint, flatu
oboritur, & menses albi, pituitosi superueniunt. Aliquũ et sanguis tenuis pellicu-
lis plenus, & præ humiditate cũ viro coire non vult, & pallida, ac tenuis fit.

B Flaua. n. uilis pallidos efficit menses. Quem sanẽ humorem proficisci ab exurẽ-
te iecoris caliditate nemo negabit, sicut albicãtes reddere inundãs pituita ex vẽ-
triculi, aut vteri frigido intemperamento. Ita quoque in nigrum colorẽ, sanguinẽ,
vertit melancholia ex iecoris siccitate, & splenis impotentia per vniuersum cor-
pus redundans, atque ad vterũ delata. Pari et rationẽ liuidos, uirides, aut plurimũ
colorum menses fieri conspiciamus, uel ex membrorum nutrimentaliũ diuersa,
ualidãque intemperie, uel ex totius corporis vitioso temperamento, uario tñ in
diuersis eius partibus, præsertim ad caliditatem vergente cum totius imbecilli-
tate. Ex quibus constat, quales sint corruptorum mensũ causæ. Præter quas aliã
etiam addit Hipp. lib. i. de mor. mul. nimirum, mensium trimensium suppressio-
nem, quæ menses efficit suppuratos, inquit. n. Signa uerò sunt, si suppurati fue-
rint, dolores in pectine, & pulsationes fortes, etiam inctum non sustinent. Et si
melius habitura est, menses ipsi erumpuntur in pudendum, & procedit pus, ac
sanguis, & procedit graue olens ad septimum, aut octauum, aut nonum diem.
Atque hæc in vniuersum sunt mensium deprauatorum causæ.

Docet Hip. li. de nat. mul. & i. de mor. mul. ex colore, humore peccantem in *Causa.*
mēstruis cognoscere, primò. n. loco iubet, sanguinẽ menstrũ sup arenã spargi, *ru. & af.*
& exsicari Sole, & si color euaserit pallidus, flauã bilẽ dominari refert, si uerò *sectus di.*
sub albidus, pituitã: quã noscere docet idẽ autor lib. de mor. mul. his verbis. Si *gnatio.*
mulier corpore malẽ habuerit, & pituitosi menses pderint, cognosci at possunt,
si pituitosi pdeant, pelliculosi. n. apparent, & uelut araneorum casses distendũ-
tur,

tur, & subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus, & caput ipsi pituita repleta fuerint, & hæc non sit purgata neq; per nares, neq; per sedem, neq; per vrinæ meatum, sed in mensibus, & in turbatione sanguinis vnà cum purgatione foras exit. Licebit autem totam Hipp. dictionem subiungere. Nam ex eo sermone facile discēs, & causas, & affectus naturam, ac prælagandi rōnem. Multa. n. refert pericula fœminis sic affectis succrescere. Si mulier corpore malè habuerit, & menses biliosi prodierint: ex hoc probè cognosci possunt, si nigri sunt, qnq; verò nigri, aut splendidi, & paucissimi prodeunt, & citissimè congelant. Ac subdit paulò inferius. Et incipiente quidē morbo purgatur diebus, quibus solita fuit, non pluribus. Progredientibus aut mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores singulis diebus apparent, & febres succedunt erroneæ, acutæ, cū horrore, & cibi fastidio aliàs atq; aliàs, & stomachi dolor, & dolebit magis vbi menses appropinquauerint. Postq̃ aut purgata fuerit, & ad modicum tps superiorū respectu melius habuerit: postea rursus ad idem perueniet. Dum aut curatur, citò sana fit. Si verò non curetur, & tps procedat: oīa prius relata valde ipsam affligent, & dolor corripit inam ventris partem infra vmbilicū, nunc inguina, nunc lumbos, & coxendicum ad sedis iunctarum, nunc collum, aliquñ verò strangulatio fortis accidit, & caligo ante oculos obuersionabitur, & vertigo, vtpote purgatione sursum vergente, & accedente. Si in corpus male habuerit mulier, menses pauciores fiunt. Et quibus corpus plenum fuerit, his menses plures prodeunt. Et tandem subdit Hipp. docens signa redundantis humoris. At verò biliosi si menses prodeant: pusillanimitas incidit, & cibi fastidium, & anxietas, & vigilia, & eructat frequenter, & non vult deambulare, & tristis est, & nō uidere sibi vī, & timet. Tandem paulò inferius inquit. Si. n. quid ex his fortè inciderit in corpus afflicto, periclitabitur. Si verò leniter, depurgetur aliquid biliosi, aut totū id, qd̃ molestum est, sana fiet. Si verò neq; curetur, neq; quicq̃ horū fiat, morietur mulier. Quibus verbis, & alijs, q̃ paulò inferius subdit, euidenter constat qualia sint accidentia, q̃ his fœminis ex hoc morbo succrescunt, vt facile in eius notitiā deuenire possimus. Nā si optimi medici diligentia fœminarū q̃remōias intuearis: proculdubio plerasq; mēstruorū corruptione affici conspicias, tā virgines, q̃ viduas, & eas et, q̃ viro vtuntur. A quibus interrogare iubet Hipp. lib. de nat. mul. (vt certiores nos humoris peccātis reddat) an qd̃ fluit, mordeat, & exulceret: & si non mordeat, pronuntiare à cerebro fluxum esse, si verò mordeat, à uētre. Sed pensatis Hipp. signis, ad alia nobis confugiendū est, si quidē menses ob pituitā, aut melancholiam, decolores longo tpe latent, & protrahuntur, biliosi verò festinanter prodeunt, & albi quoq; subinde festinant, modò serosi sint. Corruptos et esse menses vel ex eo discēs, q̃ eodē semp mō, neq; cunctantur, neq; anticipāt et si q̃ maximè semp eodē mō viuant, eo qd̃ tēperatura optima semp suo more constat, & parū certè huc, aut illuc mutatur. Intēperata verò lubrica est, & nūq̃ eodē statu pmanet, sed modò, huc mō illuc magis inclināt. Medium. n. certis quibusdā terminis circumscribit, extrema in vtranq; partē varijs modis insolēscūt, & luxuriant. Itabilis, prout est morosior, aut procacior, nūc plus, nūc minùs festinat. Et pituita quod est ignauior, eò magis cunctat. Præterq̃, q̃ ex acrimonia, calore, & exulceratione bilis flauā rimari et cōceditur, sicut pituitā ex stupore, mucore, frigiditate, flatu, & uteri tensione. Quapp̃pter sanguinis fluētis, colorē, vitæ,

Ate institutum, corporis habitum, accidentia, quæ superueniunt, fluendi quoq; modum, & rationem intueri fas est, vt certiores facti, tutius grauissimi, & communissimi huius affectus curationem aggredi possimus.

Huius affectionis curandi rationem, ac methodum. §. Aphor. 36. & libris de morb. mul. & de nat. mul. adduxit Hip. veruntamen ita obscure, indistinctè, ac breuiter, vt omnino tyronum captum subterfugiat. Quamobré sumptis ab eodem Hipp. principijs, paulò clariùs hac in parte illam aggrediar. Iubet itaq; §. Aphor. fœminas, quibus menses decolores sunt, purgandas esse. Cuius opinionem in sequens Gal. in com. ita refert. Si verò menses decolores sint, multò magis purgatio sanabit ita se habentes mulieres. Verùm fœminas sic affectas triplici remediòrũ genere curare oportet. Primò præmissa humorũ cuiuslibet naturæ sint, præparatione, ea nimirum, quæ extenuatione perficitur, secundò purgatione p vtrinq; aluum pharmaco conuenienti facta, tertio medicamētis, q vires habeant. conterendi, ac discutiendi, q ex humoribus post purgationē superest. Extenuationi igitur humorum tantum inniuitur Gal. com. citato, vt tenues etiã

*Curandũ
ratio.*

B humores, adhuc biliosos, extenuari iubeat, cum illud primò accessu non videatur ad modum necessarium, si quidem ipsi citra maiorem extenuationem p vterum fluere assuescunt. Sed quòd pituita crassã, ac melancholia attenuatone indigeant, priùs quam possint alacriter educi, omnes fatentur. Idem etiã est de flauabile iudicium, etiã si sanguine tenuior, fluxibiliorq; existat. Quippe non eadem facilitate vilis per angustas hepatis vias à medicamento educetur, quã à natura per manifesta uteri, aut hæmorrhoidũ ora expurgatur. Quamobré antequam illuc deuehatur, attenuatone maiore indigebit, quã dum per vterum solum expurgare nitimur, si quidem flauabilis præcociter sanguinem mēstruum per vterum seducit sine extenuantis adminiculo. At dum aliò purgare ipsum humorem est in animo: vterius extenuare oportet. Idem est de melacholia. Cum hoc tamen pituitæ aliquando sola concoctio sufficit, quòd concoctã, in bonum sanguinem sepe transmigret. Saltem attenuata sanguinem menstruũ non impedit, & cum eo decedit. Verùm cautè hic obseruare oportet, ne pro extenuantibus, vehementer menstrua prouocantibus vtamur, nam subinde, & hic & alibi plus obsunt, quã profunt, vel quia id, quod serosius est, colliquant tantum, vel quia multa prouocatione multitudinem angustijs vasorum magis impingunt. Extenuantibus igitur paulatim, ac sensim primò veris, qualia sunt, quæ longo nobis vsu & ratione explorata existunt. Quæcunque enim olfatui, gustui, aut vtriq; simul acria, & mordacia, & calida apparent: ea facultatem habere attenuandi, atq; inscindendi certum est. Adhæc, si quid olfactu odorem bonum inferens, aromatis speciem gustui repræsentet: id quoq; calidum viribus, esse oportet, & attenuans, quamuis non perinde, ac ea, quæ mordicant, & rodūt & insigniter calida sunt. Attenuant præterea, & inscindunt, q saporem habent nitrosũ, aut salsum. Nec minùs, quæ amara sunt. Item, q acida, vt acetũ, & quæ ex eo cõsũt. Ex quo pater attenuantia omnia non calida modò, sed sicca èt facultate esse, & tanto magis attenuandi vi pollere, quantò fuerint sicciora. Et ex ijs similiter, quæ sicca non sunt, maturiora alijs minus maturis, & quæ siccis locis proueniunt, & montibus, ijs, quæ in paludibus, & campis crescunt. Sunt tamen primi inter vt tenuantia ordinis, allium, cepa, nasturtium, & porrũ: quæ proxi-

*De hum-
moriũ
extenua-
tione.*

*quæcunq;
acria
mordacia
& calida
apparent
attenuant
& inscindunt*

G mè

mè accedunt ijs, quæ menses ualenter mouent. Post illa aut smyrniū, pyrætrum, **A**
 organū, calamintha, sisymbrium, pulegium, satureia, thymus. Quibus ordine
 proxima sunt capparitis, terebinthi fructus, crucea, sium, apium, petroselinū, ori-
 ganum, raphanus, brassica, & beta. Quibus (p̄sertim eis, q̄ calida sunt) decoctis,
 aut forma syruporum confectis uti in extenuandis huius affectus humorib. po-
 teris. Quippe calidiora corpore existente cacochimo, febres, fluxiones, & alios
 grauiore affectus fœminis accersire mihi non est dubium. Acida uerò in eis ui-
 tanda quoq; esse consiluit utri conditio. Qualia autem sint, quæ menstrua ualē-
 ter euocent, cap. de prouocatione mensium dicta sunt. Ac si eorum aliqua hic
 reppereris, scito, mitioribus esse admiscenda, compescenda uero.

*De pur-
gatione.*

Facta sufficienter humorū extenuatione, maiore nimirū, aut minore, prout
 humoris cōditio exposcere uideat: biliosis nimirum, mitioribus, temperatori-
 busq; pharmacis adhibitis, pituitosis uerò, & melancholicis, paulò acriorib. Ad
 ministratis ēt potibus, & alimentis prædicto vsui idoneis, commodè eo tēpore **B**
 purgationem institues. Cuius initium sumes à pleniori aliqua purgatione, quæ
 fiat pituitoso humore redundante ex agarici infuso in aqua graminis, cū syru-
 po ex infusionibus rosarū persicarū. Item ex infusione turpeti, in qua dissoluan-
 tur electarii indi, vel diapheniconis. ʒ. iij. vel iij. aut diacatholiconis. ʒ. j. Ex bo-
 lis ēt ex agarico cum p̄dicto diacatholiconis, aut ex pilulis mastichinis, de aga-
 rico, elephanginis, aggregatiuis, & de hiera purgationē quoq; institues. Quod
 si humores biliosi p̄ualuerint, eisdē purgabis infuso rhabarbari, aut myroba-
 lanorum, aut utriusq; syrupo ēt ex infusionibus, manna, cassia fistula, & simili-
 bus: quibus uel rhabarbari, uel myroba'anorum aliquid admiscere poteris, ut
 plenior fiat purgatio. Quā in robustioribus fœminis pleniorē efficies electa-
 rio rosarum Mesues diluto in aqua lactis, uel cichorii, aut pilulis aggregatiuis,
 uel de rhabarbaro in modica quantitate cum aloe. At si melancholicum succū
 redundare cognoueris: robustas fœminas cōfectione hamec purgabis, sed in
 maiori dosi, ex ea nimirum, quæ simplicissima conficitur sine scāmoneo, & co-
 locintide. Nam reliqua vsu venire solet rarò. Purgabis ēt cassia, vel decocto se-
 næ, aut saccharo violarū, vel violis ipsis saccharo conditis. **C**
 Cæterum facta hac
 purgatione, curabis deinceps paulatim, ac sensim corpus à vitiosis humoribus
 expurgare, ita ut simul & humores extenuēs, & per epicrasim expurges. Nullā
 enim præstantiorem curandi rationem adinuenies in corporibus multo vitio-
 so succo abundantib. q̄ paulatim facta vitiosorum expurgatione, & ex laudabi-
 li nutrimento noua facta refectio. Quibus autem paulatim purgationē mo-
 liri possis præcedentib. capitibus abundē dictum est. Inter vnā tamen, & aliā
 purgationem concesserit extenuantibus uti, & modico exercitio, atq; clysterib.
 quæ & corpus, & uterum ipsum purgare possint. Quod si uentriculum causam
 esse redundantis pituitæ cognoueris: proficuum fore auxilium censeo, fœminā
 bis, semel uel ad uomitum cogere, ut quod in dies ibidem præter naturā institu-
 tum aggregatur, statutis dieb. antequam uenas irruat, expurgari possit. Quod
 de biliosis etiam succis subaudiri, non displicebit.

*De abusu
omnis
humoris
reliquis*

Verū si p̄missis pleniorē, & paulatinis vacuationibus, residui aliquid adhuc
 supererit: prouidendum est omni arte antequam in maiorem molē succrescat
 radi-

A radicitus extirpare. Cæterum quia id vel in utero, vel corpore reliquo, aut in v-
trifq; vagari compertum est: necesse quidem erit auxilijs per vtrāq; partem pu-
gnare. Sic ea, quæ in vniuerso corpore supersunt, optimè extirpant sudores vel
naturales, vel arte excitati ex decocto pentaphylli, spartæ parellæ, radicis chi-
næ, aut cuiusvis alterius rei, quæ citra maximam totius corporis turbationem,
aut humorum effluuescentiam id efficere habeant. Verum quia flauabilis agrè
tolerat vim auxiliorum sudores mouentium: balneis aquæ dulcis temperatè ca-
lida rem agere oportet. Quod sanè auxilium melancholicis etiā humoris profi-
cium esse nemo negabit. Omnibus tñ vtilissima est totius corporis mollis, sed
largiuscula frictio. Vtero etiā adhibebis pessaria, & suffumigia, quæ præcedē-
ti c. duximus. Verum vtriusq; theriaca, mithridatum, aut angelicæ decoctum,
præsertim frigidis succis prævalentibus opitulabitur. Quod si neq; his omni-
bus affectionem quietescere compertum fuerit: nihilo tutius, aut citius huic ina-
lo opitulaberis, quàm aperta in altero, aut bombus cruribus fontanella. Nam
dum membri alicuius, aut totius corporis facto intemperamento, hi humores
in corpore propagantur, vt ex purgantium pharmacorum frequentia, & vsu
B plus læditur: ita hoc saluberrimo præsidio magis, quod in dies aggregatur, su-
sceptat beneficium. Nec displicebit membrum primò affectum corroborare, ac
iungere iusta distemperiei modum.

De Albis vteri purgamentis.

Cap. 15.



INTER plerasq; affectiones, quas feminæ ratione sexus mise-
rè perpetiuntur, ea profectò potissima est, q̄ in vteri purgamē-
tis (siue alba sint, siue ulterius coloris) sita, mille accidentibus
adiuncta feminas ipsas creberrimè torquet. Quippe cum co-
gnouisset natura, vterū non solū fuisse huic sexui concessum
propagandæ proli gratia, sed ueluti sentina, vt toti et corpori
inferuieret, non modo secundum naturam in mensuris purgationibus, uerum
renū more, dum aliquid modum naturæ exuperat, illius quoq; vacationi sub-
seruit.

C Nam dum vterus, aut corpus vniuersum præuè afficiuntur, & affectui non
satis est menstrua purgatio, assuera per illam partem natura sese ab humorū in-
iurijs tuetur. Quod et mali persensit esse cām, præcauens maius malū, per vte-
rum quoq; excernere nititur, licet ab huiusmodi excretionē affectio hæc nō mi-
noris momenti suboriat. Cuius sanè mali Gal. meminit li. 3. de sympt. cau. c. 4.
Quod proculeubio, vteri purgamentum appellare libuit, licet vulgus (nec im-
merito quidē) albos flores appellet, sicut alij albas matricis supfluitates, & ple-
riq; et fluxum muliebrē nuncupent. Est quidē diuturna, & nonnullis continua,
alijs per intervalla superueniens p vterum distillatio ferè indolens, vlcerato iā
vtero, dolorificè. Vt ex Gal. colligitur lib. 3. de cau. sympt. & 6. de lo. aff. Profluūt
autem ab utero purgamēta hac lege à menstrualī purgatione diuersa, q̄ in hac
sanguis ferè sincerus iusta mēsurā, & debito tpe prorumpat. At in muliebris flu-
xū, quod excernitur nunc rubrum, quod non sanguis, sed ipsius sanies existit.

At multi autumant. Vt Hip. testimonium est lib. 2. de morb. mul. quo hæc verba **A**
 refert. Ruber fluxus fuit talis, qualis sanguis victimæ recens mactatæ, & grumi
 pelluentes. Cuius sententiam insequens Areteus lib. 2. de signis, & can. diutur.
 c. 11. inquit. Fluor sanè ruber, aut albus est, ruber quidem si sanguis flauus ema
 net, & huius species, vel liuidus, vel niger, vel tenuis, vel crassus, & cōcretus, &
 grumi. Albus (inquit) vt aqua, aut flauus cum pallido mixtus, vt vilis; crassus ve
 rò, aut subtenuis, aut tenuis liquor, & malè olens: albus item vt pus, sed exquisi
 tē albus, vt album serum. Quin etiam gutta cruenta nonnunquam cum pure si
 mul effluit. Et subdit. Mille aliæ sunt secundum rationem maioris, aut minoris
 istorum met species. Sed ad pensum rediens censeo rubrum fluxum aliquando
 sanguinem posse esse, aliquando saniosum sanguinem; quorū nullus mēstruā
 purgationem complet, sed vterque vteri, aut corporis est purgamentum, citra
 naturæ ordinem, & rationem profluens. Aliquando verò id, quod ex vtero pro
 fluit, album est ac tenue, lactis sero, aut ptisanæ cremori per simile, à pituitoso
 sanguine proueniens, quo corpus abundat, & sine dolore erūpit, vt ex adducta **B**
 Aretei sententia euidenter constat. Nunc etiam luteum, aut pallidum est, liqui
 dum quoque & aquosum, à seroso excremento proueniens: sæpe verò subuiri
 de, quo fuliginis colorem imitans, adeoq; acre, & erodens, vt quamcunq; par
 tem attigerit, adurat, ac leuiter exulceret, vilis quidem amara, & eruginosa so
 boles. Atq; id rursus tetri, grauisq; odoris, aliàs nullius est. Quas sanè fluxus dif
 ferentias multis modis barbari medici depinxerunt, & numerosa sobole mul
 tiplicarunt, iuxta Erasistrati sententiam, qui terdecim humorum differentias e
 numerauit. Quas ego potius ad diuersos putredinis, aut corruptionis modos re
 ducere, quam ad humorum prædictam varietatem. Est tamen potissima om
 nium differentia, nimirum, quosdā fluere tenues, crassos alios, plures citra mor
 dicitatem, & qui nullum inferunt læsionis sensum, alios verò mordaces, & a
 cres, ita vt sæpe vteri collum erodant. Vnde purum sanguinem fluere contin
 git: quem à menstrua purgatione ex præcedenti dolore, erosione, sanie, ac inor
 dinato fluendi modo sciungere necessum est, vt Gal. 6. de loc. aff. docere vide
 tur. Caterum si quis Hip. lib. 2. de morb. mul. attento animo legat, reperiet pro
 culdubio tot esse huius fluxus differentias, quot sunt humorum sortes, ac idæa, **C**
 qui fluere possunt. Et sic ex pituitæ crassitie differentias duas annumerat, ex san
 guine duas aliàs, ex bile tres. Quas quidem signis peculiaribus distinctas paulò
 inferius reperies.

Vtunque tñ sit, pertinere hanc affectionem ad id genus symptomatis certo
 scio, quod ea continet, q̄ immodicè excernuntur, vitiosa & præter naturā facta.
 Atqui licet vitii excretionis vtero reduci possit: dū verò id cōtingit ipso nequa
 quam affecto, toti corpori effecto communis existit, et si aliquando alicui singu
 lari particulæ morbus referri possit, vt iecori, spleni, capiti, aut ventriculo. Mor
 bus tñ à quo proficiscitur, nullus alius haberi potest, quàm aut totius corporis
 distemperies, quæ vitiato temperamento, id in excrementi, aut corrupti humo
 ris naturā cōmutat: aut alicuius membri particularis, cui conficiendi alimenta
 munus incumbit, quòd idem vitium humoribus præstet. A quibus excremētis,
 seu vitiatis, humoribus lacessita natura huiusmodi molitur symptoma, vt se
 a maiori

A à maiori malo tueatur, ipsa in uterum, tanq̃ in emunctorium transmittente, & ipso sese ab eis exonerante. Sicut frequentius utero male affecto cōtingit, quia nequeunte p̃be cōficere proprium alimentum, quod redundat, pellit: uel corruptente sibi cōmissum, in multigenā naturā excernit. Quorum sanè fluxuū, albi seniorib; feminis magis, pprii sunt, ut apertè Hip. refert li. ij. de mor. mu. in initio dicens. Fluxus albus in senioribus mulieribus magis fit, q̃ in iunioribus fluxus sanguis in utrisq; fluxus ruber in iuniorib;. Licet aliqñ quarundam feminarum fors contrarium nō sine euidenti damno cōmonstret. Quippe iuuenulae alba distillatione saepe laborant, quæ si uirgines sint, uel contabescunt, & ingratae, ac morbose degunt: si uerò nuptæ, steriles fiunt, & uiris insuauis, & ingratae. Ceterum ruber aliqñ senioribus accidere conspicit non sine euidenti damno. Nā facillè in malum corporis habitum, aut aliā ex frigore affectionem plumbuntur, ut in præfatio docebo. Verum, ut rē concludā, causas prædictorum fluxuum nuper citato loco ut Hip. cōprehendisse dicens. Et ruber quidem fluxus fit in febre, magis aut ex abortu fit, & ex mensium interceptione, cum conclusi de repente eruperint, fit et ex partu, & febribus. Sed has causas paulo specialius expendere oportet, si prius dixero meminisse quoq; Hip. rubræ cuiusdā bilis, quam aliqñ fluxisse comperimus. Inquit enim lib. 5. Pop. referens huius bilis speciem. Bilem multam abunde coloretam uomuit ad tres dies, ac noctes; ualdeq; rubram. Quam ego cenfeo esse, quam luteam ex eiusdem mente inferius referam, per uterum aliquando fluere.

B Cum à triplici fonte in feminis hos fluxus oriri, nobis cōpertū sit, ab utero nimirū, ab uniuerso corpore, & à mēto aliquo ex præcipuis: necessum sanè est oīum causas diligenter scrutari. Est igitur causa, utcunq; & à quauis parte oriatur, vitiosorum humorum copia, aut malitia, facultatem citra consuetas leges, modum, & institutū ad expulsionē laceffens, ut ipsa continere eos, cōplectiq; renuat, uel præ impotentia nequeat. Ex quo prodit nonnunq̃ continuo fluore feminas affici, aliqñ uerò per interualla, nimirum aggregata humoris copia. quæ molestare, utcunq; potentia nata sit, ac donec aggregatū existat, fluere desinunt purgamenta, postea uerò copiosius. Quod profectò non ita fit acri profluente materia. Nam et si pusilla sit quantitas, semper irritat, & semper fluit. Quo fit, ut quibusdā quotidie, alijs post mensium purgationem, nonnullis inter duas purgationes tantum eueniat. Præcedit aut prædictā causam alia non minoris momenti, nimirum prædictorum humorum generatio. Quā esse in triplici differentia cōperimus, quippe uteris dum solus causam huic malo præstat, id profectò efficit, uel quia proprium alimentum cōmutare non pōt, uel quia prauè cōficir. Ob id quidē tenuia, cruda, uel serosa recemēta excernit, aut pallida, putrida, fæculenta, uel alio deterrimo colore, odore uel affecta. Primū sanè uitū ex frigido distēperamento principiū nascitur, atq; nō utcunq; sed ueluti connaturali iā ipsi utero facto, quo inconfectum relinquit alimentum. Quam sanè causam Areteum retulisse constat, qui lib. 2. de signis, & cau. diutur. morb. c. 11. inquit. Est aut uulue refrigeratio, quam obrem humorum tenax esse non pōt, quin etiā sanguinem in albidum colorem transmutat. Vim. n. ignis rubificam nō habet. Ex quo euidenter constat, uterum non posse ali. At qui cum uterus non alatur, trahere nunq̃ desinit, ac per consequens, neq; expellere. Et ob id duo sequi ui-

*ab utero
a toto
a per
aliquo ex
podecipit*

tia necessum profecto est, vnum, assiduam hanc expurgationem, alterum, totius
 corporis extenuationem. Secundum porro vteri vitium proficiscitur ex calida,
 vel putredinosa eiusdem distemperie, quæ loco optimæ coctionis purgamenta.
 Illa fæda, prauoq; colore affecta gignit, & expellit. Soler quoque & nō mino-
 ri efficacia vterus huic malo causam præstare, nimirum dum imbecillus factus
 ob vteri gestationem, partium contusionem, vel casuum exteriorum vim: ob
 contractam et erosionem, vlcusve ex inflammatione, vel abscessu relictū, vel ab
 erodenti humore aliunde transmissio, ibidem factum. Aut q̄ promptè totius cor-
 poris vitium alliciat dolore, calore, mordicatione, & morbosa sensibilitate ppe-
 tua. Quibus et causis accedit frequentissimus coitus. Contingit quoq; non raro
 singulis mēsis easdē humiditates excerni ex menstruis purgationibus, præter
 modum in vtero semimutatis, vel q̄ citius euocetur sanguis ad vterū, vel quod
 facilius quoq; post debitum tempus excernatur. Quò fit, vt in plerisq; feminis
 earum, quibus menstrua debitum tempus non adseruant, hæc purgamenta pro-
 deant pauco, & tenuiori sanguine admixta, modò ante sanguinis excretionē ir-
 ritata natura, modò paulò post, quia ante debitū coctioni tēpus menses mouet, B
 & sic q̄ reliquum est, crudum transmittit. At p̄dictorum humorū generatio, &
 redundātia frequentius à toto corpore profluit (cā alioqui huius mali secunda)
 quod uel ex alimento apto, ob deprauatū, & habituale vitium eos cōficiat, vel ab
 eisdē aliunde generatis sese per vterum exoneret. Contingit sanè id vitium cor-
 pore prauo temperamento affecto, prauisve cibarijs dedito: quippe his duabus
 de causis scatere prauis humoribus corpus contingit, à quibus natura totius ir-
 ritata, vel fortasse impotens ad retinendū facta, eosdē aut expellit, aut diffuere p
 vterū permittit, tanquam per cōmune corporis emunctorium. Nam qua ratio-
 ne id, quod ex optimo sanguine abundat, femina existente sana, per eā partem
 ex naturæ instituto expellitur: eadē prorsus quod vitiosum persentisci, per eandē
 partem ex consuetudine, & loci commoditate excernere conatur. Quò sanè
 fieri vel vitio expellentis facultatis irritata, vel retinētis languida nulli esse du-
 bium arbitror. Proficiscuntur aut hæc omnia vitia, vel ex vitioso temperamēto
 ob calorem, vel ex frigida, & humida distemperie, quæ retinentem facultatem
 laxet, ac emolliat. Sic quoq; hos humores redundare in vtero, vel in toto corpo-
 re cognoscimus, iecoris, splenis, ventriculi, vesicæ, aut capitis vitio (in q̄bus ter-
 tiā huius mali causam sitā esse arbitror) quæ sanè mēbra dum hoc modo affecta
 existunt, cū de munere habeant, humores toti corpori cōficere, aut purgare: fa-
 cile si præter naturā existant, vitiosos gignunt: quos aut toti corpori, aut vtero
 mandant. Itaq; si quis sedula diligentia intueatur quæ mox diximus: reperiet
 humorū vitiosorum redundantiā esse huius affectus immediatam causam, ho-
 rum quidem vel ab vniuerso corpore, vel vtero, vel membro aliquo peculiare.
 At membra hæc esse affecta, vt hos humores gignant connaturales, efficere, ha-
 bituales ferè & factas distemperies nulli esse dubitatum reor, calidam quidē,
 quæ biliosa excrementa, frigidam, quæ pituitosa, tenuia, aut fluida efficiant, vel
 aliter deprauata putredinosave, quæ nitrosos, salios, acres, & quomodolibet vi-
 riatos humores gignere habeat, siue calida, siue frigida existat. Quibus in corpo-
 re redundantibus, rationi cōsonum videtur naturam gliscere ad expulsionem,
 aut omnino retentionem renuere. Quò fit, vt per consuetum emunctoriū trans-
 mittat,

Amittat, conciterq; huiusmodi fluxionem. Areteus tamen loco citato, eū fluxum ex prædictis, fœminis esse deteriorem censet, qui liuidus est, cruentus, aut fatidus, q̄ pallidus, albus, & purulentus. Multa profectò sunt in hac affectione, quæ maiori, ac perspicaciori distinctione, q̄ vulgus existimet, opus habent. Quippe affectus natura, pars, quæ affectus præstat principium, ea item, quæ affectui in vtero consentit: nam, & vterus, & eius collum seorsum affici solent: & morbus, à quo vitium principium sortitur, ac vltimò humoris profluentis conditio: diuersam inter se notitiæ rationem, & præstant, & requirunt. Affectus quidem ad veram medendi rationem, à principio instituendam sui notitiam exigit. Pars affecta ad auxilij modum, mensuram, & adhibendi rationem. Morbus porro, vt qui vicem causæ (sine cuius ablatione symptoma auferri nequit) in symptomatum curatione gerat, si mitigandi ars non sufficit. Humoris verò conditio veram medicamentorum materiam, & auxiliorum ideam perferibit. Quamobrem horum omnium prouidentiam à principio ediscere conuenit. Docet quidem Hip. lib. de nat. mul. huius affectionis conditionem per hæc verba. Cum fluxus albus obortus fuerit, velut vrina asinina apparet, & dolor inum vëtre habet, & lumbos, & lateris mollitudinem, & tumores sunt crurum, ac manuum, & cana eleuantur, & oculi humidi sunt, & color arquatus, & albus fit, & cum iter facit, anhelat. Item Areteus. lib. 2. de signis, & causis diutur. c. 11. hmōi fluxum à menstrualium distinguunt, & nosse docet ex lege, ac mō periodicationis, cōmōstrās periodicationem habere triplicem, alteram, quæ statuto tempore reuertitur, ceterum diu durat, secundam, quæ certum diem reditus etiam si intermittat, non feruat, sed bis terve in mense regreditur, tertiam verò, quæ indefinens est, licet paulatim fiat defluxus. Sed anteq̄ vltra pergant: ex quibus affectus constet, mōstrabo. Primum itaq; eum dignosces ex ipsis purgamentis, q̄ longè diuersa sunt ab ipsa mensium purgatione, colore, substantia, odore, & profluendi tpe, ac ordine, q̄ ita his conditionibus à menstruo dissident, vt nullus id ignorare possit. Quippe in mēstrua purgatione syncerus sanguis prodit, in hac vëro fluxus corruptus apparet diuersorum tamen colorum pro humoris redundantis idea. Præterq̄ q̄ huiusmodi purgamenta imbecillitatem haud lenem fœminis sic affectis inferre solent, decolorationem item, in appetentiam, maciem, implacatum mærorem, pedum tumorem, difficilem respirationē, vel leuissimo facto exercitio, & reliqua et, quæ ex Hip. mox retulimus. Aperit item hæc affectio os vteri, & laxat ita, vt frequenter ipsum excidere contingat. Redduntur quoque hmōi fœminæ hoc malo sibi, & viris ingrata, & implacida: quibus accedit vterū exulcerari, vel admixta flauabile, vel seroso excremento, & alijs, quibus purgamenta acrimoniam acquirunt, ita vt dōlorē, & molestiam, non parua inferāt. Quapropter quibusdam purgamenta hæc cum vteri vlcere accidunt, alijs verò citra ipsum qd̄ distingues ex consistentia excrementorū. Nam dum vlcus præest, pus excernitur crassius, fetidius, & magis album. A sanie etiam, ac dolore: quibus accedit, quod fœminæ, quæ vlcus in vtero habent, maximè si in collo sit, viri congressum non patiuntur, aut saltem ab eodem irritentur maximè, ac dolent, quod etiam licet ex quantitate excrementorum colligere. Maior etenim copia serosæ substantiæ emititur, quàm puris. Præterquam, q̄ duæ vlcus non habent, licet viri congressu non delectentur, minimè tñ offenduntur. Hæc pro-

De dignoscendis affectionibus, causis, & parte.

euldubio sunt, quibus affectum in genere cuius facile innotesceat; si rem diligenter pensitet. A

Verum dum ex totius corporis vitio eum proficisci cōtigit, vel ex eo cognoscas, quod mox vniuersum corpus grauari persenties: praesertim si abundantia causam praestiterit: quo tempore citra aliquem laborem feminā grauius lassitudine premi, & veluti confrangi videbis: à qua leuatur copia recrementorum excreta: & rursus iterum grauari incipit, donec denuò aliquid expellat. Quod etiam dignoscas ex venarum plenitudine, & tēsiōe, ac ex pedum torpore, manuum, ac crurum. Præterea feminæ, quibus ob humoris vitium, & acrimoniam malum succrescit, vlcerosam persentiscunt lassitudinem, ac pruritum, & mordacitatem non leuem in vniuerso corpore: à quibus similiter per aliquod tempus leuamen susceperint excretis nimirum, per vterum purgamentis. Apparet etiam in toto corpore calor, & accidenti quoque in eodem subsequuntur, qualia hæc humoris natura producere solet. Quippe melancholica cacochimia mestitiam, terrores, taciturnitatem, & alia id genus inferre habet: bilis irasci pronomam, amarulentam, anxiam, sitibundam, & inquietam mille modis reddit feminam: sicut somnolentam, & pigram, pituita. Quorum excrementorum excretionem, subsidebunt quodammodo prædicta accidentia, & coloratio, alacriorque euadet femina. B

Quod si ex iecore, ventriculo, vel quouis alio viscere, affectio suboritur: peculiaritè cuiusvis membri symptomata, id facile monstrabunt, & excrementa cuique propria: etenim iecoris dolor, calor, & tumor cum excrementis biliosis, maxime percepta in excretionem, & parum ante ipsam molestia, facile iecur esse affectum monstrabunt. Pituitosa item recrementa, in appetentia, aut aliquando ingens fames, frequens ciborum in ventre corruptio, acida præsertim, & reclus crebri, ceruicillima sunt ventriculi affecti indicia. Verum si hæc omnia defuerint, & lumborum, ac partium circa vesicam molestiam, & leuem quandam doloris modum, seu contractionem femina persenserit, & neque citra ipsam quicquā leuata fuerit, signum proculdubio est, consensum ex vesica, & vicinis vtero partibus demandari, præsertim si his signa accesserint vrina alba, aut crassa, vel mucoribus plena. Quod si caput grauari, dorsum dolere, & totum corpus contractum esse contingat, præsertim cum suppressione eorum, quæ per os, & nares excernuntur, certo conijcies, caput esse affectum, eo magis si his omnibus excrementis, quæ per vterum excernuntur, accesserit spuma. C

Vterum porro esse affectum euidenter monstrabit prædictorum signorum defectus, & eorum omnium, quæ præcesserunt, notitia, ac rursus peculiaritè vteri sympt. Item femina plerumque boni apparet coloris, ac nihil aliud, præter leuem quandam imbecillitatem persentit. Præcessit etiā difficilis partus, iectus, casus, supra vterum, aut dorsum vel partes vicinas, vlcus, aut tumor præter naturam in ipso vtero, medicamentum aliquod graue ex vterinis intus, aut extra adhibitum. Adest quoque sensus manifestus in temperamenti calidioris, aut frigidioris, & rursus immodica suppressio, vel nimia menstruorum profusio, aut alia vterina accidentia, quæ ipsum esse affectum euidenter monstrant.

Qualem verò humorē natura ab vtero, aut toto corpore, vel quouis eius peculiari membro expurget, facile discies, si exactè pensitaueris ea, quæ excernunt frequen-

A frequentius serora esse, quandoq; bilis serum, & ichorem referre, aliquñ pituitā & sepiissime sanguinis naturam emulari, rarò quidem melancholiam. Fului et cuiusdam fluxus Hipp. meminisse constat lib. 2. de mor. mul. per hæc verba; Fluxus fuluus fluit, velut ex euo vitioso, multus, & graueolens. Quem sanè aliquñ ad rubrum accedere comperimus, cuius signa adducens Hipp. eadem parte, inquit. Vteri inflammant, & dolor ex lumbis, & inguinibus emergit, & prodeunt multa sunt. Et paulo inferius ait. Riger enim, & veluti à carnibus allatis humor defluit, & cum his simul febres fortes, ac rigores fiunt. Ex huiusmodi verò fluxibus multæ pereunt, & paucæ effugiunt. Cuius sane naturæ differentiā aliā annumerat quoq; idem Hipp. loco nuper citato, dicens. Purgatur velut ex ovo crudo luteū, subalbidū, & vlcerat pudendum, & tument pedes, ac tibiæ, & cavæ oculorū partes obtumescunt, & oculi humidi, ac lacrymosi sunt; & iter faciat, an helatio ipsam corripit, & debilitas oboritur. Quæ proculdubio snia constat, hmoi fluxum originem trahere ex ea vitellinæ bilis specie, q̄ Barbari fieri per bilis, & pituitæ admixtionem referunt; q̄ verè exprimunt sequentia autoris verba. Si verò euaserit, morbus pituitosus fuerit, & si non purgata fuerit, febricitat, bile vehementer commorata; & subdit. Cū sic habuerit, siquidem vehementer intumuerit, pharmacum deorsum purgans biuendum dato, qđ bilē, & pituitā purgat. Quibus verbis, & ijs, q̄ in contextus serie sequuntur, euidenter cōstare arbitror, hac in parte Hip. meminisse eius bilis speciei, q̄ nuper diximus. Quod euidentius adhuc constat, nā bilis vitellinæ per affationē genitæ apertè reminiscitur paulò inferius dicens. Fluit subluteum, velut ex ovo, & viscosum, & venter imus intumescit, ac durus fit, & si cōtingas, dolet, & dētibus stridet, & febris occupat, & dolor ad pubē, & ad pudenda, & ad imū ventrē, & ad lūbos irruit, et animi deliquiū, & anxietas, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manum accelerantes, debiles, deficientes, & statim pereunt. Quæ sanè omnia si quis attento animo consideret, conijciat faciliè hæc accidentia esse ex bile vitellina, cuius nuper meminimus. Refert præterea eadem parte, aliā biliosi fluxus speciei, dicēs. Purgatur à carnibus allatis humor, & pudendum exulcerat, & ad quæcūq; corporis partē distillarit, rigor & febris acuta, magna, & simul horror occupat. Dolores aut, quales in oībus fluxibus. Hæc tota intumescit, & circa vmbilicum, color fit morbi arquati: talis aut fluxus ex hoc fit. Postq̄ sanguis exhaustus subbiliosus factus fuerit, & non fuerit purgatus. Ex quibus constat, quales sūt fluxuum biliosorum differentiæ, & quibus signis liceat eos distinguere, vt iuxta cuiusq; naturæ auxillorū materiā adhibere possim⁹. Quippe facile nosces cuius naturæ fluxus sit ex colore excrementi, ex corporis conditione, & uita præcedenti, nā oībus ex bile color flauus, & pallidus inest, in quibus persentit acrimonia, & alia accidentia subsunt, q̄ nuper ex Hip. mente retulimus. Quod si à pituita affectio suboriat, color efflorescit in corpore albus, & magna q̄ritas. p̄ vterū defluit, sed q̄ fluunt, minus acria existunt. Feminae et otiose sunt, pingues & desides. Albæ quoq; fluxionis meminit Hip. lib. 2. de mor. mul. dicēs. Fluxus albus fluit, veluti alba asini vrina, & in facie sūt tumores albi, & partes albæ sub oculis tument, & hydropiformes, ac non valde bona specie p̄diti sūt oculi, & splendor abest, & lacrymosi sūt oculi, ac hebetes, & color corporis exalbidus, ac pustulosus, & venter imus tumidus, & in maxillis pustulæ paulatim ruben-

rubentes, parua, aquosa, ac maligna. Et in cruribus tumores laxi, & si presseris A
 digito, notae imprimuntur, uelut in fermento. Et eos saliuā impletur, & stoma-
 chi morsus percipiunt cum ieiunae fuerint, aut etiam vomuerint uelut acidam
 aquam: & si ad accliuem locum procedunt, anhelatio totius corripit, & strangu-
 latio, & crurum perfrigeratio, & genuum impotentia, & in ore ulcera fernida,
 ac superficialia: & uterus praeter rationem aperitur, & osculum procedit graue
 velut plumbum. Tandem alia multa recenset, quibus, & praedictis facile eius
 cognitionem, ac praesagium quis ediscere poterit. Alterius quoque albi fluxus
 speciei meminit eadem parte, dicens. Desluit multum uelut urina ouila, & sub-
 dens signa, inquit. Color est albus, & tota intumescit, & in tibijs eminentiae la-
 xae, & rubicundae emergunt. Quibus constat, duplicem constituisse albarum flu-
 xionum differentiam. Cuius unamquamque speciem eadem parte curare distin-
 cta methodo aperte docet. Sanguine etiam in foeminis redundante, ipsi per simi-
 les profluunt purgationes: aliquando quidem foeminis utero generatibus per uteri
 euericis venas instillans: nonnunquam uero mensibus suppressis: tunc etenim B
 frequenter natura loco mensium, seorsum excrementum reddit, quod plane ru-
 bescit, & tale est, qualis esset aqua pauco sanguini admixta. Cui consimile flu-
 xum adduxit Hip. li. 2. de mor. mul. & alios etiam plures dicens. Ruber fluxus
 fuit talis, qualis sanguis victimae recens mactatae, & grumi pellucens: aliquan-
 do et rubrum fluxum emit: ac subdens eius signa, & ut a menstrua purgatio-
 ne distinguat, inquit. Et uenter imus attollitur, & attenuatur, & impotens fit, &
 indurefcit, & ad contactum dolet uelut ulcere praesente, & febris habet, & don-
 tium fremitus, & dolor, ac ipsa pudenda, & pubem, & lateris mollitudinem, &
 lumbos, & tendinem, & uentrem, & pectus, & scapulas: refertque id malum pro-
 ficisci ex laborioso partu. Et paulo inferius rubri fluxus meminit longe diuer-
 sis uerbis a praecedentibus. Praeter quas omnes fluxus differentias, alias quoque
 aperta oratione Aetius monstrare uidetur li. 4. ser. 4. cap. 63. quo loco inquit. Si
 obscurum colorem habeant huiusmodi excrementa, causam ita scrutari oportet.
 Linteam co inquinatum arefactum simplici aqua eluimus, & inde a maculae
 colore redundantis humoris notionem capiemus. Quod censeo ab Hipp. acce-
 pisse li. de nat. mul. & li. j. de mor. mul. qui hac probatione certiores posse fieri C
 ex humore peccante apertissime profert.

Se se offert in ultima parte notitia signorum seminis profusi, quae affinis est pi-
 tuitoso fluxui: quae proculdubio foeminas non raro sicut, & uiros exercere sci-
 mus, ut paulo inferius probabo. Est tamen foeminarum semen crudius, quod a uasis se-
 minarijs, non ab uteri sinu in eius ceruicem, citra ullam ueneris voluptatem, pro-
 fluit: non tamen assidue, neque quotidie, ut in uteri fluore, sed per quaedam interual-
 la, citra illum etiam foctorem, aut uirulentiam. Cui porro fluxionis sorti accedit
 uirulentum quoddam seminis profluuium, quod contagiosa, impuraque; uenis pro-
 gignit. In quo quidem semen crassius, interim album, interdum flauum, aut vi-
 ride, odore foetidum, acre, & erodens excernitur: non autem assidue, ut in uteri
 fluore, idque raro circa pudendarum partium uleus infestare deprehenditur. Di-
 stinguatur maxime haec seminis profusio a mulieri profluuiio, quod ipsa non ab
 utero, ut hic, sed a seminarijs uasis prodeat: at haec dimanantibus adhuc men-
 sibus

Alibus non desinit, sed simul cum eis, & postea perseverat: muliebre autē profluuium cessat, quando menstrua feruntur, & breui interuallo post illa: praterquā q̄ prædicta seminis profusio semper sibi habet coniuncta morbi gallici signa, nisi in virginibus, si quando is fluxus accidat.

His habitis, quæ cognitioni affectus proficua sunt, memoria te quoq; tenere oportet, grauem esse, & periculo plenum huiusmodi affectum. Quippe qui ingratis viris efficit fœminas, tediosas, steriles, & vterum etiam exulcerat, proci dereque cogit, corpus contabefacit, iecur & membra nutrimētalīa deiicit, adeo ut sæpe in hydropem degeneret: & tandem miserrimis accidentibus, melancholia, mæstitia & animi deliquo premat, ac mortem non raro afferat. Cōsideratio ne quoq; dignum est, hanc affectionem omnibus fœminarum ætatibus accide re posse: virgines etenim corripit, sicut & eas, quæ virum iam gustarunt: licet Montanus contrarium videatur asserere, innitens Hippo. decreto lib. de morb.

Bmulier. qui ex professo refert, eas quæ peperunt, esse huic affectioni promptiores, & mox eas, quæ corruptæ sunt: cum hoc tamen non negat idem author vir ginibus posse accidere, sed rarius id esse propter venarum ineptitudinem, quæ in reliquis fœminis veluti cū causā huic fluxioni existit: qua quidem aptitudi ne incorruptæ carere videntur. Præterquam quod omnibus fœminis ex semine potest hic fluxus cōcitari, ut cap. de gonorrhea reperies. Quapropter hac in par te supersedeo, solū in memoriā reuocans, fœminas salaces huic morbo prōptio res existere, sicut eas, quibus præhumiditate vasa spermatīca laxa fiunt, ac semē aquosius. Quibus vltimis citra salacē conditionē accidere optime potest: quini mo hæ neq; viris gaudent, neq; viri concubitum desiderant, neq; vllā persentiunt semine excreto delectationem. Præterea expēdendum est hac in parte id, quod Areteus lib. 2. de signis & causis morb. cap. 12. refert, existimans eum fluxum ex prædictis deteriorem esse fœminis, qui liuidus est, & cruentus, aut fœtidus, quā qui pallidus steterit, albus, aut purulētus: inquit enim. Quinetiam ex ipsis minus noxij sunt vsitati, sed re vera, senioribus infestiores sunt rubri fluxus, minime autem puellis, quibus magis albi nocent albi enim si male oleant, pessimi sunt. Nec prætereundum est hac in parte, nō paucas esse fœminas senio iam cōfectas, quibus sanguis per vterū instillat: quæ sanē existimant, sibi adhuc mēstrua durare (ut ætatē simulent) quas velim intelligere rubra hæc purgamēta potius esse ex vteri, vel totius corporis vitio, vel iecoris nimīū sanguifici, quā ex naturali & consueta sanguinis copia. In summa vereri oportet ex diuturno fluxu marcorem malum corporis habitū, pessima, & diuturna vteri vlcera, mēstitiam, & pleraq; alia mala, quæ ex diuturnis fluxibus subsequi solent, & non raro sterilitatem, licet Hipp. lib. 4. pop. text. 51. referat, ex albo fluxu fœmelam, & ex rubro, filium fœminas peperisse: inquit enim. Alia bis fœmelam peperit, alia rubris ut par erat. Quamobrem diffidendum non est sic affectas concipere posse, etiā si quod dictum est, frequentius accidat.

COmniū sanē fluxionum hæc est peculiaris conditio, ut periculosam habeāt vtranq; immoderantiam, siue in ea plurimū, siue nihil effundatur. Si enim semē exire immoretur, non quosuis morbos oriri conspicias, sed difficillimos quidē & periculosissimos: quia ex separato excremento, quod natura ad fluxus locum destinarat, talia concitari solent: mixta etenim cū sanguine excremēta, mitiores

& secu-

Præsa-
gium.

Curādi
ratio.

& securiores paritunt effectus. Sic dum assuetudo fluxus acquiritur, habitū effici- **A**
 cit morbis summè obnoxium. Est tamen hoc desiderium inter hæc duo affectio-
 nū genera, quod ex vacuatione immodica, frequentius morbos frigidi ac sicci
 intemperamenti oriri est necessum: vacuato namq; spiritu, quem necesse subin-
 de est cū fluxu abire, refrigerat corpus & cōtabescit naturali humido & calore
 deficientibus, etiāsi aliquando tumeat, & humectetur ex accidenti, frustrata ni-
 mirum cōtione. Ex retentione verò, cōpositionis affectus, vt tumores, obstru-
 ctiones, & vlcera fieri proculdubio oportet. Præterquam quod ex vacuatione
 morbi prodeuntes, corpus perduat: ex retentione quidem vterū primario in-
 festant: quod Hippo. optime. 5. aphor. docuerat, dicens. Ex retentione, morbi
 vtero contingunt. Quapropter summa diligentia curandum est, ne aut fluere ni-
 mis, aut non fluere permittamus, plus minusue, quàm femina ex usu sit. Præ-
 mittenda igitur in oī fluxu debita viuendi institutio est, quæ, vt Hippoc. refert
 lib. de natu. mulie. cibis constet quasi siccissimis, & tenuis, astringentisq; substa-
 tiæ. Fibataquā ferratā per se, vel eam, in qua aurum sæpius ignitum extingua-
 tur, aut cū syrupo citoniorū, granatorumve, & si vires imbecilles steterint, pau- **B**
 cum vinum porriges, crassum & austerum. Edat item pyra austera, pruna, & cæ-
 tera fluxui menstruo impetata. Qua etiam in re vitare oportet vinum tenue, &
 præcalidū, nisi virium gratia modicum aqua pluuiali nimis dilūtum porrigere
 necessum fuerint. Qua victus institutione præmissa, triplex erit in hoc affectu
 curandi ratio: prima quidem, è toto corpore, vel a membro aliquo peculiari in-
 dicatione sumpta, si ab his malum originē traxerit. Secunda ab humoris seu re-
 cremēti fluentis natura. Tertia verò & vltima, ab vtero ipso, modo per primo-
 geneam affecticnem laboret, modo affectui alterius partis consentiat. Docet au-
 tem vniuersam medendi rationē huic effectui proficuum, Hipp. lib. 2. de morb.
 mul. in principio: q̄ sanè plurimum esse expēdendam arbitror: & ob id ad eius
 pensum hanc nostram conati summus ad instituere.

*Si flu-
 xus totū
 corpus
 consen-
 siat.*

Corpori itaque vniuerso huic affectioni consentienti (vt latissime etiam lib.
 nostro de auxiliiorū indicatione diximus) prouidendū proculdubio est tribus
 modis. Vno quidē, euacuato humore, qui expuerat: alio, distracto longe à par-
 te, per quam assuescit fluere, tertio verò per ea auxilia, quæ residuum humoris **C**
 conterat, & corpus roborent, ne amplius eos humores gignat, ac vterū quoq;
 ne eosdem deinceps recipiat. Quapropter in memoriam reuocare oportet quæ
 li. nuper citato diximus, & huc transferre: quippe prima indicatio docet humo-
 rē quo corpus supra modū abundat, imminuere, ne nobis accadat quod vxori
 Boeti Galen. lib. de præcognitione ad posthumū accidisse refert: cui adhibitis
 topicis auxilijs nulla habita corporis prouidentia, viscerū tumorē succreuisse
 profert, ac ob id nihil profecisse auxilia. Quamobrē initio sumpto ab humorū
 redundantū vacuatione (ne exterius adhibita auxilia intro ad viscera vitiosos
 succos pellāt, & maioris fluxus, aut maioris mali causam præstent) primò expē-
 des toto aīo qualis sit humoris redundantis natura, vt antequam aliud moliaris
 opus, maiorē humorum partē educas, vena quidē scissā, si sanguinē redunda-
 re cognoueris. Quippe in rubro fluxu, vel si ex mensū suppressione accadat affe-
 ctio, a sanguinis missione principiū curationis auspicari oportet: idq; ex venis
 brachiorū medijs, q̄tū feminā tollere posse cognoueris: vel si maior internā
 cubiti

A cubiti venam seca. Quod si Aetio credere velimus, secta frontis, aut narium, vel scapulis scarificatis maximum fit p̄sidium, ut longe à parte, per quam fluxus sit, sanguis distrahatur, qđ si vsu venerit, per partitas vices, & interualla id fieri tutius censeo. Dimitto consulto hac in parte eā Hippo. curationem, quā li. de mor. mul. his fluxibus ascribit: nā suspecta mihi quodammodo v̄r, & diuersa quidē ab ea, quam in principio lib. 2. adduxisse diximus. Tandem sanguine missō, ea medicamenta adhibebis, quae à serosis recrementis sanguinem expurgare nata sint, quippe hoc sanguis uitium censemus, non mediocre esse fluxionis causam. Quem sanē vsū pr̄stathiera Gal. & casia cum pulueribus myrobalanorum, citrinorum, uel rhabbarbis; item serum lactis cum modico rhabbarbo: confectio hamec sine scammono, & colocintide cum eodem rhabbarbo: syrupus etiam de rosīs hispanis ex nouem infusionibus confectus, additis in vltima infusione pro quaque eius libra. 3. iij. rhabbarbi. Cui consimilem vsū pr̄stabit syrupus cichorij compositus cum sero lactis. Confert etiam modicum cōseruae rosarum cum rhabbarbo exhibitum, vel, si profusio fuerit maxima, eandem conseruam cum granis tribus, aut quatuor mastichis porriges.

B Quod si alterius sortis fluxus sit, insequens Hippo. pr̄ceptū, biliosis quae bilem, pituitosi q̄ pituitam expurgent pr̄beto. Verū quia (vt superius dictum est) biliosi fluxus non vnica est species, sed multiplex: consideratione dignū esse existimo, medicamenta esse, aut miscēda, aut temperāda, aut aliter m̄tescenda, iuxta humoris fluentis ideā. Nam sic Hipp. loco saepius citato de mor. mul. ad vitellinā bilē ex pituita permixtione pharmaca admixta ex ijs, quae pituitā, & bilem purgant porrigit. Sic quo biliosior fuerit fluxus, eo magis oportet humore atēperare, ac diligenter puldere, ne fluat, & si fluxerit, ne uterum mordeat, exulceretve, ac per cōsequens magis humores ad se alliciat: aliqñ per uteri nos clysteres ex mucilaginis ac lenientibus pharmacis confectos, id pr̄cauēdo: adhibitis ēt alimentis, syrupis, & potionibus, quorū abunde meminimus cap. de menstruo. flore. Tandē facta cuiusuis humoris purgatione, ut vires permittere uisum fuerit, paulatinis purgationibus humorū reliquias cōterere opus erit: nā dum corpus uniuersum alicui affectioni consenserit, difficile quidē erit tantam simul efficere purgationē, q̄ causae magnitudini respondeat: nequit. n. id citra noxam humanum corpus perferre: ob id sensim, & paulatim quod ē purgatione superest, consumere tutius est. Sic flauae bilis reliquias conteres frequēter exhibitō rhabbarbi infuso, aut decocto largiori corticū myrobalanorū citrinorum: syrupo violarum ex infusionibus cū decocto foliorum senae. Huic etiam vsui pilulas conficies, quas plurimū profuturas censeo, quae recipiunt qđē rhabbarbi electi frequētissime irrogati succo rosarum. 3. ij. myrobalanorū citrinorum, chebulorum, & indorū infusorum in succo rosarū. ana. 3. j. Mastichis. 3. j. spica. 3. l. cum syrupo ex infusionibus fiant pilulae; quibus aliquando addi possunt myrrha, & crocus. Interim tñ dum haec exhibes, & antequam purgationē moliaris, in interuallo nimirū, humores frenare oportet, ac apozematis eorum acrimoniā retundere. Verū si neq; his, neq; opūma nictus institutione affectus, adhuc q̄uerit, studēdū est omni arte affectū p̄ defluxū humoris ad aliam partē curare, qđ promiserat secunda intentio; natura nempe affluxu dissueta, ac humoribus ipsis aliō euocatis. Qui etenim humores cū uitiosi sint, verēdum est, ne

est, ne quocunq; ierint, nisi excernantur, malum efficiant. Quapropter non solum
 eis diuersionum generibus, quæ tantum humores alio transferant, erit contus:
 sed in eo opere diuersionem cum euacuatione coniunges, vt simul, & reliquias
 conteras, & fluxum alio transferas. Ob id facto diuersionis principio, à mollibus
 totius corporis frictionibus exercitio, vinculis, cucurbitulis paruis & frequen-
 tioribus, summopere confert naturalium balneorum usus, præsertim sulphureorum.
 Quæ quoq; usum præstat sudoris, puocato, si humor biliosus, & acris fuerit, aqua
 tepida, sin aliter ex ligni guayaci, aut sparte parellæ decocto, vel radice chinæ,
 quod vtilius esse arbitror. Verum si femina sudare renuerit, incredibili efficacia per-
 derit ex prædictis decoctis syrupus confectus, noctu ante somnum exhibitus. Prius
 tamen, quod id moliant in rubro, & bilioso fluxu, & in alijs, qui mordaces existunt, po-
 tionibus vtendum est, quod humores retundant. Sunt proculdubio huic vsui, profi-
 cua, lac, pituita, aqua hordei, aut portulacæ, & seminum frigidorum expressiones
 sed lac maioris est commodi, præsertim cum eius meminerit in gratiam huius af-
 fectus Hip. lib. 2. de mor. mul. iubens lac calidum de vacca sic affectis exhiberi.
 Præstat item eundem usum lac asinæ, & serum. In quo et affectu lactis usum com-
 mendat Hip. lib. de nat. mul. dicens. Postquam autem infra purgata fuerit, bubulum lac
 bibat ad dies quadraginta si poterit meracum, sub diu per noctem expositum, quæ
 ta aquæ parte admixta, vespere verò, ubi ebibat, alicam forbeat: ubi autem decem
 dies fuerint transacti, lactis & aquæ decimam partem extrahito. Quantum autem detra-
 xeris, tamen tepidi recentis multam portionem additam bibat. Qua sententia constat, qua le-
 ge prodest nostro vsui lac, ut Aetium quoque consuluisset legimus. Præterea ad uri-
 nas et humorem euocare Gal. præcipit, ac per easdem expurgare. Cui vsui propi-
 nat aqua, in qua asarum, & apium sunt decocta. Verum cum multa aquositas fre-
 quenter his purgamentis admisceatur, iure optimo usus est Gal. ijs quæ aquam du-
 cunt, qualia sunt decoctum cartami cum polipodio, & calametho: decoctum ite-
 sambuci, aut soldanellæ in parua copia cum modico turpeto, aut agarico. Atque
 licet alia sint his validiora, hæc mihi in feminis sufficere videtur: a quibus iterum
 ad ea, quæ paulatim per ventrem, & urinas euocant, deuenies. Quippe bile redundante
 te maximi esse momenti censo summo mane sumere 3. iij. eius, decocti, quod re-
 cipit cichorii, scariolæ, lupulorum, fumarie, borraginis, an. m. j. passularum, & pru-
 norum, an. 3. j. & 1. foliorum senæ, & medullæ cartami, an. 3. j. & 1. florum cordialiū.
 p. j. anisi. 3. j. quatuor seminum frigidorum maiorum, an. 3. j. & 1. fiat decoctio in sero
 caprino, vel in aqua plumbali: cui facta colatura adde succi rosarum lib. j. succi
 intibi. 3. iij. sacchari quod sufficiat, vt fiat apozema. Cui iterum adde santhalorum
 rubrorum. 3. j. quod si malueris coquere ad formam serapij, additis rhabarbari. 3. iij.
 maximi momenti medicamentum efficies. Monitum tamen hac in parte lectorem
 velim, ne intrepide his, quæ urinam mouent, uti audeat, nisi & præmissis purga-
 tionibus, & rarius, quod omnia menses mouere nata sint, & ob id videatur huic flu-
 xioni quodammodo esse aduersa. Cum hoc tamen, vt ex Gale. constat, ea quæ pro-
 prie urinas ducunt, mouere menses nequeunt: quinimo cohibent, quia sangui-
 nem siccant, & crassant. Quod si eis ad ducendos menses aliquando utamur, hoc est,
 quia ex accidenti prosunt, quatenus obstructions, quæ menses remorantur, tol-
 lunt. Nec valet, si quis arguat, urinas ducentia aquosum à sanguine separare, vt
 Gal. mens est, ob idque fiet, vt ad uterum quoque promptè illabatur, sicut ad re-
 nes.

A nes. Cui dicimus humorē illum aquosum non delabi ad renes sua sponte, ita ut periculū sit, ad uterū quoq; posse peruenire, sed potius vi maxima, & efficacia renū trahitur, & eo magis, quo liquidior sit: ad uterum uerò neq; sponte it, neq; vi trahitur, & ob id facile diureticis medicamenti ad urine instrumenta euocari poterit. Quamobrem si quis vsum horū medicamentorū exactè discat, ut nos lib. de indic. docuimus, facile citra periculū, eis uti poterit. Interim tamē dum prædicta auxilia exhibemus, ijs, quæ roborent, & astringant, p̄ interualla vtendum est. Cui vsui multis probatum reperio hoc præsidium, quod cōstat ex nucleis granatorum acidorum siccatis, & in puluerem redactis, ac obsonijs respersis, uel incoctis. Sic & nucleorū inglandis cōbustorū cinis ex uino subter inditus, mirè purgationes has sistit. Reliqua uerò paulò inferius reperiēs.

Quod si pituitosum humorē, aquosum uerē redundare cōpereris, audacter prædictis, & calidiorib. auxilijs uti poteris, initio tñ factō à sufficienti purgatione, & p̄missis, quæ pituitam ipsam præparent, qualia sunt mel rosaceū, syrupus stœchadis, de artemisia cū oximelite, & aquis betonica, absinthij, hyslopī, aut decocto aliquo ex prædictis, aut consimilib. herbis: quorū abunde meminimus cap. de mensium suppressione. Purgabis tñ pituitam ex decocto largiori turpeti, agarici cartami, aut frequētib. pilulis ex hiera, & agarico, vel mastichinis, aut elephanginis, vel Mechoacano radice nuper ad nos ex India asportata. Proderit ēt decoctum ligni guayaci, vel radicis chinæ, vel in quo parum turpeti, aut agarici leuiter ferbuerit. Cui itē vsui serapium ex ligno guayaco conficies cum hermodactilis, rosīs hispanis, & cartamo, ac folijs senæ. Profunt quoq; ad purgationē electarium indum, vel pilulæ aggregatiuæ, aut de sagapeno. In quem vsum optimè facies, si paraueris pilulas hac formā confectas. Excipe pilularum de hiera. 3. ij. agarici trochiscati. 3. j. & s. cum melle rosaceo fiant pilulæ: quarū summo manē tertio quoq; die laborans sex, vel septem sumat, postea uerò earū tres tantum quinto, aut sexto die. Quod si purgationem fœmina renuerit adeo crebram: necesse profectō erit tempus aliquod excretioni alienorum per uterū concedere, & interim victu uī tenui, & exiccanti. Item paulatinis vacuationib. vtendum est, quæ minus molestæ, & ingratae sunt, ex agarico nimirum infuso, aut feruefacto, ex cartamo, ex pilulis ab eisdem factis, & ex aliis huius census. Verū sine hæc quidē prodesse videantur, vomitibus ante cibum, aut ab ipso vtē dum est: quo sanè auxilio per plures hoc malo leuatas uidimus, facta in cōtrarium auersione, & pituitosorum, quæ redundabant, excretionē: ne tantum in uterum humorum, & crudorū maximè, defluat. Quo factō reliquiis pituitosorum recrementorum prouidendum est, concitata sudatione, frictionibus frequentioribus, ac durioribus, quàm in biliosa cacochimia, & exercitio, ac balneis aquæ saluginosæ, & aluminosæ, sulphureæ, aut bituminosæ: decoctionib. item spartæ parellæ, ligni indici, ac præcipue decocto radicis chinæ, quod huic vsui maximè esse proficuum arbitror, cuius simplex aqua quotidiano potui exhibita, utilissima censetur. Per suffitus etiam aromatum, & per euaporationes ex decocto (in aqua pluuiali, aut ferrata factō) herbarum calentium, & aromaticarum, iniectis in balneo lapillis ignitis. Corpus quoq; inunges à balneo, aut sudore oleo, in quo incoxeris anulæ, piperis, aut pyretri parum, vel squinantū, chamæmalum, thymum, radicem angelicæ, aut eiusdem semen.

Utatur

*Cautela
mē id fa-
cies,
quia li-
cet auto-
res cōsu-
lāt, nuf-
quā mi-
hi arripit
diu rei-
corū u-
sus: nro
fam. n.
et mor-
dacē red-
dit mate-
riam, et
copiosius
euocat.*

Vtatur etiam fœmina diebus aliquot cornu cerui vsti, aut acacia, & diatraga A
cantho ex vino, præstant loti ramenta, si Gal. credimus, & eiusdem corticis de-
coctum, sic corallum & semen vtiæ pondere. 3. vnius cum vino nigro: hædi et,
aut leporis coagulum ad erui magnitudinem in posca dilutum. In hac quoque
pituitosa causa corpore satis purgato maximi esse momenti cœleo diuretica ad-
hibere medicamenta ea lege, quam paulo superius diximus, à quibus sanguis
præter extenuationem, quam suscipit, separationem quoq; crassarum partium
nanciscitur, ex quo seroso recremento renibus tracto sanguis purus euadit ci-
tra periculum prouocationis mensium. Huic etiam vsui, & ad reliquias humo-
ris conterendas theriacæ mediæ ætatis, vel mithridati. 3. vnam conferre scimus.
Idem pari lege facit conditum, quod recipit conseruæ anthos, stachados ana.
3. ij. conseruæ acori vulgaris. 3. j. pulueris diarrhodonis, aromatici rosati. 3. j. & f.
cornu cerui vsti, coralli rubei ana. 3. ij. & f. conchularum marinarum vstarum,
& lotarum in vino. 3. v. cum serapio de corticibus citri fiat opiata. Huic etiā vsui
scio proficuum fore, summo mane. 3. j. pulueris radices mori cum vino negro su-
mere, quod tanquam peculiare beneficium obseruabis. Cui cōsimilem præstat B
vsu puluis, qui recipit spongiæ prius diligentissimè lotæ, & post vstionem si-
militer lotæ aqua plantaginis, aut ferrata, vel rosarum. 3. ij. rasuræ eboris, & cor-
nu cerui ana. 3. j. & f. rosarum rubearum, corticum citri puluerizati ana. 3. j. gali-
trici, cyperi, sacchari rosati in tabellas confecti. 3. ij. misce, & fiat puluis, qui &
biliofis fluxibus ex vsu quoq; erit.

*Melan-
cholia.*

Verum si melancholici succi aliquid redundare compereris (quod raro acci-
dere solet) præmissa purgatione, si affectio recens fuerit, medicamentis leuissi-
mis, ex ijs tñ, quæ melancholiam purgant, velut est confectio hamec sine scam-
moneo, & colocintide vtendum est. Infusum foliorum senæ, epithymi, & poli-
podij, aut serapium ex eisdem, & fumaria cum succo borraginis, & infuso rosa-
rum siccarū cōpositū, idē quoq; beneficiū præstare poterit: sicut aqua lactis, in
qua per noctem contabuerint senæ. 3. vj. Verum si affectio inueterata fuerit, pur-
gandum quoque est, eo tñ medicamento, quod modicū ingestum plurimū edu-
cat, qualis est confectio hamec, aut sunt pilulæ de lapide lazuli, aut serapiū nu-
per adductum, si ei addideris lapidis lazuli ligati momētū. Quod si malū his ce-
dere nequeat, non erit ab re. g. ij. stibij optimi pparati cum saccharo rosaceo p-
bere. His quidem factis, q̄ humoris peccantis naturam respiciunt, expendendū C
quoq; est, vt primam & secundam indicationē in curatione huius affectus pro-
positas absoluiamus, an corpori astringentia sint adhibenda, & quā rōne, cor-
pus ipsum deinceps roborare possimus. Quippe veretur tñ Gal. lib. de præsa-
gatione ad Posthumum, indebitum astringentium vsu, q̄ id solum exstimaue-
rit cām præstitisse tumori ventris, quem vxori Boeti accidisse eadē parte refert.
Quamobrem præmissis omnibus, quæ hucusq; retulimus, cōmodum fore exi-
stimat Gal. prædictis astringentibus vtī. Cuius snām confirmat quoq; Aetius.
lib. 4. Serm. 4. c. 66. loquens de rubris fluxibus astringendis, dicens. Mulieri ru-
bro fluxu vexatæ primum sanguinem euacuabimus per venæ sectionem: hæc
enim non solum materiam ad vterum confluentem diuertit, sed detentionem
etiam, ac constrictionem vitam efficit. Multa n. sequerentur incommoda, si san-
guinis, vel cuiusq; fluxus lauationem localibus auxilijs reprimeremus: nā aliqua
in hy-

A in hydropem, aliqua in neruorum affectiones, aut oris ventris, aut capitis vexationes collapsæ sunt. Quæ sententia profectò constat, quantum sit astringentium vsus formididus: ex quo infero minimè esse toti corpori adhibenda: nam cum pleraq; repellendi quoq; vires obtineant, intropellent ad canales, per quos effluere assuescunt excrementa. Quamobrem tantum ex vsu erunt vtero, & vicinis partibus adhibita.

Dictum etiam est à principio huius cap. necessum esse totum corpus roborare, neq; aut amplius eadè excrementa generet, aut per inconsuetos canales expurgat. Sunt autem auxilia, quæ id possunt ea, quæ præter id munus, partes quoq; firmare, ac densare humores queunt, tam per alimenta, quæ optimè sint substantia (verum non tenuioris, sed aut mediocris, aut crassioris) quàm per medicamenta, veluti est aqua ex chalybe sæpius extincto, aut frustis alabastris succèsis, & eodem modo extinctis, vel posca ex decocto polygoni, symphiti, plâtaginis, & hordei: vinum etiam nigrum, & austerum, vel potus, in quo dissoluantur trochisci ex lemnia, spodio, aut succino. Roborant quoq; partes miro modo leues & frequentes frictions, q; vegetiorem calorem ad eas renocent: dū primò lintheis mollibus, & molliter fiant, secundo verò asperis, & duriter: nam primis alimētum reuocatur ab internis partibus ad extimas, duris verò per cutim resoluitur, quod inutile est, donec natura desinat ad intimas partes pellere. Ex quo proculdubio partes roborari est necessum, nam euocato ad eas nativo calore, & propulso excremento rationi consonum est, firmiores fieri.

B Quod si membri alicuius vitio affectio suboriat, coniectandum quidè est, id fieri ex facta aliqua intemperie, quæ loco alimenti proprii, aut humorum (si eorum fuerit officina) excrementa, & vitiosos succos gignit, quos tanquā inuiles (fortasse vt minus noceant) expellit, ac in vterum transmittit. Cui affectioni cum aliquod membrum assuescit, diuturnus efficitur affectus: curandi tamē ratio habita illius membri maxima prouidentia, in eo consistit, quod excrementum illud deinceps generari interdicit, & genitum per distantes ab vtero partes euacuet. Sic ventriculo prouidendum est, dum prædicta imbecillitate laborat, præmissa leui purgatione, & ordinatissimo victus moderamine, per vomitus tertio quoq; die prouocatos, ac per eam purgationem, quæ per epicrasim fit, pilulis de mastiche, de rhabarbaro, & alijs, quæ ex mastiche, aloë, agarico, & rhabarbaro conficiuntur. Verum si vomitus profuerint, præsertim si leui irricamento fiant, innitendum est plurimum eisdem: nam excrementa euacuant, & ob id natura à consueto fluxu dissuescit. Quod si hæc non prodesse videatur, potui frequenter porriges decoctum radicis chinæ, vel ex eo serapium conficies, cui munus proculdubio incumbet exiccandi humiditates, si quæ sunt, & visceris roborandi. A quibus ventriculum iunges, vt reliquias cōteras, & eius substantiam robores: intus quidem per calidissimos aque potus, per vini etiam haustum cum modico aromatico rosaceo, vel diarrhodone, aut theriaca, vel cū modico rhabarbaro masticato, tertio quoq; die sumpto, vel serapio de mentha, de absinthio, de corticibus citri, & similibus. Exteriùs verò inunctionibus ex oleo absinthiæ, nardino, de mentha, de cinnamomo, de semine, aut radice, vel folijs angelicæ: aut appposito sacello ex galanga, corallo, garyophyllis, nardo, cinnamomo, rosis, absinthio, & mēta. Item affixo emplastro aliquo ex ijs, quæ pro

*Si vitio
alicuius
membri
fluxio
fiat.*

H uentri-

ventriculo passim solent parari, & nos quoque adducemus cap. de vitijs ventricu-
li ex vtero: aut inuncto etiā ventriculo ex balsamo nuper ex india ad nos aspor-
rato, aut oleo de abiete, vel napha. Item facto ex eisdem emplastro, additis carā-
na vel techamacha, gummi alioqñ ex Indi a quoque adducto, & vtilitatis non
contemnendae. Sed animaduertisse in his omnibus auxilijs oportet, vnūquod-
que esse adhibendum iuxta ideam humoris peccantis, aut naturam intemperā-
menti, cuius occasione ventriculus imbecillitate laborat.

Iecoris quoque vitio vterus affici solet transmissis ad eum alienis humori-
bus, quorum prouidentiam abunde monstrauimus hoc eodem cap. docentes
humores à natura alienos vel minuire, vel alio transferre. Cui sanæ curationi
addere tantum expedit ea, quæ huic visceri robur præstare nata sint, tantū intus
sumpta, quam exterius adhibita: quorum subinde maximam copiam reperies
lib. nostro secundo de auxiliiorum indicatione cap. de prædijs roborantibus.

Solet non raro fluxione à capite concitata vterus fluere: cui sanè obstitēs adhi-
bita capiti eadem diligentia. Nam instituta optima vitendi ratione ex victu ac
potu moderatis, caput primo purgare oportet iuxta naturam humoris ex eius
intemperamento geniti: sic pilulis cochijs, aggregatiuis, arabicis de agarico, fœ-
tidis, aut eis, & si ne quibus: prout magis visum fuerit, in parua tamen quantita-
te (ne inopinato fiat vi medicamenti maior ad vterum fluxio) necessum est vti.
Postmodum capiti appones, quæ reducendi ipsum ad antiquum temperamen-
tum vires habeant, & aliā etiam, quæ si quid intus manet, quod postea lesurum
sit, digerant, & consumant. Cuius census sunt pulueres, & facelli confecti ex
chamaemalo, coriandro preparato, stœchade, maiorana, rosis, thure, & alijs hu-
ius conditionis, si frigidam distemperiem causam huic malo præstare comper-
tum sit. Cui etiam vsui commodissimum est per epticalim caput purgare ali-
qua ex prædictis pilulis in parua quantitate, vel alijs ex agarico, aloë, & rha-
barbaro cum modico turpeto confectis. Prodest eodem modo puluis sparte pa-
rellæ noctu pondere 3. j. sumptus cum aqua maiorana, aut in ouo sorbili. Vel
rurū si calidum steterit cerebri intemperamentum, ratiū purgationibus vte-
ris, frequentiusque ipsum attemperare studebis balneis aquæ dulcis, lactis, de-
coctionis ordeï, rosarum, & papaueris, vel extremitatum animalium, cui po-
stea insperges pulueres rosarum, myrtillorum, coriandri preparati, & coralli,
aut cucufam ex eis parabis addito bolo armeno. Vsui tamen proficius est pul-
uis cornu cerui, rosarum, & myrtillorum cum ouo sorbili sumptus, dum femi-
na dormitura est. Prodest etiam, & multis probatissimum præsidium repertum
est, quod constat cremore seminis lactuce prius macerato in aqua extinctionis
chalybis, addito puluere eboris in tenuissimum pollinem redacto: quod femi-
na summo manē tertio quoque die ingerat. Nec displicet in hac causa aliqua
ex prædictis sudationibus vti. Quod si ne hæc quidem sufficere videantur, ad
aliud auxilium longe vtilius, & tutius confugiendum est: cuius naturæ fonta-
nella altero brachiorum aperta esse creditur. In qua sanè sitam esse maiorem
huius curationis partem experimento fidissimo compertum mihi habeo: nam
hæc à capite, quod redundat, expurgat, & vterum ab antiqua, & miserrima illa
fluxione vindicat.

Supereit his oībus adhuc consideratis, animo euolendum quantū negotium
faceffat

A faceſſat in hac affectione vteri ipſius prouidentia. Quam proculdubio eſſe dupli-
cem ceſemus: alteram, quæ vtero primario offecto debetur: reliquam verò, quæ
ipſi per conſenſum à nuper dictis partibus laſo proficua exiſtit. Primam quidẽ
diuides in tot partes, quot ſunt cauſæ, quæ vterum excitare ad expulſionem na-
te ſunt: quippe vel diſtemperies eſt, vel vitium in figura ex laborioſo partu, ictu
aut percuffione contractum. Diſtemperiem quidem (quæ aut cõficere propriũ
alimentum nequit, aut complecti, continereq; non valet) corriges ijs, quæ om-
nino contraria ſunt intemperamento: quorum non leuem copiam reperies lib-
huius operis 2. c. de vteri diſtemperie. At complectendi, retinendiq; munus mō-
do ex diſtemperie, modo ex frigura vitio, vel per aſſuetudinem recipiendi ab
alijs partibus ſumpto conſenſu, aut vtrunq; fiat, aut difficulter perficies (pre-
miſſa vniuerſali prouidentia) per ea auxilia, quæ denſandi fluentia excrementa
comprimendi partes vtero vicinas, & corroboradi vterũ ipſum vires obtineāt,
Cui accedit ſecunda indicatio, quæ impedit quominus excrementa hæc in vte-
rum confluunt, aut ad ipſum tranſmittantur. Quæ quidem opera efficies per epō-
ta, aut per os ſumpta, per inſuſa in vterum, aut aluum, & per exterius adhibita.
B Sic alijs non proficientibus, inter plurima alia, quæ c. de menſũ fluore diximus,
portulacam commaducatam, & eius ſuccum potui datum prodeſſe plurimũ,
compertum eſt. Item decoctum, aut puluis balauſtij, fructus rubi: equiſetum et
cum aqua chalybeata, aut vino rubro ſumptum: hypociſtidis, aut lēuſci fructus
cum vino: ſammus alter, terra lemnia, coagulum leporis, hædi, aut capreoli: iſe-
vua immatura, ſicca, & in puluerem redacta, vino aut aqua chalybeata excepta,
aut picæ cortex & myrti, quæ idem beneficium præſtare fertur. Sic præonia gra-
na quindecim, vel coralli. 3. j. cum vino nigro, vel vinacea trita cum aqua capi-
tum roſarum, aut plantaginis. Nec minoris momenti eſſe creditur prædictum le-
poris coagulum (vt Gal. refert. 10. ſimpl. aceto exceptum. Quod ſi deſluxus cali-
dus fuerit, vteruſq; exulceratus ſteterit, lac aſinæ mire prodeſſe comperimus: ſi
cui ſuccus ſtercoris eiſdem aſinæ optimis herbis nutritæ: aut ſuccus alicæ, pti-
ſanæ, vel roſarum, quæ ſanè omnia prædicto lacte admixta, plurimũ iuuare
ſcimus. Item lac caprillum ignito chalybe, aut lapide vſtutum, deinde coctũ,
cum farina tritici, ordeï, fabarum, & orizæ ex vſu eſſe fertur. Preſtat quoq; lens
C excorticata cũ aceto bis cocta, mica panis poſca madefacta, panis hordaceus,
oriza cum poſca, pyra, cidonia, meſpila, ſorba, oxalis, & cyme rubi iure incoctæ,
valet quoq; hmōi vſum, & fluentis humoris denſationem, & partium, ad quas
& per quas fluxio fertur, corroboracionem præſtat: tandem fluxum compelcit
confectio, quæ recipit coriandrorum preparatorum, ſeminis acetofæ, ſeminis
plantaginis an. 3. ij. terræ ſigillatæ, boli armeni, an. 3. ſ. ſpecierum aromatici roſa-
ti, diatragacanthi. 3. j. ana & ſ. quibus ſubtiliter in puluerem redactis, & cũ ſac-
charo reſolutis, in aqua plantaginis quantum ſit ſatis fiat, conſectio, cuius 3. j. &
ſ. cum hauſto vini nigri diluũ, aut aquæ chalybeatæ manè laborans ſumat ven-
triculo ieiuo, & deſuper dormiat abſtineatq; a paſtu quatuor horarũ ſpatio.
Conſimile huic beneficium impartitur id medicamentum, quod recipit gum-
mi arabici, tragacanthi. 3. ij. maſtichis. 3. j. quibus conſimiliter puluerizatis, ac
commixtis ſaccharo diſſoluto in ſucco citoniorũ fiat conſectio in rotulis: cuius
ſemina quoq; ſumat. 3. ij. prædicta lege. Maioris adhuc efficaciz eſſe creditur

id, quod recipit ouorum recentium albumina numero duo, thuris masculi, bo
 li armeni, terræ sigillatæ, ana 3. s. quibus mixtis fiat admodum electarij. Ex vsu quo
 que est, & experimento comprobatur singulis diebus dragmam vnâ radicis phi
 lipendulæ virentis, cum vino nigro potandâ, vel in ouo sorbili deuorandâ. Sed
 longe vtilius fore arbitror, ex succo eiusdem radicis serapium conficere, eiusq;
 mane. 5. j. cum aqua ferrata porrigere. Benefacit quoq; aliud, quod recipit vini
 nigri chalybeati. 3. iij. gummi arabici, tragacanthi, boli armeni, coralli, rubei pul
 ueris myrthyllorû, & coriandri pparati, ana 3. j. quibus mixtis fiat admodum loch.
 Itē confert summô manē feminis hoc malo vexatis prebere. 3. s. huius pulueris,
 qui recipit lapidis hæmatitis torrefacti, cornucervi vsti, corallorû rubeorû, an.
 3. j. & siccantur oia aqua rosacea, aut chalybeata, & sole iterum siccantur. Cō
 similem huic vsui pstat puluis, qui recipit ossium dactylorum subtiliter pulue
 rizarum. 5. s. sanguinis draconis. 3. j. amyli. 3. ij. Parat et alter ex granis granato
 rum torrefactis pondere. 5. j. ex thure. 3. ij. cum modica miua citoniorum.
 In vterum et, si hæc non profuerint, infundes eorum, quæ c. de menstruo fluore
 diximus, aliquid quale est quod humores putredine, vel mixtabile acres, aut et
 frigiditate insigni vnitatē diuidentes, mulcent, tergat, & abluat: velut est lac qd
 uis, et amylo incrassatum, hydromeli, cremor alicæ, & orizæ, fenugraci succus:
 additis quoq; quæ parum astringunt, vt thure, manna thuris, aloë lota, vel absin
 thio pontico: ac in nimis pituitosa, myrrha, præsertim si pruritus affectioni ad
 iungatur. Quibus addere poteris ex ijs, quæ valentius astringunt, modicum, vt aca
 cia, hypocistis, galla, balauustum, & malicorium: vbi admodum diluta fuerint:
 quibus admisces oleum rosarum ænanthium, vel de mastiche. Cum hoc tamen
 raro his vti datur, nisi vtero immodica fluxione vexato, & ob id exulcerato ni
 mis: idq; cautiùs, ne menses quoq; sisti contingat: ob idq; longè à menstruatio
 nis tpe ea esse adhibenda censeo. Securius tñ extrinsecus oia pharmaca vtero ad
 hibebimus, qualia sunt enchathismata, suffumigia, & longè magis inunctiones.
 Sed primitus fertur apud viros nō contempnendæ autoritatis, oxalidè utero appo
 sita comodissime fluxum muliebrē sistere, & qd magis mirandū est, menses nō
 cōpescere. Parantur quidē enchathismata varia pro humoris fluentis varietate:
 vt abundè dictū est c. de mensum fluore. Verum ne aliquid eorum, quæ huic
 vsui idonea esse possunt, deesse videatur: nosse oportet valere plurimū in hac re
 decoctum consolidæ maioris, & in pituitoso fluxu lexibiu cum modico alumine,
 vel decoctū herbarū, florū radicū, & seminū exsiccantiū, vt lexibij parati ex ci
 neribus ilicis, quercus, ficus, aut cannarū, q̄tum sufficiat ad enchathismata con
 ficienda, sumas, in quo radicis bistortæ incoques, & lapati acuti, ana. lib. s. corti
 cis mali granati, gallarum. an. 3. iij. rosarum rubearū. p. ij. fiat decoctio: cui ad
 de aluminis 5. vj. & facito encathisma. Quod si sola aqua p̄dictis reb⁹ feruefacta
 sine cineribus, id efficere velis, securius facies. Aliud et parabis, qd recipit florū
 clematis. p. j. hedere. m. j. fabarum integrarū numero xx. ordeï leuiter torrefacti.
 p. j. rosarū rubearū. p. ij. fiat decoctio in aqua artemisiæ, vino rubro, & aqua plu
 uiali ad lib. ij. cuius fiat fons infessio, aut iniectio in vterū. Seruabis tñ modū ef
 ficiendi iuxta humoris peccantis conditionē, additis nimirū, q̄ aut attrēperent,
 aut calfaciant. Ex vsu quoq; sunt suffumigia: quorū primū recipit galliæ musca
 tæ, & aliptæ muscatæ, ana. 3. j. ladani, hypocistidos, ana 3. s. stiracis, belzoini, ligni
 aloes

A aloes, santholorum omniū, ana. ʒ. j. nucis muscatæ, macis, gariophyllorū an. ʒ. ʒ. mucaginis gummi quantum sit satis, vt formentur trochisci: quibus vtēdum est frigidiori, & tenui existente pituita, nā acrioribus purgamentis enchathismata, & suffumigia q̄ mitiora sint, adhibenda esse consulit rei rō. Vtero verò adhibenda sunt, quæ temperamentū, & robur præstent: primò compressionis gratia vt re emplastro, quod recipit radicū bistortæ, musci quercus ana. ʒ. iij. fiat emplastrum pro matrici: a quo ferunt tanquam secretum saluæ suffitu menses immoderate fluentes, & omne muliebre profluuiū sisti mirū in modum. Confert, & posca tepida admixta decocto poligoni, symphiti, plātaginis, & hordei cū oleo rosaceo, mellino, seu myrthino, paucō uino nigro admixto. Cataplasmata ēē ex ordeī farina, fabarū cum eadem posca, aut decocto ex radice symphiti, poligoni, plātaginis, aluine, palmulis, & balaustio. Fouere item partes oportet eodē decocto, addito uino nigro, aut oleo myrthino cum pulueribus santholorū, terræ lemnæ, trochiscorū de succino. Regionē quoq; vteri inunges vnguento, qđ recipit vini nigri stipitici li. ij. scorix ferri li. j. bulliāt simul vsq; ad cōsumptionē medietatis, & post colaturā, uino adde olei rosarū, myrtulorū, & mellini. an. ʒ. j. & ʒ. ʒ. pulueris balaustiorum, rosarum, & radice symphiti. an. ʒ. j. bulliant iterum ad consumptionem vini, & adde ladani depurati, & ceræ quantum sit satis, ut fiat unguentum: cui consimilē uisum p̄stabit emplastrum diaphanico appellatum. Sic calida existente cā prodest illud vnguentum, quod recipit succi solani, succi semperuixæ, & plātaginis. an. ʒ. j. pulueris coralli rubei, rosarū rubearum. an. ʒ. ʒ. boli armeni, terræ sigillatæ, pilorum leporis combustorum, an. ʒ. iij. ceræ quod sufficiat, ut fiat vnguentum, addito modico oleo rosaceo, & absinthij.

Atqui licet hæc dicta sint in vteri gratiā, dum sua sponte huic malo cām præstat: non ob id omnino contemnenda est totius corporis prouidentia, ne aut ali quid quoq; in uterum transmittat, uel ab eodem utero, si malè affectum sit, ui comprimentium recipiat. Quā in re eam prouidentiam, quam superius diximus obseruabis, cauens omnino ventriculi, aut alterius uisceris cruditatem.

Hæc sunt candidi lector, q̄ ex multis alijs, quæ, & legi, & probaui, seligere potui: quæ si non profuerint (crede mihi) nihil aliud magis prodesse poterit, q̄ aut sudare, aut balneis uti, aut fontanellam altero brachiorum, aut crurum aperire, iuxta fluxus principium, & originem. Quod proculdubio tutissimum, proficuum, & summopere necessarium esse experimento, & ratione didicimus.

De menstruum cum morbis implexu, & prouidentia. Cap. 16.



NIL profectò in fœminarū morbis peritos medicos deterre re magis, anxiosq; ac sollicitos reddere assolet, q̄ menstruorū, cum morbis implexus: rursus imperitos nil citius in præcipitium defert, ac laborantes fœminas ocyus perdit: quippe siue sangninem demas, siue non demas, expurgantivè pharmaco utaris, aut secus, uel quoduis aliud præsidium instituas, certū est (nisi menstruorū cōplicationi aliqd tribuas, aut illi ex toto prouideas) te potius læsurum, q̄ q̄ beneficium aliquod præstare possis. Nam id proculdubio est, quod peritos medicos remoratur, nimis confidentes turpiter decipit, argutos,

H 3 & di-

& diligētes deludit, pigros transacta occasione arguit. Deniq; cordatos oēs, diligētiore cautioresq; reddit. Quo quidē factū est, vt non pauca inter fēminas hac sola occasione potius perierint, q̄ ex vi, & efficacia morborū: quorum senitiā proculdubio (vel leuissimis auxilijs) fugerēt, nisi mēstrua purgatio morbis ipsis succresceret, q̄ vel proficua remoraretur auxilia, aut anteuerteteret, aut eorū naturā mutaret, vel quantitātē imminueret, ac deniq; formā & modū immutaret. Quamobrē hac in parte huic rei integrū caput dicare decreui, vt deinceps tyronibus constet, quid agendum sit, menstruis morbo alicui superuenientibus.

Constat igitur menstrua purgationem aliquid posse peculiarius, distinctiusq; in morborum curationibus indicare: quod profectō efficit vno ē tribus modis. Primō quidē, cum menstruis imminentibus, fluentibus, remoratis, suppressis, & ante tēpus debitum instillantibus affectio aliqua, quae curationē expostulet superueniat. Altero verō, quum morbo aliquo praexistente, menses, vel imminēt: vel quia menstruationis, & morbi tēpora cōplicantur, aut quum debitum tēpus remorantur, & fortassē ob id causam morbo praestāt, vel ipsum augent, aut aliquod graue symptoma ipsi accersunt, quo exacerbatur, excandescentq; magis: vltimō verō cum consuetum, & naturale menstruationis tempus anteuertit, & in aliquo ex praedictis temporibus inopinato irruit: atq; id quidē vel copiosē, vt morbo sufficere possit, vel diminutē ac parcē, vt ne sufficere quidem valeat, impedire tamen proficua auxilia semper studeat. Quibus exactē pensatis, qualis futura sit cuiusque prouidentia, iam audies.

Quod si mēstrum suppressio, vel remoratio (vtcunq; fiat) morbum praecedat, considerandū primō est, an remoretur natura menses nunc denud, vel suppressi diu sint: tum quidē vltimū sciscitandum est, an ex praedicta suppressione morbus, qui succrescit, suboriatur, necne. Quod si ita sit, proculdubio a sanguinis detractione ex talo curationē auspicari oportet: neq; ante purgandū, sudandū, aut vomendū est, quā sanguis mittatur, idq; ex talo, vt dictū est. Quo facto, si affectionē urgere comperiamus, sanguine iam misso ex talo pro menstruationis consueta copia, ad uenarum aliarū partium scissionem (si affectio detractionē sanguinis postulauerit) deueniendū esse consulit rei ratio, etiamsi menses alijs praesidijs adhuc exhibitis non profluxerint. Verū de alijs auxilijs administrandis sciendum est, si recētes fuerint suppressiones, & morbus non plurimū urserit, expectandā esse mēstruorum fluxionem antequam manus adhibeamus, ad ipsam prouocandam. Non etenim aequē tutum est mēstruo suppresso purgare, vomere, aut sudare, sicut sanguinem mittere: nam hoc in quouis affectu fieri licet, illa uerō opera nō, nisi in urgente, aut pmissa sanguinis detractione, praesertim ex talo. Caterū si suppressio fuerit diuturna, uel affectio grauis, cunctandū non est, quin mittendus sanguis protinus sit, si id affectio postulauerit: uerum si alia auxilia poposcerit, ea cōfestim adhibebis (leui facta mēstruorū prouidentia) pro morbi usu, & indigētia, citra ulteriores mēstruorū considerationē, quae praedicta auxilia remorari possit. At dū menses morā trahūt, & morbus succrescit ex alia cā a sanguine mēstruo diuersa: censeo quidē curationē auspicandā esse ab eo auxilio, quod causam, & morbum exposcere cōpertum sit, citra respectū ad uenas tali, licet utrumq; respicere satius, meo, & multorū iudicio, foret. Quia in re cōsiderandum est, an morbus sit ex ijs, qui plurimum urgent, uelut pleuritis,

Aritis, angina, uel id genus, quo tempore ab ipso solū (nisi ex mēsum suppressio ne morbus oriatur: nā tunc ex talo scissiones utilliores existunt) indicationē sumere ad auxiliorum adhibitionē oportet: vel an eorum sit, qui inducias præbēt expectandi; quod si ita accidat, non nihil menstruis tribuendum consulo, facta primitus ex talo sanguinis detractione, frictionibus, lauacris, ac surarum ligaturis, & cucurbitis: post verò morbo ipsi prouidendum est, ut usus postulauerit. Quod si mēsum profusio iam iam immineat, & eo tempore morbus suboriat, sicut de remorantibus diximus subaudiendum est, quatenus ad sanguinis detractionem attinet: quatenus verò ad purgationem, & alia artis præsidia, quæ alicuius momenti sunt, minimè. Quippe differre ea oportet, donec menses profuant, aut consuetum tempus menstruationis præterierit, & alijs præsidijs tentatum sit, eos mouere, aut minuere sanguine leuiter ex talo misso: q̄ si ad morbum auferendum non proffit, proderit tamen, ut purgare, sudare uel laborantes (quod morbus expostulat) tutius possis.

B Caterum si ex mensibus debitum tēpus anteuerterentibus morbus accidat, credendum quidem est ex cā, quæ materiā menstruorum ad citatiore excretionem irritauit, morbum quoq; ipsum principiū traxisse. In qua sanè re, siue plenitudo, siue cacochimia sit in morborum principijs, sanguis mittendus est ex talo: ac si multū urgere affectionē comperiamus, ex brachio, præsertim si totius corporis plenitudo malo, & mēsum principium præstiterit. Verum si in utero fuerit redundantia, innitendum magis est sanguinis missionibus ex talo, donec uteri plenitudinem depositam esse constet, nec verendum est, nimis urgente adhuc ardentissima febre, ex talo sanguinē mittere, licet affectione inter inguina, & alas existente ex brachio exposcere id videat. Nā sciso talo eodē malo paulò minus subuenimus, & præcauemus humorum ad caput ascensionem, quod frequentissime in his febribus accidere conspiciamus. At si cacochimia utriusq; uitium præstiterit, coniectandum est, an menstrua purgatio consuetam quantitatem adæquet, quo tpe sanguinis missione ulteriori opus nō est, sin aliter, sanguine ex talo misso defectum naturæ adimplebis. Quo facto, verendum non est, adhuc instillantibus (diminutè tamen) mensibus, ijs pharmacis uti ad purgationem, quæ humores naturam lacescentes ad citatam menstruationem, & morbo materiam præstantes auferant. Atque hæc de prima parte dixisse sit satis.

C At si tempore ad menstruam purgationem statuto menses fluxerint, & cū alī quo ex morbi temporibus coierint (qđ grauius, & difficilius est) considerandum primò, principiū ne sit, & qualis affectus natura, & conditio existat. In qua sanè re (dū usu venit) consuetū apud plerosq; medicos reperio, apparentibus mensibus (etiā si à principio morbi id accidat) mox à sanguinis detractione subsistere, quantumuis necessaria sit, & morbus urgentissimus: differentes quidē per duos, aut tres dies, ac existimantes hac existente, non esse opus alia vacatione, donec natura à mēstruis subsistat, vel parū antè. Quos mille modis deceptos fuisse, & morbos subinde immedicabiliter creuisse nō semel cōperimus. Ob id quidem urgente affectu, si non copiosè fluant, si euidenter non conferant, etiā si debito tēpore proueniant, mihi non est dubiū, quin expectato primo nature impetu, quē in vacationibus (adhuc præter naturā factis) expectare iubet Hipp. opus sit, trāfactis ad minus duodecim horis sanguinē ulterius mittere. Verum id quidem

H 4 dem

*fluat huius mēstruis
etiam in principio morbi
dō, mitte dū in
gru*

dem ex talo, tñ inquam, quantum sat sit ad complendam naturalem, & consue-
 ram illius scēminae menstrualē quantitātē. Quippe iā leuioribus affectionibus,
 & q̄ non plurimū urgent, menstruationi prouidendum est semp, sanguine nimi-
 rum misso ex ea uena, quā ipsum ab utero extra, & ad uterū euocet: alioqui pe-
 riculum est, ne menstruo non probē purgato, affectio, quā sua sponte leuis est,
 grauior subinde fiat. Ob id quidē ad uterum sanguinē in leuioribus affectibus
 euocabis lauacris, ligaturis, & frictionibus: nā satis est prādictis affectionibus, q̄
 sanguinis detractioni cessurā sunt, ipsum per commodam regionem utcunque
 educere potius; quā mēstruis (quā iā iam fluere cōperunt, quorum in utero nō
 leuis copia existit) ad superna euocatis, aut ob contrariam reuocationē, maio-
 ris vel alterius mali cām existere, sanguine ex brachio misso. Verum si purgatio
 nē leuis hāc affectio postulauerit, ipsam quidem remorari opus erit, ne motu
 illo ad contraria factō, aliunde ueturbatu, aut euocato uteri sanguine, quā dixi-
 mus mala, & longē grauiora succrescant. Quamobrem clysteribus, aut suppositi-
 torijs, quā partes utero uicinas irritent, rem oēm potius agere oportebit. Cate-
 rūm si affectio ex grandioribus fuerit, & ijs quā maximum, ac breue periculū
 minantur, mihi non est dubium, quin aliquando (uelut, in angina, phrenitidi-
 ne, pleuritide graui, & similibus) ex usu sit ocysimē ex brachio sanguinem mit-
 tere. Ego tamen securitatis gratia, in grauioribus affectionibus, primo ex talo sā-
 guinem mitterem, incipiente (ut dictum est) affectu, reuulsionis, & menstrua-
 tionis cām, mox tñ eadem die, praesertim si purgatio menstrua non creuerit, uel si di-
 minutē processerit, ex brachio citra cunctationem sanguinem demerem: quip-
 pe grauioris, & vrgentioris mali conditio dignitate, & occasione agendi supe-
 rat reliquam indicationem: modō ea lege, quam nuper adduximus, id opus fiat.
 Quā sanē curandi rōnem adseruare oportet in reliquis morbi temporib. qua-
 tenus ad sanguinis detractionem attinet; uerum in purgatione, vomitib. & sudo-
 re non ita: nā mēstrualis purgatio semper horū auxiliorum indicationes supe-
 rat. nisi ultra tempus statutum durauerint sanguinolenta quādā uteri purga-
 menta, q̄ non plenitudinē, neq; naturae actionē, sed uitium, & irritamentū facul-
 tatis attestantur. Quib. etenim sic existentib. ego non dabitarem vrgēte purgan-
 di occasione, pharmacum porrigere: quin potius arbitror, necessariū eo tpe ef-
 se, ad vindicandam naturam ab iniurijs humorum mordentium, & irritantium
 ipsam intra uenas, & uterum: cuius rei rōne credendum est purgamenta illa diu
 instillare. Cum hoc tamen si aliqua occasione intueri oportet diligenter men-
 strualem naturae motum, & abstinere ab omni medio opere, ea potissimum est,
 ubi menses in morbis stata periodo profluunt nisi (ut dictū est) iā iam desinenti-
 bus, aut instillantibus purgamentis illis, alioqui tutum nō est, imo periculo ple-
 num, & ab omni rōne absonum existit, naturam à consuetō, & utili fluxu debi-
 to tempore commoto, ullo uacuationis genere diuertere. Nam qui rōne quā iu-
 dicantur, & iudicata sunt Hipp. mouere, aut nouare medicamentis vel aliter irri-
 tando omnino interdicat, eadē profectō mēstruam purgationem tueri, innuare,
 aut finire oportet. Verū cū artis praecepta vrgēte necessitate enertere utile, & ne-
 cessarium saepe sit: ob id quidem, q̄ hucusque diximus, diligenti animo rimari
 oportet, & exequi, ubi tempus occasionem praestiterit, ne occasione oscitanter,
 aut negligenter praetermissa, in turpius erratū medicus, & laborantes decidant.

Quodd si

*fluctibus mē-
 stru in graui
 morbo quomodo
 do mittere
 sanguis.*

*Artis praecepta
 in vrgēte sunt
 inmutanda.*

A Quodd si menses incipiente morbo, procedenteve immineant, coniectadū co-
rpe est, an affectus, qui viget, ex ijs sit, qui ex vtero prodeunt: an ex alijs, qui vel
toti corpori cōmunes sunt, vel alicui ex prācipuis membris peculiāres existūt.
Nam si primum, mihi non est dubium, quū longe vtilius sit citra vllam moram,
ex talo sanguinem mittere, q̄ ex brachijs: quippe coniectabile est ex uteri pleni-
tudine, q̄ exitum iam iam minatur, morbum originem traxisse: ob idq; certum
erit tutiores, & vtiliores esse ex talo sanguinis detractiones, quā per cōmodio-
rem regionem euocent, & euacuent vteri redundantiam, & mali simul causam
elidant. Verūm si ex corpore vniuerso, vel ab aliquo ex prācipuis mēbris mor-
bus oriatur, properandū ocysimē est ad sanguinis detractionē ex brachijs, ea ni-
mirum vena scissa, quā toti corpori, vel mēbro primò affecto cōior existat. Stu-
dendum igitur est copiā demere ante quidem, q̄ menses profluāt, ne postea co-
gamur, necessariū auxiliū differre menstruis incipientibus, vel ex distantiori
parte, q̄ affectus postulet id efficere, minori laborantis cōmodo, ac fortasse mor-
bo facto grauiori. Verūm in alijs auxilijs, purgatione nimirū, vomitu, aut sudo-
re, non ita; quippe instante menstruo verēdū est aliquid horū tentare, ne vel di-
strahatur, vel ab antiquo, & necessarijssimo munere p̄pediatur natura: quo ni-
hil ipsi grauius esse solet. Nā sepe motus ille (vel motui paratus sanguis) p̄ter mo-
dū detentus, aut aliō euocatus in aliq̄ mēbrū princeps inopinatō irruit, vel ibi
dē detentus putrescit, & cām malo p̄existenti adauget, aut aliud grauius denud
progignit. Quamobrē differre oportet huiusmodi vacationes, donec mēstruatio p̄-
tereat, nisi in ijs feminis, quibus procrastinari frequēter mēses contingit: in qui-
bus vrgēte necessitate purgare salē oportet, (licet vomere p̄p vehemētiā motus
ad superiora, vel sudare, p̄sertim sudoribus arte ex citatis, eo tpe tutū nō sit) com-
pleto menstruationis tpe, quia id permittere v̄ consueta procrastinatio. Cucur-
bitis verō semper locus concedit, p̄sertim vniuersali vacatione p̄missa, ac à fe-
moribus, & suris facto operis principio. Verūm si debitū, & statutū menstrua-
tionis tps menses p̄tergrediantur, animo eo tpe expendendū est, an id, femina q̄
laborat, de more habeat, vel diu suppressos habuerit, & vltimō, an ex noua sup-
pressionē morbus principiū, aut incrementū, exacerbationēve nanciscatur. In
qua sanē repensandū quoq; est, menses (sicut reliquas vacationes) vna ex qua-
tuor causis, pluribus, aut simul oibus posse detineri, nimirū, ex materia, facul-
tate, instrumento, & cā sine qua non. Nunc verō sat est nosse, materiā posse esse
crassiorē, vel copiosiorē, vt id magis efficiat: facultatē deiectā: instrumentū im-
peditū, & vltimō sensum partūs iusto hebetiorē. Vtq; tñ proueniat, si sanguis
p̄p affectus indigentia mittendus est, & femina id procrastinationis vitiū de mo-
re haheat, cunctandū non est, sanguinē ex ea parte mittendū fore, cuius scissio-
nem ē directō affectioni, & affectae parti prodesse magis cōperiamus, nulla, vel
leni de mēstruo facta consideratione. Idem quoq; agendū arbitror, vbi diu fē-
mina menses suppressos habuerit: quippe eo tpe citius, & copiosius sanguinem
mittere oportebit ex p̄dictis venis citra vllū venarū tali respectū. Quod equidē
in alijs auxilijs, sudore nimirū, & purgatione ita exequendū fore nō cēseo: nam
prouocare prius menses oportebit, nisi morbus ex vrgētoribus fuerit, aut sup-
pressio diuturna. Verūm menstruis in morbo v̄turis, ceterū deficientibus, ita vt
coniectabile sit, ob defectū morbo cām, & fomentū p̄stari, nulli esse dubiū arbi-
tror,

*Instatibus me-
struis p̄stari
ad nō propin-
quandum.*

*Quatuor de
causis menses
detinentur.*

tror quin sanguis mittendus ex talo sit, donec vel ~~quod~~ menses prorumpant, vel A
 utri plenitudini satisfactum esse conijciamus: idq; non solum in sanguinis de-
 tractionibus, verum & in omnibus alijs auxilijs exequendis obseruandum et
 est. Primò nanq; in hac curatione hos menses prouocare, vel expectare, aut sup-
 plere sanguine misso, opus erit, postea, ad alia auxilia confugere: nisi vehemen-
 tissima, vrgentissimaq; fuerit expurgandi necessitas, qd facies sub cōditione, ni-
 mirum, cum mēsum remoratio malo cām non pstat, vel auget: q si aliqn neces-
 sitas vserit id quidē cautē, & prudenter facies, blandis tñ, & lenissimis medica-
 mentis, quæ naturæ imminentem motū non euertant, & vtilē affectui moliant
 vacationē. At si debitum tps menses anteuertant, qd plerunq; in morbis cōtin-
 gere scimus, considerandum primò est, quid boni vel mali ea res portendere
 possit: secundò, à quibus causis proficiscatur: tertio verò, & vltimo, quid agen-
 dum vel non agendum sit. Nihil profectò in curandis feminarum morbis, diffi-
 cilius, grauius, molestius, & periculosius reperies, q menses inopinatò morbis
 quibusq; succrescere: præsertim ipsis incipientibus, & anteq̃ medicus auxiliares B
 manus omnino præstiterit: nam reliquis temporibus, vbi agendum nihil est, le-
 ue quidem, & tolerabile existit damnum: huius profectò mali meminerat Hip.
 li. 2. pop. par. 3. tex. 5. dicens de his qui febricitant, & menstrua ipsis succrescūt.
 Quibus in febribus anxiosis horridis rubescunt facies, laboriosè degunt. Dolo-
 res oculorum capitis grauitates, paraplexie, & muliebria si apparuerint, maxi-
 mē aut quibus primum, sed virginibus, & mulieribus quibus ex multo tpe, sed
 & quibus, non quo consuetū est tpe, aut oportet apparent, deinde pallidæ fiunt
 qua snia visus est comprehendisse maiorem huius rei q ad mēstruorum imple-
 xum pertinet partem. Difficultatis quidē, & molestiæ cā multis proculdubio sit
 rōnibus: prima, q auxilia aliog̃ pficua, & necessaria mēses fluentes renuāt, vel
 remorentur saltem, aded vt morbus tm̃ crescat, q deinceps beneficium suscipe-
 re aliquod vtiliter non possit. Præterq̃ q cum mēstruorum anticipatio ex gene-
 re sit symptomatica vacationis, dubium non est, quin maximum arguat peri-
 culum, maius quidē in morborū principijs, q in quouis alio, ob adductas à me-
 rationes. Cui accedit vacationes nullas in principijs morborum viles vsquā
 natura mouere posse. Verum cum hoc contingit aliqn vtilem esse hmōi men-
 struorum anticipationem, nimirum, cum in morbi statu prorumpit copiosè, &
 cum tolerantia. Quod (licet tps anteuertat) iuuat peofectò magis commoditate
 tps morbi, & copia, q irritamento obfit: velut et de declinatione subaudiendū
 est: dummodò nō cohæreat cum alia naturæ vacatione. Quippe eo tpe grauius
 malum portendit: arguit. n. naturam maximè irritatam, & ob distractionē nul-
 lam vacationem perfecturam. Causas verò habet mēstruorum anticipatio, C
 iudicio nostro, numero quatuor: nimirum, materiam plus iusto copiosam, acré,
 mordacem, tenuiorem, aut oīno à natura alienā facultatem, expultricem quidē
 irritatā, aut retentricem nimis deiectam: instrumentum pter naturē modū laxū,
 apertum, aut disruptum: ac vltimò fit pp cām sine qua non, exquisionem vide-
 licet, & acutum sensum, qui à rebus et secundū naturā existentibus, exacerbat.
 Atq; hæc de causis dixisse sit satis, vt quisq; intelligat præfagij rōnem iuxta cāæ
 naturam, & curandi et methodum. Quippe aliqn opus est minuere, q abundāt,
 nonnunq̃ quæ virtutē exacerbant retūdere, aut sensum stupe facere, vel vijs, &
 meati-

Anticipatio me-
struorum in prin-
cipijs morborū
nō quā vtilis

Anticipatio me-
struorum in statu
morbi vtilis
si nō vīgatur
alteri euacuati-
oni.

Anticipatio mē-
struorum quatuor causis
in rebus quas
diuersa cura
tio.

A meatibus patulis, puidere. Verū menstrui (vtcumq; sit) debitū tēpus an reuertē-
tib. morbo incipiente, magnā fas est diligentia adhibere in sanguine pro rōne
morbi vltius mittendo: p̄sertim si anticipationē ex copia pficisci cōperiamus,
quo casu nullo interposito tpe, ex talo primo quantū sat sit ad impetum naturā
suuandū sanguinē mittemus, q; si necessitas vltius pergat, & vteri plenitu-
do deposita sit: audacter ex brachio, vel ea parte, q̄ affectus postulauerit, sangui-
nē mittere licebit. Si quidē symptomatice vacuationes id permittere vnr, quin-
imo exposcere sapissimē. Quapropter in anticipationē mensiū differre nō licet
vltiorē sanguinis detractionē, si affectionē postulare cōperiamus, sicut in a-
liis menstruorū cū morbo implexib. sed protinus ipsum mittere, si ex vteri ple-
nitudine prodeat, ex talo, nō semel, sed bis, & pluries: sin aliter, semel ex talo
quantū sat fuerit & affectus postulauerit, nimirū quod sufficiat cōsuete purga-
tionis quantitati rēdere, idq; maxime si affectio ex his sit, q̄ caput irruere solēt,
vt in ardentissimis febrib. conspicimus: deinceps verō ex brachio. Secus quidē
res se hēt in reliqs vacuationū generib. in quibus plus tēporis expectare oportet,
ac differre, donec natura, vel quieuerit, uel saltē remissius egerit. Quo tpe
apparentibus tantū stilla sanguis aut vteri sanguinolentis purgamentis, vrgē-
te affectu, pharmaco purgare tantū, ac saepe necessariū existit: p̄sertim si p̄cedēte
iā morbo, ac eunte ad iudicationē, anticipatio fiat. Quibus procul dubio tēpori-
bus cōiectandū erit vitiosos humores, acres, & mordaces id efficere: ob idq; p̄-
perandū est ad purgationē ne eorū vitū intus perperā cohibitū in grauius ma-
lū cōmigret. Verū si in morborū principiis ex humorū corruptela potius, q̄ co-
pia menstrui anteuertit statutū tēpus, magis ob id innitēdū est sanguinis de-
tractionib. q̄ purgationi, licet partius q̄ in primo casu, quod in statu, & declina-
tione fieri minimē licet, sed vberius purgandū, quia ea tēpora ex artis rōne pur-
gationi potius, q̄ sanguinis detractioni idonea sunt: nisi ēt eisdē tēporib. sangui-
nē abundare cognitū sit, quod vtile foret à principio affectus impedire: nā pe-
riculo plenū est sanguinē in statu, aut propē ipsum abundare. Quod si ob medi-
ci, aut laborantis negligentia factū nō sit, & menses ea causa in statu instillauer-
int, sanguis quidē eo tpe mittendus est, cautiū tñ q̄ in principio, sicut in prin-
cipio cautiū purgādū, q̄ in declinatione, idq; si necessitas vrgeat, mēlib. adhuc
ex toto nō finitis. Itaq; debitū tēpus menstrui anteuertentib. in morborū prin-
cipijs, mittendus sanguis ocysimē ex talo est: & si necessitas vrget, ex brachio ip-
sis nondū finitis: p̄sertim si ex totius plenitudine anticipatio fiat: sin aliter, id fie-
ri quoq; pōt, sed partius purgandū tñ si id plurimū affectionē exposcere cōspi-
ciamus, ipsis tñ iam iam desinentibus, idq; maxima cum affectus vrgentia, ac p̄-
nuntiato prius damno ab assumpto pharmaco, & maximo periculo ex dilatio-
ne. In aliis verō vacuationibus, vt superius dictum est, fieri pōt. At si in statu, aut
declinatione anticipatio accadat, & morbus praestiterit expectādi inducias, dif-
ferre purgationē tutius est: sin aliter, iam desinente menstruo, & nusquā aliter:
licet his tēporibus audaciū purgate liceat facta collationē ad principiū, vt nu-
per diximus: p̄sertim viciosis humoribus causam anticipationi praestantib. Hec
atq; optime lector animo frequenter enolues, vt ex mentis exercitatione, &
artis principijs peritiā assequaris, qua in rebus grauiorib. & difficillimis, qua-
les huiusmodi sunt, rectum ad agendū possis proferre iudiciū, ac decretum.

De

*Menstrui antici-
patione in p̄ci-
pio morbi q̄
agendū.*

*Statu et decli-
natione morborū
tū idonea pur-
gationi, nō in
sanguinis missione*

De duris, & de canerosis mammarum tumoribus.

Cap. 17.



De menstruum quoque purgationem, & ad eius proculdubio vitia pertinere existimamus eos tumores præter naturam, quod feminarum mammis adnascentes vulgari nomine, zaratanes, nuncupari conspiciamus, malum quidem maiori ex parte feminis familiare, graue, difficile, & maioris, ac periculosis prædium.

De cuius sanè natura, & essentia non satis conuenit inter autores: quamobrem hac in parte eius conditionem, & differentias explicabo docens causas, signa, & veram præcauendi, & curandi methodum, si prius docuero, quales in mammis experimento, & obseruatione comperiamus tumorum differentias prædicto tumori generi per similes adnasci.

Quia
mama
laxata
sint, plu-
res, &
grandes
uenas
haberi ob
laque re-
ceptioni
propri-
sima ex-
istunt.

Frequentissimè quidem in feminarum mammis (in ijs præsertim, quæ viro orbata sunt, aut parere ante debitum tempus deseruunt, vel steriles existunt: sicut in virginibus, quæ iam grandiores sunt & viro maturæ) duros conspiciamus succrescere tumores mille accidentibus præditos: quos quidem ob id rude vulgus existimat caneros esse, aut eosdem semper minari. Verum vt rem à primis principijs aggrediamur, expendat diligens lector experimento quotidiano esse confirmatum, sex tumorum durorum sortes cancrum simulates, aut minari tes, feminarum mammis succrescere posse: has quidem præter communes tumorum differentias. Prima porro ex crasso fit, & caliginoso flatu mammam vniuersam distendente ducenq; eam in turgorem. Altera dum mammarum glandulæ humore aliquo fluente, aut sensim, & paulatim ibidem concreto, & infarcto tument, dolent aut citra dolorem turgent. Alia verò dum ex pituita vel quouis alio crasso humore à capite fluente, vel aliunde in mammas transmissa, aliquid imbibitur citra collectionem in ipsis factam, cuius ratione dura apparent mammae, dolentes quidem, si bilis flauæ, vel adusti alicuius humoris aliquid accesserit, indolentes verò, si citra ipsos fluat. Quo proculdubio malo affecta mamma in maiorem molem augeatur citra tumorem aliquem parti alicui eius peculiarem. Quod ob id fieri scimus, quia humor imbibitus potius existit, quam alicubi collectus: res sanè ad tumorum præternaturam confectionem apprimè necessaria. Quarta quidem duritiei species fit, cum scrophula mammis adnascitur: quod frequentissimum est: vel glandula ipsa in scirrhum conuersa, duritiè in mammis repræsentat non leuem. Quinta sanè fit, dum ex causis huic rei proficuis scirrhusus tumor in mamma paulatim congeritur. Sexta porro, & vltima, cum scirrhusus tumor, vel quouis alius ex prædictis in cancrum migrare nititur, aut iam iam in eum mutatus existit; idque cum vlcere, aut citra ipsum. Verum vt quisque hæc omnia distinguere sciat, ac præcauere, & pro vsu, & indigentia curare discat: placuit hac in parte cuiusque seorsum meminisse, & signa, causas ac medendi rationem docere, nene nobis vsquam accidat, quod multis euenisse scimus, nimirum, ex negligentia propter mali ignorance, aut ex nimia diligentia propter rusticum futuri mali timorem, in grauiora pericula feminas deferre, curatione potius, quam sua sponte vi morbi excitata.

Fami-

A Feminis quidē ijs, quibus, & menses, & semen ex suppressione, aut impro-
 spera purgatione corrumpuntur, & in utero, & vicinis partibus existētes, ibiq;
 corrupti, & vtcunq; viciati, à se crassos halitus fundunt: succrescit faciliè ob sym-
 pathiam his partibus propriam, vt commoto ex aliqua euidēti vel abdita cau-
 sa flatu, illucq; delato, cor doliter, & mammae (sinistra praesertim) turgēant, ac in
 tumorem eleuentur dolore non leui, simul cum brachijs, & totius lateris consen-
 su, & cruciatibus. Quā sanē tumidam dolorosamq; mammaram affectionē mul-
 ti dolore, & tumore decepti indicant tumore esse cancerosum, vel cancerum mi-
 nantē. Verum si quis rē hanc diligentius pensiter, comperiet causas habere p̄di-
 ctam affectionem cognitu quidem faciles, praecautione verò difficillimas, & sua
 natura graues. Prima sanē omnium est obstructio, quā vel mensium purgatio-
 nem cohibet, minuit aut remoratur, vel vteri necessaria, ac vtilia purgamenta
 supprimit. Secunda quidem excretionis priuatio esse censetur, siue inconsumpta
 fuerit, siue consueta. Ex quibus iam tertia prodit, nimirum, excrementorum, aut
 humorum, quos nuper diximus, corruptio: ex quibus vel adaucta fuliginum
 copia, vel plus iusto cohibita aliquid ad reliquas corporis partes transmitti ne-
 cessum est: ad eas praesertim, quibus maiori consortio cohaeret, & gaudet vterus
 ipse. Quo fit, vt succrescat quarta, & vltima causa, ac immediatior, videlicet, ob
 flatum in mammis receptum tensio, quae tumoris naturam aemulatur. Verum
 quia huic parti propriē sunt partes quaedam, quae dolore possunt, & rursus hali-
 tus maiori ex parte vitiosus, corruptus, acris & mordax existit, fit subinde faci-
 le, vt dolorem haud mediocrem edant: quinimo doloribus cancerorum persi-
 milem, grauem quidem & acutum, ob halitus illuc ascendētis naturam, & cō-
 ditionem: extensum etiam, & pluribus partibus communem ob colligantiam
 & consortium mammaram cum brachijs, scapulis, costis, & his proximis parti-
 bus. Quibus sanē, & causas, et causarum differentiā haud difficulter distingues,
 vt huic malo prouidens praecauere faciliè possis, quominus ad maiora, & gra-
 uiora fiat comeatus: quippe non difficulter in affectione hac ascendente ali-
 quo ex residuis humoribus vel excrementis, schirrhosa, & postmodum cācro-
 sa efficitur durities, quod frequenter accidisse comperimus.

C Reperiet diligens medicus, si rem hanc attento animo considerauerit, affectū
 hunc mammaram flatuosum esse tumorem, quem (licet mammae cinitatem in-
 signem non habeat) in eisdem fieri facillimum est ob spongiam, raram, & laxā
 naturam, q̄ sortiuntur: quod fit vt non difficulter recipiant flatum, & aliquo ipis
 spatio pertinaciter continent. Quem sanē tumorem nosces, & ab alijs eiusdem
 partis tumoribus distingues, quia in eo, si quis mamam manibus comprimat,
 reperiet vniuersam esse in tumorem elatam, tensam, dolentem, & non vnicam
 eius partem, neq; quid peculiare in ipsa tumidum, aut dolens existens, sed rigi-
 da rota est. Grandulas ēē eius citra dolorem contingeret attrectabitq;: q̄ si qñ doli-
 tent, potius extensione, q̄ ex duritie fieri comperiet. Sed distingues eam affectio-
 nem à reliquis duris, quia in ea, vera durities nō reperitur, sed tensio, & turgor,
 res quidem longē diuersa à duritie. Praeterea id cognosces, q̄ in reliquis māmā-
 rum tumoribus semper aliquid durum remanet, dolorosum vel dolore carens,
 diuq; perseverans: at in turgētia seu inflatione p̄ interualla quod tensum est re-
 peries

De fla-
tuo
causa
mole.

causa.

Signa

peries, idque uel menstruationis tempore, uel per lunares circuitus, aut ex aliqua occasione, uel citra ipsam. Femina item mœsta est, aut animo deficit, uel uteri, aut hypocondiorum, ac cordis dolore premitur. Sed quod frequentius ipsis accidit, saltus quidem cordis est, & palpitatio: deniq; dum aliquid eorum, q in utero præter naturam retentam computrescit, mouetur, magis, ac magis prædicta affectio exacerbatur. Quibus sanè occasionib. cessantib. uel sponte, uel p̄sidio quouis mox subsideat mammae, & dolore leuantur, & accidentia omnia, quæ mammarum tumorem comitabantur, cessare uidentur. Habet etiam id peculiare hoc tumorum genus, ut difficilis sit iudicii, quod plerumque uel aliis tum moribus adiungatur, uel durante affectu mox alter succrescat.

Curandi
ratio.

Magni quidem est momenti in hoc malo prouidentia: quippe ipso prædito, aut extirpato, maiora proculdubio præcauemus: ob id qui uerâ desiderat nosse curandi rationem, legat c. de uidiuarum, & uirg. melancholia lib. 2. huius operis, ante quidem, quàm curatrices adhibeat manus. Interim tamen sciat primum curandi principium pendere ex ea uacuatione, quæ sanguinem in utero abundantem minuatur, scissa uena, quæ utero corresponsdeat, qualis est, quæ in malleolis reperitur, ea porro quantitate, quæ plenitudini, habitui, ac menstruorū priuationi æqualis existat. Quo sanè præsidio triplex præstamus beneficium: sanguinem nimirum, ne putrescat, uacuatione facta efficiamus: menses euocamus, & ultimo eorum ad minus defectum supplemus: præterea prouidemus, ne affectus ex flatuosum in scirrhosum, aut uerum cancerum commigret. Quam etiã sanguinis detractionem tutius, & commodius per interualla facies, saltē quarto quoq; mense, menstruationis tpe. Interim tñ aliis præsidii menses euocare opus erit, ijs quidem, quæ (ut dictum est proprio cap.) id efficere nata sint, uel exhibito chalybe præparato, crurum lauacris, in sessionibus in calida aqua, uel pedibus ibidem diu immorantibus, ligaueris, cucurbitulis, & modico exercitio. Verum quia uires non permittunt rem omnem sanguinis missionib. iusto frequentioribus fieri, & quia coniectabile est, corpus uniuersum, mesereon, uteri uenas, iecoris, aut splenis scatere crudis, melancholicisue, aut utcumq; aliter uitiatis excrementis, ex usu erit his medicamentis per uices, & interualla corpus purgare, quæ diximus cap. nuper citato. Huius sanè census sunt cōfectio hæc sine scāmoneo, & colocintide, agaricus, folia senæ infusa, decocta, uel pruna damascena, saccharo, & prædicta decoctione condita: ualet & syrupus ex prædictis foliis confectus cum passulis, & succo borraginis, addita pro libra decoctionis. 3. j. lapidis lazuli linteo molli ligata, & per diem integrum macerata, & expressa, cuius. 3. iij. porrigere poteris. Præterea, facta purgatione, cordi prouidendū est ijs, quæ flatū discutiant, qualia abundè reperies c. de cordis affect. Deinceps tñ mammas apponere oportet linteolū crūdum aqua uitæ sapius madefactum, & umbroso loco exiccatum, uel eidē saponis spuma imbutū, aut oleo liliorum, de sambuco, uel ex semine, aut radice angelicæ confecto. Præstat, & confectum ceratum ex eisdem cum modica cera, balsamo, uel oleo abietis, ac pulueribus plumbi usti, & non loti, anisi, aut seminis rutæ. Cui et usui non parum proderunt, pleraque ex ijs, quæ inferius hoc cap. sum dicturus, præferim ea, quæ discussoriam, & anodynam obtinuerint efficaciam, uelut est oleū de napha solum, uel cum modice cera, uel aliud ex nup dictis. In qua sanè curatione

eam

A eam victus rationem institues, quæ & parca sit, & optimi nutrimenti: cum potius parsimonia ne, vel crudum ex alimento quid supersit, & obstructionib. obfit, vel malum in aliud degeneret, nimirum, in ventris, aut vteri inflationem.

Solet non raro in feminis (quibus, aut menstrua deficiunt, aut impropere profluunt) caput fluxionibus doloribusq; grauissimis tentari: quibus sanè occasioneb. aliquid eius, quod influit in mamas, vel ex vtero illuc commigrat, ipsas in tumorem eleuat vniuersas cum dolore vel citra ipsum. Quæ porro affectio non leuibus, aut vtcumq; adhibitis præsidis subsidebit miscetque: quin potius minari grauius aliquod malum videtur, præsertim cum in ea affectione tota mamma intumescat, velut in præcedenti dictum est: ceterum dissident, q in illa flatuosa substantia, in hac verò humor magnitudinem, & turgētiam efficit. Quamobrem etiamsi causæ ratione differant, morbum tamen in magnitudine vtraque constituit.

*De mām-
mis du-
ris, et tur-
gentibus
humore.*

B Causas habet hæc tumorum species non contemnendas: vnam quidem menstruorū suppressionē, cuius ratione facto recursum ad mamas, easdē præ copia in tumorem eleuat, doloremq; subinde concitat, dum nimis tenduntur, aut dū id, quod influit, acrius, mordaciusq; extiterit. Quod etiam secundo contigisse cernimus cōfluente à capite tenui pituita flatibus admixta, præsertim si dolor simul accesserit. Ex quibus causis scimus feminas non raro graui dolore premi, idq; nō in māmīs solum, sed in humeris et brachijs, ac sub alis, ita vt plures existimarint, canceri esse principium: nec omnino sanè falluntur, præsertim si quis eā affectionem negligenter tractet: nam sepe eius, quod influit, aliquid in duriem ita grauem commigrat, vt difficile nō sit credere, in cancerum quoq; posse degenerare: & ob id curandum est eam affectionem rectè distinguere, præcauere, & curare, ne quid præter institutum nobis inopinatò accadat.

Causa.

C Cognosces aut hanc affectionem, distinguēsq; à cæteris sibi similibus, quod in hac tota mamma intumescat, doleatq; etiam æqualiter tota: item quod nulla sit in ea pars, quæ magis quā altera induruerit: licet cum morbus diu durat, id quoq; reperiat. Præterea id cognosces, q per intervalla ac certis quibusdam temporibus tumores doloresque exacerbari magis contingat: quod sanè ad psum fluxionum, vel prope tempus menstruationis euidentius fiet, ac subsidebit protinus, vel cessante fluxu, vel mensibus prætereuntibus, & eò quidem citius, quò magis sanguine menstruo purgata fuerit mulier, licet non nihil in māmīs semper dolorosum supersit, quod in inflatione non accidit, quia penitus, quod flatuosum est resoluatur.

Signa.

In hac quidē affectione ei causæ prouidebis primò, q cognoueris malo principium p̄stare. Sic etenim capite affecto, & instillante in mamas, primitus exiccatē victus modum institues ex passulis nimirum amygdalis tostis, amylo, melle rosaceo, ante oēm victum assumpto: in gestis postmodū auum assatis carnibus cum potu ex aqua anisi, vel radicis china, aut sparte parellæ. Quo quidem facto ad medicinalia te conferes præsidia purgato prius corpore: caput et pilulis parua & frequēti purgatione euacuabis. Quem sanè vsum præstant pilulæ sine quibus, aureæ, arabicæ, ex hiera, ex agarico, ex hiera & agarico simul: ac si ventrem affectioni consentire comperias, ex mastichinis quantum sat sit porriges, vel ex mecho acano, indica nimirū radice. Exhibebis quoq; noctu coriandrum præpa-

*Cura ad
ratio.*

præparatum uel anisum tostum, aut puluerem spartæ parellæ cum ouis sorbilibus, aut pilulas ex agarico, & spartæ parellæ decocto confectas. Verum si hæc (præsertim adhibitis crurum frictionibus, lauacris, & imperato modico exercitio) prodesse non videantur, confugiendum proculdubio est ad sudandi munera, quæ in hac affectione magni esse momenti creditur. Quod præsidium parabis decocto spartæ, aut radices chinæ, vel serapium ex prædictis conficies, quod sanè non minoris momenti esse scio. Cæterum si ne hæc quidem sufficere constet, fontanellam altero brachiorum aperire proficuum, & summopere necessarium existet. His quidem factis mammas ijs medicamentis tractabis, quæ resoluendi, & modicè laxandi vires habent, quale creditur esse vnguentum, ceratum vel cerotum ex oleo amygdalarum dulcium, de semine lini, liliorum, axungia gallinæ, & anseris cum modico diaquilone, loco cere: facto vnguento vel ceroto, put magis placuerit. Prodest, & emplastrum filij Zachariæ cum diaquilone, & pulueribus ireos. Itè si mamma nimio dolore, aut calore crucietur, ex usu est vnguentum rosaceum cum modico plumbi usti, & cera alba: aut idè vnguentum sepius in mortario plumbeo agitatum, uel oleum omphacinum cum pinguedine galinæ, & oleo amygdalarum dulcium, quæ etiam in eodem mortario sepius agitentur, & proderunt magis, si ex eisdem ceratum cum modico diaquilone, uel cera confeceris. Cui etiam affectioni consimilem curationè adhibebis, si ex supprellis, aut improspere fluentibus mensibus mammas indurari comperias: præterquam quod vniuersalis prouidentia, non quidem in purgatione, sed in mensium prouocatione & sanguinis missione ex talo præmittenda est: cui quidem curationi innittendum erit ante particularem auxiliorum administrationem.

*De du-
tis mam-
marum
glândulis
ac de ea-
rum scro-
phulis.*

Inter eas mammarum affectiones, quæ cancerum simulant, aut minantur, una profecto est glandularum, quæ in mammis secundum naturam existunt, durities, aut noua glandulosi tumoris generatio siue dolens, siue dolore carens existat. Solet quidem non raro (quemadmodum amygdalis, & columellæ in ore euenire conspiciamus) in mammis quoque fluxio eius conditionis delabi, quæ sola citra inflammationem, durum tumorem concitare nata est. Quæ sanè affectus, si dolorem sibi comitem habeat, non pauci inter medicos tumorem esse cancerum minantem iudicant: verum, ut mea mens est, longè ab eius natura dissidet. Quod equidem constabit, si quis consideret, hanc affectionem dupliciter posse mammis succrescere: vno quidem glandula ipsa glandulosa ac duriori facta: altero verò, dum in mamma glandulosus quidam tumor progignitur, qui ei generi tumorum incumbit, quod scrophulas obtinere scimus: quæ sanè multis rationibus scrophulam esse arbitramur: & ad scirrhosam naturam Gal. lib. de tumoribus præter naturam, & 13. metho. reduxit dicens. Scrophulas esse glandulas in schirrum conuersas. Quorum sanè tumorum vnumquemque; mammis euenire non raro conspiciamus: quippe aliquando glandulas indurari scimus: nonnunquam verò alias ipsis persimiles mammis præter naturam accrescere. Quamobrem considerandum est, glandulas duobus modis indurari, aut (ut rectius loquar) apparere induratas: vno quidem affluente humore pituitoso & fluxili, qui in eisdem glandulis turgorem creat sine dolore, vel fluxione admixto acri, & bilioso humore, quo cruciatus non leues in mammis, & vicinis partibus inferunt: altero etenim cum ipsa mamma, haud secus, ac in alijs eius naturæ partibus scrophula gignitur. Inquit. n. Celsus. lib. 5. cap. de strumis. Nascuntur maxime struma

A in aëne ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus, in māmīs quoq; feminatū se reperisse, chirurgus Mages autor est. Quam sanè huius viri opinio-
nē verissimā in plerisq; fœminis comperimus: in quarum māmīs strumofus tu-
mor succrescit ex cōcreto pure, vel sanguine formi glandulæ adipiscente: quā
ē sententiā Tagaultium tueri euidenter constat. Cuius proculdubio naturæ ar-
bitramur esse non paucos ex tumoribus, qui cū dolore fœminatū māmās extor-
quent, quos subinde medici existimant caneros esse, aut minari, cū meo, & mul-
torū experimento constet, nullam aliā acquirere (nec diuturno adhuc tēpore)
conditionē, sed eo statu pluribus annis persistere, nō sine magna quorundā ad-
miratione. Causas quidem habent hi glandulosi tumores longē diuersas, sicut
causa
aut & naturā diuersam sortiuntur (vt d. Atū est) per paulatinam congestionē al-
ter: alter verò per defluxū. Quippe glandulas fieri turgentes contingit, vel men-
struis deficientibus recurrentibusq; ad māmās, vel defluente tenui aliquo hu-
more pituitoso solo, vel seroso sibi admixto. Vt his fœminis accidere conspici-
mus, q̄ cantu, vel quouis alio superiorū partium exercitio nimis vtuntur, mēsi-
bus quidē fluentibus, aut imminētibus fluere. Ex quo iā constabit glandulosis
māmatarum partibus humore hunc susceptantibus dolorē, & magnitudinē accē-
dere, ita vt glādulas, quas antea percipere erat difficile, iā vel leuissimo tactu cō-
periamus duras, vel dolentes, aut vtroq; dāno affectas. Strumā verò ex purulen-
to, & sanguineo humore fieri refert Celsus, quam equidē causam fœminarum
mammās hoc malo perdere, maiori ex parte arbitror ob mensium defectum, &
putredinem: licet strumas plerunq; ex erasis, & viscidis humoribus notissimū
sit prodire, quod etiam in fœminarum mammis accidere nō raro comperimus.

Facile quidē noscimus hos tumores tactu, ceterum difficulter distinguimus
vñ ab altero: nā vterq; duritiē obtinet non leuē, dolent ambo, sed magis phy-
getlon, q̄ scrophula. Habet tñ hoc peculiare excrefcens glandula, q̄ ad phygeelō
non sine ratione redaximus, q̄ non semper, sed affluētē humore, doloribus, &
cruciātibus exacerbetur, idq; iuxta fluentis humoris naturā, & conditionē: sub-
sident quidē, & sedantur dolores quoniam p̄sidio, aut sponte resolutio humore.
Præterea glandula facile hinc inde mouetur, scrophula verò immobilis sciri thī
instar existit sine dolore, & maiori duritiē p̄dita, ita vt non immeritō q̄s scirrhu
dixerit. Verū à scirrho peritus distinguet, quia indurata plerūq; dolet, scirrhus,
aut scrophula minimē, aut per q̄ raro. Itē glādula detumescit ocysimē quouis
p̄sidio adhibito, scrophula verò non, nisi diu p̄sidia adhibueris. Tandē licet glā-
dula indurata brachia quoq; & clauiculā plerunq; dolendo attingat, neq; ita
molestus dolor est, neq; persistans, vt reliquorū tumorū, qui cancrū minant, nisi
iā glādula in scirrhu cōmigret, qd potius ex incuria medicorū, q̄ ex affectionis
natura proficisci arbitror. Vltimō tñ scrophula vñ locū obsidet, vñāe duritiē
repræsentat: glādula plerunq; in paruulos secatur tumores, seu extuberantias
intra māmās diuagantes, quas vix vna ex parte comprehendere poteris, etiam
si bis, aut ter mammam attingas, sed semper nouū obsidere locum repræsentāt.

Huic affectioni curandi ratio existit duplex, altera quidē, quæ duritiē emol-
liat: altera verò, quæ & cancrū inhibeat, & si quid eius factum est, augmentum
præcaueat. Hæc aut vna est, & in glandulis induratis & in scrophulis: nā primò
expendisse necessum erit ante oē opus, traxerit, ne principū durities ex impro-
ba

Curandi
ratio.

ba viuēdi forte, an ex menstua purgatione perperā fluente. Quōd si primū, eā A
 viuendi legē institues, quæ ex toto sit præcedenti aduersa: verū cum plerūq;
 ex crassis, viscidis, ac pituitosis humoribus affectio originē sortiatur, victū por-
 riges extenuantē, siccum, & modicē calidum, fugereq; præcipies agrotantem à
 crassis, viscidis & coctū difficillimis alimentis, ac solū ipsi concedes arietū, vitu-
 lorum, auium montanarū ac domesticarū carnes cū passulis, & amygdalis to-
 stis, ficibus, & alijs, quæ prædictis similia existāt. Potus sit ex aqua cinnamomi,
 unisi, vel (quod magis probo) ex radice chinæ, vel spartæ parellæ decoctus. Ce-
 nā verò, q̄ tenuem imperabis ex ouis, aut pyris assis, vel fructu aliquo saccharo
 condito. Exercitiū sit moderato maius ante cibū, & summo mane factum. Verū
 in medicinalibus præceptis hoc primū dignum obseruatione existimo, nimirū,
 frequentiores debere esse purgationes, minutas tñ, & facta prius per extenuan-
 tia, & inscindentia pharmaca præparatione. Quod sanè probè facies syrupis de
 risantjs, de radicibus, hydromelite, rhodomele, & similibus. Post modū verò
 eā purgationē institues, qua crassos humores educas, vel ut est ea, quæ ex agari-
 co parat, turpeto, cartamo, folijs senæ, pilulis ex hiera, mastichinis, elephāginis, B
 & alijs, q̄ consimiles habeant vires. Quōd si hæc prodesse nō videantur, ad artifi-
 ciales sudationes veniendū esse consuli rei difficultas: quas sanè moliri oportet
 decocto radice china, aut spartæ parellæ: ac probarē maximē in hac re serapiū
 aliquo ex prædictis decoctis confectū, eo mō, quē docuimus. lib. i. de p̄sid. indica.
 His quidē factis, & ut par est, pro viribus egrotantis, & morbi indigētia repeti-
 tis, ad topica auxilia confugiendū est, qualia mox referam, si prius dixerō, quid
 agendū si menstuis deficiētibz, vel improbè fluentibus si eos huic malo p̄sta-
 re principiū constet. Quippe in hoc casu initiū curationis auspicandū arbitror
 à sanguinis detractione: si plenitudo adfuerit non leuis, ex brachiorū basilica,
 quindecim nimirū diebus, plus minusve paululū, ante menstuationis tēpus: si
 naliter, vel si iam mēses instauerint, vel nuper præterierint, diminutēq; proces-
 serint, ex talo. Quo facto pro plenitudinis copia ad mensū prouocationem pro-
 perandū est ijs, q̄ proprio ca. diximus. Interim tñ non est ab re bis terve in anno
 sanguinē ex brachio ē regione māmæ affectē minuere. Postmodū glandulis ex C
 acris, vel nimis tenui fluxione induratis inunctionē parabis ex oleo rosaceo, pin-
 guedine gallinæ, anatis, & butyro, ac modica cera alba. Itē ex vnguentō rosaceo,
 & cera, ex oleo rosaceo, ex oleo amygdalarū dulciū, sesamino, violarū, & axun-
 gia anatis sepius in plūbeo mortario agitatis: vel ex emplastro filij Zachariæ cū
 modico plūbi vsti sepius loti. Quibus, cessante iam fluxione, ac si resoluendi
 mens fuerit, dolore oīno remisso, addes olei chamæmeli, vel liliorū quantū sat
 sit, vt citra nouā attractionē, aut caloris concitationē resolvas, id qđ emollitum
 vi emollientiū pharmacorū iam steterit, diu etenim in his persistes, aut telā con-
 fices his vnguentis imbutam, quæ fixius mammis adhæreat, donec vel dolorē
 cessasse, vel duritiem mitiorem esse comperias: nouatis ad tempus his præsidijs.
 Verū si duritiem in scrophulā, aut scirrhi effigiē migrasse cōperias, p̄missā
 vniuersali prouidentia, q̄ diximus, expurgatione paulò efficacioribus facta ute-
 ris: velut fieri solet radice indica mechoacam appellata, & diaturbit à Rasio scri-
 pro lib. 9. ad Almanforē cap. de colica, & alijs id genus. Et rursus facta cōsidera-
 tione eorū excrementorum, q̄ ex malo viuendi genere prodeunt, necnon, & ex
 men-

A menstruis suppressis, aut improbe fluentibus, ea oīum habita prouidentia, quā superius diximus. Quo facto, ad topica peculiarius veniendū esse cōsultat rei natura, & cōditio, q̄ p̄dictis cedere nequit, nisi grauiora adhibeas. Quamobrē cōgnitis māmārū scrophulis, duplex erit curādī ratio (nā licet hoc tumorū genus in cancrū ob humoris sortē non ita facilē degeneret, sed diu in eadē sp̄e perstet, cū hoc tñ hand leuē pr̄requirit in artifice diligentia) vna quidem, q̄ sensim, & paulatim emollientibus, & discussorijs auxilijs paulo efficacioribus tumorem dissipet: altera verò, q̄ radicis manus opera tumore euellat. Primò hanc emolliōnē, & discussionē tentabis, donec ex toto durities euanescat: huius ministrii sunt emplastrū nigrum Gal. adscriptū li. 6. phar. ge. qđ recipit olei vete is. 5. iij. viridi aris. 3. iij. picis. 5. j. siladani. 3. vj. lythargirii. 5. iij. fiat emplastrū. Cui cōsimile efficies, si addideris diaquil. mī. puluerē radicis ireos, & his iunctis emplastrū confeceris. Valet & diaquilon Mesue. Sed pretiosius his oībus est oleū de bufone, aut vnguentum ex eodē oleo, pice, & plumbo vsto, vel lythargirio cōfectum: itē idem oleū cum diaqui. ad cerati formā redactū. Cōfert, & emplastrū melilotum cum modico ammoniaco, & oleo liliorum, ac puluere radicis ireos. Quod si ad maiore duritiē affectio pueniat, cōficies emplastrū ex radicib. altheę coctis, & extractis per setā cum modico oleo ex bufone, pinguedine gallinæ, & anseris, & puluere plumbi vsti, ac radicis ireos: qđ profectò magnæ esse frugis arbitror, p̄sertim si nigritiē durities contraxerit: sic & alia adhibebis, q̄ paulò inferius recēsebo in scirrhi curatione. Sed nō est minoris momēti apud chemicos medicos, id quod recipit nucum cupressi paria quinque, sicuū paria tria, radicis arundinis. 5. l. coquant in oximelite, post salis cōmunis, cineris spongię, chalcitis ana 5. iij. iuri expresso addantur, mixtaq; in vnguētū formā redigātur.

Verū si eō scrophulæ duritiē peruenisse videas, q̄ pr̄terquā, q̄ emolliōnē, aut suppuratiōnē non cōsequaris simul radices in venas, & arterias inferere videatur, aut (vt rectius loquar) ad maiore molē sese extendat, tunc sanē ad manus opera peruenire necellum erit: in scissa nimirum mamma, prius scrophula vtrinq; digitis cōpressa, quā tñ acu perforabis, & filo per foramen traiecto, manuq; sinistra cōprehensō, hinc inde leniter à māmārum carne scalpello separabis, ita ut simul totā scrophulā cum pellicula extrahas: cauēs ne pelliculæ quicquā intus super sit, qđ tēporis tractu regenerationi scrophularum principium pr̄stet. Qua facta curatione vlcus per vniōnē simplicē curabis, facta nimirum futura, q̄ discissas partes vniat: quē sanē curationis modum nō parum profuisse constat. Verū si intus quicquā ex pellicula, vel scrophula ipsa remanere comperiamus, ulcusve nimis dilaceratum esse, curare oportet ijs, q̄ ipsum digerant, ac superfluum exedant, velut est unguentum ægyptiacum cum puluerib. aluminis, & albumine oui superpositis, q̄ dolorem leniant. At dum varias inferere in māmā radices certum sit, aliter quidē ipsam scrophulam tractare oportebit, nimirum factis iuxta p̄dictis radices in circuitu scrophulæ paruis incisionibus scalpello, vel ignito ferramēto, ac immisse arsenico instar grani tritici minutissimi: hoc quidē in robustis fēminis, in alijs verò sat est Vigonis puluerē immittere, ac desuper vnguentum populeonis apponere, aut oxierati pannum: quod facies donec radices exesas esse comperias. Quo facto, secedet facilē struma, & vlcus (ut par est) suppurantibus donec ad abstergētia deueniendū sit, curabis. Po-

test et struma curari affixo in medio eius candenti ferro, vel facta cum scalpello scissura: in q̄ ex causticis medicamentis aliquid immittere par erit, donec tota e struma caro exeat. Causticū huic vsui parat ex fermenti partibus, & vna arseni ei: ex quib. facta massa in furnello desiccabis, cuius instar nuclei pini modicum immittes. Abscides et scrophulā si fili modicum sumptis, & in aquā arsenici ter quaterve immergas, donec vim caustici sumptis cōperias, quo sanē filo radicē scrophulæ ligabis, singulisq; diebus cōprimes, donec arefacta radice prætabitudine, & alimētū defectu scrophula exarescat, & procidat, aut facilius abscindi possit. Quo facto reliquā curationē, vt vlcus ex postulauerit, ministrabis, cauēs ne iterū malū reuertatur purgationibus, & victu moderato, & superposito aliquo ex ijs emplastris, q̄ māmam roborēt, & si qd adhuc superest, discutiāt.

*De mām-
marum
scirrho.*

Seſe iam offert illud māmārū vitium, quod cancro finitimum exiſtit, quimimo ipſius præludium eſſe plerunq; ſolet. Scirrhoſa quidem durities, non raro in ſceminarum māmīs, ita pertinacis naturæ, & malitiæ excreſcit, vt vel diſſiciliter emolliatur, vel facilē in cancerum migret. Quamobrem, & generationis modum, & naturam, & cauſas, ac ſigna ante curationem docere erit opus. B¹

Cauſa.

Generatur quippe in māmīs ſcirrhoſa durities vno è tribus modis, quantum ex varijs Gal. locis colligere potui. Primò quidem, ex atri humoris affluxu, id èt aſſerente eodem Gal. lib. de tumo. præ. na. per hæc verba. Quatuor. n. hi ſunt, qui frequenter ſiunt affectus propter influxū humorum, eriſypelas, & edema, inſtāmatiōq; & ſcirrhus. Quam equidē generationis rationem ijs ſeminis accidiſſe cōperimus, quibus obſtructo ſplene, nequeuntq; ſanguinē à melancholiæ ſpurcitia purgare, ipſa per vniuerſum corporis ambitū redundare cogit: in quarum māmās haud diſſiciliter illius humoris non parua portio inſiuit, quæ ſanē ſcirrhoſam duritiē tractu tēporis contrahens, hmōi affectum progignit. Proſiſciſitur ſecundò eadē affectio ex ybertate melancholici, & craſſi ſanguinis, mēſtruis non fluentibus, ſed paulatim illuc non ſubidò (vt in primo generationis mō dictum eſt) recurrentibus. Ex quo proculdubio in eiſdē venis, & carne condensato inæqualis in māmīs durities ſuccreſcit, prædicto humore ad māmās velut alimento eunte. Qua etenim ratione fit facilē, vt per diuerſas māmārū partes diuerſi tumores duritiē non leni polleant. Vltimò tamen ſcirrhoſa hæc affectio per paulatinam (vt Medici ferunt) congeſtionem plerunq; ſuccreſcit, humore nimirum melancholico in dies magis, ac magis congeſto, adhæreſcenteque, donec in immedicabilem duritiem, & magnitudinem ſuccreſcat: diſfert tamen hæc generationis ratio à ſecunda, quia in hac ſolū in māmārū carne concreſcit, & induratur humor, in illa verò in venis, & carne.

Verū quouis ex his tribus modis fiat, fieri èt tenetur vna è duabus cauſis, exiccatione videlicet in humore à calore facta, aut concretionem ex frigido ingruente. Quippe humores, quos ſemel in aliquo māmārū loco contineri cōtingit, calor ita, reſoluta tenui eorū parte, in craſſat induratq; , vt in ſcirrhoſam hæc duritiē migrare per quā facilē conſpicias. Quod proſectò, vel ex frigidityte propria, vel externa, aut defectu proprii caloris adeò denſari contingit, & coerceri, vt in grauiffimā, & immedicabilem denſitatē prōptè migrare cōſter: mō id ex prima generatione fiat: mō ex alio tumore perpetuā curato, à refrigerata nimirū inſto nimis inſtāmentatione, vel vehementer, aut ante tēpus reſolutione perpeſſa.

Est

A Est igitur scirrhosa durities tumor durus doloris expers quē (licet variā sortiatur generationis rōnē) duplicis tñ differentie, & nature existere scimus: quippe alter exquisitus est, dolore carens, alter verò non exquisitus, leuē doloris specie referens. Exquisitū eū censent autores q̄ ex melancholico sit sanguine, aut crassa pituita nimirū; condensata. Eū verò, qui sensu leui gaudet, ex alterius humoris miscella fieri constat, aut ex assato sanguine, humoreq; atro, quē bilē atrā appellant. Ex quib. cōstare arbitror causam huic malo materiā pstantē, nullā aliā esse q̄ humorem melancholicū, sanguinēq; crassum, aut nimis crassam pituitā, ni affectio, vt dictū est, illegitima fuerit. Neq; obstat quominus hæc vera sint Gal. li. 5. simp. c. 9. scirrhū fieri ex bile atrā dixisse: nā eo loco, & sæpe alibi, arbitror, per verbum atrā bilē subintellexisse melancholiā, quemadmodū facile colliges ex eiusdem auctoris verbis, q̄ loquens de medicamentis huic affectioni p̄ficuis, illi necessaria esse emollientia auxilia p̄fitec, q̄ sanē morbis ex atra bile ortis cōuenire minimē possunt. Sed habet p̄ter has causas generales, oībusq; cōes femineū corpus vnā aliam peculiare, nimirum, mensū suppressionem, & improperam purgandi feculentum sanguinem rōnem. Quippe cum purgatio illa crasso, melancholicoq; sanguini expurgando idonea sit, si qñ supprimi, aut vitari contingat, vitiatos in corpore superesse humores nulli fore dubiū arbitror: quos sanē in graue aliquod malū prorumpere certum est, p̄sertim circa eā partem, cū qua maiorem habet vterus cōiōnem, & colligantiā: quō fit, vt feminarum mammae subinde facile in hæc vitia prolabant: præterq̄ quod receptioni excrementorū ob laxitatem māmariū, substantia prona sit. Huius affectionis signa haud facile inuenies, ac licet inuenias non ob id vterūq; cancerū minari peipies, aut se

Signa

B duritiem ex tumore sine dolore duro, ex inæquali corpulentia, ex colore fusco aut subnigro: sicut dum ex pituita p̄dit, ex subalbo colore; & corpulentia equa biliori, vt ex Gal. constare vī lib. de tumor. p̄ter naturā, c. 10. & 14. meth. c. 9. Nō exquisitum verò eo dignosces, q̄ dolorem ad tactū præ se ferat, aliq̄ minimū, aut per q̄ paruum: quā et rōne distinguetur ab imminente cancro, siquidem citra contractum dolet, & à quauis causa excandescit, exacerbaturq; magis, quod scirrho non exquisito cōuenire minimē pōt. Præterea generationē habet nō exquisitus ab exquisito diuersam: nā plerūq; per defluxum fieri constat, aut per intempestiuum discutientiā pharmacorum vsū, vel ex aliqua causa externa, q̄ dolorem in mammis excitauit, cuius occasione in eisdem aliquid indurnit, vel ex corporis vbertate ibidem confluxit: præterq̄ quod ex aliis tumorum præter naturam generibus proficisci solet, velut ex erysipelate, aut phlegmone.

C Cum duplicē hæc affectionis cōditio terminum sortiatur, resolutionē, nimirum, emolliuōne p̄missa, vel canceri principium, in q̄ duo scirrhosa durities migrare plerūq; solet. Ob id quidē in hac curatione (p̄sertim in māmīs, quæ ob p̄priā laxitatem plus recipiunt, & facilius indurant) grangi diligentia emolliuōni, & discussione innitendum est, ne ad cancerū cōmigret. Erit igit in indurata hac affectione curandi via duplex, altera, quæ mollitionem efficere studeat: altera verò, quæ extrahere doceat id, quod in mammis durum superfit, ineptū alioqui emolliuōni, aut resolutioni: nam suppurari hæc mala nunq̄ cōtingit, vt optimē Hip. docuisse constat li. 2. de mor. mu. per hæc verba. In mammis tubercula

Curanda ratio.

I 3 fiunt

fiunt dura partim maiora, partim minora, hac autē nō fiunt suppurata, sed semp
 duriora. Quinimo si quis suppurationē tentare audeat, dubiū nō est, affectionē
 citius in cancrū, aut exulcerationē degeneraturā. Antē tñ, q̄ ad emollitionē ve
 nias, curandum proculdubio est, corpus ab excrementis, & crassis humorib. im
 mune reddere, uel mensib. euocatis, si fortē defecerint, ablatis obstructionibus,
 corpore purgato, uel sanguine misso, aut ad inferas sedes euocato, iuxta corpo
 ris affectū indigentia q̄ppe nōnullis, p̄sunt euocata hemorrhoides, uel sanguis
 ab eis missus, aliis sectiones ex talo, uel ex sinistra saluatella. Sed qđ utilius esse
 arbitror, est ter, quaterve in anno corpus à melancholico succo purgare, qđ fa
 cies, his medicamentis, q̄ superius diximus melancholiā posse purgare, uelut est
 illud Matthioli, appellatū, elleboris mundi, uel aliud qđ hac lege cōficiet: exci
 pe ellebori nigri. ʒ. ij. rhabarbari. ʒ. iij. zingiberis, cinnamomi, gariophyllorum
 nucis muscatae, an. ʒ. smasticis croci, epithimi, an. ʒ. radiciis dulcis rase. ʒ. iij.
 macerent in musto, aut uino dulci ad cōsumptionē medietatis, & collaturā su
 me cū aqua lupulorū. ʒ. iij. Sed in uacuādo his humorib. q̄ & difficiles sunt, &
 rarō cōibus medicamentis cedunt, arbitror summopere esse proficiuū, p̄ internal
 la p̄bere stibij p̄paratū, modicū, nimirū. g. 4. aut ʒ. nā id censeo esse, qđ in his hu
 morib. cōsuluerat Hip. uidelicet ea medicamenta esse adhibenda, quorū partū
 ingestū plurimū educat, ac licet primo accessu ualidum, & formidandū uideat
 medicamentum, usus tñ, & prudentia faciliē mōstrabunt proficiuū fore. Verū
 si his uti formidaueris, aliud ex elleboro parare poteris, qđ utilissimū fore arbi
 tror, recipit qđ corticū mirōbalanorum oīum. ʒ. i. polipodii. ʒ. i. foliorū senae.
 ʒ. iij. agrimoniae, florū uiolarum, boraginis, & buglossae, an. p. ij. bulliant simul
 oīa in feri lactis, li. iij. ad cōsumptionē medietatis, & in fine adde epithymi. ʒ. i.
 ellebori nigri ʒ. j. misceant, & colet: ac fiat apozema, cuius ʒ. ij. aut iij. porrigere
 poteris. Quibus exhibitis aliqđ ex cordialib. pharmacis uesperē porrigere po
 teris quale est, electariū tria santhalorum de gēmis, cōfectio alchermes, & alia
 ejus naturae: q̄ si mitiorib. purgantib. uti uelis, ea reperies faciliē li. 2. c. de uir. &
 uid. melancholia. Huic ēt corpori eā uictus rōnem institues, q̄ crassis humorib.
 extenuandis, & conterendis idonea sit: sic & exercitium, & reliquum uitae stu
 dium pari pensu donec humores mitiores, & humectiores reddis. Postmodum
 uerō ad rectā emolliendi rōnem exequendā, considerabis, an tumor duritiē cō
 traxerit ex nimia humorum uiscidorum copia, qđ haud difficulter cognosces
 ex tactu: q̄ppe sic indurati tumores minus tactui resistunt, & quodāmodo cras
 sam duritiem prae se ferunt. In quo sanē affectu modicē calidis, sicciorib. inscin
 dentibusq; pharmacis p̄missis duritiem frenare opus est: huius naturae sunt, q̄
 ex aceto conficiuntur pharmaca, uelut oedematosis cōuenire dictum Gal. est, iux
 ta ipsius decretum li. 8. de comp. phar. lo. c. 8. inquit. n. Quae uerō ob frigidos, &
 uiscosos humores in solidis corpōribus imbutos indurantur, ex necessitate fri
 gidam habent affectionem, quare & calfacientibus simulq; tenuium partium
 pharmacis opus habent: hac. n. sufficientia sunt, & ad uiscositatem humorū in
 duratis partib. infartorum extergendam, & ad secundā crassitiem, & discutiē
 dos humores ita extenuatos. Cuius ēt fuit sententiae li. 2. ad Glau. & 14. metho.
 c. 5. Verum ex recta medendi ratione (ut nos lib. nostro, de indic. c. de emollien
 tibus docuimus) constat induratis mammis, nec liberaliter, nec protinus acetū
 esse

A esse porrigendū, nisi dum inueterata admodū est durities, idq; aliorum medica-
mentorū admixtione, ne vel māmā ocyllimē aceti viribus cōtabescant, vel scir-
rhosus tumor pressus indureseat. Quamobrē principium curationis auspiciati
oportet ab inunctionibus, q̄ cōficiuntur ex pinguedinibus, & oleo sabino, vel
oleo, in quo incoxeris radicē lilij, cucumeris amari, anethū, aut fenugræcū. Præ-
mittere et conuenit fomentū ex radicibus althææ, maluarū, & ex fenugræco, ad-
ditis. ʒ. ij. radicis cucumeris amari, ac folijs et maluarū, & branchæ vrsinæ cū se-
mine lini. Quibus per dies aliquot factis deueniendū est ad pharmaca, q̄ acetiū
recipiant, cū moderatione tñ, quale est, quod hac lege conficitur. Excipe acetiū
mulsi, in quo percoxeris hyslopum, thymū, pulegiū, anethū, radicē althææ, & fe-
nugræcū. ʒ. ij. pinguedinis anatis, anseris, & cerui, & ac olei rycini ana. ʒ. ij. bul-
liant sinu ad consumptionē aceti, & vtere, partē bis die inungendo. Quod si ef-
ficacius efficere velis, adde ammoniaci. ʒ. ij. vel diaquilōnis gūmati q̄tū sit satis,
ut fiat cerotū, si solidior forma magis placuerit. Præstat, & diaquilon maui, præ-
sertim si in eius confectiōe aceti modicū addideris, vel pinguedinis anatis, &
vituli momētum cū oleo rycino, aut de radicibus lilij. Idē quoq; beneficiū præ-
stat oxicrocū, sed longē præstantius arbitror vnguentū agrippa in cōmuni for-
ma adhibitū, vel ad solidiorē redactū, cui admisceas aliquod ex pharmacis, quæ
vel corporis tēperiem amulentur, vel tumoris peculiarē aliquā conditionē re-
spiciant: ego quidē cenfeo maioris adhuc momenti esse, si diu in mortario plū-
beo id agitaueris. Quibus cognitis, facile erit maiorē pharmacorum copiā iux-
ta vsus varietatem effingere. Verum si duritiem tumor contraxerit, factā per
intempestiuā resolutionē, siccitate in humoribus ibidē contentis inducta: cura-
tionē proculdubio aliter institues, præsertim cū constet prædicti duritiæ cau-
sam fuisse, aut Solē feruidū, vel validū exercitium, ardentissimā febrē, aut medi-
camentū nimis calidū importunē parti adhibitū. Quippe humor oīs eo ad ter-
ræ naturā propius accedit, quod magis aquosæ æreæq; substantiæ fuerit expers.
quib. facile priuatur vi calificantū, & exsiccantiū causarū. Qua quidē rōne
humida pharmaca his profutura esse mihi, & oīs. est cōpertum: primò, quia hu-
midū separat, id quod viscidū est à parte, cui adheret, & crassum mixtione atte-
nuat. Sic. n. corp⁹ vniuersū alimētis copiosioris, & humectioris substantiæ refice-
re humectareq; prius oportet, nullo exercitio, lōgiori somno, & oī animi tran-
quillitate imperatis. Deinceps tñ duritiē emolles pinguib. & ijs, q̄ humectiora
sunt: ob id linimētis maximē utendū est, eo p̄sertim, quod conficitur ex mucila-
ginib. extractis, oleo amygdalarū dulciū, aut decocto seminis maluarū, vel cre-
more seminis melonū, ac ultimò, decocto fenugræci, althææ, & similiū: ex quib.
addita pinguedine aliqua lento igne ad consumptionē decocti linimentū cōfi-
cies, quo vteris, si prius partē mucilaginis, & nuper dictis decoctis emolles-
cis. Confert et vnguentū ex radicib. althææ coctis, pistatis, & extractis, per setā
cū modico unguento rosaceo, vel resumpiūo confectum. Prodest & cerotū
refrigerans Galeni: oleo amygdalarum dulcium: item oleum de seminib. me-
lonis, & cucurbitæ cū pinguedine anatis, & modico unguento rosaceo facto lini-
mēto, vel ceratū cū modica cera alba. Eundē quoq; usum p̄stant mucaginēs psy-
lij, seminis citoniorū, & fenugræci cū oleo rosaceo, omphacino, si diu in morta-
rio plūbeo agitentur: aut ipsum rosaceū, & omphacini cū eadē plūbi mixtione.

adlag

1 4 Quod

Quod si per cōcretionem ex frigiditate partis, aut humoris, vel ex frigore cuius rei extrinsecus occurrantis, duritiem mammas contraxisse certum sit (ut plerunq; melancholicis, aut viscidis humoribus in eas partes fluentibus accrescentibusve contingere solet) longè aliter emolliitionē instituere oportebit. Primum quidem vinctum institues moderatissimum, mediumq; inter omnem excessum: vitā nec sedētariā, nec nimis laboriosā, ac pari omnino pensu in ceteris rebus. Sed in animi passionibus omni arte curandum est, tranquillitatē, aut hilaritatē adseruare. Ad medicinalia igitur deuenientes, innitendum est bis, terre in anno corpus vacuum immuneq; ab excrementis & crasso sanguine reddere: mitētes sanguinem ex sinistra basilica, aut siluatela eiusdem lateris, vel si mēstua probè non processerint, ex talo. Quo facto pro habitu, & viribus fœminæ, cōiectandum est, an hæmorrhoidum fluore fœmina perpeffa fuerit, vel ipsas dolētes, aut nimis tumidas habuerit, nunc verò suppressas habeat. Qua in re easdem iterum euocare necessum erit, vel hirudinibus affixis sanguinem ab eisde elicere. Sic etenim corporis cacochimiā per purgatiā pharmaca turpius, ac facilius detrahes bis terre (ut dictū est) in anno, corpore purgato cōfectione hæmec simplici, casia fistula, manna vel serapio ex infusionibus rosarū, aut violarū, vel prunis decocto senæ, & saccharo conditis, aut ipso senæ decocto cū saccharo, & passulis. Postea verò reliquias cōteres eisde decoctis, & prunis frequētius, & in minori dosi exhibitis, & tandē ijs, q̄ superius diximus humorē melancholicū purgare posse, maxime adhibitis g. 4. stibij præparati, qđ huic malo proficuum arbitror fore p̄sidiū. Verū circa partiēculariū auxiliōrū administrationē primò expendendū esse consulo ea, quæ congelatione induruerūt, vel ex propria humorū frigiditate cōcreuerūt, emolliitionē posse n̄ scisci ijs medicamētis, q̄ verè emollientia dicuntur, qualia esse dixit Gal. lib. 5. simpl. c. 6. calida, & sicce naturæ exstantia: inquit. n. eodē loco. Oris autē induratoriū affectio ex fluxione viscosa, & crassa paruis particulæ potius siue meatibus impacta, digesto verò p̄ haliū, qđ tenue est eius, ac subtile: ac deinde qđ reliquū est, refrigeratō, ac veluti congelatō, scirrhusa sequit̄ dispositio, ac proinde frigidū pathos aiunt. Porro qm̄ cū frigiditate humor redundat supfluous, idcirco et cōpositū esse eius medelā oportet: ob refrigerationē. s. ex calfacientia p̄scēte affectu, ob alienā verò humiditatē, q̄ mediocriter siccant. Hinc etenim evenit, q̄ q̄ congelata solvunt, non tū calida sint, sed et sicca. Quamobrem nō solū in māmārū affectionibus, verū & in multis alijs (ut latius lib. 2. de ind. diximus) mineralia pharmaca admiscere pinguis, & ijs, q̄ inter emollientia Gal. annumerat, proficuum esse semper duxi: ut calore, qđ cōcretū est, eliquaretur, & qđ calore liquatur, mineraliū siccitate ebiberetur consumereturq; Sic profectō plūbū ferofam materiā exulcerationē minātem, conterit, & exsiccet. Cuius et naturæ creditur esse bdellium, stirax, galbanum, ammoniacū, & medulla omnis. Sed prodest primò accessu parti adhibere linimentū, qđ conficit̄ ex emplastro filij zachariæ, & pulueribus marchasitarū vel plumbi vsti, sicut idē emplastrū diu in mortario plūbeo traiectū, p̄sertim si gummosum aliquid addideris: confert, & idē emplastrū ad solidiorē formā reductū cum eisde pulueribus, & modico diaquilonē. Erit et proficuum diaquilon maius cum plumbo vito, & marchasitis p̄paratis, ac pinguedine anatis. Itē ceroneum Nicolai vel diaquilon gummatū, aut illud, qđ conficiscitur ex bdellio, galba-

- A** galbano, styrace, ammoniaco, medulla ceruina, vituli, ac adipib. anseris, & anas cū modico oleo cōmuni. Conferūt in super reliqua oīa, q̄ glandulosi tumo-
ribus, & scrophulis prodesse superius diximus, & multa quidē alia, q̄ ipse effin-
gere poteris, si p̄ceptū Gal. 2. ad Glau. tenueris, quō loco scirrhosam duritiē cu-
rare docens, inquit. Nō igit̄ curādæ sunt partes indurātæ medicamento immodi-
ce siccatū, sed cū eo, qd̄ calorē habeat tepidū, humiditatē verō neq; multā, neq;
oīno minimā: qd̄. n. superflūū humorē habet, nihil oīno dissoluit, qd̄ verō mi-
nimū, plus q̄ oportet exsiccat. Verū si p̄dictis pharmacis duritiē emolliiri non
cōtingat, ante quidē, q̄ in cācrū degeneret, proficiū erit cōsiliū, chirurgica ope-
ratione scirrhosam duritiē radicatus amputare. Quinimo (vt verū fatear) nullā
aliā ex duris mammarū affectionibus audaciū licebit ferro extrahere, neq; tu-
tiū, q̄ scirrhosam, idq; non leuibus rōnibus. Prima quidē, q̄ nullū hēat more cā-
crorū sanguinē in venis prope duritiē cōgestū: cuius occasione nō raro (ē si exa-
ctē thuat carne scirrhosam duritiē iterū (& maligniorē qd̄) cōcrescere scimus.
Secūda, q̄a fluxū sanguinis plerūq; periclitari cōtingit laborātes cācrosis tumo-
ribus scissis, vt apertūlimis verbis ex Aetio cōstat ser. 4. c. 44. dicente. Cancros in
B pectore obortos oīno deploratos esse scito, quemadmodū, & eos, qui in capite,
collo, humeris, sub alis & inguinibus generāt: sunt. n. & hi incurabiles: nā p̄ter
q̄ p̄fectē tolli nō possunt, sanguinis eruptionis timor incūbit, vt ex ea ager
inter manus pereat: qd̄ equidē in scirrhī abscessione cōtinget inūq̄. Tertia sanē
rō est, quia cācrorū vlceras, ē si ante fiant, & probē curent, periclitant frequen-
ter ob vitū sanguinis vel canceri malignitatē, insanabilia fieri: & aliq̄ vniuersa
māma (adhuc cancro excepto) canerosa efficitur, & maligna ex ulceratione perit.
Quibus rōnibus ad stipulatur Aetij autoritas, qui ser. 4. c. 50. ex Leonidis decre-
to hæc refert verba. In alijs quidē corporis partibus prius ostendimus induratū
tumorē sine dolore esse, at in māmis nō ex affectionis natura, sed detractæ papil-
læ grauitate, dolore inducit. Si itaq; tota māma indurata fuerit, atq; ita scirrhī tu-
mor induratus thoraci annexus, vt citra periculū à sanis partibus amputari non
possit, chirurgiā nequaquā attentabimus: si verō summitas māmæ solum indurata
fuerit, aut vltra dimidiū affectio nō occupauerit, summitas amputanda est citra
inustionē: neq; n. in scirrhī tumore indurato, velut in cancro sanguinis eruptio
C nē vereri oportet. Qua snia euidenter cōstare arbitror, qd̄ sit grauius, & periculo-
sius cācrū ex māmis euellere, q̄ scirrhū, p̄sertim si in papillis nō sit, vt pauld
inferius docebo. Itaq; in scirrhōsa mammatum duritiē primd innitendū est, ip-
sam medicamentis emollientibus lenire. Quod si id nō profuerit, considerādū
tunc vltius est, an tota māma induruerit, vel scirrhosus tumor thoraci anne-
xus fuerit, ita vt sine periculo à sanis partibus separari nequeat: quo sanē tpe chi-
rurgiā tētare nefas esse arbitrat Aetius. Verū si summitas māmæ solū indurata
fuerit, securissima erit duri abscessio, securior quidē, q̄ ea, q̄ in cancro fit, ē si in
papilla steterit, vt c. 44. dixerat. Quippe subdit rōnē. c. 50. dicens. Si verō summi-
tas māmæ solū indurata fuerit, aut vltra dimidiū affectio nō occupauerit, sum-
mitas amputāda est citra inustionē, neq; n. in scirrhoso tumore indurato, velut
cancro, sanguinis eruptionē vereri oportet, neq; vbiq; vstionē cōsultat, sed ea le-
gē q̄ pauld inferius scribā. Ex quo dogmate duplex insurgit, post scirrhī abscef-
sionē, curādī ratio: vna porrō quam Aetius scribit eo loco dicens; Post amputa-
tionem

A cōprehendī, siquidē multis rōnib. aut dictum est, à uero cancro differre constat, Neq; rursus noīe scirrhi eos cōprehendere æquum est, cū scirrhosus tumor exquisitus oīno dolore careat, & q nō exquisitus est, leuē fortiat, idq; solum in ea parte, qua tumor uiget, qd ea lege p̄d. Etis tumorib. accidere nō apparet: si qdē acriorib. qnq; cruciatib. p̄ intervalla, & uicinius et partes affligit, quibus constat longē inter se differre. Erit igit, ne lōgius abeā, hāc tumorū species media qdā durities inter scirrhu, & cancrum, uel (ut rectius loquar) durities qdam (sive scirrhosa, sive alterius speciei, ex ijs quas diximus māmīs peculiariter posse accidere) q in cancrum migrare tētat. Itaq; cum durities aliqua cancri naturam iāā adipiscit, anteq̄ ex toto in ipsum cōmigrat, hāc qdē uerē nomen sortit̄ eorum tumorū, quos zaratanes appellamus, ita ut mediam cancrorum, & reliquorum, qui duri sunt, tumorū, naturā adipiscantur. Cuius doctrinæ gratia expendisse oportet cancrōs fieri vno ē duob. modis: quosdam. n. incipiendo ex atro adustoq; humore, ex quo proculdubio fieri oēs huius sortis tumores Gale. fatet. Quos equidē, quantumuis parui sint, scimus à principio dolorē, & nō leuia accidentia, ac pleraq; alia mala inferre quinimo aliqñ veneni instar, intolerabilia. Quosdam et constat fieri non incipiendo quidē, sed p̄ transmutationem ex scirrho, aut quauis alia duritie in cancrum, præsertim si p̄existens durities ex melancholia non naturali proficiat, vel aliquid humoris adusti accedat. De quorum sanē numero est scirrhosus cancrōsus nominatus, quē existimamus cōprehendī sub noīe, zarata: sicut re uera reliquos oēs, licet non sint de genere scirrhi, dum cancrum minantur, aut in ipsum cōmigrant, hoc noīe cōprehendere licet. Huius porro tumoris meminisse Auic. constat per hāc uerba. Et qnq; canceratur sephyros, & propinquitas sephyros ad cancrum, & elongatio ab eo est secundum multitudinem inflammationis, & paucitatē eius, & apparentiā pulsationis in eo, & occultationem eius. Eiusdem quoq; sn̄. r. Rasiū fuisse constat, nām inquit: Quotiescūq; cum apostemate schlyrotico inueniuntur accidētia apostematis calidi, sicut dolor, pulsatio, inflammatio, & oīa alia signa eis attinētia tunc illud apostema de genere cancrorum est. Pari quoq; lege Ioan. de Vigo, vir in re chirurgica maximī pretij, eadem uerba refert dicens. Reperitur sephyros non purum, & cancrōsum, cuius signa sunt dolor punitiuus, pulsatiuus, & inflammatiuus. Atq; licet ex his locis constet, hos viros de sola mutatione scirrhi in cancrum loqui, cum hoc tñ asserimus, tumores oēs duos, quibus in cancrum mutari contingit, tunc iure optimo noīe, zaratanes esse comprehendendos: ac tenemus quoq; differre à uero cancro, & scirrho, ac reliquis duris tumoribus. Horum equidem tumorū iuxta hanc, q̄ diximus, descriptionem Hipp. primū oīum meminisse constat lib. 2. de mor. mul. per hāc uerba. Et in mammis tubercula fiunt dura, partim maiora, partim minora, hāc autē nō fiunt suppurata, sed semper duriora, deinde ex ipsis nascuntur cancri occulti. Quum aut cancri futuri sunt, prius ora amarescunt, & si quis plura dederit, accipere senuunt, & compescenda faciunt. In qua sententia, si quis attentō animo mentem hoīs expēdat, reperiet proculdubio hos tumores, quos zaratanes appellamus, non fieri solū, ut multi autumant, ex scirro cancrum minante, sed plerūq; ex aliis duris mām. arum tuberculis proficiat, ut Hip. uerba mōstrare uidentur.

Habet hāc sciuissima affectus natura causas non paucas, quarum qdā occasionem

sione huic malo pstant, quædã materiã suppeditant, alia verò exulcerationem
 molunt. Cõstat igitur ex Hip. fortiori principium huius duritiẽ, plerunq; ex im-
 proba mensũ fluore, siue oĩno supprimatur, siue diminutẽ (dummodo quod
 tenue est, erumpat solũ manente inuis, obstructionis causã, crassiore sanguine)
 siue ordinatẽ profluat, qđ humorum cum sanguine mixtorũ hetero geneitatẽ
 cõmonstrat. Quibus et caulis accedit praua, & pauca mensũ purgatio, vt lib. de
 loc. aq. aer. Hip. refert, qđ sterilitatẽ infert, ac subinde plerunq; sterilitas huic ma-
 lo principium pstat: purgatur. n. in partu mulier, & in lactatione prauis, & melã-
 cholicis recrementis, qđ ob cõtinuã in pueris lactandis vacuationẽ, aut cõfertã,
 & copiosam in partu aggregari minimẽ possunt. Ob id virginib; viduis, aut nu-
 ptis, qđ vel non peperunt, vel parere immaturẽ deserunt, plerunq; hæc mãmã-
 rum vitia accidisse cõperimus. Huic et causarum generi reduci improba viuẽ-
 di rõ ex crasis, viscidis, aut quouis alio modo vitiatũ eduliis facta, vel nimis se-
 dẽtaria, aut curis, & vigiliis plurimum turbata, & plena. Quæ proculdubio oĩa
 vel crassos in corpore congerunt humores, vel probos plus iusto exsiccant, &
 in assatos, ac subinde crassos cõmutant. Præstat itẽ huic affectiõni materiã solũ
 ea melancholiæ species, quæ p adustionem fit. Verũm hac solã rõne à scirrhus, &
 cancro differre cognoscimus, sub hoc genere causã, qđ scirrhus, si exquisitus sit,
 nõ ab hac, sed à naturali, aut crasso alio humore profisciscit: cancer ab atra quidẽ
 bile. At is tumor hoc habet peculiare & propriũ, qđ principium suæ generatio-
 nis à crassis humorib; nasciscat, siue melancholici, siue pituitosi sint: postea tñ
 vel adusto illo, qui præexistebat humore, vel alio denuo in partem confluentẽ,
 qui adustus sit exulcerationem fortitur. Hanc eundem generationis viam, &
 materiã curaturus exactẽ expendat, alioqui profectò perdifficile erit, frugis
 aliquid huic malo præstare. Præsertim ni exactẽ expenderit imminentem exul-
 cerationem, quam paulò inferius nosse, monstrabo.

Signa.

Verũm noscendi hos tumores, ac distinguẽdi eos ab aliis eiusdẽ sortis rõ, &
 modus haud obscurẽ constabit, si quis quæ ex Hip. Auic. & Rasio attulimus di-
 ligenti aĩo expendat. Inquit. n. Hip. loco paulò ante citato de his tumorib; verba
 faciens. Cum autẽ cancri futuri sunt, prius ora amarescunt, & quidquid ederint
 oĩa amara esse vñr, & si quis plura dederit, cõpescenda faciunt, & accipere re-
 nuunt. Mente verò pcellunt, & oculi duri fiunt, & nõ acutẽ vident, & ex mãmĩs
 dolores ad iugulum transiliunt, & sub scapulas, & sius tenet, & mãmĩs graciles,
 & ipsæ p totum corpus attenuatæ sunt, & nares obstructæ sunt, & non leuãtur.
 Quibus proculdubio verbis, cõplexus est pleraq; ex signis, qđ frequenter in fœ-
 minis sic affectis conspiciamus. Quæ sanẽ magis elucescent, si in mediũ adduxe-
 ro, qđ Auic. profert verba, inquit. n. Et propinquitatẽ sephynos ad cancrum, & elõ-
 gatio ab eo est secundum multitudinem inflãmationis, & paucitatem eius, & ap-
 parentiã pulsationis in eo, & occultationem eius. Sed clarius id quoq; mõstrat
 Rasiũs dicens. Quotiescunq; cũ apostemate schlyrotico accidẽtia inueniuntur
 apostematũs calidi, sicut dolor, pulsatio, inflãmatio, & oĩa alia signa eis attinen-
 tia. Verũ pter hæc oĩa nosse et oportet, tumorem quẽmuis durũ eo tpe in cãcrũ
 migrare, cũ dolores acuti p interualla, vel minima occasione repetunt, qđ equidẽ
 ad brachia, humeros, & costas non rarò extenditur, præsertim si prædictæ par-
 tes moueantur. Quibus etiam accedit, si tumor in conspicuo sit, ipsius magni-
 tudo,

A tudo, q̄ cancro incipiente maior existit, color cinerinus, ac subobscurus, & tandem durities: venæ et ipsi in circuitu adnascuntur liuescentes & tumide, vari-
cū instar. Quæ omnia si ad extimam partem vergat tumor, facile percipies: finali-
ter, ea quærere frustra est, q̄ nimia carnis molles, & loco abdito delitescant, oc-
cultenturq̄, quo tpe ex dolore, & doloris modo, sat est exquirere. Quippe ex-
pectandum non est, oīa signa simul in quouis tumore reperiri posse: oīa. n. qui
perfectus iam est & consumatus habere tenetur: incipientibus verò sat est quæ-
dam adesse: ad ultioribus alia: & omnia deniq̄ in perfectis. Qui hos tumores cu-
raturus est, prædicta causarum genera tria diligenti animo expendere prius curet. Curatio
ratio.
Primum quidē omni arte studeat, eam in mensium purgatione moderationem
ponere, q̄ nec parca, neq̄ ita quouis alio vitio defecta sit, qd̄ in prædictū huius
mali apparatus degeneret nunq̄. Secundum talem victus conditionē eligat, q̄
omnino prædicto humori contraria existat: aut rursus, talē purgandi formā, ta-
lia et pharmaca, q̄ illum humore, & non alium, purgando eligat. Tertiū verò,
& vltimum omni diligentia caueat, quo min⁹ acre aliquid, ac mordax in cor-
pore subsit: ac si fuerit, quo minus in eam partē aliqua occasione confluat. Quo-
sanē facto, ad effectus curationem tutius deinceps venire cuius conceditur. Cu-
randum quidem primò est, menses suppressos vel diminutos euocare, aut quæ-
uis alia vteri purgamenta, si quæ fuere suppressa, ea sanē arte q̄ sæpius præcedē-
tibus c. docuimus: præsertim si obstructio aliqua insignis in viscere aliquo, aut
vtero ipsi præfuerit, eam deinoliri primis curabis, chalybe præparato exhibi-
to, vel quouis alio modo. At si id commodē fieri non detur, vel femina steri-
lis quoquo modo fuerit, fontanellam altero crurum adaperies, qua quod in
corpore crassum, defectu naturæ purgationis, superest, facile expurgari possit.
Deinceps tñ mediocris in omni q̄titate, & qualitas excessu victum imperabis,
qui potius ad humidiorē non nihil accedere tenetur, cauens omni studio exer-
citiū excessum, sed in eo, & cō reliquis moderationē imperans: p̄sertim abstinē-
tiam eorū alimentorum, q̄ crassos viscidos, vel nimis tenues, & acres humores
adaugere nata sint. Quos si in corpore red undare cōpereris (nō subita purgatio-
ne, q̄ nimīū humores exaurat) protinus p̄ epictasim purgabis ijs, q̄ superioribus
c. hos humores purgare posse diximus: velut est serum lactis cū rhabarbaro, cō-
fectio hamec siue scāmonico, & colocinti de, decoctū senz aqua lupulorū vel p̄-
dicto sero factū, aut prunæ damascenæ eodē decocto, & saccharo conditæ, vel
syrupus ex his cōfectus, addita in ligatura 3. j. lapidis luzuli præparati pro libra
ipsius syrupi, aut portiges g. iij. p̄parati stibij. Quibus frequenter vti poteris sal-
tem bis, aut semel in mense hiberno, ac p̄cauere vel mali augmentum, vel mali
gnam exulcerationem. Quod si à sanguinis missione curationem auspiciati velis
ex vsu facies, p̄fortim ex brachio nisi mensium gratia ex talo id efficere placue-
rit. Erigitur (ad tumoris curationē deueniendo) duplex medēdi via & rō: vna,
q̄ duritiē emollire doceat: altera verò, q̄ ipsam manu extrahere. Illa quidē, indi-
catione sumpta à materia, & cōditione huius tumoris, q̄ peculiarē sibi p̄cogni-
diligentiā, longē diuersā à tumorib. quorū subinde naturā sortit, scirrho nimi-
rū, cancro, tuberculo ve, aut quouis alio ex p̄dictis. Quippe scirrhosa substantia e-
mollitionē ex optat malacticis medicamētis factā: ac ceteri natura oīno hæc eadē
renuunt: quoniam exacerbari eisdē Gal. aperte docet. Sed medicamētis à principio

rcm

reages, lōgē diuersis ab ijs, q̄ in augmento p̄ficua esse docebo. Verū in genere **A**
oīa huic operi pharmaca mixta debēt esse naturē ex malacticis, & siccis, ac aliis
ēt, q̄ mōstrabo, cancris fore necessaria. Sic dū māmārum tumor citra manifestā
cām dolere incipit (habita prius corporis, p̄uidētia) rosaceo vtendum est, vel
omphacino oleo, aut rosaceo omphacino, quib. aliqui ex vsu erit, dum timoris
iāiā aliqd emicat, nonnihil succi plantaginīs, vel solatri addere. Qui ē succi, si
feruoris aliqd in tumore insit, in mortario plūbeo agitati plurimū p̄bant. Ean-
dē quoq; intētionē cōplet ceratū ex eisdē sic agitis, & oleo omphacino, ad suc-
corū cōsumptionē feruēfacto cū modica cera, & anatis pinguedine p̄stat & idē
beneficiū vnguentū ex tutia cōiter factū. Sed mirabili quadā efficacia creditur
pellere, & acré calorē cōpescere lamina plūbea crebris foraminib. excavata, q̄
Gal. 9. simp. summopere cōmendatā esse legimus. Refert idē autor ex Apol. li. j.
de cōpo. phar. lo. hisce tumorib. incredibili quadā cōmoditate p̄desse vnguentū
qd̄ recipiat olei rosacei omphacini. ʒ. viij. agitent in mortario plūbeo, & pistillo
plumbeo ad spissitudinē, & mutationē coloris, pulueris cerusæ, & lythargirii,
an. li. j. q̄bus in eodē mortario mixtis, vtilissimum fit linimētū. Verum dum miti **B**
gare dolorē tm̄ in aīo est, ex solo p̄dicto oleo cum pinguedine anatis, aut citra
ipsam, mirabile fit p̄sidiū. At si id quoq; opus efficere piacuerit, & cū hoc modi-
cū resoluerē, fomētis vti est opus ex decocto foliorū fragini cōfectis, quē ē vsū
ferunt p̄stare folia eadē aqua decocta, & pistata, ac sup̄ dolentē māmā calētia
imposita. Verum si dolor vltra p̄gat, p̄sentaneū fit remediū, hoc vti linimēto, qd̄
recipit olei rosacei. ʒ. iij. seminais papaueris albi. ʒ. j. opii. ʒ. j. gummi arabici ʒ. iij.
cera q̄tum sufficiet, vt fiat linimētum. Fiunt et vnguenta, aut linimēta nō parū
mōmēti ex mucilagīnib. seminis citoniorum, & psylli; extractis succo solani,
aut plātaginis cum cerusæ, & tutia, vel modico lythargirio, p̄sertim si in morta-
rio plūbeo diu agitaueris: sic & sola ipsa mucilago ibidē ad mutationē coloris
agitata, nō minoris est momenti. Caterum cum in animo est, exulcerationē im-
pedire eisdē prorsus remedijs vtemur, q̄ & mordacium, calidiorum, & acrium
succorū defluxū auertant, vel eorum acrimoniū retūdāt. At dum studemus, qd̄
in parte induratum est, emollire, & resoluerē, inter pleraq; alia, q̄ passim repe-
riunt, singularis efficacīa est hyssopum cerotum descriptione Filagrii, p̄sertim **C**
si diachilonis minoris momentū ei addideris: itē diachilon guminatum cū pin-
guedine anatis, & anseris. Eiusdē ē vtilitatis esse d̄r emplastrū filii Zachariæ cū
puluerib. plumbi vsti & loti, aut marchasitarum, vel lythargirii. Confert itē &
cerotum ex pinguedine anatis, & anseris cum puluerib. plumbi vsti, ac modica
cera. Præstat & aliud, qd̄ recipit olei rosarum, & chamemali, an. ʒ. j. pinguedinis
porcinæ. ʒ. f. pinguedinis gallinæ, anatis, & caponis, an. ʒ. ij. ceræ quantum sit sa-
tis, vt fiat spadrupum. Vsu ē probatum habeo aliud, qd̄ recipit olei rosati. ʒ. iij.
cerusæ. ʒ. f. plumbi vsti, tutiæ p̄paratæ, & lythargirii subtiliter in puluere reda-
cti, an. ʒ. j. sepi caprini, pinguedinis gallinæ, anatis, & caponis, an. ʒ. f. ceræ quan-
tum sit satis, vt fiat ad forma vnguenti albi. Observatione quoq; prodesse aliud
cōperimus, qd̄ recipit emplastri diachilonis Rasis. ʒ. j. pulueris marchasitarū p̄-
paratarū, & plumbi vsti, an. ʒ. j. malaxentur simul, & extendant sup̄ pannū seri-
cū. Aliud quoq; p̄batum reperio, qd̄ recipit olei amygdalarū dulciū. ʒ. j. f. pin-
guedinis gallinæ, & caponū, ana ʒ. ij. pinguedinis porci. ʒ. f. plumbi vsti. ʒ. iij.
ceræ

A cere q̄tū sit satis, vt fiat ad modum tele ceratæ. Quibus proculdubio, & alijs, que sumpta ab his indicatione facile effingere poteris, dolorē mitigabis, fluxum reprimēs, duritiem emolles, & tandem qd liquatum, emollitūq; fuerit, resoluēs, p̄ter q̄ omnia, oleum vel vnguentum ex bufone adhibere poteris, vel vt Fallopius aduertit oleū ēt ex viperis, quod ego in his q̄ dolore ex venenositatē mactet. & cruciantur, proficuum esse arbitror. Sicut in his q̄ dolore vexantur emplastrum ex vnguento tutiæ, & emplastro filij Zachariæ equis numeris confectū. Quod si & his omnibus affectum subsidere, & minui non comperias, coniectandum proculdubio est, ac verendum, ne in verum cancerum, aut malignam exulcerationem cōmigret: ob id quidē anteq̄ ad chirurgi manus deueniendum sit, iterum tentare oportet ipsam duritiē conterere ijs, q̄ id efficere nata sint. Sic dū ex humore crasso, & viscido prodit affectio, ferunt, succum nasturtij, cōriandri, & intibi cum aceto, & lentibus decorticatis, super positum parti affectæ plurimum prodesse: item gallitricum comestum: centum grana herba: tormentilla trita, & super imposita, vel agrimonia cum nuce vetusta, & rancida pistata. Confert, & ranarum pinguedo, q̄ maximi esse in hac re pretij multi, & non contemnendi auctores scribunt. Itē, & vnguentū ranarū, qd mirabilis esse efficacitē creditur, & hac lege conficitur. Excipe viginti ranas, quas extinctas, aut viuas butyro recentū, aut pinguedine anatis inuolues q̄tū sit satis, easq; sic in ollam vitream multis foraminibus in fundo excavatā proijcies, q̄ sanē in alterā capaciore immittes, & per partē eius supernā ignē, factō prius ex luto cooperimento appones, donec butyrū, & ranas satis superq; in mai⁹ vas eliquari cōperias. Postea verō separata pinguedine ranas cōbuti permittes, donec in puluerē cōmutari facile possint. Quo factō ex ranarū butyro solo vel cū cera, vel in mortario plūbeo agitato, linimentū mirabile parabis ac expuluerib. simul, & ex cācorū, & limaciarū pulueribus cū p̄dicta pinguedine vel alia ei simili, vnguentū nō minoris momēti cōficies. Vtū quoq; est emplastrū de carnibus ranarū, sed de limaciarū carnibus p̄cipuū esse arbitror, vt Gal. de fer. li. 1. 1. simp. aperte monstrat: cerū huic vsui p̄tiosius est p̄sidiū, qd ex limaciarū carnibus, & testis simul paratur: pdest, & p̄dicta caro cū lixiuio pistata, & parti durā affixa. Sed cū dolor nimis vrget, confert summopere fomentum, qd recipit succi plāragihis, lanceola, vermicularis, consoli dē maioris, & radicis ireos. ʒ. iij. ouorū albumina duo, olei rosarū, & aque rosate. an. ʒ. i. acetū albi. ʒ. i. calefiāt, & pannum ei dē imbutū parti appone. Sed reperiunt instillationes duæ, quas huic vsui maximē esse p̄ficuas arbitror: prima quidē recipit terebinthinæ, p. ij. masticis, sarcocollæ. an. ʒ. j. & siliq; aloes, ireos, carpopalsami. an. ʒ. iij. incidat lignum aloes in frustra minuta, & ireo radix, & carpopalsamum terant: deinde in mortario plumbeo, & plūbeo pistillo vehementer ducant, postmodum in alembico igni lento apponant, donec subliment, ac si alēbicum fuerit plumbeum, proderit magis, tandē q̄ instillauerit, in plūbeo vase resōde: cuius deinde excipe partes duas, & parti vni optimi balsami admisce, ac addito oleo de vitellis ouorū, partē iunge. Præterea secundā instillationē efficere poteris, si p̄dictis rebus addideris ranarū, & limaciarum catnes, & tria gallinarum oua cum testis cōquassata, q̄ oīa instillari permittes q̄tum sit satis: p̄stat emplastrū ex ciccribus coctis aqua pluuiali, & cinere. Verū si ne hæc quidē prodesse videant, sed eō durities perueniat, q̄ im-

medica-

medicabilis existat: tunc quidem coniectandum est, an scissionē admittat. Quip
 pe Aetius Ser. 4. c. 44. eos cūcros scissioni esse idoneos arbitratur, qui in summi-
 tate mammarū consistunt: nā reliquos, qui aut mediā mammam occupant, vel
 prope costas degunt, chirurgi manibus non licet euelleret: inquit. n. Cācros in
 pectore obortos omnino deploratos esse scito, quemadmodū & eos, qui in ca-
 pite, collo, humeris, sub alis & inguinibus generantur, sunt. n. & ij incurabiles.
 Nam prāter id qđ perfectē tolli nō possunt, sanguinis eruptionis timor existit,
 ne ex ea eger inter manus percat: eos verō, qui papillā summitatē occupant, af-
 fectā partis amputatione faciliē curabis. Itaq; constat eos tumores scalpello esse
 solum extrahendos, huius viri decreto, qui in partis affectā summitate, & exte-
 ma regione consistunt, vel eos qui adeo induruerunt, vt extractioni solum ce-
 dant: vel eos qui iā principium exulcerationis contraxerunt: hi. n. nulla alia via
 tutius q̄ scalpello curantur, licet costis adhāreant. Nā quō diutius ibidē immo-
 rantur, eo citius fēminā perdunt. Exulcerari. n. vno ē duobus modis hos tumo-
 res posse, arbitramur, & experimento cōperimus: altero extrinsecus accedenti-
 bus tenuibus, acribus, ac serosis humiditatib⁹: altero verō cū itra tumores alios
 & in medio ipsorū cōgerit ixorofum saniosum vepus, aut ixor vel aquositas qđ
 dā acris, erodens, cerulea, viridis, fusca ut qđ exulcerationis futurae sunt pludiū,
 vt monstrat dolorum immanitas, aliquñ pulsus citra venarū externarū turgētā.
 In extractione verō summopere curandum est eos radicitus euellere, quippe si
 ex toto non abscideris, nil aliud facies qđ ex non vlcerato cancro, vlceratum effi-
 cere. Qua profectō rōne consulit Rasi⁹. 13. cōti. liberalius vlceratos cācros ma-
 nibus, & chirurgia euellere, dum radicitus id efficere studeamus: finaliter, ten-
 tādum id minime est, & minus adhuc in nō vlceratis, ne vlceratos facias. Quā-
 obrē cautē id opus tentare oportet paruo nimirū existente cancro, & cōspicuo
 & corpore ēt vinctu, & medicamentis satis munito. p̄munito. Constat tñ ex Gal.
 quatenus ad operationis modū attinet li. 14. meth. duritiē manibus esse cō-
 prehendum, per partē eius pōsticā, vt extra ad papillā promineat: tunc māmā
 scalpello scindere longitudinaliter oportet, & vtraq; parte carnē à duritiē sepa-
 rare. Quo facto vel instrumento aliquo vel filo acu per duritiē traiccto, ipsam
 cōprehendes, vt faciliē à partibus māmā scalpello duritiē separare possis. Ac ne
 interim dū id opus fit, sanguinis fluxus infestet, nō erit ab re māmā ligatūra pro-
 pe radicē eius cōprimere: duritiē verō extracta exprimendā parum partes sunt
 sanguisq; crassus extrahendus, ne iterū fōmētū nouo affectui p̄stet ibidē manēs.
 Postea velut vlcus simplex scissionē curabis, vt ipsū permittere visum fuerit: sed
 arbitror per simplicē vnionē curari rarō posse. Prāterea, has partes vrere, licet
 aliquibus vtile, & necessārio visum fuerit, mihi tñ arrisit nūq̄, nisi sanguinis
 fluxione nimis vrgente: causticis tñ pharmacis primō esse vtendū cōsulit rei rō,
 ac vlūmo (si prodesse nō videant) ad ignitum ferramentum veniendū est. Maxi-
 me quidē vñione opus habemus, vbi vel pelliculē, vel folliculū, aut tumoris ali-
 quid post abscissionē in vlcere remansit: uel si quid ex māmā virulēta corruptio-
 ne cōputruit. Nā aliter māmā vtēre, timore & periculo plenū est, vt Gal. vī. 2. ad
 Glau. c. de cācro. Qđ si feceris, aureo instrumento ad glādis, aut dactili formā ef-
 formato, facies, vñta solū qđ sup̄fuit parte, sanis manētib. illesis. Iuxta māmā at, &
 regione eius in parte appones, phibēdā fluxionis grā, frigidorū, & astringen-
 tium

A tum pharmacorum aliquod, uelut est succus polygoni, equiseti, semper uine cum modico terra lemnia. Quod si adhuc aliquid supererit, caustico medicamento satius est paulatim conterere, quam copioso igne viscera urere. Postea uero ea uita ratio instituenda, quæ ulteriorem illius humoris, uel tumoris generationem, aut grauioris mali, omnino impediat. Reliqua uero huic curationi proficua ex Actio colliges, qui latius huic instituto innititur, ac cōsultat quid agere oporteat mamma iam aperta, & duritie ab eadem abscissa.

Qualis nam sit cancrorum natura, constare iam euidenter arbitror, si quæ nuper dicta sunt, exacte expendens. Quibus, ut clarior euadat doctrina, addes, cancri nomine non esse intelligendum, quod Celsus astruit lib. 7. nimirum, partis corruptionem, sed intelligendum solum esse, quod ipse lib. 5. c. 28. carcinoma appellat, etiam si carcinoma, & cancer de ulcere quoque dici possint. Cuius sane ulceris, aut cancri tres aduenit Celsus species, unam quæ cacoethicum comprehendit uetus cum duritie, & tumore; alteram sine ulcere; & tertiam, quæ thymium appellat. Est igitur cancer tumor tactui retinens, inæqualis, instar feræ sanus, penitissime pertinaciter insertus, radices longè lateq; extendens, & uenis circumfusus, uelut alligatus, quas circum circa uaricosas habet, colore cineritius, ad rubrum uergens, & aliquando subliuidus, & uidentibus quidem mollis apparet, tangentibus autem durissimus est, ac dolorem inducit pungentem, quod late se extendit, ut sæpe per consensum glandularum malignas inflammationes sub alis excitet, dolore extenso per scapulas ad claviculam. Quæ procul dubio diffinitione euidenter constant signa omnia, quibus faciliè uenimus huius mali naturam; ob id quidem breuitati studens hæc ad cognitionem sat esse arbitror, si quis intelligat, cancri iam confirmati ea esse propria, non quidē incipientis, ut paulò ante docuimus. Est tñ huius mali duplex conditio: quippe ex cancris quidam sunt ulcerati, quidam uero non ulcerati, in qua sanè re, quæ potero breuitate exponā utrū horum appellet Hipp. cancrum occultū, ut euidenter constet, an cōtare occultos cancos liceat: dixerim reconditos, aut externos ulceratos, & an possibile sit, hos, radicitus extirpare, ac licet possibile id sit, an liceat, & ultimò qua medendi ratione utrosque tractare oporteat.

C De cancrorum materia non satis constat apud autores: quippe Gal. lib. de tumoribus præf. nat. & 2. de fa. natu. & 2. ad Glau. ex non feruida atra bile generari, uidetur fateri, cum alijs in locis constet, ex adustis humoribus progigni. Sed ne longius abeam, autorem ipsum intelligo de eo humore loqui, qui adhuc feruiens non existit, hoc est, qui actu non sit in feruore, fieri tamen ex humore, qui iam ferbuit, qui si iterum ferbuerit, in exulcerationem duritiem deducit. Atqui cum ex adusto fiat humore, sit sanè, ut tam seua inducere possit accidens: licet aliquando ex melancholico humore fieri Gal. fateatur, quod intelligendum arbitror, si calorem, & uisionem nactus sit, & non ante. De cancri occulti natura uaria autores proferre comperio: nam ex antiquioribus non pauci, ut Actius sentit, ulceratos, oculos appellarunt, quos Hipp. refert, tutius esse non curare: cuius procul dubio sententiam multi ex autoribus probarunt, astruentes ulceratos non esse curandos: quamobrem constat, ulceratos Hipp. intellexisse, dum refert, curandos non esse occultos. Alii quidem per occultos intelligunt eos, quæ abditas corporis sedes inhabitant, & eos etiam, qui extimas, ubi ulcerati sunt:

K qui

qui auctores arbitrantur quoque, ulceratos radicitus posse euelli. Mihi autem ar-
 risit magis sententia eorum, qui tenent, per occultos, Hip. intellexisse ulceratos, A
 ubicunque sint, & non ulceratos, si in recondita corporis sede immorentur: il-
 lud quidem, quoniam ea operatio, quæ ulceratos exagitat, multū excruciat, &
 debilitat ægrotantem, nec finit morbum, cuius origo iecur est: hoc uerò pro-
 pter loci commoditatem ineptam operationi manuum, & fluxum sanguinis,
 quem compescere in abditis corporis sedibus perdifficile est. Cum hoc tamen,
 ut omni dubio respondeam, mihi alienum è ratione semper uisum fuit, chirur-
 ga operatione carcinoma quoduis extraheret: tum quia, etiam si ex toto erradi-
 ces, non subinde corpus sanabis: reuertitur enim nō multò post, ut ex Celsi de-
 creto diximus: tum uerò, quia periculum est, aut corpus deinceps in grauius ali-
 quod malum prorumpere, aut in affecta parte ulcus cacoethe, & insanabile su-
 peresse. Quamobrem censeo, id opus maxima cum cautione aggrediendū esse.
 Gal. 14. metho. dixisse: inquit enim. Caterum si quando carcinoma per chirur-
 giam curare audebis (quasi opus graue, & periculo plenum) cepisse quidē ab
 euacuando per purgationem melancholico humore oportebit: ubi uerò totū, B
 quod uiuatū est, prorsus excideris, sicut nulla supersit radix, fines effluere san-
 guinem, nec properè eum inhibebis, immo premèdo potius, quæ circum sunt
 uenas, exprimes ex his crassiorem sanguinem. Quamobrem semper suspecta
 mihi fuit huiusmodi curatio, nisi uel incipiens fuerit durus tumor, & alijs au-
 xilijs non cesserit, uel ex alio tumore prodeat: nam cancerum, qui à principio ta-
 lis fit, curare radicitus perdifficile tibi erit. Quod si forte per mammam aliquid
 effluxerit, ne curare tentes, sed sine, tutius id quidem est, ut Hip. refert li. 5. pop-
 in historia mulieris, quæ in abderis, circa pectus carcinoma habebat.

At in his curandi ratio consimilis est nuper dictæ curationi, præterq̃ q̃ nulla
 admittit malactica medicamenta, sed gaudet in principio repellentibus, ac di-
 fensorijs: uerum non his, quæ astringentia sint, sed quæ frigida tantum naturæ
 existant: ut humoris acrimoniæ simul repellendo retundant, & maiorem flu-
 xionem inhibeant, ac si quid fluxum est, discutiant. Caterum quia Actius ulce-
 ratorum, & nō ulceratorum copiose curationem scribit, & nos paulò superius C
 utilissima adduximus pharmaca: ob id quidem pauca referam, & primò quæ ul-
 cerationem quodammodo impedire nata esse existimo. Ferunt proculdubio
 huic usui non parum prodesse, desuper in carnosâ duritie apponere pimpinel-
 lam, arnoglossam, & agrimoniam simul contritas: eundem præstat usum puluis
 capitis gruis exsiccati, uel mustelæ combustæ. Sed præcautioni, & curationi si-
 mul prodesse certum est succum semperuiæ cum cerusa, aut succum lactuæ
 cum bolo armeno, uel terram sigillatam cum mucilagine psyllij, præsertim si
 omnia diu in mortario plumbeo agitaueris. Præstat & emplastrum de cancris
 fluminalibus: idem beneficium confert succus solani, aut semperuiæ in mor-
 tario plumbeo sæpius agitata. Sed ulcere iam conspicuo curandum est ea ap-
 ponere medicamenta, quæ sine mordacitate siccant, ut Celsus consulit libr. 5.
 c. 28. Nam satis sunt eo tempore medicamenta, quæ quasi blandiuntur (ut Celsi
 uerbis utar) apponere, quam sanè curandi rationem fucatam Medici appellât.
 Sed ex peritissimis chyrurgis didici, diuturna obseruatione sibi esse confirma-
 tum, maximi esse momentū unguentum illud quod recipit lithargirij 3. j. duca-
 tur

Atur cum pistillo plumbeo in marmorea pila, & adde donec incorporentur aquae rosatae, olei rosati, & acetum ana .j. iij. quod facies donec acquirat, linimenti formam. Aliud etiam experimento proficuum comperio, quod recipit olei rosati cum succo solani, ut paratur, ad conficiendum vnguentum pompholygos. .j. iij. pulueris lithargirij. .j. ij. pulueris Ioannis de Vigo. .j. f. pulueris cerusae lotae, & plumbi usti ac loti ana .j. iij. ceræ albæ .j. vj. misce, & fiat vnguentum liquidum pro linimentis ponendis intra ulcus. Aliud præterea refert Gal. lib. i. de com. phat. ge. c. 2. quod recipit olei rosacei. .j. x. ducantur in mortario plumbeo sub Sole donec crassescat, & nigrescat, & postea adde plumbi usti, & loti. .j. j. cerusæ, & lithargirij puluerizatorum. ana .j. xij. ducantur simul cum .j. j. ceræ albæ donec mediocrem acquirant consistentiam. Quod si hæc prodesse non uideantur, ad chimica auxilia ueniendum esse consulit rei magnitudo, & malignitas, interq; primas tenet oleum de stibio, & de fæce uini, aut acetum, vel de salibus, aut ferro uel ex plumbo, quorum extractionem latè docet Andernacus tomo eius operis 2. fol. 722. Haud secus grandioris pretij est illud vnguentum, quod recipit turis lotæ, & cerusæ ana partes æquales, terantur cum oleo rosarum, & succo portulacæ, aut solatri, aut cucurbitæ, uel mucagine psyllij, & postea fiat frequenter linimentum. Prodest, & frequens usus aquæ solatri: item ex usu est, si amyllum, cerusa, thus, aloes, & terra lemnia cum aqua solatri dissoluantur, & linimentum fiat, quod nusquam exsiccare permittes. Dimitto hac in parte sicca medicamenta, & alia non pauca, quæ passim à Medicis scribuntur, ut quæ uel parui momenti sint, uel uulgaria existant.

F I N I S.



DE VIRGINVM ET VIDVARVM AFFECTIONIBVS;

ET DE VTERI MORBIS.

LIBER SECVNDVS.

B Studui hoc secundo libro, optime Lector, ea complecti vitiorum genera, quæ & utero ipsi primario pertinent, & alia, quæ ab ipso proficiscentia reliquis corporis particulis communia sunt. Principio tamen sumpto ab ijs, quæ ex utero prodeuntia multis modis semina torquere habent, virgines præsertim ac viduas. Secundo tamen loco eorum recordabor, quæ utero ipsi melle assolent, velut vlcera, & reliqua huius census mala.

De uteri natura, ac de morbis, quibus affici potest.

Cap. I.



INTER pleraque eximia membra, quibus natura toti corpori ministrat, quoddam, idque præcipuum in feminis fabrefecit tantæ proculdubio dignitatis, & præstantiæ, ut iure optimo à Platone, tanquam animal quoddam in corpore peculiariter viuens fuerit existimatum. Est quidem uterus tantæ efficaciar in feminarum corporibus, ut in eo tota ferè sanitatis ratio ex Medicorum omnium decreto, sita feminis existat: ob id profectò hac in parte decreui, eius naturam, & conditionem scribere, ut faciliè deinceps cuius innotescat affectionem omnium ipsi pertinentium causa, & modus.

Vt uerò mulierum uterus, ex quo tam miranda humani generis machina faberrimè ortum traxit, in maximam omnium admirationem innotescat. Principiò pars illa, quæ pudibundâ appellant, sese nobis tractanda ingerit, offertque. Porro muliebrem naturam, os genitale, genitale muliebri, partem hanc pudendam nuncupari uidimus: qui carnis tuberculum hiulcum bisidumque; puberibus maturitatis indicio, pube inlectum honestatumque; prominet, uulnam intus tutantes, ac custodientes. Quibus sanè in partibus ueneream appetentiam sitam esse multi existimant. Cæterum nymphaeam etiam, utrinque admotam, naturam eò progenuisse, quo primo hoc monimento, ac ea, ac cætera quæque; extra officere ualentia, arceantur, credi par est. Sed occurrit post hæc ceruicis os aliquanto præstantius, intra cleotrem muliebri genitali annexum: subinde ceruix ipsa ceu pars finitima, quæ uulvæ canalis, & ab Arist. et matrix dicitur. Ab intimo, qua

K 3 uterus

uterus definit ore, prolifico matris semini accessum præbens, adusq; muliebrem naturâ recto tramite protensa ceruicula hæc inchoat efferturq;. Verum ob sui constrictionem in nonnullis mulieribus ad dextrum, in alijs ad læuum magis collabitur. Huic quidem velicæ foramine directo per eius meatus nerosus cartilagineusque parte superâ annectitur: quæ lotij à renibus ad vesicam delati, fistula intra muliebrem naturam sita, nymphæ fatiscente visitur. Sic. n. vesicæ fistula foramen humidis recrementis: menses vero vteri cernix illi conterminata in mulieribus egressum suppeditat. Est autem huius partis longitudo quatuor sexve ad summum digitorum: amplitudo vero, quæ collem capiat, cariosa ad modum, chartilaginea, ut partus tempore fatiscat, dilatetur plurimum atq; contrahatur, modicè obdura, ac transmutationibus his pallioni cuiuspiam obnoxia euadat, proindeq; ut concubitus tempore, genituram excipiens tantisper opportunè attollatur. Quandoquidem in modica mollitie partibus quibusdâ eleuatis, alteris concidentibus, anfractus sinuososque prolifici seminis vsum ad vulua grandiore sinum transitum prohibentes, molitum iri cognitum sit. Quod si non celerrime permeauerit, longior em moram in ceruice trahens, spiritu geniuo ocyslime exhalante, genituraq; tempore suo prorsus priuata, haudquam concipi possit. Huic etiam sphaerica rugiosaq; cauitas inest, ut penis subingressu tentigine oblectamenti causa afficiatur: in cuius sanè confinio nerosa exilitas colligationibus venulisq; tenuibus ex adiacentibus particulis exortis dispersa contextave minutissimis maculis interstincta, inuenitur, quæ integræ virginitatis testimonij assertum hanc eugion vel hymena vocant, ex qua coitu primo excissa, cruorem emanare aperuisse constat. Præter hanc stat protinus vteri os, quod eatenus (intelligo internum illud ostium, quæ loci desinunt, & ceruix inchoatur) nerosum existit, quo excellentiore sensu, coitus tempore summe oblectetur, modica duritiæ affectum, ut vuluæ os ob immodicam duritiem haudquaquam coniunctat. ut. n. uterus simul seminis facilitationem intra se susceperit, vniuersum alueum contrahere, atque os ipsum sigillare opus est: ob id decuit modica duritiæ constare. Glandulosum insuper est, instar glandis penis mucronatum, foras in ceruicem iniquabile sua facie, admodum oris caulti recens editi prominens. Deinceps vero vterus subsequitur, quem nominibus alijs utriculum, vuluam, mulierumve locos, ac matricem meliorum consensu appellare liceat: sed de nomine sit satis.

Ad rem igitur accedendo, locum vteri ac domicilium rimari prius oportet: porro ima spina, quam caudam appellant, in coxarum osse desinit, quod transuersum longèq; valentissimum, vuluam, vesicam subrectum intestinum tuetur: ab exteriori parte gibbum, ad spinam verò resupinatum à lateribus adest, in ipsis coxis sinus orbis latos obinet, à quibus os pectinis suboritur, quod super intestina sub pube transuersum ventrem confirmat: in viris rectius, in feminis in exteriora magis, ut partui commodius sit, recurvatum conspicitur. Vteri itaq; positura inter imam spinam, & ultra vesicam infra mediam aluum habetur: ab umbilico enim paululumve supra ad suæ ceruicis initium vsq; extenditur, quare infra aluum situs. Tunc a parte priore vesicæ eidem iuncta præsertim versus ceruicem, quandoquidem vuluæ amplitudo vesicam superueniat, qua parte ab eadem minimè regitur, laterali ter coxarum ossibus recuruatis, posticè, ima spinâ

A na sub recto intercedere intestino circuit, qd ne facile hoīe iā inchoato, cum in creuerit, auriōri mattici enixus oblderet. Quā illi regione cōdiderat natura, ut comodius arterijs, cordi, iecori, venis, cerebro dotaliq; medulla, neruis pcor dijs, itē māmīs, renibus, vētri, coxendicibus, pubi, cunctis his vna committeret.

Vteri igitur quātitas in virgine admodū exigua vīditur, in cuius virginatis aut, nī si dum vterō gerunt, non multō maior, quā manu comprehendī queat: ita ut in vterulis iam sit similis summitati asperae arteriae, ut rectē ab Herophilo comparatum est. Verū quantitas hīc ambigua indiscretaq; aetate, tēperatura, venereorum vsu, muliebri proflutio, fertura, & adhuc fatium vna cōceptorum numero, corporis proceritate contrariantibus censetur. Est insuper neruacea materia per simili pelliculosa: quippe quae ad puerperij vnius vel plurium magnitudinem extendi posset, verrucosa cavitare pollicari crassitudine constat.

B Extat etiam tunicis duabus obductus, interna vna, & altera externa. Tunice huic villi per longum porrecti (quos rectos appellant) insunt, q admodum pauci existunt, eoq; illis viri dumtaxat genitura facillimū quidē trahere erat. Sunt & villi per transuersa ducti (transuersi appellati) quos sanē in vterō redundare operapretium fuit, quando quidē ijs ipsis etiam rapta genitura detentum itura foret, simul, & fetus toto tēporis tractu a cōceptione ad partum vsq;. Quinetiā & illi in latū diductos (qui latitudinales nominant) inesse liquet, qbus partus fetura absoluenda est: & ob eā rē si uterus duas eas partes cōplexus in vniuersū spectetur, quadrangularem orbiculatam figurā prae se feret, amplitudo cuius ad ceruicē coangustatur, qua sui parte ima canalis effertur: & ob id cucurbitae vtrinq; paululum cōpressae speciem repraesentat. At extrema mēbrana separata, internam tunicā diligentius rimari oportet: cui sinus gemini, alter dextra, laeva parte alter leuiter discreti sunt, ad unā ceruicē coeuntus. Quos planities quēdā intus, semite per quā similis, separati: cui etiam ex rugositatibus comparente minentiae plures, quae priscos deceperunt, ut crederent, varios esse sinus, quod leniter credendum est.

C Venas hēt etiā vterus non paucas (sed a caua disseminatas, nullā) a vena aorta diductas. Caterum extrinsecus, canalis parte superna, qua vulua p̄tinitur, & ceruix innascit, vtrinq; testis conspicuae magnitudinis coherescit, vnus dextro, alter lauo lateri forte creditus, nō minores multō ijs, qui virorū sunt, duriores tñ, qui intus matricis ceruici adherent, quos peritonēum deducens, in ipsos vasa seminalia obuoluit, simul cū p̄pria ipsorū tunica epididymiade nuncupata: carent tñ erythroide, & seroto, & darto, a quibus vasa semen in cornua deferunt, q̄ prope vteri suū dum laxiora existunt. Habent tñ distincta inuolucra, q̄ solertissima natura eō procreauit, ut salualem quendam succum, qui mulieribus oblectamini esset, molirentur. Supra hos deinceps, bina cornua (sic. n. appellant) lateri dextero vnū, alterū leuo admota, perinde atq; additamenta duotendunt. Etenim qua parte vterō annectunt, pleniora sunt atq; crassiora, tñ adilia coxendicesq; procedentia minuiuntur atq; attenuantur. Hec sanē cornua appellamus duas ipsius apophyses exiguas a lateribus adilia perreptātes, papillis seu cornibus exorientes p̄similes: iuxta quas semē muliebri excernit, quae sanē eo tēpore, ut ceruix, & loci prolifce geniturae, helluones insigni tantisper amplitudine, ad eandem vorandam, dehiscendam protinus ab initio extenditur.

K 4

Postremo

Postremò similia uasa ad hunc modum intelligere oportet: venales gemini A
meatus de aorta: uena flexuosis orbibus ad testes portendunt, alij toudè iusta re-
nes eodè deueniunt: sed hi sanguinolenti, illi quos mittit aorta exangues cõpa-
rent. Qui oēs circum duos: iã dictos testes, pgressi, sese flectunt, mox cornua sub
eunt, subinde passim in tenuissimas fibras diuiduntur: quarum pars maior ra-
morum seriè sparsa ad uterum deuenit, substantiã penetrans, ex qua èt, ferūt co-
tylidones fieri, quibus partus per umbilici radices aliqua ex parte utero uali-
dissimè cõmittitur. Ex quibus èt genitalis quidam succus citra uoluptatè emis-
sus, ad conceptum necessarius in uterum instillat. Ex alijs uerò menstrua pur-
gationis aliquid in uterum defluit, præstaturum quidem fœtui alimentũ: ex qui-
bus rubentia membra apparere in genituris assolent. Ex qua èt uasorum propa-
gine ramusculi quidam in internum uulua ostium protendunt: unde inutilis
quædã humiditas, q̃ supra saliualem succum uocauimus, incredibili (ut ferūt)
uoluptate exiliendo, ac per saltus haud secus, q̃ uirile semen prorumpit, tanto
in plerisq; impetu, ut marium more longius prosiliat. Hinc sanè orta est cõtro-
uersia inter Gal. & Arist. nã hoc utile, & ad prolem necessarium Gal. fateatur: in
expediens uerò, atq; irritum Arist. & Auer. arbitrantur. Nec mirandum est, me
hac in parte non meminisse uiarum, quæ utero, & mammiis consortium p̃stāt,
quia de hac re alibi disputatum est. Hæc itaque est huius membri descriptio, q̃
summopere esse cognitu necessariam reor ei, qui uteri affectiones exactè distin-
guere cupit: nam, ut in singulis uteri morbis monstrabo, eorum quilibet suam
sortitur differentiam, & conditionem, sumpta ratione à natura, seu officio cu-
ius uis harum partium, cui morbus subijcitur.

Uteri
usus &
morbis.

His ita constitutis, ut à primis principijs rei huius exordiamur, uteri usum
hac in parte expendisse oportebit, & morbos èt, ad minimã usq; eorum differē-
tiam. Hæt igitur uterus triplex officiũ, unum quidè sibi proprium, & peculiare,
quod illi inest, quatenus pars simplex & similis est, quo pfectò sibi alimentũ
allicit, & in sui naturã cõmutat, aliturq;: non quidè, ut multi censent, ex sangui-
ne menstruo (nã eum non trahit, ut pars simplex, sed suscepat, ut instrumentum
alijs usibus dicatum) sed ex proprio, & peculiari alimento p peculiare sibi in-
fitas uenas, distinctas à menstrualibus, p uniuersam uteri substantiã dispersas.
Quo sanè munere, ut optimè utatur, fruit̃ proculdubio duplici instrumento, tē-
perie nimirũ, & optima partium unione, in quibus sitã hæt alterã sanitatis par-
tē: quapropter ad hanc partē pertinent morbi ex distēperie (licet temperamen-
tũ oĩbus uteri actionibus cõmune, & proficuum existat, ita ut eo mutato ali-
nascant̃ utero morbi, ut inferius monstrabo) & soluta unitate, q̃ utrisq; partib⁹
cõis existit, cui ulcera, & aliæ continui diuisiones reducuntur. Secundum uerò
uteri officiũ, id est, quo dignitate, & præstantia ab oĩbus alijs membris diffi-
det, non quidè ob sui commodum, sed p fœminæ utilitate, & beneficio, p̃ficiũ
existit: nã qua rōne in utroq; sexu mēbra quædam sunt totius corporis uacua-
tionibus dicata: ita in fœminis peculiari quadã dote, membrũ hoc excogitauit
natura, cui propria (p̃ter alia officia) inest uacuandi rō, & qua rōne deficientib⁹
uesica, & intestinis à proprio munere, maximum subinde incommodum cor-
poribus subsequitur speramus, ita quoq; & potiori quadã rōne, in fœminis
hanc partem sanam, & menstruationis officiũ idoneam desideramus. Quod si
aliquo

A aliquo modo contrariū fortē acciderit, mille proculdubio illis succrescunt affectionum modi, mensuris præter naturā utcūq; suppressis: nā quo substantia aut superfluum illud, quod per uterum excernitur, præstantiorē obinuerit naturā, eo si præter naturā institutum supprimatur, grauiora suboriri mala necessum est: Præstantioris quidem esse substantiæ semen, & sanguinē menstruum recensuerat Gal. li. 6. de lo. aff. & ob id, si retenta putrescant, aut utcūq; aliter uitient longē grauiora efficiunt accidentia, & maiora mala. Tertium autem, & ultimū uteri officium speciei propagandæ proficuum, & dicatum est: quod sanē diuidere in tres potissimas partes mihi hoc loco placet. Quippe uitatur cuiusvis instrumenti propria actio, aut ablata ex toto operandi potentia, aut diminutē agēte, uel corruptū, & menstrosū, pducēte effectū. Sic. n. ex fœminis qdā oīnō non concipiunt, quas peculiari nomine steriles appellat Hip. Aliæ concipiunt quidem, sed fœtū perferre nequeunt, aut necessarium, & pñitum tempus gestare sunt impotentes: quibus frequenter abortire contingit, q̄ diminutē uterī facultas operetur. Rursus aliæ concipiunt, & fœturā continent, cæterū monstrum quid ex utero producant, uelut est mola à Medicis appellata, ac sunt alij mendosi, & monstrosi conceptus, qui mira uarietate ludunt, & peritissimis Medicis plerūq; illudunt: quos ex corrupta uteri actione proficisci nulli esse dubium arbitror. Atq; hæ sunt in uniuersum omnes uteri affectiones, quarū speciatim meminisse quoq; oportebit, sumpto ab hysteris affectibus initio.

*De hysteris affectionibus in genere.**Cap. 1.*

FREQVENTI nomine cum antiquiores Medici, hysterā, uterum appellauerint, iure ob id optimo ipsius affectiones hystericas, seu uterinas nuncupauimus: quas hoc uno capite cōplecti mihi nunc in animo est. Dictum nanq; superius leges, uteri munia tria potissimum officia diuidi, quorum primum est sibi proprium, & peculiare, alimonia, ipsius dicatum, totum naturali potentiæ subditum, aliud uerō cōius est, totī speciei subseruiens, cuius ratio, & finis est prolem procreare. Sic etenim Gal. 6. de lo. aff. c. 5. uterum diffinit eam partem, q̄ natura mulieribus ad concipiendum concessit. Cui subseruit tertium uterī officium, licet uniuerso fœminæ corpori sit cōmune, & proficuum, quod est menstruum sanguinem statutis temporibus expurgare, & semen in ueneris actibus excernere, quæ sanē omnia pari quoque lege certis quibusdam temporibus contineri oportebat: hoc quidem, ut fœtū subsit materia, & locus: illud uerō, ut fœmina excrementis purgata uegetior, sana & conceptui aptior existat. Verū sicut utroq; modo seruata naturæ lege, inculcata sanitate fœmina uiuit: ita quoq; prorsus dum utrunq; , aut alterum modū excedit (ut lib. de uirg. morb. Hip. recenset) mille affectionibus ferē incōprehensibilibus, premitur miserrima fœmina. Sic profectō fluentib. debito largius mensib. fœminæ fiunt steriles, imbecilliores, pigræ, ineptæ ad actiones obeundas, decolores, tædiosæ, & tristes, ac plerūq; degenerat affectio in malum corporis habitum. Sic semine, aut quauis alia substantia defluente, eadem & longē grauiora subsunt accidentia: tandem corpus in maciem, & tabitudinem quando ocysimē degenerat. Verū tolerabilia profectō quis existimabit huius-

huiusmodi mala, si ea cōsideret, q̄ ex insolita, & p̄ternaturali seminis, aut san- A
guinis menstrui retentione suboriri assolens. Quæ p̄culdubio oīa facile colli-
ges, si Hip. legeris loco paulō ante citato: quippe inquit. Nā cū virgines iā matu-
ræ viro steterint, natura duce sanguis menstruus ad matricis locellos, & venas,
ab hepate defluit, qui cū ob illarum angusta oscula, q̄ nondū patuerunt, aut in
fœminis, q̄ viro orbata sunt, viscosis, & crudis humoribus obstructa, & deniq̄
ob sanguinis crassitiē erumpere nō possit: tum rursus p̄ venæ cauæ maiorisq̄
arteriæ propagines ad cor, hepār, diaphragma, & præcordiorum venas regur-
gitat. Capiti quoq̄ non minor pars cōis fit, & tandem circa viscera oīa acciden-
tia grauiā parit, difficiles respiraciones, tremulum cordis palmum, hepatis inflā-
mationē, & mille alias eius distemperies, ventriculi subuersiones, cibi fastidiū,
vomitum, ingentem famē, varium malorum appetitum, cardialgiā, epilepsiam,
& delirium: sanē, iudicio nostro, optimē huc afferri potest illud Gal. dictum li-
bro de diffē respir. nimirum, quæ p̄ter naturā sunt, varia & multiplicia esse, in-
quit enim. Vnum. n. est, quod secundum naturā se habet in animantis corpore,
varium aut, & dissimile, & multiplici errore inuolutum id, quod p̄ter natu- B
rā habet, adeo, vt necessario sequatur esse incomprehensibile. At si qua in re, dū
p̄ter naturā efficitur varia, multa, cognitu difficilia subsequuntur accidentia,
maximē profectō in semine, & sanguine menstruo retentis coniectabile effici-
tura quibus tot oriuntur vitiōrum genera, quot neq̄ scripta reperiri possunt,
neq̄ facile memoria teneri, vt eorum possit lex, & ratio difficulter haberi ali-
qua. Quo quidē factū est, vt medicorum non pauci consilio destituti ab horum
affectuum curatione desistant, vetulis, & mulierculis id munus relinquentes.

Proficiscitur itaq̄ huius miræ varietatis ratio, una potissimum ē tribus rōni-
bus: nā dū hæc duo excrementa p̄ter naturā legē cohibentur, aut putrescūt, aut
alterantur, aut quantitate solum, & copia abundant, & peccant. Quippe hac ra-
tione virginum morbos fieri Hip. reulit li. de virg. morb. dicēs. Cum. n. hæc par-
tes repleta fuerint, & horror cū febre ingruit, erroneas febres appellant: his ha-
bentib. p̄acuta quidē inflāmatione insanit, p̄ter putredine verō clamat, præcali-
gine sitate aut timet, ac formidat, p̄ter cōpressionē verō circa cor strangulatio-
nes parat, p̄ter sanguinis aut malitiā animus mœrens, ac anxius malum trahit. C
Qua sententia euidenter constare vī, quanta varietate mutetur humor, & q̄ ma-
la efficere possit. Quod ēt ex ipsa rei natura, & conditione haud difficulter pro-
bari potest: nam si nerui, venæ, musculi, addē & cornua vteri, mensium affluxu
aut viri coitu non humectentur, tunc exsiccata prolabi ad aliquam partem, &
vterum ipsum lacerare necessum est: pariter si mensiū repletionē distendunt: sic
& eodem modo, si semen in vteri cavitatē, & vasis coaceruatum, computruit, in-
credibilia quidem mala suboriuntur. Pari quoq̄ pensu dum citra putredinē,
sola copia abundant, malum, quod per se efficere nequeunt (p̄ter plenitudi-
nis damna) alterius mali interuentu moluntur: nam & fluxus sanguinis hemor-
rhoidē, narium, aut per vomitum, & urinam patiuntur: item hepaticam dy-
senteriam, hydropem, corporis contractionē, lassitudinem, tumores p̄ter
naturam, & alia pleraq̄ vitia succrescere longē diuersa ab vterinis affectibus
existimamus: quæ omnia, vel deposita plenitudine, curare non est difficile.

Verum cū prædicta excrementa alterantur citra aliquam putredinem solū
calidiora,

A calidiora, frigidiora aut ficciora facta, affectus vterinos efficiunt quidem, sed neq; admodum graues, neque ob id facile intelligibiles. Nam primò fœminæ hoc modo affectæ æstuationibus, sibi inquietudineq; non leui vexantur, vbi caliditatem contraxerint excrementa. Item pallescit corpus, albidius aut decolor redditur, & ipsa fœmina pigra efficiunt, maesta, tediosa ac mille doloribus plena: quæ quidem accidentia neq; ordinem seruant, neq; legem, q; si perseverauerint in aliquo statu, frigiditatem in ea parte contractam esse attestantur. Alia etiam ex hoc vitij genere suborinuntur accidentia his æqualia, & simillima, quæ profectò præcludiū maioris mali, & grauiorum accidentium existunt. Quobrem eis citra cunctationem subueniendum est, antè quidem, quam in epilepsiam, aut alium grauiissimum affectum degenerent.

Ceterum dum fœmina cō miserie, deuenit, q; huius excrementa, semen videlicet, & sanguis menstruus, putrescant: accidentia quidē grauiissima sunt, & aspectu terribilia, & quæ sui speciem, & naturam facile monstrant: sed tam sunt varia, vt neq; certa lege, neq; vlla methodo comprehendere queas. Subitū in hac re mirari, cum vnica sit materialis cā, vnica formalis seu efficiens, putredo, vnica particula affecta, vturus, quam rōne tam mira accidentium varietas suboritur. Quod sanè ita fieri posse, tria ostendunt facile: primum, putredo ipsa: fœminæ putrescentis substantiæ copiam: tertium verò, & vltimum, varietas, & natura membrorum, quæ vtro sic affecto consentiunt, & compatiuntur. Circa primum attento animo lector expendat, qd; licet sanguis solum putrescat, aut semen ipsum, p se, aut vtrumq; simul, ea tñ est putredinis natura, & conditio, vt omni generarietate, & mille modis fieri possit: iuxta quam sanè diuersitatem accidentia quoque variari necesse est, velut de re quauis diximus dum præter naturam efficit. Contingit insuper miræ hæc & multiplicis nature varietas in putredine multis modis: primò quidē rationē causæ mouentis humorem ad putredinem, q; esse variā inficiabitur nemo, ac ob id varias pullulare putredinis rationes, & differentias: secundo id contingit ex loco, ubi putrescunt humores: multa. n. atque varia putredini posse succrescere ex loco, manifestissimum est; vltimò varias contingit oriri putredines ex varia putrescentis rei natura, & substantia. Ex qua quidem conditione plurima hysteris fœminis accidunt malorum genera, ex semine nimirum, & sanguine menstruo corruptis: idq; duabus rōnibus: prima ob putrescentiū perfectionem: constat. n. semen ex perfectiori sanguinis parte, & calore natū perfectissimo, ac ex copioso spiritu: ut sanguis ex quatuor humoribus, & totidem humiditatibus, quæ singulis humoribus sunt adiunctæ, ita ut quilibet humor ex parte tenuiori, & crassiori, ac mediocri constitutus existat. Ex qua procul dubio varietate mirum uideri non debet, si unus cū sit humor, sanguis nimirum, aut semen, tot modis uitari possit, ac tot accidentium varietates efficere. Secunda huius rei ratio est, quia putredinem contingit fieri predominantibus in ea uno, duobus, tribus, aut omnibus humoribus, vel paribus eorum, quas diximus constituere, ac componere utranq; substantiā, sanguinis scilicet aut seminis. Quobrem rōni consonū vī, varia ob id fœminis subsequutura accidentia fore, & qd; mirabilius est, unicū & idē accidēs in diuersis fœminis, & temporibus, & qd; adhuc maiore infert admirationē, in eadē fœmina, & eodē

tem-

*Cur ex uni
ca causa
tam mira
accidentia
variata
sint?*

tempore diuersa, varia, & saepe contraria succrescere accidentia. In qua procul dubio re, rationem monstrositatis, & varietatis hystericeorum affectuum consistere arbitror: nimirum, quod praualeat magis in putredine, causæ efficacia, aut loci putredinis deterrima conditio, vel humoris putrescentis malignitas, aut quod prædominetur magis in putredine vnus humor, vel vna substantia ex nuper dictis, quàm alia.

Ad dubitare iuxta hanc rationem mihi visum est, cum sanguis, & semen temperatissimæ, & perfectissimæ sint substantiæ, qui fieri possit citius, & deterius ceteris oïbus posse corrumpi, cum bilis tanto deterior, tanto tempore incorrupta duret non solum in vesica fellis, sed prope cutē in arquatīs, & pituita in arthritide prope articulos. Verū quia hic non est disputationis locus, breui quadam rōne respondere huic dubio mihi est in animo. Inquit Arist. lib. de longi. & breui. vitæ. Pura oïa & impermixta, vt quæ magis à contrarietate recedant, diuturniora esse: contra, citò vitari, aboleriq; quorum essentia multa oppositione constat. Sic elementa, inquit, lapides, & metalla, q̄ vel simplicia sunt, vel eis, proximè accedunt, incorruptibilia creduntur: contra, lac, sanguis, & semen seruari diu minime possunt, vtpote, q̄ manifesta cōpositione, & varia constant. Quod euidenter monstrant sanguinis grumus vbicunq; sit, lac et coagulatum in puerorum ventre, & semen retentum: q̄ oïa facillimè, uel aeris cōtactu alterantur, quæ variā, & perfectissimā nacla sunt elaborationē. Ob id profectò, homo crebrius ægrotat, quia multiplici, & perfectissima constat cōpositione. Neq; obstat quominus hæc vera sint, sanguinem menstruum nouem mensibus citra euidentis vitium in vtero gerentib. contineri: nā eo incolumis adseruatur, q̄ partim repleat vasa, partim fœtui p̄stet alimentum, partim verò in secundina colligatur: q̄ natura familiarissimā ob id sanguinis substantiæ fabrefecerat, vt ibidem citra corruptionem contineretur toto prægnationis tpe. Cur verò præstantiora quæq; deteriora dum corrumpuntur, euadant (quod experimento quotidiano comperimus: nā sordidiorem putredinem cæteris animantibus, hoïum cadauera cōtrahunt, & oua putrescentia, ac poma, quo præstantiora fuerint, & odora, eo deteriori corripuntur putredine) duplex ratio cōmonstrat: prima, q̄ præstantissimā substantiā nequit deuincere, ac superare, nisi vehemētissima, ac spurcissima causa, quia cæteris facilius resistit: qua propter necessum est putredinē, & vitium causæ naturæ responderē: secunda, quia perfectis substantijs quoduis vitium deterius efficitur imperfectis. Quibus rationibus multi addunt, illud in causa esse, q̄ ex pluribus, & maximè diuersis perfectiores mixtiones euadant, calore natiuo ueluti iunculo colligante cogenteve oïa: sic naturali calore dissoluto, dispersis oïbus prodit fœdus sapor, odor, & color, quæ magnæ putredinis, & horridæ sunt indicia: ita vt semine, & sanguine menstruo corruptis, quasi venenū in corpore nasci, lib. 3. & 5. de lo. patien. expresse fateantur Gal. Auer. & Auicē. Ratio quidem in promptu est, quia si ex purissimis alimentis, sanguine nimirum, semine, aut lacte, moro, ac melone viuatis, facillè venefica, ac deleteria excitatur qualitas, multò profectò rectius ex ipsorum excrementis generari poterit, quod in vtero potissimum accidere certum est, eo q̄ sentina sit uniuersi corporis, & substantia, quæ putrescit, præstantissima. Quo fit, vt fœminæ vterinis molestare, veneni instar symptomata persentiant.

Cur

Cur præ
stantiora
dum cor-
rumpuntur
deteriora
euadant

A Cur verò in plerisq; feminis vtero affectis hæc veneni seminaria clā occulteq; diu lateant citra euidētem corporis noxā, ac ad ipsū, & per intervalla reuiuiscant, elucescantq; grauissima symptomata, haud facile est nosse: scimus tñ non solum in his, verum, & in multis alijs, qui venenū sumpserunt, diu in corpore venena latitare: nam si Hipp. credimus, viginti annos malum ocluditur oppressum aut reuersum. Causa tñ huius rei non desunt: quippe quod sensim, & paulatim fit, nullum donec in habitum vergat, specimē de se præbet, sed dū factum est, subito in grauissima prorumpit accidentia, ac sæpe in mortem. Præterea, si ignobile membrum venenum adoriatur, donec ad nobile peruadat, nil mali, autq; paucissimum sentimus: cum. n. ad nobile peruadit, facile toti corpori cōis fit affectio. Ad hæc, præstantissima est membri, in quo viger assuefactio, et si ex deterrimo sit, quia tñ abest, vt membrum lædatur, quod sæpe huius humor alimentum præstare possit. Verum cū ex alimento crescat vltra debitam, & consuetam magnitudinem id excrementum, pellitur ad aliud mēbrum, vbi morbum facit, quia in iustum, quia multum, & quia prauum, quo tpe fieri grauissima accidentia mirū nō est. Postremo huic malo principiū pstat dissensio facultatū naturalium, vigentibus nimirū aliqñ coctrice, & retentrice, languida facta expellente: q; non pellatur quod pter naturam effectum est, & sic accrescente, cōparatur venenosa illa qualitas, q; paulō post in morbum, & leuissima accidentia, prorūpit. Quibus profectō constare arbitror, qualis sit huius dogmatis ratio & veritas, vt cognita causarū varietate, medētis cōsiliū tutius, & certius euadat.

B Secunda ratio varietatis prædictorum accidentium, quæ secundum tenet locum, excrementorum q̄tati reducenda venit nam semen, & sanguis mēstruus cū intra vterum putrescunt, nō solū hæc mala pariunt ex diuersis putredinis modis, sed ex copia et sanguinis, & seminis putrefacti: quippe maxima q̄titas vtriūsq; vel alterius in leuissimos, & varios prorumpit affectus: parua verò eodem minatur, sed non perficit. Sic etenim facile reperimus apud plerasq; feminas querimoniam, & sensus plurium, ac diuersorum affectuum, qui vix cōprehēdi, & distinguī possunt, præludium quidem maiorū: quos sanē leuissimis auxilijs, aut sola animi distractione vel delectatione curabis, adhibitis et leuib⁹ frictionibus, exercitio, ac deambulationibus, & huius census alijs. Itaq; venenosi & corrupti humores natura eadē mala minatur, & aliqñ efficit, sed pp paruum humorum corruptorum copiam, aut non perficit, aut mox subsistit. Habent tñ ex diminuta prædictorum humorum q̄tate hysterice & femine hoc proprium, & peculiare, ut mox ab accessione, & q; primū quiescit malum, ad pristinam, & antiquam sanitatem redeant, veluti si nihil perpessę fuissent: quod alijs, q; ex nimia humorū copia laborant, non dat: supersunt quidē illis per aliquod tps nō leuia præteriti mali vestigia. Quibus et feminis accidit, varijs accidentibus vni eo, & eodem tpe corripī, ac mox subito leuari: ratio quidem est, quia parua humoris aut huius copia cōtemnit, à se rejicit vel deuincit particula illa, ad q̄ ex vtero aliquid transmittitur, huius rōne accidentia suboriuntur: quod alijs feminis, quæ plurima abundant huius venenosi humoris q̄tate, nunq̄ conceditur. Succrescunt præterea his feminis varia accidentia, & in diuersis partibus, q; a halitus pauci elati ex pauca materia peruenientes ad particulam aliq̄ malū ibidē efficere conantes, ad alias protinus transmittuntur, & pari modo ex his ad reliquas,

quas, in quibus omnibus proculdubio aliquid mali perferri necesse est, A
quod varium esse contingit ob membrorum varietatem.

Tertia sanè, & vltima ratio diuersitatis hystericonum accidentium, est mem-
brorum consensus, quibus vterus communicat suum vitium. Ex qua quidem
causa, prædicta accidentia tribus potissimum rōnibus subotiumur: prima, ex
consensu mutuato præstitoq; alicui membro ex affectione vteri: secunda, ex mu-
tua reactione, q̄ membrum læsum iterum præstat, & refert ipsi utero: quod profe-
ctò multorum accidentium solet esse causa. Nam cū mēbrū aliquod primo ab
utero afficitur, rōni consonū vī, excrementa, quæ ex vitio contracto generat,
maiori ex parte transmittenda fore in vterum ipsum, tanq̄ in membrum imbecil-
le, primò affectū, & corporis quodāmodo sentinam: quod dignoscēs, quia acci-
dentia, q̄ sic affectis superueniunt, redolent quadā tenus naturā excrementi in
vterum transmissi. Tertia porrò, & vltima ratio est, q̄ licet accidentia ex utero
prodeant, non in sequuntur naturam seminis, & sanguinis menstrui corrupti,
sed naturam excrementorum a mēbro aliquo affecto in vterum transmissorū,
aut eorum, quæ in vtero generantur, præter semen, & sanguinem menstruum. B

Prima porrò diuisio, q̄ ex consensu proficiscitur, quadruplici cōstat mēbro,
dimitto hac in parte consulto tres consensus differentias, quorum Gal. memi-
nit. lib. 1. de locis aff. c. 6. quia huic vsui nō ita sunt proficua, licet earum aliqua
ex vsu sit: nam consensus ab utero præstat primò per partium quæ coafficiuntur
similitudinē: cōpassiones. n. & confus facilius, & promptius fiunt inter similia:
& ob id utero affecto nervosum genus omne facillimè cōpatitur: non quidē,
vt multi falso censent, q̄ plures, & magnas nervorum propagines vterus fortia-
tur, sed q̄ mēbranosa constet substantia, & nervea natura intexta: qua rōne etiā
vesica, & colis nervea dicuntur. Secundò idem consensus præstat per vicinā:
quo fit, vt plerisq; feminis vrina supprimatur, & varijs modis vitietur, rectum
intestinum tenasione afficiatur: sic & mesereon, uentriculus, intestina, & venę
meseraicæ varijs accidentibus premuntur: præterq̄ q̄ nervea sunt hæc omnia,
& ob id etiā compati possunt. Tertiò uerò consensus fit maximus per collig-
antiam: scater. n. uterus uenis, ijsq; grandioribus, vt ex Gal. constat, qui lib. 6.
pop. par. 1. inquit. Vterus inter oēs corporis partes plurimas, grandissimasq; ue-
nas habet: p̄ quas proculdubio iecur cōpati per facile est, sicut iterū utero refer-
re supplitium accepti mali: nam illi ob id præstat feculentum, & impurū san-
guinē, quo (vt nuper dictū est) vterus nouiter afficitur. Arterias quoq; hoc viscē
non paucas neq; parua suscipit à corde, p̄ quas varia, & grauissima, ac periculo-
sissima cor suscepat mala, quamobré rōni consonū vī, cum uterū, & intra ipsum
contēta plerūq; ex putredine refrigerari cōtingat, citra frigidorū humorū abū-
dantiā (adhuc in biliosissimis corporibus) grauissima feminarū nō paucas p̄peti
accidētia frigidā naturā falso æmulātia. Ex quo et sequit̄ nō posse cor deinceps
im̄ caloris vtero trāsmittere (arterijs ab utero ad ipsum vergētibus, paruis frigi-
disq; halitibus plenis) q̄ tū utero calfaciēdo sit satis. Pari quoq; rōne uterus di-
uersis nostri corporis partibus mille modis alligat: quas simul cōpati neces-
sū est, subindeq; varia efficere accidētia. Quartò verò, & vltimò oēs partes uero de
mādato ab utero cōsensu cōpatiunt, suscepta nimirū substantia aliqua ex ijs, q̄ in
vtero p̄sunt: nā et si uterus nullā hēret similitudinē cū alijs partibus, colligantia,
aut

A aut vicinā, cū totū corpus cōfluxile, & trāspirabile sit, facile quāuis eius pars alterius damnū susceptat transmissa ad eam aliqua substātia ex ea, quæ laborat. Ex quo etiā varia, & grauissima subsequi accidentia conspiciamus, tum ex substantiæ, tum verò ex partium diuersitate.

Hæc igitur sunt varietatis hystericonum affectuum causæ, quorum sanè naturā bellissimè expressisse visus est Gal. lib. 6. de lo. patien. c. 5. docens, q̄ licet affectus nomen sit unum nimirū hysterica passio, nihilominus tñ sub se comprehendit innumera, & varia accidentia, iuxta diuersitatem trium causarum, quas nuper adduximus. Quas sanè oēs si quis sedula diligentia intueatur, perdiscet facile, cur feminae aliquæ refrigerentur, & mox simul incallescant: item cur marcidæ appareant, aliquæ verò nimio madore, ac pinguedine abundant. Ex eisdem quoq; causis proficiunt, caput vniuersum uel aliquam, aut plures eius partes fixo, & stabili dolore apprehendi, nonnunq̄ mutabili, sæpe diurno, sepiissime à quibusvis externis causis exacerbato, ita ut solam dolorum capitis varietatem comprehendere difficulter queas. Quis præterea narrare poterit dorsi, thoracis lumborum, coxendicium, ventris utriusq; & crurum dolores? quos nulla quidem alia rōne certius ex utero proficiscentes cognosces, q̄ eò q̄ nullam feruent legem, nullamq; uniformē naturā habeant: sed uarietate maxima præditi nullis limitibus, aut conditionibus coerceri possunt. Monstruosa nāq; varietas hæc aliunde q̄ ex utero proficisci non pōt præsertim cū dolor, neq; distemperie, neq; tumorem præter naturam eius partis, quæ dolet, comitem habeat. Ex eisdem quoq; causis prodit, quāsdā feminas famescere citra vllam rationē, alias verò idq; frequentius cibos fastidire, & abominari: plures tñ optimos, & vsuales odio habere, spurcissimosq; & inusitados prosequi. Inter quas multæ quidē uomunt, & nauseabundæ existunt citra manifestam causam: quarum ventrem si purges, magis lædes, q̄ ex halitu ab utero illuc irruente affectio suboriat. Sic plurimæ ventris inferioris murmurio, doloribus, & cruciatu maximo premuntur, flatibus vterū, & intestina distendentibus: quæ potiùs leuantur vterinis auxilijs, q̄ quouis alio præsidio. Cordis item morsu, & dolore premi plures, omnibus cōpertum est, ore. s. ventriculi compatiēte, aut corde ipso. Quibusdā arteria iuxta dorsum, & quæ mesereum ambit uehementius pulsant: vñ eas mēstas esse, inquietas, anxiosas, animo linguētes, aut syncopicas quotidiana experientia conspiciamus. Quod si septum transversum malum apprehenderit, hinc difficiles respirationes, suffocationes seu strangulationes, sicut ex laqueo periculum impendere, manifestum fitatq; in hoc et uaria existit difficilis respirationis mutatio, & grande periculum. Verū si iecur degustauerit uteri vitium ob deprauati sanguinis generationē, feminæ protinus obstructionibus innumeris corripuntur, decolores fiunt, pedibus tument, totum et corpus redditur cacoethes, tumidū, & iamā in malū habitū cōmigrans. Sed quis numerare poterit accidentia, q̄ aīalis potentia, dū læditur, perfert, quippe aliquā motiua facultas ita pueruitur, ut aliqua pars corporis, aut plures uel totū corpus tremore afficiant: contusiones et p̄sertim pedū, ac manum eadē læsa efficit: itē resolutionē, iuxta naturā habitus, qui aut nervosas partes, aut neruorū capita, aut nervos ipsos ptingit. Aliquæ ex motus defectu uoce priuant, & mutæ p̄ aliqd̄ tps̄ supersunt: ex quo et emanat respiratione priuari nō raro, & periclitari suffocatione mille modis:

partim

partim obstructis vijs, partim musculis respiratori feruentibus plurimum lesis, ita ut verè videantur omnino respiratiōe priuari.

Tanta itaq; in p̄dictis accidentibus reperitur varietas, ut rarò in eadem femina idem accidens (licet ab eadem causa) eodem modo proficiatur. Pari quoq; lege diversissima sunt symptomata, q̄ sensibus exterioribus uteri vitio succrescunt. Nā ex fœminis quardā ita toto corpore, aut aliquo membro torpent, ut paralytici pati videantur: aliæ varijs & inordinatis doloribus aded afficiuntur, ut neq; alicui causarum reducere, neq; in aliquo genere cōplecti facillè possis: plures gustu, & olfactu priuantur, plurimæ verò prave gustant, aut olfaciunt citragustabilem, & olfactilem vitium. Aliæ sanè sunt, quæ aut sordescunt, aut tintu aurium perpetuò cruciantur, licet non pauca vitia in visu quoq; persentiscant. Habet aut̄ auditus hoc peculiare in hystericeis affectibus, quod et si femina in accessione oībus alijs sensibus priuentur, auditu tñ nunq̄, aut raro priuantur. Ex eodē fonte manat sensus internus variæ et pat̄ vitia: nā quardam delirant, maniacæ, ac furibundæ redduntur: aliæ vultu existente secundum naturā amētes fiunt, & veluti congelatæ supersunt, nihil percipientes, neq; respondentes quicquā. Dignum profectò animadversione hac in parte esse existimaui, diligenter expendere, si ex vitioso semine totiam sæuāq; accidentia fœminis succrescant, an ea quoq; castis, & pudicis viris pariter possint accidere: cui dicimus, q̄ licet aliquid hystericeis persimile in viris et videatur, id tñ neq; ita frequēter, neq; pari vehementia, ac in fœminis, quia improporionale vitium est viris, q̄ & calore abundant, & vegetiores sunt, & vitium ipsum frequentissimè frigidum: q̄ si in mare aliquñ id accadat, melancholica vitia afferre potius q̄ alia conspiciamus. Succrescunt tñ ea mala fœminis, q̄ uterus sit corporis sentina, & excrementorum putridorum conceptaculum, aded ut nihil mirum sit, si deleteria frequentissimè in eis suboriantur qualitas, propter caloris imbecillitatem, q̄ causis putredinis minus resistit: quibus accedit mensium, ac seminis in uterum profusio, & improba expurgatio. Atq; hæc accidentia retulisse sat sit, quæ veluti summa capita existant eorum, quæ frequentissimo euentu experientia comonstrat. Verum quia non sat esse grauissima hæc accidentia sic in genere nosse, ad rectam medendi rationem, ni quis exactè cuiusq; naturam adipiscatur, ideo per capita, ea distribuere in animo est, initio sumpto ab uteri strangulatione, tanquam à communissimo in hoc genere affectu.

De uteri strangulatione.

Cap. 3.



INTER maximos, & grauissimos effectus, quos ex uteri consensu fœminarū sexus perfert, vnus profectò est uteri stragulationis, q̄ eo maxime nomen generis (hoc est, uterinus affectus) obtinet, quod magna grauissima & ceteris periculosiora inferat accidentia. Quæ quidē affectū non genus hystericearum affectionū, licet generis nomen sortiatur, sed unā potissimāque prædicti generis speciem esse censemus, ut Hip. refert lib. de virg. mor. qui inter cetera accidentia hysterica, quæ recensuit strangulationem, tanquam specie annumerat. Quod sanè malum tunc est, cum sanguis menstruus redundans aut

A aut vitiosus vel quauis alia ex vtero cā septū transversum comprimit, & oppri-
mit, vt ex Areteo Gal. Actio ac Paulo euidenter cōstat. Qui proculdubio autores
strangulatus nomen vsurparunt, p symptomate quodā, in quo fœminæ veluti
strangulari ac suffocari vident, respiratione omnino suppressā. Verūm, q̄a potif-
simum huius morbi accidens respirationis cohibito est, ob id iure optimo, cōi-
oium consensu, suffocatio nuncupatur. Cum hoc tñ Stephanus Atheniensis vir
maximæ eruditionis, & autoritatis commento li. i. ad Glau. inter vteri itangu-
lationem, & aphnæā seu respirationis priuationē, nō minimā adinuenit ac pro-
fer differentiā, nec omnino quidē vanā: nā refert aphnæam proficisci ex super-
fluitate seminis in vtero putrescentis, q̄ in cor frigidus quosdam halitus trans-
mittit, quibus aut cor ipsum obstruentibus, aut refrigerantibus respiratione inter-
cipit: strangulatum verò fieri refert vtero retracto protrulq; versus partē supe-
riore, quo, & intestina, & vterus, & septum transversum comprimuntur ita, ut
respirationi nullus aut q̄ minimus sublit locus. Ego tñ in hac re cenleo, hāc esse
differentiam operationis causarum, non differentiā affectus. Erit igitur matricis
præfocatio nil aliud q̄ vteri (ob siccitatem, vel ex retento menstruo, aut humo-
rum affluxu, seu exacerbatā putridi spermatis virulenta exhalatione) versus dia-
phragma, aut ad alterum latus conuulsio: cui non raro ex retento menstruo ve-
narū obstructio coincidit. Quippe si nerui, venæ, musculi, adde, & cornua ma-
tricis mensium affluxu, aut viri coitu non humectentur, tūc exsiccata, faciliē ver-
sus diaphragma, & ad neruorū principium recurrit pariterq; si mensium reple-
tione p̄dictæ partes distendant, ad septum transversum irruit. Sic prorsus dum
sperma in vteri cavitatē, & vasis coaceruatū cōputruit, incredibile est quanto
neruorū musculorumq; nixu vterus conuellitur, vt eius virulentia exprimere
expellereq; possit, q̄ sanē exhalatio si ad cerebrum ierit, exhorresco dicere, q̄
fœua accidentia ac varia deliramenta proritet. Cum igitur diaphragma, præci-
puum respirationis organum, & præcordia, vteri ad superna conuulsione, coar-
ctata fuerint, nil mirum, & mulieres sic affectas, quas Græci hystericas dicunt,
suppressio arteriarū pulsū, & anhelitu, velut exanimes in terrā concidere. Con-
sistit itaque, ut ex Gal. 6. de loc. affect. c. 6. & li. 3. de artic. constar, vniuersa huius
affectus ratio in difficili quadā respiratione, & vocis priuatione, quæ penē ad
aphnæam omnimodā accedit: sic. n. inquit Gal. Veluti in eo affectu, quē nonnul-
li vteri suffocationē, alij spirationis ob vterum, ablationem uocant. Quæ sanē ac-
cidentia optimē Hip. complecti uisus est lib. 4. de rat. vict. (vel ut ego magis cre-
do ex Athænci snia. 2. diphosoph. Polibus) his verbis. Si quis (ait) repētē obmu-
tuerit, is uenarum obstructione molestat, id si sano absque euidentī occasio-
ne acciderit, venam brachij dextrī internam secare oportet, & sanguinē p cor-
poris habitū, ac ætate detrahē: & subdit, ut integram affectus notitiā præstet.
His sic affectis, accidit faciei rubor, defixus oculorum intuitus, digitorū in ma-
nibus tremor, dentium stridor, maxillarum vellicatio, extremitatum refrigerā-
tio, spirituum in venis, & arterijs conclusio: & iterum subdit. Si verò ab atre bi-
lis effluxu internæ corporis partes corroduntur, aut venæ aridiores factæ distē-
dunt, tunc inflāmatæ ad se humoris affluxū alliciūt: unde corrupto s̄guine, &
ita ob eius cōsistentiā concreto, vt spiritus per naturales meatus exire non pos-
sint, corpus, & viscera ifrigidari necesse est. Hinc morbos comitiales, vertiginē,

L

capius

capitis grauedinē, loquelæ priuationē, spasmos, & syderationē euenire oportet, **A**
 præsertim si talis sanguis, & oppilatio iam uel ad cor, hepar, & cauā eius uenam
 peruenerit. Hæc quidē & multa alia refert, q̄ licet Gal. ad hystericum effectum
 non retulerit, ego tñ feminis uterinis affectionibus molestatis adaptare semp̄
 studui. Quibus proculdubio constat optimē dictum esse Gal. Ani. & Constan-
 tino ad morbos frigidos huiusmodi affectum esse referendum.

Huius aut̄ affectionis triplex cognoscit species: prima, uehementissima, in
 qua laborantes pulsu, & respiratione priuantur, p̄terq̄ in medio pectoris, i quo
 oīum quid superest: in qua specie corpus uniuersum refrigeratur. Secunda
 quidem est, cū agrē laborantes spirant, licet sensu oīno non priuentur, cū hoc
 tñ pulsum habent paruum. Altera uerò est in qua præter dicta, brachia, & cru-
 ra et contrahuntur: cuius meminit Gal. 3. prori. he. com. 27. dicens. Conuulsio-
 nes in hystericis sine febre faciles sunt, ut Dorcadi: quibus equidem accedit q̄-
 dam anginae species, quæ ex resiccato gutture sit ab halitibus illuc ascendenti-
 bus ab utero, cui et̄ medebris per uteri prouidentiam sanguine missio cauens **B**
 ne ad ipsum ex supernis extrahas, nisi urgentia affectus grauis ad modū sit, sed
 semper utero prouidendū est. Quas proculdubio differentias iuxta causā uehe-
 mentiam, ac membri, cui affectus ab utero præstatur, suboriri necessum est. Ex
 quibus constat morbum hunc aliquando ad uteri intemperamentum simplex,
 aliquando ad idem cum humorum accessu pertinere: præterquam quod ad ute-
 ri situm, & figuram plerunq̄ reducitur, ut inferius patebit.

Verū quia consimiles huic affectioni plures aliæ reperiuntur, uelut est syn-
 copis, apoplexia, & epilepsia, ob id profectò necessum est, in quo dissideat, aut
 conueniant considerare, ne quis in curatione, aut cognitione facilē decipiatur.
 Conueniunt quidē p̄dicti affectus cum uteri suffocatione, q̄ repente in oībus
 laborantes obmutescant, & se continere minimē possunt, catetum dissident à
 syncope ex pulsu, quia in syncope pulsus aboletur, in suffocatione uerò plerun-
 que manet, licet exiguis, aut languidus, aut rarus. Itē in syncope sudor frigid⁹,
 & color plumbæus erumpit: at in suffocatione, aut color non mutatur, aut non
 nihil pallidus efficitur. Differunt quoq̄, quia syncopim leuat gratus odor, & **C**
 idem suffocationē euocat: sic etenim Auic. arbitratus est, & affirmat 2. 1. 3. tract.
 4. c. 17. hystericā passionem syncopi esse grauiorē, q̄ ipsam syncopis frequenter
 antecedit. Differt et̄ a catalepsi suffocatio, q̄ non habeat partes rigidas, & oculo-
 los apertos, ac in eodem statu permanentes. Dissidet non minus ab epilepsia
 conuulsione, qua carent, quæ uerē suffocantur citra alterius symptomatis com-
 plexum: aut saltem conuulsio si quæ adest, perpetuò affligit, non ut motus cō-
 uulsiuus: item suffocata non omnino sensu priuantur, ut epileptica: quippe re-
 cordantur plerunq̄ eorum, quæ audierunt, dum suffocarentur.

Verū dissidet ab attonito morbo: q̄ maneat, plerunq̄ sensus in hystericā
 affectione, & nō adest stertor, neq̄ semper refrigeratur corpus. Præterea in hy-
 stericis spuma signū est salutis, in alijs p̄focationibus lethale, ut cōstat ex Hip.
 2. aphor. 13. A lethargo etiam distinguitur febre. Caterum à uenenis frigidis,
 tribus maximē distinguitur: primo quòd non sudent, neque habeant liuorem
 vnguium & extremitatum, & syncopis, ac deliquium animi sunt longiora: nā
 & hæc si adsint in uenenatis moriunt: sunt et̄ in uenenatis, aut dolor, aut icterus
 aut

A aut uomitus. Verum quia solent hæc signa aliorum affectuum, etiã suffocationi grauiori accidere, ob id accidentia intueri oportet, ne aliquñ turpiter decipiamur. Causam huius affectionis potissimã, & immediatã esse vitium instrumentorum respirationi seruientium, eamq; ab utero mutuam non dubito. Quin proculdubio mille modis ipsa instrumenta lædi certum est, nimirum proprio temperamento uitiatum, vel humore ibidem contento exuperante, aut corrupto, uel ipsius uteri mutato situ, aut figura utcuq; euerfa. Ex quibus omnibus septũ transuersum per sympathiam afficitur, ac hmõ accidentia concitat, utero non quidem conuulso, sed ueluti in septum transuersum irruente, aut in aliam partem prolapso. Quod nullo alio modo fieri constat, q̃ dum uterus siccitate, plenitudine vel morfu alicuius venenosi, & putridi, versus illam partem quẽ afficit, irruens vi prædictarum causarum septum opprimit. Hip. tñ lib. de nat. mulier. & de mor. mu. solam uteri peruersionem censet, causam esse uarietatis symptomatum huius mali: quid uerò Hip. addendum sit, iam refero. Sunt aut huius morbi in genere hæc, quas diximus, causæ, verum accidentiũ uarietas quoq; forciat causas pro cuiusq; natura, & sorte: referam omnia, & singulis suam causam ascribam. Deficit primò in plerisq; ex toto respiratio, deficientq; ceteri sensus, & immobiles existunt pulsibus manentibus illæsis: quod fieri est necessum nõ ex uteri retractione solum, ut aliqui autumant, sed ex prauis halitibus cerebrum ascendentibus præcedentibusq; spirituum animalium liberum ad instrumenta actionũ adiũ. Carent aliquñ hmõ femine pulsu, idq; corde refrigerato ab eisdem venenosis halitibus, qui plerũq; frigidam naturam repræsentant aut suffocato, spiritibus retrocedentibus ad cor ipsum, caloremq; ueluti extinguentibus: quò fit ut sæpe extrema frigeant, & frigidus erumpat de fronte sudor. Accidit quoq; eisdem aded difficilis respiratio, ut quasi suffocari videantur: quod quidem fieri arbitror septo transuerso, & cæteris instrumentis respirationi seruientibus ex utero per uiciniam compressis, aut aliter malè affectis. Aliæ loqui minime ualent, sentiunt tñ leuiter, & optimè audiunt: quod una è duabus causis fieri posse constat, nimirum, quia halitus ille frigidus ad cor ascendens, respirationem interdicens, defectu aeris loquelam, & pulsus interdicat, indicium quidem cordis affecti uel accidit instrumentis respirationis immotis manentibus: quapropter aerem locutionis materiã trahere minime possunt. Fieri aut hac occasione constat, q̃ septo transuerso cõpresso difficulter respirant, & loqui conantur, licet non possint. Vterus igitur hæc oĩa uitia præstat, uel mutata propria figura, q̃ situm mutari cogat, uel temperamento eius plurimum ad frigidum subuerso: uel halitibus ab eo transmissis in partẽ secundario affectã, ut cor est, cerebrum, uel quæuis alia ex respirationi seruientibus. Cuius halitus rōne in hmõ affectu conspiciamus, utrum ita in tumorem eleuari, dum flatibus ibidẽ genitis uel aliunde trãsmisissis distenditur, ut mutata magnitudine, partes sibi proximas comprimatur, & illæ vicinas, donec per continuitatem septum transuersum comprimatur, & suffocari laborantes videantur. Quod et ad latus, & ad uarias partes procumbere posse dictum Hipp. est, & frequenter conspiciamus, ut inferius cõstabit cap. de uario uteri situ. Fit etiam id malum, dum uteri uasa aded humore implentur, ut mutata quoque uteri figura, idem, ob eandem septi transuersi compressionem, subsequatur accidens: licet ob aliam rationem symptoma hoc.

211. A.

L 2 profi-

proficisci ex hac causa quoque possit nimirum, eisdem vasis non solum humore, sed flatu eum repletis distensisq; ac ob id contractis. Quo fit, ut vena cava hac ratione plena ad iecur retrahatur, & ea parte maius malum laborans persentiscat, & sic arteria, & reliquæ partes, quarum vasa implentur: nam vasa, & cætera omnia mollia, dum in latum extenduntur, breviora fieri habent. Quod eleganti sententia Hipp. dixisse constat lib. 3. pop. dicens. Polemarchi uxori in morbo articulari coxæ dolor quidam vehemens, causa erat, quod menses non prodirent: vox interciperetur per totam noctem usq; ad meridiem, audiebat autem, & sapiebat, & per mantum significabat, quod circa coxam esset dolor. Quæ sententia euidenter constare arbitror, ex uteri immodica plenitudine huiusmodi perversiorem fieri, & accidere quoq; in uterinis passionibus aliquando auditum, & mentem superstites esse, reliquis potentijs, vel uoce interceptis. Igitur in vasis cumulatæ sanguis, aut turgens spiritus ea omnia extendit, vasa autem per tensionem, & repletionem breviora facta, utrum ad se retrahunt: idq; uel equaliter, & tunc uterus recta sursum ventericulum, & diaphragma versus ascendere videtur: vel inæqualiter, tunc autem vel in dextrum, aut in sinistrum, ad partem scilicet vehementius trahentem inclinat uterus, facturus quidem prædictam respirationem.

Itaq; utero grandiori facto, ac in tumorem elato, & retractis vasis ad sua principia suffocationem fieri certum est. Non enim verisimile existimo, uterum mutari, neque ut animal (ut multi censent) licet gratis odoribus delectetur, & fetidis horreat: nam id ex nativa quadam sympathia habet, sicut cæte a membra delectari, & gaudere alimentis sibi familiaribus habent ex naturali principio ipsis insito, ac respicere ingrata. Neq; ut membrum, quod moveri liberè possit, id efficiat: sed eo quod venis, arterijs, & filamentis alligetur varijs corporis particulis ob idq; repletis illi, nil mirum est, si uersus illam partem retrahatur. Quod sanè vitium Hip. appellasse uteri prolapsionem ad partem censeo: nam is est modus loquendi huius auctoris frequentissimus, quem reperies libris de mor. mul. Secunda porro causa ex ijs, quas retulimus, est frigidum uteri temperamentum ex frigido semine per corruptionem sic facto, cor & uniuersum corpus refrigerans: quo sanè ad respirationem, & ad alia munia inepta redduntur membra, & cuiusq; potentia: quo fit, ut uentilatione, ac refrigerio non egeant, sed sola sufficiat uniuersi corporis transpiratio, quod haud difficulter internoscimus expulsi exiguitate, & languore, quæ cordis, aut alterius visceris frigiditatem, attestantur. Tertia uerò, & vltima causa, quæ alias non paucas complectitur est putridus, & corruptus seu venosus halitus à putrida aliqua substantia ex utero proficiscens intercludensq; vias respirationi dicatas, compressis nimirum instrumentis vel obturatis meatibus. Quæ profectò causa prævalente magnas, & inæquales fieri respirationes contingit, sicut scæminas maxima angustia premi, donec excreto ubicunq; flatu, aut humidum putridumve aliquod uteri purgamentum natura pellat, affectio subsideat. Ex qua ite causa, sicut ex plurimis alijs deterrima figura utero comparatur, & vitiatas subinde situs acquiritur, quibus mille accidentia ex ijs, quæ uterina censentur, scæminis succrescunt. Recenset quidem ea Hipp. lib. 2. de mor. mul. per hæc verba. Porro omnis occasio uteros pellere potest, si quid malè habeant: nam & à frigore pedum, ac lumborum, & à salutatione, & terrore, & lignorum sectione.

Actius

A Actus tñ, & alias recensent causas, aut externas, aut manifestas, quas ego cōsul-
 to prætereo. At Hipp. referens eodē loco differentias huius prolapsionis paulò
 superius inquit. Dico aut cum vteri ex loco moti fuerint aliò aliàs allabuntur:
 ad quemcunq; verò locum allapsi fuerint, dolores ingētes incūbunt (& subdit
 partes recēdens) & si q. vesicā contingat, dolorē exhibēt, & urinā non suscipiūt.
 Et refert. Si verò ad sedē conuertantur vteri, secessus excrementa impediunt, &
 dolores occupant lumbos, & intestinum rectum ac inum ventrem, & podicē:
 ac pergit dicens. Si vteri ad sinistrā partē ac coxā declinauerit, dolor acutus, ac
 vehemens hēt lumbos, & laterum mollitudinem, ac ipsum crus, & claudicat.
 Et multò inferius prope finē libri inquit. Si cor strangulatur ab vtero, reprimi-
 & spiritus hēt, & anhelatio: & refert iterū. Si verò sub septo trāuerso ac pcor-
 dijs vteri sedere videant, de repente voce destituunt, & præcordia dura fiunt, &
 strangulatur, & dentes conferit, & vocata non audit. Dixerat quoq; eadem Hip-
 po. ipse lib. de nat. mul. fidem præstans prædictæ sententiæ. Cum verò ad pcor-
 dia vteri allapsi fuerint, suffocant, & ubi frequenter acida euomunt, ad modicū
B tempus melius habet. Sic uteri obliquitatem, inflationem, & extorsionē ea quo-
 que parte refert, & ipsius ēt motum ad caput, ad cor, ad coxā, ad pedes, ad ma-
 nus, & multa alia in situ vitia recenset. Quæ quidē vel ex prædictis causis exter-
 nis, ubi vteri malè habuerint, cenſeo posse proficisci, vel ex semine & sanguine
 menstruo corruptis, aut quouis alio vitiatō excrementō vterum infestante.

*Si ex fla-
 tu fiat
 accessio.*

Sed, consideratione hac in parte dignū iudico expendisse, an seminis, & san-
 guinis menstrui corruptio (quā tantorum malorum cām esse diximus) intra vte-
 ri cauitatē fieri teneatur, vt hæc mala moliri possit, an potius intra eiusdem uteri
 vasa. Cui dubio dicimus, certum esse in vtraq; parte has substantias posse cor-
 rumpi, & ea mala efficere. Censeo quidē in hac re vteri motus & peruerſiones
 plerunq; ex valorum plenitudine à sanguine menstruo, & semine facta contin-
 gere: & ex hac etiam cā vteri strangulationes proficisci: licet ex flatu corpus vte-
 ri distendente non rarò succrescant. Verū ea mala, q̄ ex corruptione harū sub-
 stantiarum prodire conspiciamus, frequentius extra vasa corruptis semine, & sā-
 guine menstruo delapsis prope testes, & in vteri cauitatem, ac non purgatis: ēt
C si, vt mea fert sententia, non rarò intra vasa ipsa putreficri contingat, efficereq;
 febres, & alia accidentia, quæ diutius durant, q̄ vteri strangulatio, & pleraque
 ex ijs accidentibus, quæ subito cessant. Quippe coniectabile est, mala, quæ diu
 durant, & diuturnas virginum febres, potius ex causa conclusa, & intra vasa la-
 titante fieri, quā ex ea, quæ in vterum prolapsa haud difficulter purgari pos-
 sunt. Ex quo quidem arbitror, hystericas virginum affectiones maiori ex parte,
 ex semine, & sanguine menstruo intra vasa vitiatīs fieri (licet ex eisdem in vterū
 prolapsis aliquando rarius tamen id succrescere contingat: præsertim in gran-
 dioribus, & ijs, quæ salaces sunt vitamq; degunt sedentariam, ac virorum lo-
 quelis, & contactu vtuntur & gaudent) eas verò affectiones, quæ viduis acci-
 dunt, plerunq; ex eisdem substantijs in vterum prolapsis in eoq; putridis profi-
 cisci credendum est, vt euidenter constat ex vteri purgamentis, quæ plerunque
 habent, quæ suppressa facilè hystericum affectum accrescunt. At in sterilibus,
 & virginibus, ac solidæ contexturæ fœminis intra vasa huiusmodi putredines
 fieri, vt plurimum, arbitramur.

L 3 Sed

Sed dicet fortasse quispiam qui fieri possit, hanc substantiam corrumpi intra propria & naturalia loca, cum id accadat frequentius his substantijs dilabentibus, in loca non naturalia: præter quàm quòd si intra vasa putrefieri aliquo modo possunt, multò rectius id fieret in omnibus feminis parum ante menstruationem, concludo ibidem sanguine futuro menstruo. Cui dicimus, non minus id fieri posse, quàm dum sanguis id februm generatione intra vasa putrescit, prohibita naturali caloris ventilatione: sic virgines, & solidioris contextura vidue, præsertim iuuentulae, cum ob naturalem meatuum constrictionem improbe purgentur, plerunque ea mala perpetiuntur semine, & sanguine menstruo intra vasa putrescentibus. Quo fieri arbitror, ut virgines frequenter febricitent, & febris non sit admodum intensa ac periculosa, quia minera putredinis longè distita sit à corde: at viduae, & quæ viro vniuntur maiori ex parte refrigerentur, ut pote semine, & sanguine extra vasa prolapsis, & putredine vel corruptione alia refrigeratis. Contingunt quoque hæc eadem mala ex læuigato, & nimis uacuo utero: sic etenim ad loca humida sese conuertit, & à capite ac reliquo corpore (immodico etiam labore) siccatus trahit: quòd gravidis accidere quoque potest inopia alimentum, aut concalfacto labore utero. Quamobrem Hipp. dictum esse celsio li. i. de mor. mul. in ediam esse utero affectus perniciosam: inquit enim. Si suffocatio de repente accesserit. fit autem maximè his, quæ cum uiris non coeunt, & seniores magis quàm iuuenibus. Leuiiores. n. uteri ipsarum sunt, fit autem potissimum tunc, ubi mulieri vasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit reficcata à labore uteri conuertuntur, ut qui vacui sint, ac leues: qua sententia arbitror constare, ex siccitate, & inanitione proficisci non raro uteri conuersionem, uel ad coxam, uel ad hepar, uel ad alias partes, ut Hip. mens est loco nuper citato: licet Gal. 6. de lo. aff. ca. 5. quodammodo huic sententiæ videatur refragari, docens utrum nullum situm mutare; Sed uelim ego hac in re monitum lectoris, ne intelligat Hip. id intellexisse, ut uerba sonare uideatur, nimirum, uterum hanc, aut illam partem peruadere, sed quod uteri uasa uelligamenta ex ea parte distensione, siccitate, aut inatione conuellantur, dannumque circa eandem partem inferant, haud secus quàm si uterus eisdem partibus incumberet: nam hoc est, uterum ad humiditatem concurrere, ut Hip. refert. Quo sanè in sensu uolo intelligi loca illa Hipp. quibus docet huc, & illuc uterum vagari.

Contingit ultimò uterum affici, & prædictam suffocationem efficere, & defluxione à capite uel quauis alia parte facta, aut ex susceptione aeris, cuius ratione inflari conuiiente collo contingit. Dimitto etiam consulto hac in parte uteri inflammationes, & alios affectus, qui solent huic malo causam præstare, quorum suo loco latius meminero. Neque est ab re toto animo expèdere causas quoque procatarticas, utpote quæ non raro id malum efficere assuescant: ut frigiditas intro pellens superfluum humiditatem: exercitium plurimum dissoluens: quies, quæ plurimos generet succos, eosque crudos, ac uitiosos: somnus multus: ueneris intermissio: prauis succi alimenta, & grauiora animi pathemata, quæ proculdubio omnia uel per se, uel internis causis commotis, affectum hunc excitare nata esse comperimus.

Instantem huius affectus accessionem planè ostendunt ea ferè signa, quæ præsentè, licet non æquè intensa: nam dum imminet, torpor mentis accedit, pigritia,

Signa
causarum
& affectus

- A** crurum imbecillitas, pallor faciei, & iam approximante affectu, sopor grauis desipientia, sensum interceptio, vocis priuatio, crurum contractio, quibusdam risus, alijs lachrymæ, alijs vtrunq; plerisq; oris ventriculi morsus, cibi fastidiū, nausea, & omnium rerum veluti obliuio quædam: item pulsus debilis, cordis palpitatio, dolor capitis plerunq; cum rubore labiorum, faciei, & oculorū, qui etiam interdum sic clauduntur, vt aperiri facili nequeant: interdum tristantur, aliquñ vertigine corripiuntur, aut stupent, vel, licet intelligant, & audiant, respōdere tamen non possunt, vt de vxore Pollemarchi retulit s. pop. Hipp. adest etiā quibusdam murmur in hypochondrijs: alijs venter tumet, & dolet ita, vt se erigere non possint: siti plures cruciantur putredinoso halitu fursū ascendēte: crura quoq; imbecilliora ceteris partibus existunt: corpus etiam fit pigrum ad omnes motus voluntarios. Quæ omnia proculdubio augentur muliere iam suffocatione apprehensa, & contractis antrorsum cruribus, quæ in spinā veluti mortua cadit. Quibusdā cum sic afficiuntur, ab vtero instillat seorsum quid, aut spermati simile aliquñ insensibiliter, aliquñ verò cum delectatione excretum, præsertim plus iusto tractatis pudendis partibus, alijs effluit flatulenta pituita, alijs perfectibilis. Quorum signorum Hipp. meminisse constat lib. 2. de morb. mul. per hæc verba. Cum vterus strangularit, spiritus autem aceruatim fursū commotus fuerit, & grauitas incubuerit, & mens percussa fuerit, & loqui nō potuerit, & perfrigeratio adest, & spiritus offendens, & oculi obscurantur. Qua parte multa alia recenset prædictis simillima, quæ breuitati consulens prætermitto.
- Cū ad rectam medendi rationem proficuum sit, nosse affectus ipsius causam, & occasionem, ob id nobis in animo est hac in parte huius affectionis cās exquirere. Primo quidem vteri intemperamentum ei malo principium præstare venabimur ex sequentibus c. quæ docent intemperantia vteri curare. Sanguinem tamen menstruum huic malo occasionem porrigere, ostendunt multa: prius menses præter consuetudinem, & tempus suppressi, vel ob improbam vitæ institutionem, quæ crassum generat sanguinem, vel quia ora uasorum, p. quæ labitur in vteri cavitatem, clausa sunt: quod ex priuatione signorum aliarū causarum facile discis: item māmæ turgent lacte, totum corpus graue efficiē, & partes colli, & oculorū dolent, sic, & partes iuxta renes, & femora: rubent item supremæ partes ex calfacto retento sanguine, aut vitiatō alijs humoribus simul redundantibus. Quod noscimus, quia si causa noxæ frigida est, vniuersum corpus adeo refrigescit, vt vix sensu pulsū deprehendas; si acris materia extiterit, conuulsionem excitat: si melancholica, mororem, animi uerò deliquia ob accessum vehementiam, & maximas refrigerationes, ac oris ventriculi uitia provenire cōperies. At semen esse uitiatū, & abūdās ostēdit uidua iuuenula, & boni habitus: itē accidētū aliarū accessionū uel p̄sentis grauitas, & sæuitia, & cubitus casus: quia semē tenuius est, & acutius sanguine ipso. Sic. n. his, q̄ ex cā laborāt, pulsus, & respirationis priuationes, cōuulsiones, & animi defectiones magis insūt q̄, ut Gal. refert. 3. de lo. pat. ab excreto multo, & tenui semine, aut pauco, & crasso prius liberat. Cōstat quoq; hāc esse cām, quia mēstruæ purgationes optimē p̄deūt, cū hoc m̄ laborās nullū, aut tenue p̄sentit leuamē. Verū an sit accessionis causa acēsus uteri, ut ferūt, uel recursus ad superiora, aut (ut rectiūs loquar) uasorū illius partis cōuulsio, cognosces, quia symptomata sunt suffocationi, pxi-

ma, adest suspirium, vertigo, capitis dolor, cibi fastidium, nausea, ructus, & intestinorum crepitus: sentitur quoque grauitas, & compressio tanquam à rotundo aliquo corpore circa umbilicum. Quòd si vterus peruertatur versus partem anticam, posticam, laeuam, aut dextram, foeminae grauantur, dolent, tumentilia, uel pecten, vel vesica, aut rectum intestinum iuxta partem, cui uterus incumbit: quòd etiam manifestum sit, quia si foemine eo tempore viro vtantur, adeo os vteri puerum apparet, vt semen protinus dilabatur. Signa verò, quae foeminas hoc modo affectas viuere, aut posse uiuere, vel morte periclitari ostendunt, sunt (præter lanæ floccum naribus appositum, aut vas aqua plenum super ventrem situm, aut speculum, quod halitum respirationis suscipiat) quae ab sternutatorijs pharmacis desumimus: nam facillè cognoscēs foeminam uiuere, si appposito aliquo sternutatorio cerebrum quodammodo moueri uideatur: quod solet etiam mirum in modum monstrare pilorum atulsio è pudendis partibus facta: quòd si his non reducatur, periculum est, ne mortua sit foemina, uel morti proxima. Periculosas item eas accessiones iudicamus, quae præter id quòd frequentes sint, diu protrahuntur, & in quibus spiritus summe difficilis est, pulsus creber, & ordinis expers, aut ex toto abolitus, summum corpus in his frigido sudore madescit, moxque syncopis sequitur, & aliquando mors. Minus profectò graue vitium est, in quo hæc, quae proposuimus, omnia reperiuntur solo illaeso spiritu: & rursus minus graue, in quo sensus, & motio integritatem habet. Præterea, morbus is quibusdam quasi circuitibus, vt comitialis, mouetur: incidi quoque magis hyeme, & autumnò, maximè calidis atque humidis puellis, & viduis et, quae præter morem viro diu carnere: item his, quibus sterilitatem medicamenta conciliarunt. Grauidis aut licet diu menses supprimantur, symptomata hæc raro accidunt, quod humorum parte puriore foetus in vtero alatur, reliquum crassius in uasis ad uterum pertinentibus, in secunda ad partus expulsionem seruetur integrum, aut non ita corruptum, nisi aliunde, ut ex febre magna, aut prauo uitæ instituto, uel antiquo uteri intemperamento vitium accesserit: cuius sortis nonnullas foeminas cognouimus, quae, & menstruantes, & vtero gerentes hoc affectu haud leuiter premebantur. Accidit non minus id malum a pituita putri quam plurimis foeminis, iisque natu grandioribus, & mensium, ac seminis annos egressis, vt sexagenarijs, & septuagenarijs. Quod etiā vitium ex hac causa commune est iuueniculis, quae victu utuntur parco, & potu largo, atque intempestiuo aquae aut vini.

*Curandi
ratio.*

*Accessio
nis prou
alientia.*

Cum dictum superius sit, causas huius affectionis in genere triplices esse, triplicem quoque medendi rationem fore, subinde necessum esse arbitror: idque non solum in uera curandi ratione a causa ipsa principio sumpto, verum, & in ea, quae accessioni debetur. Non enim vterunque fas est, foeminas sic affectas ab accessione reuocare: sed aliter eas, quae ex uteri retractu, aliter quae ex semine corrupto aut sanguine menstruo, & vltimò, aliter eas, quae ex flatu iacent: quod pari prorsus ratione sub intelligendum est de singulis causis. Dictum quidem est, contingere omnem uteri strangulatum aut subuersa ipsius figura, aut mutato temperamento proprio uel humorum, uel ab halitibus ipsum distendentibus, aut principem aliquam corporis particulam irruentibus consortio venarum, aut artiarum, vel quouis alio modo. Sic dum figura vitiata strangulatum infert (præter quàm quòd, vt Paulo placet, cibo potuque eo tempore vtendum uon est)

A est) corpus eo situ locare oportet, quo citius ad pristinam figuram, & situm vterus reducatur. Sic accliuibus scapulis, femora, ac inguina in decliuem locū prona locentur, quo tpe omni ingenio curandum est, vterum reducere frictionibus ventris deorsum factis, crurum vinculis, cucurbitis et suris, femoribus, ac inguinibus affixis: q̄ si prodesse non videatur, umbilico eas apponere oportet, quo citius ad proprium locum euoluatur vterus. Præstat et, sicut in omni alia causa, pilos digitorum pedum uiolenter euellere: sed feminas sic affectas citius ab accessione reuocat pilorū ē partibus pudendis violenta emulsio. Ceterū q̄a naturali quadā sympathia uterus prauos odores auersatur, amplectiturq̄, ac sequitur gratos: ob id natibus quæ fatida sunt, ad mouere oportet, qualia galbanum, assa fetida, opopanax, castoreū, bitumē, oleū exgagate, & sulphuris, vel pilorum, aut papiri cōbustio, & alia huius cēsus, quibus et digerendi qd̄ in vtero est, facultas inest: à quibus abstinendū esse consulo, si femina epileptica fuerit. Prodest et odor lucernarum extinctarū, aut fumus ex vltis plumis potissimū perdicis: fumus itē ex corio, & ē fœce: capilli quoq; hoīs, cornu cerui vel alterius animalis, aut ungula: lana itē combusta vel planus, quorū proculdubio uapor seu fumus sua fœditate nterum tristatum descendere coget, ac spiritū animālē, & uitalē quasi sospitos spergefācit, & vaporem infestissimum, à quo vterus deturbatur, resoluit contentq̄. Possunt itē ex prædictis vsui parari medicamēta, exceptis pice liquida, galbano, & similibus. Sic vtile paratur immedicamētū ex galbano, aceto dissoluto, & ex castoreo, ana. ʒ. ʒ. ē sulphure viuo. ʒ. ʒ. ant̄ eodem aut conizā, & iuniperi baccas incoquere. Itē vinum in quo ferbuerint camedrys macerata, & betonicae folia trita. ʒ. ʒ. mufa exhibita. Sed Gal. 6. de cōpo. phar. lo. refert ʒ. ʒ. agarici potui datā mirificē conferre. Itē sternutamentum mouere plurimum cōfert puluere tenuissimo piperis, nasturtij, & sinapis, quo plures pristino statui restitutas cōspeximus. Verū q̄a plerūq; caput ab accessione male hēt, ipsum, & spinā inungere cōuenit oleo de spica calido, vel alio cōsimili, Vtero ad mouenda interim sunt, q̄ grati, & boni sint odoris, tū quia prauos halitus ad se elliciūt q̄ tali existunt, natura gratū insequente: tum uerō, quia & ipsos discutunt, & partes pudēdas aperiūt, ac laxāt, ut aliquid facilius expurgari possit, p̄terq̄ q̄ uterum ipsum sympathia quadā ad se reuocant, & ob id ad naturalē sitū reducūt. Neq; credēdū ex hac causa est, vterum animal esse sensus, & motus particeps, sed quia rebus à natura productis oībus inesse animā appetitiuā cōstat: vñ, & plantas animalia ob id esse, ac appetitu cognito ad sibi conferentia moueri censendū, quo appetitu allectus vterus insequit bonū odorē: & ob id sit, prauos halitus dissipare, & qualitate odoratorū tueri propriā naturā, nō qd̄ odorē pcipiat, sed quia odorata oīa hēant certā qdā naturā ipsi summo pere gratiā, & amicā. Eadē quoq; rōne hepar dulcia affectare, heliotropiū ad Solis accessum, magnetē septentrionē versus se inclinare uidemus: qua et uterū odorata confectari, grauiter olētia abhorrere experimur: qd̄ in mēbris nostri corporis vtile amplexantibus trahentibusq; , & contrariū rei iacentibus verū quoque existit. Sunt autē ea, q̄ id munus præstāt veluti ziberū, bombax muscatus, uel gossipiū muscho conspersum, oleū muscho perfusum, galia muscata, alypta muscata, & gariophyllū, atq; alia huius cēsus uelut oleū iasmini, naphthæ, styracis, cinnamomi, itē cinnamomū ipsū, cost⁹, calia, lignū aloes, diābra, & dimoschū.

Sed

*Aut po-
ne aures
paruas
cucurbi-
tes affi-
gere.*

Sed immittere oportet in finum pudoris, & vteri cervicem, quæ ex his cõpossi-
na prodesse comperimus, quale illud est, quod recipit alyptæ muscæ. ʒ. ij. ligni
aloes, gariophyllorum ana ʒ. j. musci, ambre, ana g. v. excipiantur oleo de spica,
additis styrace, balsamo, aqua muscata, vel alia odorata, cum ladano fieri pos-
sunt pelli, qui in vteri collum immissi plurimum profunt: præterquam in vir-
ginibus, quarum pudendum sat est inungere.

Sed antequam alias huius affectus causas aggrediar, recēdere hac in parte mi-
hi visum est, qua curationis lege Hipp. ab accessione reuocabat fœminas, qui-
bus uterum à sua sede dimoueri contingebat. Quam sanè si quis attento animo
intueatur, reperiet facillè cõsimilem esse in omnibus ferè huius auctoris scriptis.
Nam lib. de nat. mul. postquam vteri varium situm recensuit, inquit. Postquam
igitur allapsi fuerint, tepefactoria adhibeto, & graueolentia suffito, infra autem
odorata, & castoreum bibendum dato, & conizam: vbi verò deorsum processer-
int, infra graueolentia suffito, sub nares autem odorata, sedatis autem dolori-
bus pharmacum bibendum dato. Qua sententia videtur, vniuersam curationē
complexum fuisse, sicut lib. 1. & 2. de mor. mul. qua parte instituit curationem
ex fomentis, lana, spongia, aut vesica oleis imbuta, & vteris adhibita: ex ijs etiā,
quæ modicè flatus discutiant, & vteros ad inferiora euocent. Sed potissimam cu-
randi rationem, adducit idem auctor lib. 2. per hæc verba. Caput quam citissimè
radito, & per fasciam supra umbilicum, si opus fuerit, deligatam detrudito: da-
to autem castoreum, & conizam, & ruthæ aquam, cuminum æthiopicum, ra-
phani semen, sulphur, myrrham: ad nares graueolentia, ad vterum beneolentia
adhibeto. Cuius census millies repetitam eadem parte reperies curationem: cē-
seo quidem mixtam confusamq; Hipp. ex curatione, & reuocatione ab acces-
sionibus afferre non rarò curandi rationem. In qua re Hipp. laudo consiliū, qui
fœmora, & inguinæ inungit, quod virginitatis præcauendæ gratia, virginibus
proficuum fore censuit: etiam si alia ratione id fecerit auctor, nimirū, ne calidio-
ribus pharmacis excandescant plurimum: inquit. n. lib. de natu. mul. virginem,
vt viro cohabitaret, persuadeto, ad vterum verò nihil adhibeto. Atq; hæc sunt in-
ter alia pleraq; quæ consultò prætermitto, ea, quæ ab Hipp. ad uteros è sede di-
motos afferri constat, mihi tamen arridet magis eam curationem instituere, &
eidem, in reuocandis ab accessione fœminis, inniti, quæ semini, flatui, & sangui-
ni menstruo corruptis proficua esse constet. Fœminæ, quæ ex sanguinis men-
strui abundantia ob retentionem, hoc affectu premuntur, non vtcunque leuari
ab accessione desiderant: raro enim eis prodesse conspiciamus fœtida, neq; odo-
rata, rariùs adhuc cucurbitas, quinimo obesse plerunq; assolent. Quamobrem
eas reuocare oportebit, si periculum suffocationis immineat, sanguine misso ex
talo: nam licet in alijs causis id auxilium tentare nefas esset, sanguine tamē, aut
semine suppresso, præsertim in fœminis quibus sanguinem abundare cognosci-
mus, tutissimum, & utilissimum existit præsidium: nullo enim alio vires onere
pressas, vias nimia redundantia obæcatas, & suffocationis periculum leuare ci-
tiùs poteris. Præterea, clysteria immittere frequenter præsidio est, præsertim si ea
receperint medicamenta, quæ vterum respiciunt, qualia diximus. li. nostro de
psid. indi. Cui quoq; vsui glandes p sedē inijcere oportet ex cumino, ruta, hiera-
simplici, & carycis. Idē beneficiū p̄stare cognoscim⁹ cucurbitas suris, fœmorib⁹,
& pro-

A & prope inguina cū scarificatione, aut citra ipsam affixas: quo quidem casu eas umbilico apponere citra deiectū, vt vulgus oīno imperitū efficit, periculosum & graue plerunq; est, ob plenitudinē vīarū vteri. Inungere quoq; ventrem inferiorē, & totā vteri regionē, pectinē, & lumbos ijs, quæ humorem, & flatu at-
 tenuent, & vias dilatent, necessariū, & vtile experimur, ut per vteri meatū aliqd erumpat, quod facilius accessio quiescat. Est autē huic vsui aptum medicamentū oleū irinū, de croco, de anetho, de lilijs albis, de ruta, ac de nardo. Admiscere ē oportet, q̄ modicē ventrē & vterū ipsum laxent, veluti oleū amygdalarum dulciū, vel sesaminū, ne si humores tenuari cōtingat, maiores efficiant dolores ob maiorem p̄dictarum partium tensionē. Vteri et osculo, quæ trahendi, & expurgandi ab eodem vires obtineant, adhibenda sunt: virginibus facta iuxta inguina inunctione: corruptis verō immixtis intra vteri osculū pessarijs, q̄ ex nuper dictis medicamentis faciliē parabis, quorū copīa hoc cap. paulō inferius abūdē reperies. Vinculis itē & ligaturis fortissimis vtendū erit, præsertim prope digitos pedum, & suras, ac fēmora, quo factō sepe humores ad inferas sedes euocātur, & halitus retrahuntur, quibus ocysimē accessiones cessare solent.

B Quod si ex retento semine accessiois vehemētia suboriat, citra vllam vacuationē rem oēm agere oportebit: præterq̄ clysteribus iniectis, vel suppositorijs, quæ irritata alio aliquid ab vtero, vel circūvicinis partibus extrahere sint nata. Conficiuntur quidem ex hiera, mercurialis succo, & oleo liliorum: à quo auxilio ligaturis partiū extremarū, frictionibus, pilorum auulsionibus, & vellicatis quoq; narib. & auribus, vociferationibus, tandē motibus vehementibus excitare laborantem oportebit. Cucurbitas et affigendas esse prædictis partibus consulit rei rō. Sed cauere hac in re oportet à titillationib. quas multi cōsulant in partibus pudendis fieri, et si fēminas ob id leuari excreto semine conspiciamus: nam scimus nō licere medico christiano. Est autē utile pessarijs, & inunctionibus p̄dictis uti, donec vi medicamēti aliquid spumose, aut aquose substantiæ externa. Conficiunt huic vsui pharmaca hac lege: excipe alyptæ muscatæ. ʒ. iij. ligni aloes, gariophyllorum. ana. ʒ. i. musci, ambre. ana. g. iij. excipiant oleo de spica, & cū cera fiat pessarium. Cui consimile efficies, si exceperis galliæ muscatæ. ʒ. j. cinnamomi, & gariophyllorū. ana. ʒ. j. ambre, muschi. ana. g. iij. ladani, styracis, ana. qd sit satis, ut fiat suppositorium. Inungere quoque pudendū oportet, & vteri externā regionē oleo costino, de lilio, de spica, laurino, uel ex angelica herba confecto, additis puluisculis nuper dictis. Itē umbilico emplastrū aliquod p̄ matrice appones, uel gummi aliquod ex ijs, q̄ nuper ex India asportantur, ut carannā, techamachā, uel balsamum, aut styracem liquidam, uel oleū de styrace, & alia non pauca, quæ caliditate pollentiā, huic vsui non parum cōferunt atqui salacibus fēminis calidis, aut uirginibus admiscenda esse ijs, quæ utero possunt, alia q̄ caliditatē contēperant, cōsulit rei rō, præsertim si eis adderis q̄ semen minuunt, aut refrigerent, ueluti agni casti semen, corallum præcipue album, rosam albam siccam, semina plantaginis, & eius naturæ alia. Verum ī uiduis, & grādiōrib⁹ fēminis, & ijs, qbus pituita, & reliq̄ succi frigidi abūdāt maioris efficacīe emplastrū efficere oportebit. Cui⁹ naturæ est id, qd recipit alyptæ muscatæ, pulueris gariophyllorū, & angelicę. an. ʒ. j. pulueris rosarū, et coralli albi an. ʒ. j. terebinthinæ, & cere, quod sit satis, adde ambre g. iij. Itē aliud conficies

*Si ex semine
fiat accessio*

ficies, quod recipit galliæ muscatæ, diambre. an. g. x. pulueris santhalorum om
niū, coralli, agnicasti, & rosarū albarū. ana. ʒ. j. ladanī depurati quātū sit satis,
ut fiat emplastrū. Aliud ē parabis vsui pficuū, qđ recipit olei naphthæ. ʒ. j. theria
cæ magnæ. ʒ. j. pulueris galliæ muscatæ. ʒ. l. zibeti. ʒ. j. pulueris seminis angeli
cæ, cinnamomi, & gariophyllorū, ana. ʒ. galbani. ʒ. ij. ladanī depurati quod suf
ficiat. Aliud etiā maioris pretij cōficiēs qđ recipit, olei cinnamomi, de spica, &
balsami. an. ʒ. ij. pulueris cinnamomi, macis, gariophyllorū, & seminis angelicę
ana. ʒ. j. galliæ muscatæ, alyptæ muscatæ, diābræ, & diamusci. an. g. v. ceræ, & te
rebēthine qđ sit satis. Ex vsu quoq; erit emplastrū ex sola theriaca cōficere, qđ tā
to erit efficacius, quātō venenosior extiterit humoris natura, Qđ si alias velis ex
periri emplastrorū formas varijs vsibus pficias, abūdē paulō inferius reperies.

At si ex flatu vterū distēdente euertereq; eiusdē figurā, ac circūstantia mē
bra cōprimēte, in accessione fœmina incidat, curandum est omni arte flatu
discutere. Primò quidē clysteribus discutientibus, qualia superius diximus: qui
bus addes oleū rutaceū, aut irium, vel in quo cuminū ferbuerit, vel anisum. In
unges quoq; infernā aluum prædictis oleis, præsertim si eis addideris theriacā. B
Profunt etiā fomenta ex decocto chamæmeli, anethi, thimi, feniculi, rutæ, artemi
siæ, anisi, cumini, baccarum lauri, & similibus. Pessaria itē adhibebis, potissimū,
quibus additū sit aliqd flatū discutiēs, velut est puluis cumini, rutæ, anisi, cashe
cinnamomi, ligni aloes, & costi. Quā sanē cā existente incredibili efficacia con
ferunt cucurbitæ circa scarificationē frequēter vmbilico affixæ: quinimo cēseō
ob hanc cām solū ventri esse apponendas: nā licet muliercularum vulgus in
quavis suffocatione eis utatur, pficias magis hac cā pualente esse arbitror. Qua
pp cautē in alijs causis, aut nunquā eis vtendum erit: quā itē cā existente vmbili
co emplastra pro matrice apposita mirum in modum profunt, quæ faciliē para
bis addito prædictis aliquo ex discutiētibz puluisculis, veluti est lignū aloes,
cuminum, anisum, cinnamomum, costus, chamæmelum, & eius naturæ alia. Ex
quibus ē sacculum parabis, & ventri calidū frequenter adhibebis, sicut & ple
raque alia, q̄ flatibus discutiendis idonea reperiuntur, ac nos adduximus li. no
stro de præsid. indica. Cōsideratione quidē dignū existimaui hac in parte expē
disse, an sic affectis vinum porrigere tutum sit: quippe Hipp. id vī consuluissē li. C
i. de mul. natu. dicens. Si vteri ad hepar accesserint, muta de repente fit mulier,
& dentes conferit: tum manibus subtus depelle, ac infra hepar, & hypochōdria
fascia mulierē cōstringito, ac ore aperto vinū odoriferum infunde, naribus gra
ueolentia offer, subtus verò aromatis bene redolentibus suffito. Quā snia freti
xerit, his verbis. Cane ne des eis in potu vinum, qm̄ aqua est eis convenientior,
neque carnes grossas, & ea quæ addunt in carne, & spermate. Verū si quis rei
huius veritatē, & vtriusq; autoris mētē æqua lance expendat, reperiet, neque se
bi accessionibus ob virtutis languorem, & spiritus coarctationem syncopis cre
brò coincidere solet: quamobrē Hip. accepta à virtute defecta indicatione, quæ
ceteris præpollet indicationibus, pro reficiendo uirtutis robore, aperto egrota
tis ore uinū odoriferū instillari iubet. Auī. verò ex sanguinis redūdātis, & coa
ceruati in vtero spermatis copia præfocatio oborta fuerit: tū ea quæ sanguinem
& sper-

A & sperma in viduis uirginibus, ac reliquis ad iugent, rectè vetat, qualia sunt caro, & vinum. Verùm si uteri prefocatio ex obstructione venarum eius a sanguine crasso facta prouenerit, tum ego aquæ potum penitus dissuaderem, vinumq; album, tenue & dilutū magis vsui esse arbitrarer, præcipuè si in eo, vel in aqua ei admixta; quæ menses mouent, ut libanotis, schinantum, pulegium, & grana iuniperi prius macerata fuissent.

Licet plerisq; facile videatur veram genuinamq; huic affectioni curationem ascribere, mihi profectò difficillimum uidetur: adeo ut scribentium incuria, & medentium negligentia totum morborum uteri negotium, alioqui granissimū mulierculis, ex vulgi opinione potius, quàm medicis, nec peritissimis quidem, committendum sit. Quamobrem ne in turpi hæc ignoratione versemur, paulò diligentius rem hanc expendisse oportebit. Curandi igitur ratio in uteri suffocatione tota complectitur partes ac methodos, quot causarum differentias affectus ipse. Atqui cum is proficiat vel ex sanguine menstruo adaucto, putrido, & mille alijs modis uitiato; uel ex semine corrupto, aut exuperanti: ac utimò ex flatibus ab eisdem, aut alijs humorum spurcitijs proficiantibus: ideo profectò quid unaquæq; causarum præ requirat, seorsum pensandum est. Dimittito etiā hac in parte externas, & manifestas causas, inflammationes, & aliòs peculiare uteri affectus, quia eorum latius meminero paulò inferius.

Si uero menses abundauerint, & huic malo principium prestiterint, non quidem ut suppressos menses eos tractare oportet: sed considerandum prius est, putruerit ne sanguis, alteratusue fuerit, uel aliud contraxerit (præter copiam) uitiū: nam his profectò rationibus dixit Hipp. lib. de mor. mul. feminas ex utero suffocari. Inquit loquens de sola mensium suppressione. Hæc igitur causa est, ut ipsi sint occlusi (& subdit) quin suffocatio alias atq; aliàs ipsi irruit. Et refert mala, quæ tertio, aut quarto mense feminis accidere possunt, si illis menses superprimantur, aut ob externa uel internam causam retroierint, ut accidisse sorori Liciniæ reuoluit Hip. lib. 7. pop. tex. 86. cui uomitus omniumq; accipiebat superuenerunt, & cruenta per uomitum excretiones, & strangulatio ad cor procedebat. Qui sanè affectus sanguine misso facile subsideat. Verùm sanguinem mittere non utcumque licet, sed cum præ copia fluere menses desierint, primò ex brachijs ipsum de trahere oportebit, postmodum uero ex talo, idq; tempore, quo menses fluere assueuerant. Postea in medio mensis ex altera saluatela tutissimū est sanguinem mittere, ut medicamentis menses ducentibus subsit locus; qualia hæc sint, c. de mensium suppressione reperies. Confert item tam ijs, quibus sanguis ex obstructione abundat (quo tempore ex talo primitus sanguinem mittes) quàm alijs, quibus (ut dictum est) ex copia menses non fluunt, paucissima uictus ratio, & moderatum exercitium uacuationibus præmissis, ut omni arte quæ superat naturæ vires auferatur, & in his quæ crudo sanguine abundant, arbitror crurum scarificationes sufficere. Quippe id consuluit Auic. prohibens, ne nimis albis feminis audacter sanguinem fundamus, uel in his quæ crudis abundant, quod etiam Gal. dixisse constat: nam ex copioso sanguine extracto præter id quod qui superest, recrudescit, maior fit in utero obstructio confertim ad ipsum euocato sanguine. Atq; feminas sic affectas ex toto esse abstemias, id est, uino non utentes uolumus: præterq; si cruditatis aut uentriculi rōne eo opus sit.

Quod

Quod si impacti hærentesq; in vijs uteri menses extiterint, ibidem putrescere, **A**
 & suppurari profectò necessum est, id quod apertissimis verbis scripserat Hip.
 li. i. de mor. mul. dicēs; Quibusdā suppurati fiunt menses, vbi per duos, aut tres
 menses moram contraxerint. Verum suppurationem tripliciter terminari eodē
 et loco refert, sic scribens. Si melius habitura est, menses ipsi erumpunt in pudē
 dum, & procedit pus, ac sanguis, & procedit graueolēs ad septem, aut octo, aut
 nouem dies, (& subdit.) Si uerò non contingat, vt menses ipsi in pudendum pro
 cedant, suppurati facti, ad partes supra inguē, iuxta lateris mollitudinē erūpūt
 citra tuberculum, vtpote pure rupto, & illa parte purulentia, graueolentia pro
 cedent. Cui addit aliā suppurationis rōnē, q̄ in tuberculum degenerat, dicens;
 Quibusdam vbi bimestres, aut trimestres, aut diuturniores fuerint mēses, & ad
 lateris mollitudinē allapsi fuerint, cum non suppurati sint menses, velut tuber
 culum sit supra inguen, sine capite, magnū, rubrum, & vulgus mediocrū igna
 rū quid hoc esset, iam sæpe secuerant, & sic in periculū induxerunt. Iuxta quos
 suppurationis modos ego et censeo menses diu detentos uel diminutē, aut cor
 ruptē prōdeuntes posse aliud uitium contrahere, quod nōdū suppurationē at
 tingit: sed cum parte aliqua ex uteri uasculis reconduntur, putore quendā, & vi
 tium contrahunt, à quo facilē uterus excandescit, & alterat. Qua quidē rōne ex
 quauis interna aut externa occasione ad uterinā suffocationē facilē moient ob
 halitus indomitos partes principes adeuntes, aut uterum distendentes alteran
 tes: quod profectò dānum pleraq; fœminas pati, mihi est experimento com
 probatū. Cuius affectionis signa ut Hip. doceret, hæc refert. Dolores. n. incidunt
 in pectinem, & pulsationes fortes, & contractū non sustinent. Dixerat et supe
 rius. Et dolet quidē reliquū corpus, maximē verò collum, & spinam, & lūbos,
 ac inguina. Cui sanē affectioni curationē institues consiliū Hipp. insequens,
 lib. i. de mor. mul. qui loquens de ijs, quæ probē à partu nō purgantur, inquit.
 Si uerò uteri angustioris ipsi fuerint, & puerperij purgationē non emisserint,
 inflāmur, & si nō curetur breui, oīa magis ipsam affligent. Et odor malus erit
 & exitus intumescit, & si non inflāmati fuerint uteri, sua sponte exit malum
 graueolēs, & liuidū, aut nigrum grumosum, & mulieri puerperij purgamenta
 purgantur. Qua snia docet sanguinē mēstruū ex partu, aut ex alia quauis causa **C**
 retentū, uel uterū inflāmare, aut ipsum putrescere ea putredine, de qua nunc ser
 mo habetur. Cuius medelam scribit subdēns. Qñ verò nō exit, sed mulieri mor
 tē portendit, nisi quis breui uenā secet, aut vētrē emolliat. Præstat aut clysterem
 adhibere: si verò ad vomitū facilis fuerit, et vomitū inducere, melius aut est lo
 riū ciere, & exsudare. Quibus sanē verbis vniuersa medēdi rō corrupto sangui
 ni p̄fēua ab eodē Hip. in totū scribit. Nāq; nulli fore dubiū arbitror, quin mox
 ab accessione sanguinē protinus mittere oporteat, nō tñ ea copia, q̄ posse extra
 here, dū citra uitū sanguinē redū dare cōperiamus: cōsulēdū. n. est lapsis corru
 pro sanguine viribus. Postea verò, q̄a rōnī cōsonū existit putrescētē sanguinē in
 paruos degenerare humores; vētrē duobus modis emollire oportet: clysteribus
 nimirū, qui autēperādi purgādi, & emolliēdi vires hēant, vt vicinā rōne aliqd
 p̄uterū ipsis iuuatibus ex putredinoso sāguine stillare possit: & purgātib⁹ phar
 macis, q̄ biliosos, adustos, & putridos humores purgare nata sint. Sic ex rhabar
 baro, sēna, & agarico purgationes mille modis istituere poterimus, vt p̄cedētib⁹
 bus

Abus cap. abundè dictū est, sed laudo paulatim vterū expurgare, per pessaria ex mercuriali, & ventrē ipsum ab assumpto mercurialis decocto. Laudat quoque vomitū Hip. quo parū raro, & cautè vti consulo. Præstat et vrinæ mouere, si affectus recens fuerit, ac si inueteratus sudorē euocaret: et si in nouis affectib. leni- ter ad tēpus sudare tutum, & vtile sit, præsertim, ex decocto lupulorū, chama- meli, pentaphylli, capillorū veneris, florum papaueris erratici, & buglosse. In- ungere tū ventrem oportet oleo violarum, amygdalarum dulcium, & de semi- nibus cucurbitæ, & melonis. Prodest quoq; in vterum immittere, q̄ consimilē obtineant virtutem, vt rosarum decoctum, violarum, & hordei cum saccharo.

Quod si sanguis retentus ex caliat excrescatq; vterus quoq; exurit, & sub- inde in prædictum incidit affectū. Qd̄ optimè aduersisse Hip. constat, qui loquens de retentis mensib. l. 2. de mor. mu. sic ait. Anxia erit, & aliās, atq; aliās se ipsam iactabit, & animo deficiet, & pituitiā vomet, & sitis fortis ipsam corripit, nimi- ū dū exurit venter ab vteris sanguine plenis, & ad contactū dolebat. Et referēs huius causæ signa inquit. Et aliās, atq; aliās febriet, & vteri aliās, atq; aliās mur- murabunt: dū videlicet sanguis in ipsis cōmouet, ac discurret, & venter cōsuetō mō non secedit, neq; vesica, vrina excolabit, maximè cū vteri ad stomachū, qui nervosus est, mulieri allapsi fuerint, & ad ventrē irruerint. Dolet spina & totū dorsum, & lingua ipsius refrenat, & hanc nō clarā hēt, & animi deliquiū adest, aliquibus et vocis priuatio, & stomachus mordet, & flaua bilis exit, & spūs offen- dens, & anxia est, & iactat se ipsam, & ardet: postq̄ aut̄ transmutati fuerint, & ve- sica tenuē sanguinē ab vteris trahat, tunc vrina mingitur rubra, & dolet quidē reliquum corpus, maximè verò collū, & spinā, & lumbos, & inguina. Quibus verbis apertè constant signa, quibus sanguinē exuti, ac effervescente intra vterū facili- ter cognoscimus. Quod cū cōpertum nobis fuerit ocysimè sanguinē mit- tere, idq; copiosè tenemur: p̄cipuè quidem ex venis tali, aliquā cōfertim, aliquā lente, ac paulatim. Cui vsui confert plurimum p̄missa vacuatione prædicta, ex al- tera, aut vtraq; saluatella sanguinē mittere. Per moderatas et potiones ad frigi- dum nonnihil vergentes, & p̄ alimenta huius census corpus ipsū, & sangui- nē temperare, & mitescere oportet: sic esus lactucæ, portulacæ, cucurbitæ, & iura pullorū, & carnes, id beneficiū largiuntur: itē potus aquæ hordei, buglos- sæ, acetosæ, borraginis, cichorij cum succo granathorum, & saccharo. Præstat quoq; (corpore manna, aut cassia leuiter purgato) lactis vsus, vel seri cū saccha- ro, aut ex infusione senæ, vel florū cordialiū. Itē clysteria ex decocto maluarū, prunorū, hordei, ac saccharo, & oleo rosarū, ac violarum prodest plurimum scio. Inunctiones quoq; p̄ficuæ sunt ex oleo amygdalarū dulcium, vel de semi- nibus cucurbitæ, & melonē cū vnguento rosaceo. Sed attento animo pensitādū est, ne nos causā decipiat suspicantes sanguinis feruorem esse: quippe si is non fuerit, nō est oīno tuum frigida hæc præsidia vtero admouere: quāobrem do- nec ex toto certi simus de causæ natura, à tēperatioribus initandū est, & paula- tim ad frigida progrediendū. Verū in oībus his vteri suffocationibus, quæ ex sanguine prodeunt, mirabile fit præsidium, si menses probè non fluant, ex hæ- morrhoidibus bis, aut semel in anno sanguinē extrahere affixis hirudinibus.

Verū si seminis abundātia, vel corruptio cām huic malo præstiterit, maio- ri opus est diligētia, & maturiori cōsilio. Solēt quidē virginibus, & ijs feminis, que

*Si semē
causam
huic ma-
lo præ-
stat.*

quæ nimis salaces sunt, ex sola feminis abundantia hoc malū pficisci, sicut in grā A
dioribus, & magis salacibus ac viduis, & alijs, q̄ viri cōgressū experiri allue-
runt, ex eodē corrupto, aut quolibet vitiatō. In virginibus verō, q̄ aut salaces nō
sunt, aut vigesimū quintū annū modū nondū p̄terierunt, rarō hæc vitia ex cor-
rupto semine oriri contingit: licet aliqñ vel ex nimio hoīum consortio, vel ex
prauo vitæ, & victus instituto illis semen corrupti cōtingat, & grauissima suc-
crescere accidentia: in alijs tñ oībus, & ex abundanti, & ex corrupto. Quibus
proculdubio medela esset plerunq; viri consortium, & accessus: verū quia nu-
bere oībus, aut non libet, aut non licet, alijs p̄sidijs curandum est, feminis co-
piam minuere, & eisdem feruorem ac putredinem cohibere: q̄ si id per difficile
fuerit, innittendum est corrupti illius humoris resolutioni, & euacuationi.

Primum igitur oēs sic affectæ fœminæ victu vtantur tenuissimo, & maxime
extenuante, frigido et qualis lactuca est, & portulaca, panis ordeaceus, pisces,
& similia cum largiori aqua potu. Ieiunent quoq; ac laborent, & lasciuum con-
sortiū ac loquelā vitent. Quippe ex veneris apprehensione, impudico sermone B
virorum elegantis formæ aspectu, vino generoso, carnibus, & ceteris sanguinē
ac semē augētibus, facilē semē excrefcit, aut mouet, & non excretū subinde pu-
trescit. Quo circa omni arte curandū est, ea adhibere, q̄ semen adhuc genitū mi-
nuere nata sint. Semen quidē (inter pleraq; alia) genitum cohibet, & gigni pro-
hibent diaciminū, diatriopipereon, diacalaminthæ, semen agnicasti, rutæ, mē-
thastri, quorum puluis sumptus vel lumbis aspersus proficius censet. Cui p̄si-
diorū sorti cōsimilē gratiā p̄stant ijs fœminis balnea, p̄sertim naturalia.
Prodest quoq; viticis semen torridum, ac folia, & flores, similiter cannabis se-
men, lactucæ, & nymphææ radix cū aqua plantaginis vel chalybeata. Cōfert nō
minus laminā plumbeā lūbis affigere, p̄ter q̄ in nuptis, quæ parere amant: se-
men itē, & succus plantaginis, & puluis conchularum eidem parti appositus.
Itē ex p̄dictis herbis refrigerantibus super renes quasdam arefactas spargere
oportet, vel eardū puluisculū cū folijs rutæ, viticis, calaminthæ, rosarum, & simi-
lium, licet Aetius lumbis nocere referat: cum hoc tñ Gal. li. 6. de san. tuen. c. 14.
nō solum hæc, verū, & multa alia commendata relinquit, inter quæ assiduū C
vsum viticis, & rutæ probauit. Cōfert itē. 3. s. castorei robustis fœminis p̄be-
re, qd̄ cautē efficere oportet. Iuuat nō minus pastillus, qui recipit feminis rutæ,
agnicasti, & vrticæ. ana 3. s. feminis lactucæ, portulacæ, plantaginis, & papau-
ris albi. ana 3. j. seminū coriandrū torrefactorum, & cannabis. ana g. iij. diacala-
minthæ. 3. ij. cornu cerui vsti, feminis rosarū, santhalorū, & corallorum. ana g.
v. seminū mellonū. 3. iij. sacchari dissoluti in aqua rosarum quantum sit satis, vt
formēt pastilli: quorū 3. s. cum aqua plantaginis pōrriges. P̄stat itē p̄dictum
vsum cōserua, q̄ recipit terebinthinæ abietis lotæ in aqua artemisiæ. 3. s. feminis
dauci, agnicasti, pulueris cinnamomi. ana g. viij. cum modico conseruæ anthos
fiat bolus. Itē purgando semini idoneum est medicamentum, qd̄ recipit terebin-
thinæ abietis. 3. iij. agarici trochiscati. 3. j. feminis dauci, cannabis, pulueris li-
gni aloes. ana. g. viij. cū saccharo fiat bolus. Porphyrius itē citante Stobeo sermo
ne. 68. tradit salicis fructū cum vino propinatum libidinis impetū marcore affi-
cere. Sed ante eū Plin. li. 24. c. 6. scribit, folia salicis cantusa, & epota intemperā-
tiam libidinis coercere, atq; totum eius vsum auferre sæpius sumpta. Quin &
eodem

A eodem loco prodit, si cinis myrice arbusculæ bonis castrati vrine misceatur, vel in potu, vel in cibo venerē finiri. Idem lib. 26. c. 10. tradit, nymphæam, heracleā venerem in totum adinere, & radicem quoq; eius genitalibus illitam inhibere venerem. Ferunt etiam lactucam idem lib. efficere, eo quod Pithagorici ipsam eunuchion appellare consueverint, q̄ scilicet ineptos faciat ad venerea. id q̄ Athenæus quoq; scribit. Autor etiam geoponico lib. 12. c. 24. prodit, mentham rebus veneris ineptam esse. Quod tradiderat Marcellus, qui ponit menthā inter herbas veneri contrarias: quibus astipulatur antiquus ille proverbialis versus ab Arist. relatus probl. sect. 20. c. 2. menthā in bello, neq; edito, neq; serito: cuius rationē reddit ipse Arist. q̄ ea herba membra refrigeret, eo argumento q̄ semen genitale corrumpat: frigus autem fortitudini, & audaciæ, q̄ bello necessaria sunt, maximē aduersatur. Cui adstipulatur Gal. qui. 6. simplici. scribit, q̄ cōceptum vitare dicatur. Sed his omnibus non obscure aduersatur Diosco. lib. 3. c. 37. scribens, eam herbam calfaciēdi vim habere, atq; venerem stimulare: cui Paulus consentiens tradit, eam in tertio ordine esse calidam. At Hermolaus Barbarus hanc controuersiam dirimens Corollarii cap. 363. Fieri potest, inquit, vt per se calfaciat, & per accidens refrigeret, vt in aliis plerisq; frequenter conspicitur. Cuius sententiam proculdubio cenſeo verissimam esse: nam præ calore cōsumptis humiditatibus, & semine ipso, facile qui ea vtuntur, & à venere abſtinent, & refrigerantur. Verū Arist. dicendum est, non quod refrigeret, nocuā esse militibus, sed quod multam sanguinis profusionem comesta, si quis vulneretur eo die, proritat, vt non contemnendi autores referunt, quapropter militibus pugnaturis nocturnam arbitrantur.

Ceterū, quia non sat est in prædictis affectionibus, alioqui grauissimis, feminis generationem prohibere, sed genitum iam soluere, aut euacuare: ob id curandum omni ingenio est, id efficere. Quod sanē Auic. exequitur opus, vomitibus prouocatis: qua tamen ratione id fiat, ignoro, ac cēſeo raro, aut nunquam vel cum maxima præmeditatione faciendum, licet Hip. aliquādo id consuluisset constat, vt lib. 1. de mor. mul. scribitur. Tamen recantat palinodiam, & id omnino interdicit lib. 2. per hæc verba. At supernum ventrem ne moueto, cecutiūt enim, aut circa fauces turbationes, & alia infestabunt. Verū cum hoc prodesse aliquando poterunt, præsertim purgato corpore, ac si fœmina ad vomitū facilis fuerit, sed maximē inundantibus in ventriculo humiditatibus, vt idē Hip. paulō inferius refert. Sanguinem verō mittere semine existente multo tutissimum est consilium: nullum enim inter auxilia aliud reperies, quo promptius, & securius fœminas hoc affectu oppressas leuare possis. Verū dum semē corruptum est, raro in fœminæ commodum sanguis mittitur, ob idq; cenſeo, veteres auctores rarissimē id commendare: quod si aliquando efficiunt, credo intelligendum fore ad adauctum semen minuendum, non ad corruptum: licet aliquando in bene carnosa fœmina, iuvene, ac salaci, tutum sit.

Quatenus verō ad purgationē attinet, experimento diuturno mihi est compertū in fœminis sic affectis, purgationes parum, aut nihil prodesse quinimmo obesse plerunq; Ratio quidē id conuincit, quia semen, siue abundans, siue corruptum, raro expurganti pharmaco p̄ vterum, aut ventrē duces: sed potius profectō, humore comoto, eleuatisq; vaporibus, propius in grauiora mala semina

M

deferres.

*purgatio
per roset*

deferres. Confertur per interualla, & paulatim corpus purgare, ne si quid excrementorum superfit, in vterum forsan dilabatur. sitq; maioris mali causae, & rursus, vt excrementa vtero vicina expurgentur, quorum successione fortasse aliquid eius, quod corruptum est, & excisum, secernet natura. Præstant huiusmodi vsum medicamenta, q̄ nuper diximus ex terebinthina confecta cū aloe, & agarico, aut agaricus sæpe potui datus ex aqua mercurialis, vel plātaginis. Itē pillula ex mastiche, ex agarico, & aloe cū rhabarbaro: præstat etiam syrupus ex rosis perficis cū agarico factus. Sed laudat Hip. frequentissimē purgationem per mercurialem factā: vtilior tñ mihi visa est, quæ fit per syrupum confectum ex succo, & plurimis infusionibus mercurialis: quæ in vterinis affectionibus magni esse momēti experimēto didicimus. Cōmendat itē Rasiū trochiscos semel aut bis in hebdomada sumptos, qui recipiunt foliorū agnicasti, foliorū rutæ, seminis cicutæ, menthastri montani, seseleos, aristolochiæ, & rubæ tinctorum ana partes æquales, formentur trochisci, & quantitas sit singulis vicibus. ʒ. ij.

Post quæ sanē præsidia vterū ipsū purgare necessum est, quem vsum præstat liquor vterum iniectus, qui recipit aquæ naphthæ lib. j. aquæ ocymi ʒ. iij. galliæ muscatæ ʒ. ij. galbani ʒ. ij. musci, & ambra, ana g. v. syrupi de artemisia ʒ. ij. croci puluerizati, cinnamomi, & gariophyllorū, ana ʒ. j. Quod præsidium maius beneficiū præstabit, si vterum prius purgaueris suppositorio ex mercuriali, & agarico, vel quouis alio ex supradictis. Verū si nec his affectionē subsidere cōspiciamus, ijs, q̄ exteriū apposita semen digerant, & vterum roborent, vtendū est, velut sunt prædictæ infusions, & pessi, ac naturalia balnea ex sulphure. Cōferūt, & inunctiones pectini, inguinibus, ac lumbis apposito ex oleo rutaceo, irino, liliaceo, nardino, viticis, acrutæ seminibus cocto: quibus addere oportet saluā, costi, casia, calaminthæ cōtusa, seu seminis cannabis quippiā cū modica cera. Prodest quoq; non parū inunctio ex oleo dulci, in quo semen agnicasti, cinnamomū, & seminis angelicæ modicū coxerint. Quibus factis emplastrū ceroneū supra easdem partes apponere oportet: non tamen illud, quod p matrice scribitur, nam id plurimū astringit, sed aliud ceroneum inscriptum, quod ex lachrymis fit digerentem facultatem obtinens, quod conficies admodum scuti, & in parte acuta ipsius apponēda sunt grana aliquot moschi: & eandem acutam partem inferiori parti appones, vt gratum odorem inspiret intra vterum, quod magni momēti solet esse.

Conficienda itē sunt alia emplastra pro matrice, q̄ iuxta fœminæ indigentia vtilia existant. Verum experimento didici, dum tetros halitus retinere, & corroborare magis in animo est, id summopere proficuum esse, quod recipit olei naphthæ ʒ. j. theriacæ magnæ ʒ. j. pulueris galliæ muscatæ, zibet, ana ʒ. f. pulueris seminis angelicæ ʒ. j. pulueris coralli, & santholorum, & seminis rutæ, ana ʒ. f. pulueris cinnamomi, & gariophyllorū, ana ʒ. j. galbani. ʒ. ij. ladani, quod fit satis. Parabis itē aliud, quod recipit olei cinnamomi, & de spica, ac balsami, ana parū, pulueris cinnamomi, gariophyllorū, nucis, & seminis angelicæ, ana ʒ. j. galliæ muscatæ, diambra, diamusci, ana g. vj. ladani, cere, ac terebinthina, quod fit satis. Aliud huic cōsimile cōficies, quod recipit ex oleo belzoini, & de styraçe, balsamo, & ex gummi, quod ex India asportatur, caranna appellato, additis pulueribus agnicasti, rutæ, viticis, & eorū, quæ semen minuere diximus, quātum

A tum sit satis, ut fiat emplastrum. Sed conferre summopere cōperies emplastrū, quod ex theriaca, semine agnicasti, & angelicæ conficitur.

Dum flatus huic malo causam præstat, nullā aliā prærequirit diligentiam, q̄ *Si ex flatu.* eam, quæ prima huius capitis parte scripta reperitur, proficua huius affectio-
nis accessioni. Quamobrem ne videar ea sæpius repetere, illuc diligens lector re-
currer, interim tamen ventriculū, & ventrem inferiorem inungere oportebit oleo de cinnamomo, de angelica, de aniso, de pipere, de gariophyllis, quorum etiam guttulas tres cum vino sumere, non erit ab re.

Cæterum, quia pertinacissimus is affectus, neq; his omnibus adhuc subsistere plerunq; constat: ob id quidem frequenti obseruatione mihi est probatū, altero aut utroq; crure fontanellam aperire, per quam putores illi, & corrupti humores ex semine, & sanguine menstruo prodeuntes, ratione venarum, quæ utero & cruribus communes existunt, citra damnum spirent. Quod proculdubio censeo esse vltimum efficacissimum, & tutissimum præsidium, idq; summopere hac ratione commendo, & laudo.

B De virginū, & viduarum melancholia. Cap. 4.



I NTER varias fœminarū affectiones, vulgatissimā esse virginibus grandioribus, viduis ac sterilibus fœminis melancholiā, nulli esse absconditū reor: quod etiā vitij genus cōtingere scimus ijs, quibus menses, aut puerperij purgationes ex aliquo extremo casu supprimuntur, aut improspere pfluunt. Quippe huiusmodi fœminas, & mœstas, & cogitabundas, timidas, ac anxias esse, citra manifestā causam cōperimus. Quod quidē nulli alteri fœminarū forti, ita frequenter accidisse scimus, ac virginibus, viduis, & sterilibus fœminis. Differt tñ hoc melancholiæ genus ab ea melancholia, q̄ cōiter viris, & reliquis fœminis accidit, q̄ hæc ex aliqua cōi causā proficiat: viduarū verò & virginū melancholia, ex certa quadā & his solis peculiari. Itē, quia illa citra manifestā intermissione affligit: hæc verò non nisi per intervalla, & suscepto ab aliqua leui occasione principio. Præterea, illa nullum aliud accidens secū affert, præterq̄ metum, & mœstitiā, & ea q̄ cōiter melancholiæ sunt propria: hæc autem, fletū, & risum, anxietatē, desperationē, & (quod omnibus melācholiæ speciebus denegatum est) dolores tum varios, tum alicuius signate partis, præsertim sinistri lateris è regione cordis, vniuersam mamam aliquā occupās: quibusdā item spiritus deficit alijs, si spirant, dolor non leuis adest, & alia non pauca succrescunt peculiaria accidentia, q̄ paulò inferiùs recensabo, si prius dixero, melancholiā virginū, & viduarum in vniuersum esse insolentē, & subitam, præter occasionē, aut cum leui tristitia: tacitum & cautum delirium cū alicuius partis internæ dolore, anxietate, & flendi, vel tacendi desiderio, cū hypochondriorū etiam è regione dorsi manifesto pulsū, à quibus mox subitò ad pristinum redeunt statum. Cuius speciei morbi hæc symptomata sint, nullus est q̄ doceat, neq; ego faciliter monstrare potero, sed constabit proculdubio, si quis ad vnguē expenderit causas, quas iam memorare aggredior.

Causam verò huius affectionis haud faciliè inuenies, ni prius in memoriā reuocaueris pulchram quandam Hip. sententiam, quā lib. de virg. morb. in hunc *Causa.*

M 2 modum

modum scripsit. Est enim muliebris natura animi magis deiecti, ac imminuti: A
 ceterum virgines nobiles, & mature viro hoc magis patiuntur, vna cum men-
 sum descensu, antea non valde hinc affectæ. Postea enim sanguis in uteros con-
 fluit, velut effluxurus: quum igitur osculum exitus non fuerit apertum, sanguis
 autem amplius influxerit, propter cibos & corporis augmentum, tunc sanguis
 non habens effluxum, præ multitudine resilit ad cor, & ad septum transversum.
 Quum igitur hæc repleta fuerint, cor satium fit, deinde ex satuitate torpedit,
 postea ex torpedine delirium apprehendit. Et paulo inferius subdit. Quum enim
 hæc partes repletae fuerint, & horror cum febre ingruit, erroneas febres appellat:
 his autem sic habentibus, præ acuta quidam inflammatione insanit, præ putredine
 verò clamat, præ caliginositate autem timet ac formidat, præ compressione verò
 circa cor, strangulationes parat, præ sanguinis autem malitia animus mœrens, ac
 anxius malum attrahit. Ex qua proculdubio sententia euidenter constat, dupli-
 cem esse mœroris, mœstitiæ, ac prauæ imaginationis virginum, & viduarum,
 quæ sic affectæ sunt, causam (præter alias communes causas) alteram, mulieris na-
 turam, quæ animi est deiecti: alteram verò, sanguinis vitiosi prope cor conclusi
 tetram exhalationem, quæ & cor anxium reddit, & spiritus cerebri obscurat, ac B
 imaginationem peruertit: præsertim si his amatorius ardor accesserit. Idem quo-
 que viduis accidere consuevit, dum curis, & mœrore animum coterunt: in his
 enim ex vehemēti animi motu cerebrum adeo laborat, & infirmatur, ut sapissi-
 simè in hæc mala prorumpere conspiciamus. Præterquam quod accedit vitæ muta-
 tio, & ob viri defectum improba uteri expurgatio, tam à feminis recremento,
 quam à mēstrua purgatione: in quibus & virginibus sanguis ob prædictam cau-
 sam vitiosus refluit ab utero ad cor, atque ita animum corrumpit. Verum licet in
 principio lib. nuper citati Hipp. referat, aliquando hæc vitia viris succrescere,
 cum hoc tamen frequentius feminis euenire affirmat, eò quod animum feminæ
 habeant magis deiectum, quem illis ita inesse arbitrandum est, quod desiderium & ni-
 mis segnem vitam degant, ut antiquiores philosophi existimarunt; at segnes,
 atque pigras ob id asserunt esse Aristot. & Auicem. & Alber. quod frigidiores, ea
 causa sint, & cum calore destituantur, fit facile, ut animum habeant timidum &
 magis deiectum quauis causa concitante, vel nulla: animositas enim à calore
 proficiscitur. Quibus accedit, prædictum sanguinem vitiosum, & conclusum, C
 alterum affectionis principium præstare: nam cum in virginibus, ac viduis oscu-
 lum exitus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, tum sanguis
 (ut dictum est) præ multitudine resilit ad cor, quibus accedunt & viduis labores,
 curæ & assidue cogitationes ob consueta vitæ mutationem. Quippe rusticæ,
 & communes feminæ viduæ, quibus vitam mutari non contingit, sed laboriosam
 (ut antea) degere, raro in huiusmodi affectiones incidere visæ sunt; sicut quæ
 præstantioris sunt sortis, quas decet præ honestate alios mores profiteri. Ita-
 que & virginibus ex huiusmodi sanguine, & viduis ex eodem, & semine im-
 probè purgatis, facile contingit cor & cerebrum affici, & mœstas cogitabun-
 dasque esse: nam sanguis ille conclusus licet nec putrescat, nec in cor feratur, in-
 calefcit quidem plus iusto, & resoluta insensibiliter parte tenuiore, quod crassum
 est, cum aut agitur, aut incalefcit ex aliqua occasione, prædictum vitium gi-
 gnit, halitibus ab eo elatis, in cor ac cerebrum transmissis. Quod euidenti con-
 stat

*Ex reuero
sanguine
ob semine*

A stat argumento: nam cum halitus quiescit, aut minimè effervesceat sanguis, labunda incedit fœmina, & citra melancholię specimen, & mox subito affectu mœrore corripitur, quoddam causam habeat intra corpus, quam leuissima occasio concitat. Qua profectò ratione cõstat, prædictas fœminas successu tēporis (licet dum affectus incipit & viget, totum corpus excalescere, & faciē inflammari per intervalla persentiant) in frigidos eosq; grauissimos affectus delabi. Quippe sic fieri necessum est, maiori sanguinis parte melancholica facta ob tenuioris partis resolutionē. Quod verò incalcescat sanguis, & ob id subtile resoluatur, experimento & ratione mihi est cõpertum: nam fœminas sic affectas constat arteriā prope dorsum nimis ultra morē & naturā, pulsantem obtinere: etiam si in viris hypochondriaca melancholia affectis id quoq; reperiatur ob sanguinē venæ cauæ, aut venarū iuxta ipsam cõclusum & excalescētū. Quod sanè symptomata citra vllā dubitationē omnes fœminæ sic affectę perpetiuntur: quinimo causam potissimā melancholicarū affectionum in eisdē cenſeo esse succensionē arteriæ illius, quæ iuxta dorsum sita est. Ex quibus euidenter cõstat, morbū in hac affectione esse huius arteriæ inflammationē, cui consentiunt cerebrū & cor, quæ adustis & tetrīs fuliginibus obscurātur, vnde mœstitiā, mœrore, metū & tacitū deliramentū prodire necessum est: quæ sanè omnia principiū & causam sortiuntur ex concluso & concalfacto in vteris sanguine, vel semine.

Hinc sanè euenit omnes melancholicas fœminas prædictā pulsationē iuxta *Signa.* dorsum obtinere, & eandē habētes melancholica pati accidentia, quod primū & potissimū huius mali signū esse arbitror. Consimilem huic affectionē retulit Aretheus lib. 2. de can. & sig. acutarū pass. c. 8. qua parte vitia & affectus venæ magnæ descendētis prope dorsum recenset, inter quos innumerat certum quendam morbū ex sanguinis plenitudine obortū, qui in succensionē cõmigrat, & subdit. Quibus arteria secundū dorsum inflāmat, quod pulsatio in alternitris præcordijs manifestat: nā & ipsa venæ cauæ morborū particeps efficitur. Quæ equidē affectionem cenſeo citra dubitationē fœminas perpeti, cum sanguis menstruus prope vteri venas concluditur: nā cum ibidē inflāmetur (ut dictū & necessariū est) nil mirū si & arteria ipsa, quæ iuxta dorsum sita est, particeps fiat prædictarū affectionum, & subinde præ calore ea parte succēso ultra modū pulset. Quod quidē ostendunt signa, quæ autor eodē loco recenset, quæ in virginibus & viduis melancholicis facillè reperiēs, si ea attento animo exquiras, in quibusdā tamē magis, in alijs verò minus: inquit autem. Cutis sic affectorū squalida, rugosa atq; aspera est, sed in partibus prominentibus atq; ossibus, ut cubitis, genibus, digitorūq; articulis magis talis conspicitur. Sōni tumultuosi fiunt: alius quibusdā nihil reddit, quibusdā exiguum, acre, biliosum: lotium acre, biliosum mordaxq; est. Mens vtiq; his constat, sed quadam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur. Quibus constare arbitror, cõsimilia accidentia fœminis suboriri, his quidē, quibus ob prædictas causas, arteria illa pulsat: ob idq; in omnibus reperimus ferè semper eadē mala, quæ hac in parte Aretheus recensuit. Præter quæ etiā fastidiosæ sunt, languētes, sitibundæ, tediōsæ, cõsiliij inopes, desperatæ, mœstissimæ, timētēs, lachrymosæ, & insuper nullis delectantur rebus, neq; gaudēt, sed tediō habēt omnia, solitudinē amant, & ob id magis lēduntur: donec halitus à prædicto calore leuatus etianescat: nā tūc subito ad an-

ti quā consuetudinē & statū reuertuntur, ita vt nō paruā admirationē inferat tā subita mutatio: nisi cū malū iam diu inueteratū steterit, vt c. huic affectioni dicato latius docebo. Habēt etiā aliud peculiare, nimirū, non posse verbis exprimere quid sentiant, aut quā molestiā perpetiantur, sed cōquerūtur, & multa dicunt, ex quibus quid certū colligere minime poteris, tandē fatētur se multa mala perferre, ceterū verbis ea distinctē exprimere nō posse. Sed addubita bit fortasse quispiā, quā nā ratione cū melancholia sit propria cerebri affectio, fœmina sic affecta magis de corde cōquerantur. Cui dicimus, fœminas esse roboris cordis, ac animi magis deiectioni & imbecillis: ob idq; perferre magis in corde affectū, viriū & caloris damno, quā in cerebro. Quāobrem cū fœminarum plures frequentissimē hoc affectu premantur, teneris ex interrogatione, ex frequenti loquela, & sedula inspectione corū, q̄ loquuntur, desiderant, timent, aut efficiunt, ac ex hypochondriorū tactu id venari: semper prae oculis habens vniuersam huius affectus rationē pendere ex vtero, & propaginibus venarum ipsum circumdantibus. Quibus etiā fœminis ea mala succrescere cōspicimus, q̄ de scelesti urbe & stomachace veteres medici scripserunt, referentes ea vitia magnis lienibus, quorum occasione & ventriculus, & vniuersum corpus mille modis afficiuntur, hoc quidem grauitate, & impotentia ad actiones obeundas adeo graui, vt multū eā affectionem paralytis speciem censuerint, itē tetro colore genuum & articularum impotentia, & oris fetore, illud verō anxietate, & fastidio, ac adeo graui vtrius molestia, vt iure optimo stomachachexia à multis appelletur, malum quidē ex humida melancholia, & sordida proficiscens.

*Præsa-
gium.*

Sed vt ex Hip. decreto cōstat lib. de virg. inū morbis, ex prædicta melancholia sorte, plerunq; nisi maturo cōsilio fœminæ præueniantur, in mania & ferina deliramenta promptē decidunt: inquit enim. At ex corde & septo transfuso tardē refluit: venæ enim obliquæ sunt, & locus periculosus, & ad deliriū, & insaniam paratus. Et paulò inferius subdit. Præacuta quidē inflammatione insanit: ac referens varia deliramenta, inquit. Animus mœrens ac anxius malum attrahit: sed & aliū horribiliter cōpellat, & in puteos proflire ac inieere iubet, & strangulari, tanq̄ meliora sint hæc, & omnē vitæ vtilitatē excedentia. Aliquādo verō sine spectris ac phantasmatis voluptas quædā adest, ex qua mortem velut bonū aliquod amat. Accidit quidē hoc vitij genus virginibus, viduis, & sterilibus etiā si viris cohabitēt, vt Hip. in fi. li. de virg. morb. adducit: sed præcipue puerperis, & improspere purgatis: vel quibus menstrua purgatio ob subitā occasionē subito etiā retrocedit: ac vltimo ijs, quibus vteri purgamenta, & subito casu subsistunt. Quibus omnibus fit, vt aliquid in cor, & cerebrū cōmigrēt, ipsaque adeo lēdat, vt nō solū imaginandī potentiā vitiet, verū credere, q̄ cogitauerint, cogat, proferre q; efficiat. Quippe hac ratione inter alias melancholici à mania cis differunt, quod illi verētur publicē pferre, q̄ imaginātur, q̄ quodāmodo suspiciātur vera nō esse, & ob id taciturni, mœsti, & cogitabundi existunt, sibi secretū adseruantes: hi verō statim in publicū proferunt, q̄ mente cōcipiūt, idq; cū erroneū sit, tanq̄ à causa præter naturā cerebri potētias subuertente factum, facile deliramentum apparet. Quin adeo crescit timor, & vitium imaginatricis vt lib. nuper citato Hip. scribat. Ex quibus adeo forūter pauent homines, vt delirent, & demones quosdā videre se putent ipsis noctu quādoq; infestos, quādoque

A doq; interdū, aliquando verò vtroq; tēpore. Deniq; ex leui sanguinis coaceruati ex calfactione melancholiā, & ex hac ob fortē vaporē, & mœstitiā vltērius resiccatis humoribus maiore accrescente efferuescentia, prodire deliramenta necessum est. Quapropter mihi curaturo incumbit, & melancholiā, & mania quas ex vtero feminis accidere diximus, seorsum meminisse, & cuiq; propria ac peculiaria auxilia adscribere.

Primū igitur in curatione expēdisse cōuenit, nō expedire in quouis melancholiā tēpore eandē conscribere curandi rationē. Quippe alia prærequiritur *Curam* incipiente affectu, seruētq; adhuc incluso sanguine in vteri valis: alia verò fer *di ra* tiore iā restincto in aliqua humoris portione, ac in alia nuper succēso, alia rur *tio.* sus dū quod adurit, & super ex calfactū est, cā siccitatē, & naturā adipiscitur, q̄ deliramētis, & mania idonea sit. Quod faciliē diligens medicus cognoscet ex mali principio, & ex antē habito vitæ instituto: & quando inceperit mœstitiā fēminā apprehendere: nā si nuper hæc apparuerint, feruorē adhuc sanguinē cōtinere credendū est, præsertim si accessio illa breui cessauerit, & ad antiq̄ vitæ consuetudinē fēmina protinus redierit. Si enim diu durauerit affectio, si postq̄ cessauerit, vestigiū superfuerit, si mores quodāmodo mutauerit, si nequiuertit imaginibus melancholicis, & illusionibus, ac mœstitiā, resistere, vel maxima cū difficultate, argumentū procul dubio sit euident, aliquid tā crassum, & fēculentū superesse, cuius tēperaturā, & mores fēminæ cōditio insequitur. Verum si ex toto subuersum fuerit viuēdi studiū, vel maiori ex parte, & fēmina, neq; loquat, neq; respōdeat, neq; more solito letetur adhuc cū sibi familiaribus, & amicis, credendū est, maximā fuisse humoris subuersionē, & maiore humoris partem exusta, diuq; caput, & cor subinde infestari, ita vt subito casu ex merore, & mœstitiā in maniacū deliriū proflire sperandum sit. Quod sanē malū puerperis ex suppressa purgatione, cū exusta, & pernitiōsa fēculentq; sit substantiā, dū subito supprimitur, ocysimē accidere cōspicimus, equiualeat enim humoris illius vitii diuturnitatē tēporis, qua in alijs fēminis paulatim, & sensim vitiantur humores. Quod si in prima vitij sorte, fēminę & humoris statū fuisse cognoueris, nullū aliud auxiliū præquirere credendū est, q̄ vitæ fortē instituere parciore, & copiosē sanguinē detrahēre. Inquit enim Hip. lib. de virg. morb. Ceterū curatione, vt hinc liberētur, est sanguinis detractio, si nihil fuerit, quod impediāt. Deniq; primo accessu victus copiam minuere oportet, & eū qui tenuioris sit substantiā eligere, ac mediocris tēperamētī, ne nimia copia sanguinis quoq; copia vberior fiat, ac ex crassa substantia melancholicus magis succrescat succus: mediij quidē tēperamētī, ne calore vltērius efferuescat sanguis, ac frigore cōcrescat, frigidiorq; fiat melancholia. Corpus itē exercitijs mandare opus est, distrahēreq; animū varijs, & delectabilibus rebus. Mox tñ à principio sanguinem detrahēre ex brachiorū basilica, si longē à mēstruationis tēpore distauerit fēmina: sin, aut immineant mēses, aut nuper præterierint, ex malleolis. Ceterū interim, dū fēmina viro nō vititur, probare maximē tertio, aut quarto quoq; mēse in medio eius sanguinē ex brachio mittere, vt sublato redundante minus efferuescat quod superest, quod si religiosa fuerit, aut vidua, sat erit bis in anno eadē lege sanguinē fundere. At si toto tēpore, quo mēses fluunt, aut parū ante ipsum mēsta melancholicaq; magis steterit fēmina, duobus, tribusve diebus ante id tēpus sangui-

nē ex talo mittere, & presenti melancholiā, & futurā presidiū erit. Conuenire quoq; vsu cōpertū est, dū aliquod viscus etiā malū ex cōsortio cōtrahit, saluatellā scindere, manus nimirū dextre, aut sinistra, prout iecur, aut splenē cōpati nobis cōpertū fuerit. Verū quando cor etiā patitur, aut ipse fœminę calore interno cruciantur, & hac ratione opus est vltcrius sanguinem mittere, tunc sanē distinctione vtendum est.

Quippe aut viriū prouenit ex iecore calido, & eo tēpore sanguinē ex saluatella dextra fundes, quia propter humorū inustionē abundat splen melancholiā, cuius cōsensu cor cōpatitur: quod si tunc ex sinistra sanguinē detraxeris, ob spirituum resolutionem magis lædes, sicut dum vires ob melancholiā deiectione sunt. Verū si citra viriū dispēdium splen inflāmatur p̄dicto humore suscepto & cor simul coafficiatur, tunc ex sinistra saluatella sanguinē fundes. Caterum, quia in hac affectione mēfereon quoq; in cōsensum nō rarō trahitur, illius etiā prouidentia habere conuenit, sanguine nullatenus, vel quā parciſsimē misso, nisi suppressi menses id postulauerint, aut per hemorrhoides id feceris.

Verū si p̄dictis signis cōpertum fuerit, melancholici succi iā factū aliquid superesse, sanguine misso (sed multō parcius) purgantium medicamentorum ali quod adhibere oportet, quod crassos, & melancholicos succos educere natum sit. At cū humor huius naturę, vt ex Hip. constat, q̄ in parua quantitate exhibitā multum educat, expostulet, ea quidē fœminarum natura, & affectionis cōditio citra euidens dānum sustinere nequeant; ob id quidē ijs agendum est pharmacis, q̄ lentē, & paulatim parum, sed frequenter educant. Sic ex aloe, agarico, & mastiche cōfectę pillulę singulis hebdomadis sumptę plurimum p̄stant: sicut alię, q̄ ex aloe, & pulueribus rubę tinctorum, & foliorū senę tertio, vel quarto quoq; die ingestę. Sed lōge vtilior est cōfectio amech sine scammonio, & colocintide facta, qua ter quaterve in anno moliri purgationē poteris. Prodest, & purgatio ex .j. pulpe casię fistulę cū .j. & .f. pulueris foliorū senę. Itē ex vsu est singulis diebus, vel quarto quoq; die (prout alius egerit) quatuor quinqueve prunas damascenas cōditas saccharo, & decocto foliorū senę. Valet etiā aqua lactis sola, aut in qua diu maduerint folia senę, & flores appellati cordiales. Præstat quoq; semel in hebdomada. .j. iij. in frascriptę decoctionis sumere cū modico saccharo: fit quidā ex xij. .j. aquę lupulorū, borraginis, aut cichorij, & .j. & .f. foliorū senę, q̄ bulliant leuiter, ac maneant in infusione per noctē. Ego qui dē in his, & plerisq; fœminarum affectionibus, quibus aliquid melancholicū adiungitur, felici successu vtor syrupo nostro hac lege cōfecto. Recipit quidē aquarū borraginis, cichorij, & lupulorum, ana. .j. x. succi borraginis clarioris facti. .j. viij. succi pomorū redolentium. .j. vj. foliorum senę. .j. iij. florum cordialium, ana. .j. .f. radicum scortionerę mundatarum minutim incisarū. .j. ij. bulliāt lento igne ad cōsumptionē vigesimę partis, & facta colatura, adde rhabarbari electi, & agarici trochiscati, ana. .j. iij. & .f. & facta leuissima ebullitione iterū ex primantur: quibus adde pulueris lapidis lazuli preparati, ligati, ac infusi p noctē, & expressi. .j. ij. & sacchari albissimi quātū sit satis, vt fiat syrupus mediocris cōsistentiæ cum modico cinnamomo, cuius ab. .j. ij. ad iij. porriges. Sed in hac curatione mihi semper visum fuit, humidioribus pharmacis potius vtī, q̄ siccis: exacerbat quippe non parum siccis melancholicus humor: nisi post eius
vsu

- A** vsus præbueris ptisanæ modicum, vel decoctum ordeï, portulacæ, aut violarû. Quod si hæc prodesse non videantur g. iij. stibij præparati præbere tuto poteris, si femina robusta fuerit, & ad pituitæ crassæ habitum vergens, facto tamen initio à g. ij. vel tribus, qua prudentia arbitror nil mali posse pter spem accidere. Verum quia in prædicta affectione preter cerebrum, pati etiã cor & vterum cõspicimus, vtriq; providendum est. Cordi quidẽ p inunctiones ex oleo, vel vnguento naphthæ, & iasminorum cum ambra, musco, & gallia, ac reliquis odoratis, q̃ inferius recensẽbo: per epithemata ex aqua naphthæ, melissæ, & gariophyllorû cum modico vino, & aqua rosacea, ac succo pomorum redolentium additis puluisculis santholorum, de grana, vel electarij de gemmis cum modico musco, vel diambra, q̃ omnia filtro serico, vel mica panis tosta, aut pomo asso excepta cordi adhibeantur. Præstat & oleum cinnamomi, gariophyllorum, vel anisi arte chimica extractum, cuius cum aqua cardiacæ herbæ sumptis tribus guttulis mire prodesse credo. Itẽ sacculos parare poteris ex pulueribus quatuor florum cordialium, santholorum, coralli, seminis angelicæ, gariophyllorum, diambre, & diamusci. Præstat is, qui recipit florum cordialium ana p. ij. florum nemufaris, & sambuci, ana p. j. florum melissæ, seminis ocymi, been albi, & rubri, santholorum omnium ana 3. j. quibus adde nucis, diambre, & diamusci, ac pulueris seminis angelicæ ana 3. f. pulueris granæ 3. ij. & fiat sacculus. Utendum quoq; est electarijs ex floribus, & radicibus cordialibus saccharo cõditis. Sed huic vsui plurimum cõfert potui data aqua ex theriaca instillata cû pomis redolentibus cõtusis, panẽ recẽs cocto imbuto succo cardiacæ cû pulueribus electarij de gemmis, cum ramentis cucurbitæ, cinnamomo & succo pomorû acriû. Vero etiam providẽdum est emplastris pro matrice ex rebus tẽperatis, & odoris grati cõfectis, velut ex rosis, violis, & reliquis cordialibus, diambra, diamoscho, modico cinnamomo ad penetrationẽ, cum ladano, & cera cõfectum. Præstat mirò modo emplastrum ceroneum, vel vnguentum cõfectum ex eodẽ cum oleo liliorum: ac si semen retentum fuisse cõperias, quẽ ipsum minuunt, & exsiccent, addes, velut est oleum rutaceum, vel de mentha, & attemperamenti gratia modicũ olei de nemufare, vel de semine lactucæ, papaueris, aut seminis agnicasti.
- C** Verum si eò miserix affectio deuenerit, q̃ in deliramenta degeneret, nõ solũ vtero, & melacholico sanguini providendũ tunc est, sed capiti, & corpori vnũ uerso, ne habitualis siccitas, ac frigiditas, quales in his plerunq; reperimus, in prædictis partibus cõtrahatur. Qua in re sanguinẽ p venã minus extrahere oportet, vehementius tñ purgare, & caput ac vnũuersum corpus frequentius humectare. In qua sanẽ affectione hemorrhoides prouocare opus erit, vt q̃ per partẽ vtero vicinã deriuare natæ sint, p̃sertim hirudinum suctu, quo fœculentũ sanguinẽ citra purioris dispendiũ vtiliter euacuamus, & à capite, si quid illuc irruit, faciliẽ diuertimus. Verũ si aut nõ apparuerint, aut sanguis per eas extractus nõ suffecerit, proficuũ summopere erit, ex venis tali sanguinẽ fundere. Purgare verò corpus nõ leuiter, sed eo, quod modicũ ingestũ plurimũ educat, necessum est: nã hos humores siccos, densos tantumq; solidos ne mouere quidẽ poterunt leuia medicamẽta, q̃ superius diximus incipienti malo proficua esse. Quãobrẽ pillulis de lapide lazuli, tẽperatis tamẽ, vtendũ est: vel alijs, q̃ recipiunt epithymi 3. vj. agari electi 3. iij. corticis ellebori nigri 3. j. specierum hieræ simplicis 3. iij.

3.iiij. cum melle rosaceo fiat massa: cuius quantitas sit ab 3.j. ad ij. Confi-ciuntur A
 itē alia nō minoris momenti hac lege, epithymi. 3. j. aloes 3. f. gariophyllorum,
 nucis muscate, ana 3. ij. corticū ellebori nigri 3. j. & f. cū syrupo borraginis fiat
 massa. Itē p̄dicti stibij p̄parati g. iij. vel iiij. q̄ censēā, maximū esse momenti his
 crassis humoribus educendis. Sed primitus ante hāc medicamenta purgabis, &
 p̄parabis corpus sero lactis cū folijs senæ: aut mercuriali, vt frequēs erat Hip.
 cōsuetudo. Nec mirādum profectō est, hāc valida medicamenta fēminas inno-
 xiē perferre: nā protinus viscera & ventriculus adeō viūātur, vt in eis plurima
 supersint crassa, ac viscida excrementa, q̄ humori melancholico admixta, id iure
 expostulent: ob idq̄; hāc & alia frequentius (dum pro fēmineo sexu attēpe-
 rentur) adhiberi possunt: quale est, quod conficitur ex vigesima parte lapidis
 lazuli p̄parati, & reliquis quindecim partibus senæ, & duabus agarici, ac tri-
 bus syrapi portulacæ addita 3. f. sacchari rosati. Confert etiā in ijs, q̄ affectū iam
 inueteratum habent, ex pulueribus senæ & modico lapidis lazuli quantū g. x.
 cum saccharo rosaceo, vel violaceo bolū semel in hebdomada porrigere,
 Quōd si neq; his affectio quieuerit, serapium illud a Matthiolo elleborisimum B
 appellatum quantitate 3. j. porrigere poteris, vel serapium ex fumaria, & ex lu-
 pulis, cum ligatura lapidis lazuli p̄dicta forma confectum. Cui etiā vsui aliud
 non minoris momenti conficies, quod recipit mirabolanorum omnium, ana
 3. f. contundantur crasso modo, & fricentur manibus cum oleo amygdalarum
 dulcium, postea infundantur per diē & noctem in lib. xiiij. aquæ fumarie, &
 bulliant ad consumptionē tertiæ partis, cui adde ellebori nigri 3. ij. & f. liqui-
 ritie, & polipodii, ana 3. ij. seminis citri. 3. j. & f. postea effervescent donec solū
 remaneant lib. v. quibus adde foliorum senæ & epithymi, ana 3. j. & iterū bul-
 liant donec tantū supersint. ii. j. lib. tandē facta expressione colentur, & vsui de-
 coctum adseruetur: cuius deinceps excipe 3. ij. synapi ex 9. infusionibus rosarū
 3. j. aquæ cichorii 3. j. & f. porrige summo mane, ac per sex dies idem facito ter-
 tio quoq; die. Verūm quod in huiusmodi mentis perturbatione cōmendatum
 magis reperio, est puluis, qui & solus, & pilularum forma, vel cum saccharo
 rosarum, aut borraginis faciliē adhiberi potest pondere ij. 3. Recipit quidē epi-
 thymi. 3. iiij. lapidis lazuli p̄parati, & agarici 3. ij. & f. scāmonei correcti g. xiiij. C
 gariophyllorum numero xx. pulueris foliorum senæ. 3. vj. sacchari albißimi.
 3. ij. cuius quantitas sit. 3. f. Fit quoq; huic vsui opiata magni momenti, quæ re-
 cipit summitatum thymi. 3. f. epithymi. 3. j. f. seminis cuscute 3. iiij. lapidis lazuli
 decies abluti in aqua rosacea, & totidē in aqua portulacæ 3. ij. diagridii. 3. ij.
 cinnamomi. 3. f. pulueris senæ. 3. iiij. margaritarum. 3. ij. moschi. g. v. synapi de
 pomis cōpositi quantum sit satis, vt fiat ad formam opiatæ, cuius dosis sit ad 3. j.
 Possunt quoq; fieri potiones ex veratro nigro, hac forma. Recipe veratri nigri
 3. j. passularum mundatarum. 3. j. prunorum siccorum numero x. florum nim-
 phæ. p. j. fiat decoctio in lib. iij. aquæ ad tertias, cuius exhibe. 3. ij. cū aliis dua-
 bus syrapi violarū, quo robustiores fēminæ semel in mense, aut bis vti pote-
 runt. Sed inter vnā & aliā purgationem ad condita, & opiata veniendū est: qua
 in re plurimū prodesse fertur alchermes, & triphera, aut bolus, qui recipit con-
 seruæ radicis buglossæ 3. ij. consuæ enulæ 3. j. consuæ uiolarū, nenufaris, &
 anthos, pulueris latitiæ Gal. ana 3. ij. pulueris electarij de gēmis sine speciebus.
 3. j.

A 3.j. fiat opfata. Caterum fit alia pretiosior & vtilior, q̄ recipit myrobalanorum emblicorum, & chebulorum conditorum, ana numero ij. corticis citri saccharo conditi, & radicis buglossæ, ana 3.j. conseruæ anthos, & florum borraginis, ana 3.j. confectiois alchermes. 3.j. & .f. lapidis lazuli usti & loti. 3. f. electarii de gemmis & confectiois de hiacinto, ana 3.j. & .f. syrupi de portulaca quod sufficiat, vt fiat opiata, cuius bolum quantitatis auellane bis in hebdomada porriges. Sed si blādus tractare velis feminam sic affectā, aliud parabis medicamentum, quod recipit radicis enulæ recentis, radicis buglossæ, & liquiritiæ, ana 3.j. passularum enucleatarum. 3.j. prunorum numero x. ficuum (quamquā nō probentur ab Alex. Trall. sed cum reijcit ficus à medicamentis laxantibus, intelligit de recentibus, carycæ verò, quia detergant, conueniunt) 3.j. pomorum dulcium numero ij. m. recurialis, borraginis, & capillorum veneris, ana m. j. seminis anisi 3.ij. seminis apii, petroselinii, & ocymi, ana 3.ij. polipodii quercini recentis. 3.ij. foliorum senæ, medullæ seminis cartami, ana 3.j. & .f. corticis medianæ sambuci. 3.ij. florum anthos, buglossæ, borraginis, violarū, ana m. ij. fiat decoctio in lib. iij. aquæ ad tertias, & facta colatura adde sacchari quod sufficiat, vt fiat syrupus: cui si addideris agarici modicum, maximè ex vsu facies.

A purgatione verò, & inter purgandum balneis aquæ dulcis tepidæ in domo, vel in fluuio frequenter vtendum est; itē fomentis capiti adhibitis ex dulci aqua, ex oleo amygdalarum dulcium, violarum, & cucurbitæ, ex lacte etiam vel decocto extremitatum arietis cum lactucis, violis, capitibus papaueris albi, & 3.ij. ellebori nigri.

Præter hæc omnia protocationi mensium innitendum plurimum est: nam præcipua curandi ratio in huiusmodi affectu quadruplicem præstat considerationem: quarum prima cōgestionem sanguinis in vtero impedire docet, cuius gratia studendum est menstrua semper prouocare: secunda, si quid congestum melancholici succi est, expellere docet: tertia, flatus ascēdentes discutere: quarta verò & vltima id curæ habet, vt capiti, & toti corpori prouideat. Quod si neq; ijs, q̄ superius diximus, nec p̄dictis quatuor indicationibus adseruatis morbum subsistere comperiamus, regionem mutare oportebit iuxta Hip. præceptū, qui lib. 6. pop. par. 5. inquit. In lōgis morbis terrā mutare optimum est: præsertim si ad loca humida, & tēperata, ac prope mare ipsa mutatio fuerit. Quod si morbus vltra pergat, ad fontanellas cruribus apertas venire consulit rei difficultas.

Cauere tamen in hac affectione oportet acria clysteria, vtpote irritantia maximè vterum, & succos ibidem contentos commouentia: quod fit, vt non raro ab iniecto acri clystere fa minæ vehementius delirent, donec temporis tractu iterum subsideant humores.

Habet insuper hoc peculiare huiusmodi affectus, vt lentam, & paulatinam desideret curandi rationem: nam sicci & stabiles humores etiam si habituales nondum in corpore, aut capite introduxerint distēperiem, sensim parari emoliriq; conuenit, & eadem lege expurgari: ac pari prorsus modo intemperamentum introductum corrigere: nam qua ratione calidos humores ocysimè excernere oportet, ita crassos, & lentos lentè, & paulatim. Quod si ne hæc quidē omnia prodesse videantur, splenis aut meserei regioni setonem affigere expertus sum, miro modo profuisse.



IL profectò monstrosius, nil grauius, periculosiusve, aut difficilior, & obscurior in foeminarum affectionibus reperies, quam eam epilepsiae naturam & conditionem, quae ex uteri vitio, & consortio proficiscitur. Quippe tam est varia, difficilis, & abdita ac mille differentiis implicata, ut nullam seruare in cognitione, vel curatione certam legem, methodum ac regulam, qua aliquid unum in ea, aut proferre, aut efficere possis: nam in communi epilepsia, & ea, quae hominibus ex alia causa vulgariter accidit, nil aliud relucet, quam motus deprauatus, & totius corporis concussio cum sensuum oblatione: at in foeminarum epilepsia, quis narrare poterit, qualis motuum varietas, quanta motus & exteriorum sensuum mutatio, & vltimò omnium aliarum vitae actionum difficillima peruersio reperitur? Quamobrem non sat esse epilepsiae naturam, & causas in genere nouisse censeo, sed quid peculiarius haec affectionis natura in foeminis obtineat, dum ex utero principium sortitur.

Primum itaque nosse conuenit epilepsiam (utcumque sit) nil aliud esse, quam totius corporis concussione. Est quidem symptoma in genere deprauatum actionum motuarum, quod inordinatum praeter voluntatis imperium efficiat motum, laceffita solum motrice potentia ex cerebri immodica sensibilitate à remordente, seu obstruente irritata. Quae sanè cerebri sensibilitas omnes potentias expultrices, & animales sensuum in consensum trahit, & laedit, ut se tueatur à causa illa praeter naturam ad expulsionem omnes laceffens. Quò fit, ut cerebri potentia dilatatiua, & compressiua vehementius sese dilatet compressaque, ut quatiens quod sibi adheret & molestum existit, excutiat: quemadmodum in sternutamentis efficere cernimus. Neque credendum est, expultricem naturalem posse ita vehementes, ac varios motus edere, nisi motum etiam in consensum alliciat, licet non nihil inuenietur ad vehementiam motionum: ob idque non est à ratione alienum existimare, huiusmodi motus primo fieri virtute naturali expultrice, iuuante etiam virtute dilatante, & comprimente cerebri: quibus laesis animalis motum cerebri mille motibus errabundam apparere (quod nervorum principium laedatur) necessum est. Testimonio quidem est differentia inter apoplexiam, & epilepsiam: nam ob id in apoplexia malum grauius efficitur, & interimit, quia naturalis potentia, quae valuit, ex cerebro humorem crassum in spirituum foramen & cauitates pellere, nequiuit discutere eundem, & ab ea parte separare: quo in casu accedente vi dilatatiuae virtutis, motus in partibus nervosis, utpote quae magis laeduntur, fit conuulsius, & subinde motus vehementia, quod nocuum est, excernitur. Ex quibus constare arbitror, epilepsiam motus specie esse de genere conuulsionis pertinentem quidem ad spasmodum (ut ferunt) non proportionatum ad materiam: licet in quibusdam foeminis epilepsia aliquando accadat solum cerebri vitio citra ullam partium subiectarum concussione.

Verum, ut clarior euadat nostri instituti doctrina, cui morborum generi huiusmodi symptoma reducendum sit, disserendum nunc est. Costat enim vnanimi medicorum omnium consensu, morbum esse in hoc affectu, obstructionem, eam quidem ortam à crassis humoribus, qualis pituita est, aut melancholia. In qua re duo mihi sunt expendenda: primum, an morbus sit obstructio: secundum verò, an causa sit crassa & lenta.

A & lenta, ut priscorum sententia tenet. Circa primū nosse oportet, aliud esse in epilepsia motus illius vehementis rationē exquirere: aliud verō, causam adinvenire oblesionis mentis & sensuum. Nā obstructio, q̄ huius affectus fatentur esse causam, nequit ex propria natura deprauatum motū moliri, sed tantū plus minusve motum imminuere, vel ex toto auferre, quemadmodū in apoplexia, & paralyti fieri cernimus. Cōstabit agitur, aliā subesse huius symptomatis causam, nimirū (ut mea fert sententia) acrimoniā, mordacitatē, aut venositatē aliquius substantiæ illuc confluentis: deniq; id nata sunt efficere omnia, q̄ laessebunt, & irritare naturā expellente possunt. Ex quo prodit huiusmodi affectionē fieri plerūq; p̄ cōsensum, id quod apoplexiæ & paralyti non cōtingit, q̄ earū ratio in obstructione sita sit. Præterea, neq; sat est, humores esse acres, & mordaces, ut sensus interiores, & externos obledere possint: sed necessum subinde fuit, aliquē peculiare interesse morbum, quē ego citra dubitationē arbitror obstructionē esse: non tamen ut vulgō fertur, sed ut mox referā, si prius dixerō affectionē in genere fieri ex acrimia humorum, vel vaporum affluxu, qui cerebrum, aut distēperant, aut mordeant, moribusq; deprauatis occasionē p̄stentitē & ex obstructione, q̄ sensus omnes obledat. Quippe cū duo sint symptomata, q̄ in epilepsia elucet magis, sensuum nimirum oblesio, & motus conuulsivus, necessū profectō fuit, vnumquodq; propriā & peculiare obtinuisse causam. Sic procul dubio acrimoniā, & mordacitas conuulsionē parere natę sunt, ut videre licet in singultu ex aliqua p̄dictarum causarum suborto, vbi nullum apparet obstructionis vestigiū. Pati prorsus ratione cerebri obstructio, q̄ ex substantiæ, q̄ cerebrum conscendit, corpulentia proficiscitur, mentis & sensus oblesionē parit, ut in aliis affectionibus, citra motū cōuulsivum cōspicimus, quales sunt soporosi affectus, & alii his persimiles. Ex quibus cōstat, vtrūq; symptoma in epilepsia necessario subesse, quia vterq; morbus necessario accedit ad integrā eius speciē & naturā. Verū addubitabit fortasse quispiam & merito, quā ratione in epilepsia p̄ cōsensum fieri possit, ut solū aura quedā cerebrum conscēdes, potens sit obstructionē efficere, ut Gale. lib. de puerō epileptico affirmat, ita ut laborans sensuum actione omnino priuetur. Cui dicimus hac ratione differre epilepsiā p̄ primogenēā affectionē ab ea, q̄ fit per cōsensum, q̄ illa maiore infert sensuum oblesionē, quia à maiori prodit obstructione: hæc verō minorū, quia tantū ab halitu proficiscitur obstructio, seu (ut rectius loquar) obtenebratio. Quō fit, ut maiori ex parte in ea externi sensus non ex toto ledatur, id quod in epilepsia p̄ cōsensum ab vtero frequenti euentu experimur, ut paulo inferius latius probabo. Neq; credendū adhuc est, obstructionē adesse in ea, q̄ fit p̄ essentiā eo modo, quo in hemiplexia, aut apoplexia reperimus: sed peculiarius quid obtinere credēdū est, cuius rōne lōgissimis distāt intervallis, ut in causarū expositione iā andies. Cōstat igitur epilepsia ex duplici affectus genere, alio ad obstructionē p̄tinentē, alio verō ad mordicationē, aut extensionē, vel distemperiem cerebri: nō q̄ solū distemperies id efficiat, sed quatenus dolorē excitet, eō q̄ solū vnitatē, vel (ut rectius loquar) solū paratam, velut dolor id moliri possit. Cōstabit et subinde ex duplici symptomatum genere, vno ad sensuum diminutiā, seu ablatā actionē reducto, alio verō ad motus facultatē cerebri anormalium, naturalium & ipsi peculiariū deprauationē. Quo sensu mētēs ōtū

autorum

Causa.

autōrū cōcordes fiunt: quippe epilepsia partim ab obstructione, partim ab humorū mordacitate fieri, certum est. Quæ omnia communia existunt omni epilepsia, siue per primogeneam fiat affectionē, siue per consensum à quauis parte. Causas verò ob affectus variā rationē, diuidere quoq; hac in parte necessum est: nā quædā sunt, q̄ epilepsiam efficiunt p̄ essentiam, & rursus aliæ, q̄ ipsam p̄ consensum excitant. Præter quas nō defunt qui asserant, & non citra rationem, qnq; fieri ob angustia meatus à postica cerebri parte ad spinā, vel imperforatā lacunā, aut strictiorē ad palatum, aut ad nares viā. Quod Gal. de vsu partiū scribit, optime cōparatū esse à natura, vt p̄ decliues cerebri meatus, tū per palatū in os, tum p̄ corpus narium orificijs perspicuis, ac magnis pituita, aut alia cerebri purgamenta excernantur, ne animal frequenter corripatur epilepsia: nā videmus per eam viam expurgari materiam, q̄ epilepsiam excitabat, ac spumam ex ore duci. Quæ sanē cōpositionis ratio, licet reperibilis sit, q̄ rarissimē tñ accidit, quia natura id semper in cōpositionibus cauet, nisi erret. Causa verò (vt ad pensum redeam) q̄ per essentiam hoc malum excitat, pituita melancholicusq; humor est, vel quisquis alius crassus, viscidus, ac lentus in cerebro præter naturæ institutū creatus fuerit. Verū si quis rē altius examinet, reperiet faciliē (licet Gal. q̄ diximus asserat) aliter causas cōstituendas, Galenūq; intelligendū fore: nā si vt vulgus autumat ex Gal. decreto, crassos humores huius mali causam esse verū sit, haud leuia reperiet incōmoda, quibus id ita fieri per difficile esse videatur. Quippe crassos humores impossibile est hoc posse, quia sequeretur nil interesse inter epilepsia ex altera parte, & apoplexia, ac paralysem ex altera, quod probari faciliē potest: siquidē locus affectus idē est, nēpe posterior cerebri ventriculus. qua parte adhæret spinali medullæ: causa eadē, nēpe crassorū humorū copia: morbus idē, nimirū obstructio, ergo necessario symptoma tenetur idē esse. Quod si quispiā dixerit, ratione maioris, aut minoris obstructionis differre, intelligat velim, obstructionē maioris, aut minoris variare nō posse symptomatis genus, sed apoplexia, aut paralyse variare nō posse species efficere, nō epilepsia, aut symptoma aliquod ad actionē depravatā pertinens, sed solū ad ablatā, aut diminutā. Præterea, videtur per difficile à crassis humoribus epilepsia fieri, quia sepius p̄ cōsensum concitatur ab aura tenuissima, substantia aliōq; obstructioni inepta. Itē epilepsia subito generatur, ac soluitur, hoc nequit à crassis fieri, q̄ si aliqn id accidat, vel in aliud malū degenerat, vel nō soluitur ita subito vt cōis epilepsia: nā pituita difficulter separatur à partibus, q̄bus semel adhæsit, exēplo est apoplexia, q̄ nusquā subito soluitur, sed dū sanescit, in paralysem degenerat, q̄ deinceps lentē curatur. Præterea, q̄ hoc morbo corripuntur, p̄tinus spuma, aut tenui liquore p̄ os excreto liberantur, ergo mali causa nō erat viscidus, & crassus humor. Vterius ex ira, & alijs animi perturbationibus, & ex immodica cerebri sensibilitate, ac sensuū perspicuitate plures hoc morbo correptos cōspicimus, ergo nō à crassa, & viscida materia. Sūt p̄fectō tanti momenti huiusmodi rationes apud cordatos hoīes, vt iure optimo aliā teneantur exquirere in hoc affectu cause rationē: q̄ ego, saluo doctissimorū virorū iudicio, arbitror in epilepsia p̄ primogeneā affectionē, esse hos humores crassos, & viscidos, vt Gal. sententia tenet (ne videar à tanto autore leui occasione discessisse) verum alio modo dispositos, ac p̄paratos, non aut sub propria forma, ac natura existentes,

humores crassi
siue viscosi
epilepsia
causa sunt
sed alio modo
dispositi ac
in apoplexia

Ates, vt in apoplexia, & paralyfi cōtingit. Itaq; vt argumētis respōdeamus, ad generationē apoplexiæ, & paralyfis, p̄dicti humores crassi, ac visci di concurrunt sub p̄pria forma, quales natura sua existunt: eterum ad generationē epilepsie spumosiore, leuiore, tenuer, & rariore facti, alioq; impossibile est, causā huic malo coniunctam, seu continētē posse pręstare. Quemadmodum spuma pos excreta quotidiano euentu cōfirmat, à cuius excretionē protinus cessat affectio, quasi demonstrans, illā esse proximā illius mali causam. Quamobrem mirum nō est, si ex vna causa in eodē loco, & ex vno tantū affectu diuersa suboriantur symptomata, siquidē causa dispositio nata p se est eam differentiā constituere. Secundū stat etiā differentia, quia in primis duobus affectibus p̄dicti humores facultatē deiiciūt, ac superāt, ita vt ne ipsos quidē expellere possit, nec se modo aliquo mouere: at in epilepsia solū eādē irritant, & laceffunt ad motū expulsio nis, quē mouēt. Quō fit, vt cū p̄e impotētia, aut frequētia accessionū lassata, vel ex humorū crassitie impedita, neq; humorē mouere, facillē ex epilepsia apople xiā, aut paralyfim inuina patiat: quo experimēto certior efficitur dīa generatio nis inter hos affectus. Cōfirmat nostrā s̄niam altera huius affectus pars, nimirū, dū p consensum efficiunt: nā citra humorū pręsentia sola aura, halitu, aut flatu caput irruētibus in grauissimas epilepsias plures deciderūt, irritata, ac laceffita ad expulsionē facultate, & eō magis, quō acrior extiterit sentiendi potentia.

Sed vertet aliquis in dubiū, si obstructio ad sensuū oblaesionē, symptoma hu ius affectionis p̄prium, necessaria est, q̄ fieri possit, vt ex aura, vel tenuissimis hali tibus, aut ex sola sensus acrimonia cerebrū obstruat, ac si nō obstruitur, qua via sensuū oblaesiones fiunt. Cui dubitationi dicendū arbitror, sat esse ad sensuum oblaesionē nebulosam illā substantiā in caput irruere, cui tanq̄ concausa accedit vehemētissimus ille cerebri motus, quo existētī ē si nulla subsit obstructio (vt in iis cōtingit, q̄ perspicaciori sunt sensu) impossibile est, aut p̄difficile sensus posse p̄prias libere edere actiones ob cerebrū in cōmodū figurā, & spirituū in ordinatos motus: p̄terquā q̄ sic affecti non oīno sensu priuantur, quēadmodū frequenter conspiciamus in hysteris affectionibus, & epilepsia p consensum, in quibus plures fēminæ audiunt quidem, respondere tñ ob deprauatum mu sculorum motum nequeunt. Itaq; iam constabit duplicem esse in genere epi lepsie causam, alteram, q̄ per primogeneam affectionē captu infestat, velut est humor crassius, factus tñ rarus, leuis, & spumofus alteram verò, q̄ per cōsensum hoc malū excitat, & multiplicem habet occasionē, eamq; vel à ventriculo nō nunq̄ ortā, vel quouis alio membro, aut viscere, ex causa quidē vel manifesta, vel nobis occulta, vt de puero epileptico Gal. refert: modo ibidē aliq; venenatus humor generet, cuius halitus ad tēpus cerebrū irruens, epilepsiam excitet: modo ex morfu venenati alicuius aīalis virus in corpus eiiculātis p̄deat. Nā dū p̄dictū venenū ve nas primitus attingit, malū corporis habitū, ac tumorem p̄ter naturā in toto corpore generat, sanguine venenoso facto, & iecoris calore corrupto. Dū verò venenū arterias irruit, vniuersi corporis calor emorit, & ma xima anxietate, inquietudine, & frigidis sudoribus, ac syncope aīal interficit. At cū neruē aliq̄ substantiā venenū primo aggreditur, in epilepticā cōuulsio nē p̄culdubio corpus defert. Cui sanē malo cōsimile vitū vterus ex semine, & menstruo corruptis in caput regerit, miramq; illā epilepsie varietatē, q̄ à prin-

cipio

*Duplex ca
usa epi
leptice in p̄o*

*De veni
Epilepsia*

cipiō, p̄posuimus, machinatur, cuius varietatis rationē exponere iā aggredior. A
 Solet quidē hoc malū fœminis accidere, vel viduis, q̄ nō p̄bē (vt moris erat) fœminē vel sanguine mēstruo purgātur: vel virginibus, aut sterilibus, q̄ minus q̄ abundantia iuuenilis postulat, aut cōsuetudo ferebat, steriles fœmine, & virgines mēstruo sanguine expurgantur. Quibus sanē substantiis suppressis cōtin-
 git facillē inter alia vitia, venenosa sordidaq; corruptione fœdari: à q̄b; nō le-
 uia accidētia ex iis, q̄ ex epoto veneno p̄dire diximus, miserrimis fœminis sue
 crescūt. Quippe ea rōne, qua in virorū digitis, crūre, vel manu veneni q̄d p̄fimi
 le generatur, à quo epilepsiā p̄ficisci dictū est, eadē p̄fectō omnino in fœmina-
 rū vteris accidisse plerūq; certū est. Quā porro epilepsiā ex p̄dicta causā obor-
 tā, nō vulgārē, & vtcunq; esse cēsemus, sed mille varietatibus implexā: nā qui-
 busdā totū corpus cōtemiscit: aliis vna aut plures partes: rursus nonnullis vel
 oculus solus, aut lingua, vel caput, vel manus, aut alterū crus: nonnūq; septum
 trāuersum, & multis reliqua respirationis instrumēta: plerisq; horū aliquid p̄
 intervalla ordinata, aut citra ordinē accidit, vel sp̄ōte, vel à leui occasione sum-
 pto principio, & (quod mirabilius est) ex voce, sonitu, aut musico cōcentu, vel
 flatu, aut quauis alia re, cuius rōnē intellectus cōsequi nequit, q̄ extra naturē B
 ordinē & institutū videatur ad sensum p̄esse. Quibus p̄terea motus varietatibus
 aliqn̄ accidit aliquod mētis vitium succrescere, vel alicuius externorū sensuum
 ita vt q̄dam ap̄ertis oculis nō videant: alię neq; verbū audire possint: multę loq̄
 nō valentes, mutæ & veluti fatuę decūbunt. Plures itē se videre, & audire mul-
 ta, q̄ falsa, & à ratione aliena sunt, existimant: alię quidē vociferantur, & vehē-
 menter cōqueruntur, cū verō p̄ferre quid sentiant, cupiunt, nō valent: nonnullę
 itē risum non leuē proferunt, alię fletum: omnes tñ ferē sensu tactus priuantur.
 Plerisq; etiā pleraq; ex p̄dictis accidentibus simul iuncta succrescunt, variā &
 incōprehensibili cōnexionē intertexta: ita vt quiuis fœminā sic affectā nouū,
 & nūq; visum accidens perpeti iudicare iure optimo possit. Itē ex fœminis sic
 affectis quedā nullum cibum appetunt, aliæ etiā si appetant, deuorare tamen ne-
 queunt: plurimæ si id conentur, statim euomunt: quod etiam in potu accidere
 cōperimus: qua ratione subinde vrinam nō reddunt: q̄ quoq; varietatē in appē-
 titu accidere vulgatissimum est. Verūm licet hæc omnia tam mira varietatē lu-
 dentia epilepsie succrescant, una tñ eius ratio est, vna natura. Cū hoc tñ licet C
 varia & diuersa existant p̄dicta accidentia, omnia tñ prodeunt cerebro pri-
 mum ex vtero affecto: quod sanē sic affectum alicui parti deinceps vitium com-
 municat, cuius lesione accidens aliquod ex p̄dictis oriri necessum est. Itē cere-
 brum ex vtero affectum, cordi, intestinis, ventriculo, septo transuerso, sensuum
 instrumentis, aut plurimis ex his partibus vitium cōicat, nunc seorsum cuiq;,
 nunc omnibus simul, aut plurimis. Præterea, fiunt eadem vitia vice versa, nimi-
 rum, vtero ledente membrorum aliquod ex p̄dictis, quod postmodū susce-
 pto semel damno, cerebrum quoq; afficit, & in consensum trahit: quæ sanē ra-
 tio maximi est momenti in monstruosa huius epilepsie varietate distinguēda.
 Quamobrē rationē diuersitatis accidentiū in his duobus ledendi cerebrum
 modis sitā procul dubio esse arbitror: nā primo cōsistit vna diuersitatis ratio in
 eo q̄ cerebrū vitium ab vtero susceptum reliquis partibus cōmunicet: ex quo
 succrescent necessario duo accidentium genera, tria, vel plura iuxta diuersitatē
 par-

A partium, quæ vitium à cerebro susceperant: unde mirum non est, si partes, quæ afficiuntur, naturæ variæ existunt, & cuique inest sua accidentis ratio, variæ quoque succrescant in corpore accidentia. Secundò id profectò fit, quia membrum aliquod, vñ aut plura ab utero afficiuntur, & ipsa postmodum cerebrum ledunt, ex quibus eadem etiam accidentium varietatē suboriri necessum est. Vt cunq; tñ fiat epilepsia, ex utero halitum habet caput ferientē, vel partē, cui caput consentit: quod Hipp. pulchre dixisse constat lib. 7. pop. Plurimas enim (inquit) vteri affectiones flatus faciunt, signū sunt ructus, & strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, & dolores circa renes, ac coxas. Quos sanè flatus mouet externa, aut interna quævis causā, quæ excitare eosdē, non tñ discutere apta sit: quos tñ flatus sci mus ex semine, aut sanguine menstruo, vel ex vtraque substantia, quæ mille modis antea posse vitari diximus, prodire. Hanc sanè corruptionis varietatē asserimus tertiam varietatis accidentium causam constituere. Ex qua varietate, quæ dissimilis admodum est & confusa, prodit, halitus quoque, ascendentes varios esse, frigidos nimirum, quales semē corruptum gignere habet, calidos, mordaces, crassos, caliginosos, fetidos, tenuissimos, & maximè penetrantes, tenaces, diuque alicui parti persistentes, & alijs modis innumeris variegatos diuersosque: ita vt mirum non sit, si diuer forū quoque symptomatum causā sint, et si affectionis ratio vna sit, quæ potissima causa est, cur præcipuis actionibus feminas subito priuari conspiciamus, & subito ad pristinum statum peruenire. Inter quas sanè alias reperies, quibus diu durat affectio: plures, quæ nihil fuisse perpellas monstrant, quatenus ad corporis specimen pertinet, et si grauissima sustinuerint accidentia, item alias alijs modis affici. Itaque varietatis ratio stat, vel in varia corruptionis seminis, & sanguinis menstrui sorte, vel in membrorum, quæ aut vitium ab utero susceperant, & capiti referunt, vel eorum, quæ à capite ex utero affecto coafficiuntur simul, varietate: quæ omnia proficisci probatum est ab externa causā, quæ flatus concitet, vel ex interna, quæ ibidem foueat, vtraque tamen mouente, aut semē, aut sanguinem menstruum prædictis modis vitium.

B Monstrare quidē per signa hunc affectum frustra, & inutile profectò est, siquidē motus deprauati, & mentis ac sensuum oblationes id facile ostendunt. Cæterum per consensum ne, an per primogeneam affectionem sit, non est ita facile nosse. Docuerat tñ id Hipp. nuper adducta sententia lib. 7. pop. quæ hæc refert verba. Plurimas vteri affectiones flatus faciunt, signum sunt ructus, & strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, & dolores circa renes, ac coxas. Præter quæ signa, et dum per consensum sit, nulla aut quæ paucissima spuma per os erumpit. Itē id monstratur ex mensium suppressione, vel diminuto præter morem fluxu, & in viduis, ac ijs, quæ viris vtuntur, ex seminis suppressione: nam sæpe eo ultra ætatis rationem retento grauius virginibus ipsis offenduntur viduæ. Constat item per consensum, & ab utero esse ex alijs vterinis affectionibus, quibus haud raro feminæ sic affectæ conqueruntur. Præterea, ex varijs accidentibus inordinatis, & quæ nullā similitudinem seruant: quod alienum profectò est à cōis epilepsie natura. Item eo quod feminæ ex utero affectæ, etiam si reliquis sensibus orbentur, frequenter tamen auditum superstitem habent. Constat et, quia epilepsia ex utero semper habet sibi comitem alterius partis affectum. Adhæc, proficisci tur à vitio alicuius inferioris membri, quod vterus ipse afficit: id quod ex pe-

N culia-

*Affectus
nisi signa.*

cularibus partis symptomatis facillè inuenies: nã si vètricus fuerit, id optimè **A**
 dignosces ex vomitu, nausea, cibi fastidio, oris vètrici morfu, atq; oris amaro
 re, q̃ sanè omnia accessiõnè præcedunt, & vltimò eò q̃ famescerent potius q̃ sa-
 turas accessio apprehendit. Sic frequenter ab splene prodire distingues ex rugi-
 tu in ipsius regione, ex dolore, ex mœstitia, taciturnitate, & timore. Pari etiã ra-
 tione à corde pficisci internosces ex anxietate, coloris mutatione, pulsus varie-
 tate, animi languore, & totius corporis impotentia. Verũ si vteri consensus pri-
 mo caput apprehenderit, subita fit accessio, præterquàm q̃ aut tinnitus aurium,
 aut vertiginosæ imagines præmittuntur. Semen verò corruptum esse eò digno-
 sces, q̃ omnia accidentia maiori ex parte frigiditatem attestantur.

Affectiõnè hanc periculosam esse, & mortis præfagã dubitauit nullus, præ-
 sertim si accessiones frequentius irruant, & cor etiã oblædatur: finaliter, corpo-
 re existente pleno, & laborante languida nil mirũ si in apoplexiam ieuẽ, aut in
 paralyfim degeneret. Quapropter peculiari diligentia auxiliares manus adhi-
 benda sunt. Verũ si rariùs accessiones repetant, non est protinus verendũ præ-
 dictum malum accessurum, etiam si seuißima prima facie videatur accessio: ob
 idq; bona spe alere oportebit assistentes. **B**

*Curandi
ratio.*

Cum non minus pgnantibus huiusmodi epileptici affectus accidant, q̃ reli-
 quis mulieribus, ac in accessione illæ abortu, hæ verò suffocatione, aut alio ma-
 lo periclitentur: ob id primo innitendũ est accessiõis mitigationi, vt q̃ nõ mi-
 nimũ periculũ asserre soleat. Curandum igitur dũ fœminam accessio apprehen-
 derit, q̃ citissime renocare, cauentes ne vulnere percussioneve, aut alio damno
 vehementis motibus afficiatur: cum hoc tñ prohibere ex toto quominus aliqd
 moueatur, vt multi magno conatu perperam efficiunt, à ratione alienum esse,
 semper existimaui: siquidẽ dũ motus ex toto cohibentur, proculdubio accessio
 nẽ retardari haud rarò conspicias. Cum enim concutiunt partes, materia, q̃ par-
 tem internam affligit, discutitur: præterq̃ q̃ dum fœmina ab accessione reuoca-
 ta est, superest deiecta, ac confracta nimis. Præterea, cunni arte studendũ est, vt
 id totum, quod cerebrum irruit, q̃ citissimè euanescat, discutaturq;: his quidẽ
 præsidijs, q̃ naribus indita innata tenuitate ad ventriculorum cauitatẽ permea-
 re, ac materiã illam absorbere digerendo, resiccandoq; facile possint. Sunt aut **C**
 ea ipsa, quæ alioqui sua sponte epilepsiam excitare assolent, vt lachrymæ forti-
 dæ, bitumen, castoreum, folia ruta, pulegiũ, calamintha, & id genus alia. Neq;
 mirum cuiquam esse debet, si hæc, quæ epilepsiam concitare nata sunt, leuamẽ
 in eadẽ præstare possint: quippe primũ materiã cõmouendo disponunt: secun-
 dũ verò eandem commotam digerunt discutuntve. Pari etenim ratione id ef-
 ficiunt, ac peonia callo suspensa attenuando, in scidendo, discutiendove, quod
 sibi proximum steterit. Qua profectò ratione censeo, mulierculas astantes suffu-
 migijs ex papyro, pilis, & alijs (q̃ fœtida sunt) vstis q̃ citissimè sic affectas renoca-
 re: experimentum quidem efficacissimum ad dignoscendũ, an affectio per con-
 sensum sit, nec ne: q̃ in primogenea nihil hæc præsidia prodesse comperiamus.
 Prodest etiam aqua ex distillatione cerasorum epota, q̃ mille laudibus non cõ-
 temnendi autores extollunt: cuius etiã naturæ creditur esse aqua ex distillatio-
 ne hirudinum, q̃ paulò inferiùs scribam, mensura. ij. 3. quæ ori imposita discu-
 nit, & propria partiũ tenuitate se in abditissimas partes insinuat. Oleis quoque
 vten-

- A** vtendum est intra aures proiectis, & super capitis suturas adhibitis: præsertim ijs, quæ valde tenuium sunt partium, velut est oleum de spica, de sampsuco, de cinnamomo, de nuce muscata, vel rutaceum, aut sycionium, addita aquæ vitæ tertia parte. Quibus citra dubium magis profunt cucurbitæ vtero affixæ, & ea medicamenta, quæ vtero imposita flatu discutere sæpe diximus. c. de suffocatione. Vtero quoque odorata adhibenda sunt, nisi mulier prægnans fuerit, cui satis erit supernas partes suffire. Profunt etiam extremorum vincula, & frictiones, quibus frequenter adhibitis sufficere haud raro solet: sicut ventræ oleo rutaceo, liliorum, & de bacis lauri, ac similibus inungere. Suppositoria itæ valētiora, voces & strepitus magnos conferre sæpissime visum est. Itæ in conspectu laborantis magna luminaria succedere capite, & corpore subito erectis, & apertis oculorum palpebris. Sic & vehementissima pilorum pudendarum partium auulsio, dubio procul feminas hoc modo affectas reuocat: sicut viros testium dolor. Cauendum tamen in foeminis est à vehementioribus medicamentis, in quibus si diu duret accessio, eaquæ sit ex mensium suppressione, consultissimum est, ex talo sanguinem mittere: quo præsidio non paucas reuocari facile conspeximus, præsertim alijs nihil præstantibus: in quibus, si menstrua defecerint, cauendum est à cucurbitarum super vmbilicum vsu, quarum gratia laudarem potius femoribus affigi.

In vera autem curatione obseruandum est: tanquam in re grauissima, & difficillima præceptum illud Hip. li. i. de morb. mul. in foeminarum curatione non satis laudatum. Considerare oportet etiam (inquit) naturas mulierum, & colores, & ætates, & tempora, & locos; Aliæ enim frigidae, aliæ humidae, ac fluidæ: aliæ calidæ quidē sicciores, ac stabiles sunt: nā quæ superalbidae fiunt, humidiores sunt ac fluidiores: nigrae verò sicciores, & acerbiores, ac astrictiores. Quæ verò vini colorem referunt, medium quidē inter utrasque habent: sic autem & in ætatibus contingit, iunecule enim humidiores sunt, & multo sanguine plerumque refertæ: anicule verò sicciores, & modicum sanguinem habentes: mediæ vero medium quoddam iter utrasque habent, ut quæ nunc æquales existunt. Oportet autem eum, qui rectè hæc tractare volet, semper mulierum naturas discernere, & temporum occasiones, & ætates, & tempora, & locos, & ventos. Quæ proculdubio sententia constat, quanti momenti sit, & quod difficile feminam curandam suscipere. Quod etiam antea lib. de nat. mul. dixerat idem Hippoc. per hæc verba: Oportet eum, qui hæc rectè tractare velit, primum quidē ex Dijs ordiri, deinde mulierum naturas discernere. Quāobrem neque temerè, nec incōsultò cuiusvis mulieris curationem aggredi oportet: sed primò in hoc affectu peculiares foeminarum conditiones considerare opus est: nā individualis, & propria conditio plurimum euariat à cōi curandi ratione. Primum etenim sat est, foeminæ vtero gerenti (nā de eis primitus sermonē instituere placuit) emplastrum pro matrice apponere, quod recipiat massæ emplastri per matricem, & ceronei, ana ʒ. j. l. musci. g. vj. misceantur cum oleo liliorum, vel de spica, & fiat emplastra duo, quorum alterum ventri, & alterum dorso apponatur: confert vel carnis semiasse frustum cum modico moschu, & cinnamomo eisdem partibus apponere, vel pomum assum, vel micam tosti panis, vino irroratā, & eisdem pulueribus sparsam: vtatur et sic affecta trochiscis de moschu, quos ore teneat frequenter. Sed curandum omni studio est, ut quod breuissimè ab accessione reuocetur, adhibitis etiam prædictis oleis vtero, & naribus suffumigatis: nam periculum est, ne si diu duret affectio, foetura suffocetur.

Si ex mē-
struo san-
guine
fiat.

Verum in reliquis fœminis curandi rō triplex insurgit: altera, q̄ vtero proui-
deat, cui summo opere innitendū est: altera verō, q̄ capiti. & rursus tertia, q̄ eius
mēbri curā habeat, cui ēt vel vterus, vel caput dānū p̄stat. Atqui cū vterus vna ē
tribus rōnibus id malū efficiat (propter flatu nimirū, aut halitus ab eodē elat-
tos, ex semine, vel sanguine menstruo proficiscentes) ob id profectō hęc tria in-
spicere ad rectā curandi rātionē par est. Quod si sanguinē menstruū redundare
compertum fuerit; ex d̄ minuto, vel ablato menstruo, ex fœminæ habitu, ex ac-
cidentiū conditione, q̄ sanē mitiora sunt, ac ex totius corporis, & faciei rubore
& alijs, q̄ superius diximus: potissimā curandi ratio est, vt Hipp. placuit lib. de
virg. morb. ea quæ p̄ sanguinis detractionē efficitur: tū venis tali scillis, tum mē-
strui omni arte provocatis, vt proprio cap. dictum est: tū ēt per hemorrhoides.
Quibus vacationibus p̄ intervalla inter curandum factis affectionis materia
demitur, & alijs curationibus via sternitur, ac vterus quoq; disponitur, vt robo-
rantia, & discutientia innocuē admittere possit. Sed expendant hunc affectū cu-
raturi, millies mihi, & alijs viris in hac re peritis longissima obseruatione esse
cōpertū, medicamenta expurgantia, q̄ passim ab autoribus cōmendantur, pro-
desse quidē parū, aut nihil: natu cum id, quod affectū generat (ēt si semel excer-
natur) sæpius sanguine ad vteros conflente, ac semine ēt nouiter indies genito
& corrupto producat, & denuō accersat affectum, fit proculdubio, vt mini-
mum prodesse videantur. Quamobrē si quis malū radicitus (quantum res ipsa
patitur) euellere cupit, studeat perpetuo, vel materiā superuacua ex toto aufer-
re, vel si quid indies corrūpitur, sensim, & paulatim p̄ certū & determinatū lo-
cū, cui natura assuescat euacuare. Primū quidē fit, missio, vt dictū est, sanguine
bis, terve, aut quater in anno, idq; p̄cipuē ex venis tali, vt & putredo sanguinis
in vtero inhibeat, & siqd̄ ibidē redundat, auferatur, euoceturq; cōsuetis vte-
ri fluxus, vt minus deinceps redūdet, minusq; qd̄ superest, putrefiat. Quod si fre-
quēter accessiones superuenerint, tutū est consiliū, hirudines hemorrhoidibus
affigere, donec copiam sanguinis cōuenientē extrahant. Quo facto, sanguinem à
recrementis, & vitiosis humoribus (quibus abundare, dum ultra modū detine-
tur, necesse est) mundare oportet: sic etenim sanguis, & semen tardius corrūpun-
tur. Id quidem primò facere tentabis leuissimis medicamentis (nam licet in me-
lancholia, quæ in maniam degenerat, grauioribus vsi fuerimus, poposcerat id
affectionis natura, etiam si vteri conditio ea renuere videretur) bis, terve in an-
no, tum etiam frequentius nimirum per epicrasim, ex rhabarbaro, si iecur com-
patiatur; ex agarico, si ventriculus; & ex vtroque pillulis confectis, aut expres-
sione facta, si vtrunq; membrum compatiatur. Prodest & aloes lota pillularum
forma exhibita, vel pillulæ ex hiera simplici Gal. & mastiche, vel confectæ ex
pari portione rhabarbari, agarici, aloes, & mastichis. A quibus purgationibus
confectionem Amech sine scammonio, & colocintide præbere per longiora
intervalla præstantissimum est præsidium, siue sola, siue cum modico rhabarba-
ro, aut agarico commixta exhibeatur, vel aqua lactis, aut decocto aliquo cor-
diali liquata. Quem etiā vsu præstat syrupus ex infusionibus, vel casia fistula,
cui adijciendū est aliquid eius, quod calfaciendi, & flatu discutiendi, ac robo-
randi vires habeat, velut est puluis hieræ simplicis, diarrhodonis, anisi, liquiriti-
æ, peoniæ, & similibus. Verum cū huius, & aliarū vteri affectionū, aded sit
mali-

A maligna conditio, vt præterquam q̄ mēbra nutrimentalia, & viscera omnia frequenter sibi in cōsensum trahat, cruditates quoq; multas, & varios excrementisq; succos in vtero, capite, ac reliquis mēbris gignat: ob id profectō vltius purgare aliquñ conuenit, habito respectu ad aliquem humore quē ex prædicto vitio redundare cognouerimus: vel ad aliquod ex nuper dictis membris posthabita vteri cōditione: q̄ dū sic afficitur, & semine aut sanguine corruptis abundat, raro admittit maiora medicamēta. Sic redundante humore melancholico, vel splene affecto, aliquod ex dictis pharmacis c. præce. huc trāsferre opus erit. At redundantibus p̄uita, vel crassis, ac viscidis humoribus, facta preparatione pillulis assaieret, de hiera, de mastiche, de agarico vū tuto poteris. Ceterū parare in hoc affectu pillulas oportet sine croco, myrrha, & alijs, q̄ caput tētare nata sunt, sarcocolla tñ, & peonia omnibus admiscēda. Quod si alijs cedere affectio nequeat, ad stibij g. iij. confugiendū esse arbitror, quod quidē p̄sidium certū, & mille modis proficiū reperies, in grauiorib. tñ ac difficilioribus epylepsijs. Sed materia vacuationi idonea reddetur melle rosaceo, hydromelite, syrupo stœchados, aquis gallitrici, betę, rutę, hyssopi, vel cū harū herbarū decocto, aut cū radicibus peonię, polipodij, & acori. Quod si serapio aliquo, quo leuiter purges, vti fuerit in animo, hac lege mirabilis efficacit̃ cōpones: Recipe polipodij quercini ʒ. iij. radice peonię, & seminis eiusdē, ana ʒ. ij. gallitrici, violarię, mercurialis, an. m. j. summitatū rutę, pulegij, betonicę, hyssopi, ana m. s. p̄sularū sine acinis, & prunorū, ana ʒ. ij. anisi, fœleleos ana ʒ. s. seminis cartami cōtusi, & foliorū senę, ana ʒ. ij. florū violarū p. ij. buglossę, anthos, ana p. j. fiat decoctio in li. iij. hydromelitis, & vna consumpta, infundantur facta expressione in libris duab. p̄dicti decocti, agarici ʒ. vj. cū saccharo fiat serapiū addito modico cinnamomo. Quibus sanē p̄ interualla, & vt necessitas tulerit vtendū est, ne aut sanguis, aut alius quiuis superuacuis humor ea copia, vel in vtero, vel proximis partibus succrescat, qua in corruptionem facile degenerare possit.

In qua item curatione semini prouidendum est, ne aut plurimū crescat, aut corruptatur. Sic profectō omni arte studendum est, ipsum minuere, & exsiccare

C re cibis, potibus, & medicamentis, quę huic vsui idonea esse, cap. de vteri suffocatione abundē diximus, non enim mei instituti est, eadem multis in partibus eiusdem operis referre.

Secunda verō curationis ratio, q̄ posse radicitus malū extirpare diximus, id p̄sidium adinuenit, quo paulatim, & sensim, q̄ putredini parata sunt, aut putrescunt (siquidē semen, & sanguinē non succrescere interim dū fœmina iuuetute viget, est impossibile) p̄ partē aliquā, cui natura assuescat, perpetuo fluore excernatur: id sanē p̄stat fontanella altero, vel vtroq; crure adaperita, prout iecur, aut splenē consentire affectioni nobis cōpertū fuerit. Idq; hac lege facies (vt lib. nostro de auxil. indica. c. de fontanellis abundē dictū est) si affectus nondū fixū, & stabilē habuerit in capite epilepticum apparatus, sed vniuersa epilepsię ratio p̄ consensum ab vtero sit, sat est in cruribus fontanellā aperire. Verū si aut natiū contraxerit habitū, aut p̄ affectus vetustate acquisierit, tūc & in brachio & in crure aperienda est: illud quidē, vt quod in capite indies aggregatur, epileptici apparatus causa, p̄ foramen illud expiret: hoc verō, vt ab vtero parū, aut nihil ad cerebrū ascendit, retracto p̄ cruris foramen superfluo corruptove hu-

N 3 more.

more. Quod praesidium tanti semper feci, tamq; feliciter successit, vt ex graui-
simis accidētibus, & ex ijs, quæ nullis alijs auxilijs cedere voluerunt, plurimas
feminas liberauerit: ad quod profectò, tanquam ad vltimum, & maximū pre-
sidium haud frustra confugies.

*Quadi-
scunt
& robo-
rant.*

Verum vt omni studio vtero, tanq; mēbro mandanti, pvideamus, curādū est
status discutere (huius certè mali immediati autores) & vterum cōsumptus hu-
morum reliquijs roborare. Quæ sanè oīa pariter efficiunt theriacā, Mithridatū,
diamos dul. & amar. electarium de gemmis, latificans Rasis cū aqua buglossæ,
capillorum veneris, vel peoniæ. Incredibili tñ efficacia prodest (& obstructio-
nibus et aperiendis, vt seq. c. docebo) vsus lapidis vozoar appellati, praesertim si
diluetur aqua, vel decocto schorcionera. Cōsumit quoq; reliquias, & miri est
iuiuentū decoctum galli antiqui cum brassica marina, polipodio, cartamo, &
passulis, vel cum decoctione peoniæ, & senæ. Profunt item tabellæ, q̄ conficiun-
tur hac lege: Recipe seminis agnicasti, rutæ, anisi, fœniculi, ana 3. s. pulueris li-
gni aloes, corticis citri, & menthæ, ana 3. j. sacchari quantum sit satis, vt fiant ta-
bellæ. Praestat nō minus aqua, q̄ extrahitur ex destillatione p̄dictorum seminū
cum pugillo capillorum veneris, & radicū buglossæ, ac schorcionera. Eundem
vsus p̄stat ventrē inferiorē inungere oleis chamæmeli, liliorū, de ruta, de bac-
cis lauri, & alijs, q̄ ex p̄dictis seminibus, & cinnamomo, aniso, pipere, & gario-
phyllis p̄ alembicum instillantur. Cōferunt quoq; emplastra p̄matrice, q̄ c. de
suffocatione diximus, & tu ipse reperies c. de vteri imbecillitate; itē emplastrū
ceroneum p̄ se, aut p̄dictis oleis admixtum: foris et ex chamæmalo, rore mari-
no, meliloto, adianto, radicibus diureticis, seminibus anethi, fœniculi, rutæ,
agnicasti, cimini, & lauri. Ventrē tñ existente vacuo, hæc oīa tutius facies. Con-
ducit non minus clysterium vsus, p̄sertim si hac lege conficias: excipe mercu-
rialis, blii, artemisia, cuscute, melissæ, & maioranæ, ana m. s. senæ, polipodij, car-
tami, ana 3. s. epithymi, thymi, ana 3. v. seminis anethi, rutæ, & agnicasti, ana 3. ii. j.
facto decocto adde diasenæ, diacatholiconis, ana 3. s. olei chamæmali, & anethi,
ana 3. j. misce. Quæ sanè oīa moderari, & mutare facillè iuxta laborantis naturā,
& affectus conditionem poteris: nam hæc tantum exempli causa dixisse sit satis,
Præter q̄ omnia vterum expurgare oportebit suppositorijs, & pessarijs, q̄ & se-
men educant, & menses moueant: quorum non parua copiam reperies ca. de
vteri suffocatione. Quo etiā in loco reperies stillatitiam quandam aquam, q̄
potui datam maximi esse momenti experimento didicimus.

*Qua ca-
pui respi-
ciunt.*

Capiti quoq; prouidendum esse, cōsulit affectus rō: nā cum vniuersa eius na-
tura ab eisdem actionibus cōseruetur, pueniaturq; dum frequenter halitus il-
luc peruadunt, rationi consonum est coniectari, vel ipsum fieri imbecillius, vt
deinceps propria munia obire nequeat, aut resistere halitibus non valeat, uel
ex eadem imbecillitate humores quoq; , seu excrementa praua loco alimenti
conficere, q̄ postmodum à leui occasione cōmota, et epilepsiam excitant. Quā-
obrem curandum est, ut si quid in eo adhuc, ex ijs, q̄ ascenderunt, superest, aut
nouiter generatum est, discutatur, excernatur v; ac deinceps corroboretur, ne
facillimè, id vitium iterum admittat, aut generet. Primò quidem p̄dictis pillu-
lis uti oportebit, praesertim mastichinis, cum sine quibus, addito modico ex co-
chijs: uel facta leui aliqua purgatione, ijs pulueribus, tabellis, & confectioni-
bus

A bus vti cōueniet, q̄ discutiant, si quid superest, & ē caput ipsum roborent. Cōfi-
 citur aut puluis hac lege: coriandri p̄parati 3. j. pulueris radicis buglossę 3. j. cin-
 namomi, corticis citri, seminis anisi, & agnicasti, ana 3. iij. ligni aloes 3. j. saccha-
 ri 3. iij. fiat puluis, & misceantur, quo summo mano vtatur. Alter ē p̄tiosissimus
 paratur hoc modo: excipe violarum 3. j. eumini, cerui, secleos, ana 3. iij. seminis
 peonię, seminis rutę, & agnicasti 3. j. pulueris subtilissimi (aut cineris) cranei hu-
 mani, vel cuculi, vel hirundinum, aut melissę, vel mustellę 3. iij. fiat puluis sub-
 tilissimus, cuius laborans sumat 3. j. sacchari candi 3. j. cum aqua gallitrici, vio-
 larum, aut graminis. Cuius ē loco tabellas hoc modo cōficiēs: excipe myrrhae
 electę, coralli rubei, cornu cerui, & eboris, ana 3. j. seminis peonię maris, semi-
 nis agnicasti, visci quercini, ana 3. j. cranei humani 3. j. & 3. j. cum saccharo dissol-
 luto in aqua rosacea fiant tabellę ponderis 3. j. quatum vna manē, aut vesperi
 fœmina ingerat. Expendendum tñ hac in re est, medicamentum in hac affectiōe
 deuoranda minime odorata esse oportere: quippe cum capitis grauitatē faciāt,
 paratis ad epilepsiā paroxisum accerant. Valet quoq; sicut in omni epilepsia
 cōfectio altera ex craneo humano hac lege cōfecta: excipe theriacę smaragdo-
 rū 3. j. diamusci vtriusq; ana 3. j. theriacę magnę 3. j. & 3. j. pulueris seminis agni-
 casti 3. iij. pulueris radicis peonię 3. iij. pulueris cranei humani 3. iij. cū serapio
 de stœchade fiat cōfectio: p̄stat idem beneficium radix eringij saccharo cōdi-
 ta, & diu comesta. Ex vsu ēt est cōserua, q̄ recipit radicis peonię, & eringij prius
 satis decoctę lib. j. mellis quantum sit satis, vt fiat cōserua: cui adde pulueris
 cinnamomi 3. j. pulueris seminis agnicasti 3. iij. Eandem & longē maiore gra-
 tiam p̄stat cōfectio, quę recipit theriacę smaragdorum 3. j. pulueris radicis
 peonię maris, & seminis eiusdem, & agnicasti, ana 3. j. coralli rubei p̄parati 3. j.
 visci quercini 3. j. pulueris vermium rubi, & succi rutę, ana 3. j. cornu cerui vsti
 & monocerotis, ana 3. j. pulueris pullorum hirundinis adustorum 3. j. rhodo-
 mellis quantum sit satis, vt fiat cōfectio: cuius bis, aut semel in hebdomada la-
 borans sumat cocleare vnum. Item mirum in modum corroborat caput cōfe-
 ctiō alia, q̄ recipit margaritarum p̄paratarum 3. j. vtriusq; coralli, zafirorum,
 smaragdorum, & hiacinthorum p̄paratorum, ana 3. j. seminis agnicasti 3. j. cra-
 nei humani 3. j. & 3. j. cinnamomi, gariophyllorum, ligni aloes, ana g. xv. musci,
 ambre, ana g. iij. sacchari candi, & carnis vuarum passarum, ana 3. j. sacchari op-
 timi quantum sit satis, & adde pulueris coriandri p̄parati, florū borraginis, bu-
 glossę, & violarum ana 3. j. maioranę 2. j. pulueris papaneri albi 3. j. cū modico
 aquę buglossę fiat cōfectio. Extrahitur quoq; p̄ instillationem gratia corrob-
 randi caput, ac discutiendi, si quid in eo immoratur, mirabilis q̄dam aqua hoc
 modo facta: hirundinū, nu. 4. castorei 3. j. vini albi, lib. ij. aquę portulacę, & bor-
 raginis, ana lib. 3. j. seminis agnicasti 3. iij. coriandri p̄parati 3. j. cōterantur oīa, ac
 in balneo marię instillentur, & aqua vsui seruetur, cuius coclearia duo in ac-
 cessione, vel extra ipsam p̄missa vniuersali prouidentia porrigere poteris. Vsi
 quoq; est aqua, q̄ ex theriaca magna, & eisdem rebus ac mica panis melle rosa-
 ceo imbuta, p̄ instillationem extrahitur. Prestat quoq; idem beneficium deco-
 ctum guaiaci, vel radicis chinę, aut falsę parelle, additis radicis peonię, & an-
 gelicę, qđ sanē p̄terq̄ quod inscindit, tenuat, & exsiccat, malignā quoq; qualita-
 tē retundit, & frenat. Exteriùs verò puluisculos, sacculos, & inunctiones ad no-

*Vtilissi-
 ma cōpe-
 ries huic
 malo,
 mel scil-
 licetum,
 quod in-
 stillat ex
 melle,
 & scilicet
 proleptis
 in uas
 perfora-
 to, Solis
 expositio.*

uere oportet: cuius census est puluis, qui recipit granorum myrti, & granorum
 tinctorum, rosarum, & coriandri, ana ʒ. s. santhalorum ru. violarum, nenufaris,
 capitum papaueris ana ʒ. iij. florū anthos, stechados, ana ʒ. s. fiat puluis tenuis-
 simus, quo prius aceto irrorato, & rescato inspergatur pars anterior capitis.
 Alterum etiam hoc modo conficies: rosarum, granorum myrti, ana ʒ. s. seminis
 lactuca ʒ. j. granorum tinctorum, santhali ru. coralli vsti, & loti, ana ʒ. i. & s. ga-
 triophyllorum, & ciperi, ana ʒ. ij. fiat puluis subtilissimus, qui aceto irroratus,
 & leuiter rescatus vsui seruetur: ex quibus etiam facile fieri potest pileus cor-
 roborans, additis coriandro preparato, rosis, floribus borraginis, buglossæ, &
 violarum, pulueribus item seminis agnicasti, rutæ, stechados, maioranæ, anthos
 & corticum papaueris albi. Fetus non minus capiti prodesse solent, præsertim
 si fiant ex prædictis seminibus, & herbis ac rebus, quas nuper diximus: quo sa-
 nè decocto semel in hebdomada vñ non erit ab re.

*Quæ ca-
sens mē-
bris pro
ficiat
sum.*

Plerumq; in hoc affectu præter caput, aliud, aut plura ex visceribus vterius in consensum allicit: quo proculdubio monstruosior epilepsia efficitur: simulat enim hæc de causa propriam naturam præseferens aliorum affectuū specimen. Quorum viscerum curationem, dū vteri consortio vitiantur, vno in capite scribere institui: interim tamen expendat lector, necessum esse inter pleraq; medicamenta epilepsia proficua, alia vsui quoq; esse necessaria, quæ & membrum illud à superuacuis excrementis expurgent: ac postea corroborent: nā dum aliquod viscus affectu quouis afficitur (quantumuis per consensum sit) aliqua sibi gignit excrementa, quæ postea nisi euacuentur, in nouum, aut maius dānum prorumpunt: quamobrem, si ventriculum pati cognouerimus ex generibus de prauata appetentiæ, aut inappetentiæ, ex vomitu, nausea, vel singultu, purgare per epicrasim, & intervalla ex vsu erit, ijs, quæ paulò inferius proprio cap. docebo, ac rursus corroborare, conterereq; humorum reliquias, quod pari lege de iecore, & splene, ac varijs obstructionibus, & alijs, quæ succrescere solent, intelligendum est.

Verum ne quis existimet, me oblitum fuisse eorum accidentium, quæ à principio propofueram, intelligat imprimis hæc accidentia, quatenus pertinet ad vteri confenfum, vnâ communemq; obtinere curandi rationem: nullaq; lege, etiam fi varia fint, variâ expofcere medelam. Nam cum halitus ille, qui ex femine corrupto, vel aliter inquinato afcendit, vnus fit: vnâ subinde tantum expofulat curandi viam, nimirum diftractionem, refolutionem & aliquâ extinctionem. Quæ tanè opera eisdem omnino auxilijs fient: vel faltem leuiffima facta mutatione, quam prudens & diligens Medicus moliri poterit, præhabita ea foeminarum confideratione, quam ex Hip. mente antea retulimus: ob idque cognita femel affectionis natura, quæ ex vteri confortio principium fortitur, etiâ fi varia fubfequantur accidentia, non tenemur curandi institutum variare, quatenus pertinet ad vteri prouidentiam: ni forè accidentium varietas ex mēbro- rum, quæ vtero confentiunt, varietate proficifcatur. Atque id in curatione huius affectus obferuare conuenit, licet in cognitiōe naturæ vterinorum accide- ntium plura eſſe confideranda dixerimus.

De

A

De febre alba, & de virginum obstructione. Cap. 6.



INTER Virginum affectiones nullam profecto frequentius, aut vulgariius reperies, quam eam quę (eo quod proprio nomine careat) morbus virgineus appellari iure optimo potest, quę frequenter virginibus accidere conspiciamus. Appellant sanę, ut refert Ioannes Langius, eum affectum Brabantinorum femina febre albam, ob conspicuum faciei alborem: quā quoque febrem amatoriam nonnulli appellant, cum palleat omnis amans, & color hic sit aptius amanti. Hanc etenim affectionem pulchrioribus fœminis plerunque accidere certum est, cuius rationem non est, ita facillè monstrare, sicut neque docere, cur etiam pulchriores frequentius in melancholiam, aut quartanā febrē, & reliquos affectus ex prauis succis ortum trahentes, incidant, cum ipsę optima temperie præditę appareant. Cui, saluo meliori iudicio, dicimus, ea mala pulchrioribus accidere, quia quod formosiores sunt, eò temperatiores esse necessum est, & quod temperatius fuerit corpus, eò plures existunt in eo partes, quę purius, ac temperatius alimentum desiderant, si alimentum alio persimile esse tenetur. Quod fit, ut residuum alimenti deterius sit, quia quod laudabilius erat, partes ad se traxerunt, atque superante per vniuersum corpus deterioris partis sanguinis maiore portione, mirum non est, si citius in prædictos affectus prolabantur, quàm deformiores feminae, quę maiorem deterioris humoris partē in alimentum commutarunt, id ita exposita membrorum natura, quę nō adeo bene temperata erat, sicut partes feminarum, quę pulchriores sunt. Ad pensum igitur redeunt asserimus præcipuam huius morbi effigiem id descriptionē esse, cum faciei, genarum, & labiorum rubeus color, velut ex anguis pallefcit, plūbeus, vel subalbidus efficitur, ac prædictę partes, & oculorum palpebrę quodammo do intumescere vidētur, sicut & crura, præcipuē iuxta malleolos, qui noctu ordemate turgent. Contremiscit etiam sic affectis ad quenuis corporis motū, triste cor, arteriæ item temporum sensibilibiter, & non citra dolorē pulsant, in quo uis corporis exercitiū, præsertim si in accliuē, vel arduum aliquē locū cōscendat, aut largiori corporis motu utantur: accedit enim protinus adeo difficilis respiratio, ut veluti confraetę, anhelosę, & omnino impotentes sese projiciant, & mouere nequeant. Quibus nō minus succrescit, ventriculum cibos, præcipuē carnes fastidire: sic plures mæstę, fastidiosę, & veluti animi deiecti omne renouūt exercitiū. Atque hæc est huius vulgatissimi affectus imago. Quamobrē iure optimo, & virgineum morbum, & febrē albā nuncupari arbitror, quę vniuersa eius ratio, ut Hip. li. de virg. mor. testatur, consistat in venarum præcordiorum obstructione ob sanguinis crassi affluxū, & permansionē. Quum enim virgines iam mature viro (aut iuniores ex esu alicuius sæculenti, aut vitiosi alimenti) steterint, suo pte motu natura sanguinē ad vteri locellos, & venas ab hepate transmittit, & cū ob earum oscula, quę propria sorte angusta admodum in plerisque existunt, & nondum patuerunt, viscidis humoribus, et fortasse & crasso sanguine obstructa, eruptioni mensum nullus, aut quę minimus supersit locus, tunc rursus per venę causę maiorisquę arterię propagines inter alia mēbra, ad quę confluere diximus ad hepar, & præcordiorum venas regurgitat, & ibidē cōpressus obstructionem efficiens

*febris alba
cur pulchrioribus
accidat.*

*descriptio
febris albę.*

causa morbi

efficientia prædicta accidentia, prædictumq; affectum virginibus maiori ex parte accersit. Appellatur quidē febris alba, non q̄ necessariō fœminę sic affecta febricitent (saltem manifestē) sed quod ut plurimum, & in omnibus specimē febricitum corporum præ se ferat. Quippe præ corporis impotentia, & mœstitia pulsum ēt habent celerem, & frequentē, non quidem quia calor semper eisde creseit, sed quia deficit necessaria ventilatio, eo q̄ pulsus fiat coarctationē parum, cuius defectum suppleat celeritas, & crebritas: quapropter à plerisq; has fœminas febricitare fertur, licet necessarium non sit: quin potius affectus suapte natura frigidus est, & ex albo colore febrem albam fuisse appellatā censemus. Itaq; ex prædictis iam constare arbitror huius affectus naturam pertinere ad alicuius visceris obstructionem, siue iecur, siue ventriculus, seu splen sit, vel vasa illis proxima, aut mesereon, quod frequentius contingere scimus, ut mox docebo, si prius dixerō, qualis naturæ sit huiusmodi affectio.

*febris alba
ante dēno
minetur*

Qualis morbus Constat quidem suapte conditione frigidum esse morbum, quod sanē præ experimentum monstrat ēt Hip. li. 4. acut. nam inter alios affectus, quos ex magnis obstructionibus proficisci dixit, frigidum hunc quoq; annumerat. Quod ēt ex eius loci sententia Gal. Aui. & Constantinus, tanquam firmum & verum autumant existimantes ab huiusmodi obstructionibus frigidos affectus subsequi necessum esse. Inquit enim Gal. 4. acut. Quando venæ superimplentur, virtutem corporis gubernatricem grauari necesse est, & periculum est, calorē cōgenitum extinguī, & propē suffocari, velut ignis nimia lignorum cōgetie suffocatur. Ex quibus euidenter constat frigidum affectū ex huiusmodi obstructionibus proficisci: argumento quidem sunt accidentia penē omnia, quæ frigidā plerunq; attestantur naturam.

*affectus huius
morbi*

febris alba

Differt profectō à communi omnium corporum obstructione, q̄ hæc frigidum inferat in toto corpore intemperamentum: nā quemadmodum alijs partibus obstructis defectu ventilationis incalescunt humores & cor, ita profectō in huiusmodi fœminarum obstructionibus recrudescunt humores illi, ac refrigerantur, crassescunt, & impactiores fiunt, ut vniuersum corpus ad frigiditatem moueant. Quapropter fœminę sic affecta, & torpent, & inhabiles ad omne opus existunt (licet aliqui plus iusto ipsas incaluisse, q̄ humor ille putrescat, cōperiamus) ac si moueri cogantur, statim animo delinquant ob defectum spirituum, & caloris, q̄ necessaria actionum sunt instrumenta. Qua ratione censeo huiusmodi affectum posse icterum album appellari: nam quemadmodum obstructis splenis, vel iecoris meatibus redūdante humore atro, vel bilioso, reliquæ icteri species fiunt: ita prorsus redundantibus humoribus crudis, ac frigidis, mirū nō erit, si vniuersum corpus albo hoc polleat colore, qui nunc ad flauum vergat, consentiente iecoris obstructione, nunc verō ad fuscum, & subnigricantem, cōpatientē simul splene. Itaq; constabit duabus rationibus, colorem in fœminis sic affectis futurum esse subalbidum, & quia affectus suapte natura frigidus in toto corpore efficitur, & quia humores crudi, & frigidi (quales ad pedes, dum œdemate intumescunt, prolabantur) ac tenuissimi aliqui, qualis fluxilis pituita est, non parua portio ad cutaneas partes euolat, cuius ratione, quemadmodum in ictericis affectibus contingit, cutis ipsa albo colore tingitur. Dissidet etiā hic morbus ab hysterice affectibus, q̄ in his plerunq; vterus in situ, vel figura viciata

Atiata ob prædictas causas aberret, comprimatur; subinde diaphragma, & citatio-
re efficiat respirationem, et si femina quiescat: at in febre alba frequentius ob-
structiones fiunt extra uterum, in alijs nimirum visceribus: ac licet difficilè effi-
ciant respiratione non ob id est, q̄ diaphragma comprimant, sed quod dū ob
aliquod exercitium citius, & magis dilatari conetur, & cum nequeat plurimū
distendi obstructionis magnitudine ineptius proprio muneri redditur: & ob
id femina quiescentes naturaliter respirant, mota verò, violenter & dēse. Præ-
terea, dissidet à melancholia, quia in ea sanguis efficitur crassus, & melanco-
licus ex adustione, & efferuescentia, aut putredine, ex cuius halitu melanco-
lica produnt accidentia: at in virgineo morbo sanguis fit crassus ob frigidita-
tē, & cruditatē. Itē dissidet ab epilepsia generibus, quia in his halitus ex ute-
ro ascendentes ex putridis, vel aliter inquinatis semine, & sanguine menstruo,
causa accidentium existunt: cæterum in virgineo morbo, non halitus, sed ipsa
humoris præsentia, ac frigidas virgineorum accidentium causa sunt. Quod si
aliquē halitus quispiam ascendere contingat, non venenosus, ac malignus, qua-
lis in epilepsia reperitur, sed vel frigidus, vel caliginosus, aut crassus existit.

B Licet ad verā naturæ affectus virginei explanationē causarum quoq; obiter
meminisse oportuerit, cogor tñ clarioris doctrinæ gratia easdem specialius re-
ferre, ut facile cuius innotescat, qua curadi methodo progrediendum sit in hoc
affectu. Est igitur duplex causarum genus in hoc morbo; alterū morbi ipsius,
alterum verò symptomatum, q̄ ipsi succrescunt. Morbum quidem, cum obstru-
ctio sit, nullā aliam causam obtinere credendum est, q̄ sanguinis, vel immodicā
copiā, q̄ rarè morbum virgineum efficit, licet illi principium p̄ster: uel crassitiē,
lentorem, frigiditatem, ac visciditatem, q̄ vel ex appetitu & esu deterimi alicu-
ius alimenti succrescunt (velut est terra, testæ fictiles, carbones, gypsiū, cera,
sal, & huius census pleraq; quorum latius c. seq. meminero) vel ex suppressis,
aut improspere purgatis mensibus. Nam cum uteris sanguinis illius copiā, nec
recipere, neq; expurgare ob innatā vasorum angustia possit (quod aliquē videmus
vel nuptis, quæ improbè à mensuris repurgantur accidisse cōperimus) sequit̄
subinde necessario ad membra uterò proxima per venas omnibus communes
remeari, ac remorari in eisdem: nunc in solis venis, nunc facta ē obstructione
in iecore, mesereo, ventriculo, & splene. Et cū p̄dictum sanguinē præ copia va-
sorū & viscerū calorē extingnat, ipsum cōficere eadē membra minimè possunt
nec distribuere: fit quidē, ut crassus, & crudus cū supersit partibus diminutè ob
id operatibus obstructions nō leues efficiat. Quæ sanè partes obstructæ, ut ad
accidentium causas deveniamus, p̄dicta in ferunt mala ea lege, q̄ Gal. recenset
li. 3. de diffi. respir. dicēs. Si internus tumor, aut dolor circa hypochondria cōsti-
terit, tunc parua, & crebra fit respiratio. Deinde cum cor, stomachus, & hepar
utriusque venæ chilis, & arteriæ ramis velut cōi vinculo connectantur, his sa-
nè sanguine crasso, flatuosoq; spiritu, & vapore refertis, & obstructis, ut eos cor
extrudat, & deoppilet, ne suffocetur, frequenti arteriarum systole, & motu elu-
ctat, & palmo cōtremiscit, quo defatigato quid obstat (ut refert idē autor lib. 4.
de cau. sympt. & 4. acu.) pulsus & spirituum anhelitus interceptiones coincide-
re, ut velut deploratus laborans iaceat. Et subdit eodem libro acutorum. 4.

Potest

Causa.

Potest autem & multitudo, & densitas sanguinis non modò arterias inflare, & exitum obstruere, sed & ipsas propriè nominatas venas. Ex quibus euidenti argumento constat, quæ sit difficilis respirationis causa (præter eam, quæ superius diximus, ac rursus, quæ sit frequentis, & maximæ arteriarum temporum pulsationis ratio: conatur enim cor vehementi motu, quod sibi periculū minari agnoscit, excutere quod sit, ut erit arteriæ prope dorsum maximè pulsent. Ex quibus apparet non minus necessum esse, calorem præ spirituum extinctione diminui, & frigidos progignere humores, qui postea calorem extinguentes hac duplici ratione colorem subalbidum moliuntur, & totum corpus velut deiectū, & ad actionem quantumvis leuissimum impotens reddunt: ex quo item prodit, dum moueri conantur, animo statim deficere, præ caloris, & spirituum defectu. Atque hæc sunt in vniuersum morbi, & symptomatum potiores causæ.

*Albedo corporis
quomodo
eueniat.*

Signa.

Signa quibus virgineum affectū nosse possimus, censeo in morbi descriptione iam dixisse: verum cum existimem in rebus obscuris, & grauioribus maiori semper opus esse diligentia, hic quoque clariùs scribere decreui. Est itaque primū signum, coloris genarum, & labiorum rubei, & rosei in subalbidum, aut pallidum, vel plumbeum mutatio: cui aliquādo in medio faciei accedit purpureus color remissus quodammodo: signum profectò succensionis eorum humorū, qui vel obstruunt, vel obstructione detinentur. Pulsant item arteriæ temporū cum ipsius capitis grauitate, & dolore (vel citra ipsum) præsertim in parte eius antica, nisi vterus quoque, aut obstruatur, aut compatiatur: nam eo tempore potius capitis partem dolere magis, superius probatum est. Fit quidē huiusmodi accidens: aut eo caret femina sic affecta, prout ex suppressis humoribus aliquid caliginosum, vel vaporosum caput irruit, aut secus. Pulsat quoque in pleurisq; arteria, quæ iuxta dorsum sita est, eo nimirum tempore, quo sanguis crassus in venis, illis proximis impactus incalescit, ut c. seq. latius suen probaturus. Contremiscunt cor, & totum corpus, tument pedes prope noctem, cum corporis natia vis oppressa, sanguinem satis iam conficere nequit. Præterea, femine sic affectæ lassitudine maxima premuntur ob corporis quidem grauitatem humorum oppressionem, & copia subortam, & ob facultatum impotentiam frigiditate effectus contracta. Cibos itē fastidiunt, quod improspere humorum ventriculus nanciscatur distributionē, maximamque sortiatur excrementorum copiam. Quibus porro signis alia non pauca accedunt, quæ quia non in omnibus, sed in aliquibus iuxta peculiarem cuiusque feminae conditionē succrescere scimus, ob id subtili-
ceo expendenda perito, ac diligenti medico. Verū ex nullo alio signo certiorē coniecturā elicies, quæ ex mensium suppressione, vel defectu, si femina iam menstruationi apta fuerit, licet ante id tempus virgines esui alicuius rei deprauate nimis dedita non rarò predictū modū affectū patiantur. Quod sanè malum diligentia non mediocri tractare oportet, ne aut in malū corporis habitum, vel difficile melancholiam epilepsiamve femina dilabatur, aut in sterilitatem irreparabilem vtero resiccato, sanguine ad ipsum non confluente præ obstructione.

*Cura
di ratio.*

Vniuersam huius affectionis curandi rationē ob id difficile esse arbitror, quia non est solū eorum vasorū, quæ prope vterū sunt, in eadē obstructio, sed cum hoc vel iecur vel mesereon, vel splenē, & aliquā vterū quoque obstrui cōtingit: quod proculdubio monstrare diximus cum faciei, & labiorū colorē, quæ subalbido colori adiungit.

ob id

A ob id neq; vna quidem erit curandi ratio, neq; vnus modus, neq; vnica medicamentorum natura & conditio. Quamobrem duplex in hac re insurgit cōsideratio, altera, quæ huic affectui debetur, indicatione sumpta ab aliquo ex prædictis membris, dum simul afficitur: altera verò, quæ communia affert præsidia, & communem curandi viam, vtcunq; alicui prædictorum membrorum communiceatur affectio.

Primo itaque dū prædicta vasa vtero proxima, aut propria, sanguine crasso implentur, & eodem facto crassiori, & frigidiori obstruuntur, ac in iecur hac ratione sanguis regurgitat, ibidēq; et obstructionē molitur. Quod ex colore pallido, vel malicorij, vt refert Hip. lib. de internis affect. per simili cognoscet sicut ex dolore sub vltimis costis dextri lateris, & in humeris, & clauicula, & sub māmīs: ex biliosis vomitibus, & præcipue ex difficili respiratione, si super sinistru latius laborans decubat. Quæ affectū, vbi cognoueris, mox curare, vt reliquos virginēos affectus docet Hip. lib. de virg. morb. sanguine misso, non tamē protinus ex talo quantūuis menses suppressi fuerint: cōiectabile enim eo tēpore est, sanguinē potissimum redundare in vniuerso corpore, & partibus iecori proximis. Quocirca necessum est, cōsiliū sequi Hip. lib. de inter. affect. q. sanguinē extrahere protinus iuber facta interna cubiti vena: nā si ante id opus sanguinē ex talo mittere studueris, maiores necessariō efficiēs obstructiones euocata ad vterū, & venas obstructas totius corporis plenitudine. At sanguinē semel, aut bis, si laborantis vires tulerint (q. feminas sic affectas certū est posse incipere affectu perferre: nā dū inueteratur, & corpus frigidius efficitur, purgatione potius, q. sanguinis detractioe copiosiore opus habent) extracto, mittes deinceps ex talo sanguinē, donec corpus suppressi sanguinis sarcina liberatū fuissē conspicias. Quod et facies victu parcissimo, & tenuissimæ substantiæ instituto.

Verum in huiusmodi curatione et medicamenta adhibenda sunt, quæ præter hoc q. menses euocare possint, iecoris quoq; naturā, & obstructionē respiciant: in principio quidē curationis, adhibitis in maiori copia, & maiori diligentia, q. obstructa vasa, & iecur respiciant, pcedente verò affectu his diminutis, ad antea tamen, q. menses euocent. Hoc vno in hac re adseruato, q. ea, quæ menses euocant, nō licet adhibere, nisi consueto menstruationis tēpore si id haberi potest: sin aliter, quo tēpore femina maiores persenti scit circa vteri partes dolores maioremq; grauitatē. Primo itaq; in hoc, & simillimis affectibus, neq; confortim, neq; plurimū purgabis, vt abundē dictum est lib. nostro de præsid. indica. quippe obstructa corpora etiam si humoribus abundant, magnas purgationes perferre non possunt, q. viæ maximā humorum copiam capere nequāt, quin potius obstruantur magis. Nec rursus cōctionē humorum inspicias, neq; expectabis: nam humores, qui obstructionem moliantur: concoqui minime possunt. Qua in re his pharmacis primō vtendum est, quæ crassos humores attenuare, viscidos inscindere, frigidos calfacere nata sint. Quod sanē opus, neq; diu, neq; semper facies, sed per intervalla: & facta interim leuiuscula purgatione, quæ quod attenuatum est, expellat, dum amplius attenuatur. Atqui quō magis attenuari humores cognoueris ex crassiore, & coloratiore vrina, eō frequentius purgationibus, vt oportebit: addito plerūq; medicamentis purgantibus aliquo ex ijs, quæ attenuāt, & insciadūt, vt vtrūq; opus simul perficias.

Itaque

*Si iecur
obstruat
tunc*

*in rethi me
si bu cu pto
na prius sca
da vena in cu
bito*

*obstruat
corporam
feru ma
gna pur
gatione!*

Itaque primitus in ipso curationis exordio, lenem quandam purgationē ex
 casia, manna, vel syrupo ex infusionibus præmittes, nesi cruditates aliqua in
 ventriculo, ac primis venis steterint, sanguine misso crudiores fiant, vel ad ma-
 iora vasa deferantur, aut in scidentibus, & attenuantibus admixtis ad loca ob-
 structa deuehi protinus contingat. Deinceps tamen syrupum hac lege confectū
 porriges: excipe succi cichorij clarificati. 3. x. aquæ ordeī. 3. vii. succi granatorū
 3. iij. mellis lib. j. aceti ad gustum, fiat syrupus, cui adde cinnamomi parum, &
 eo vtatur manē laborans cum aqua fumariz, radicū aperientium, graminis,
 vel adianti. Transactis autem quatuor, aut sex diebus, & facta leui aliqua pur-
 gatione ex ijs, quas inferiūs recensebo, ad paulō efficaciora progrediendū est,
 quale censemus medicamentum, quod recipit succi intibi decocti, & depurati
 3. j. oxizacræ simplicis 3. ij. decocti radicis filicis, & seminis securidicæ 3. j. & f.
 Profunt itē communes syrups, vt oximel diureticum, syrupus acetosus de quin-
 que, aut duabus, de bisantijs, & oximel simplex. Quibus adhibitis iterum iecur
 purgabis, & tandē deuenies ad vsum syrupi maioris efficaciz, qui recipit adian-
 ti, lapati, lentisci, & rutæ, ana. m. f. quinque radicū diureticarū, radicis acori,
 & gladioli, ana 3. f. quatuor seminum frigidorum maiorū 3. ij. seminis apiij, fœ-
 niculi, petroselini, & aliquando macedonici, ana 3. ij. chamædryos, & chamæ-
 pythios, valerianæ, ana m. j. ordeī mundi, p. j. infundantur radices, & semina p
 noctem in aceto, & fiat postea decoctum in aqua sufficienti, cui perecolato, adde
 mellis quantum sit satis, vt fiat syrupus, cuius quantitas sit 3. iij. Sed mihi proba-
 tissimus est in hac re syrupus, qui excipit succi eupatorij. 3. x. decoctionis stæ-
 chados radicis rumicis, acori, asari, apiij, casiz lignæ, seminis viticis, dauci, lupi
 norū, floris iunci odorati, centaury, absynthij, hyssopi, & cicerū, ana 3. f. coquan-
 tur, vt ars docet, & colaturæ adde mellis, & sacchari quantum sufficiat, vt fiat
 syrupus, qui mihi ad prædicta opera, & menses euocados maximi semper stetit
 momenti. Vtor quoq; decocto veteris galli cum prædictis rebus, vel aliquibus
 earū additis passulis sine granis, & cartamo. Possunt nō minus confici aliæ po-
 tiones simpliciores, q̄ recipiant radicis rubæ maioris, gentianæ, & acori, & ra-
 dicis capparis, ana m. f. temperentur in aceto albo per noctē, & postea coquan-
 tur aqua instillationis graminis, brusci, & asparagi ad tertias, quibus adde pas-
 sularum sine granis. 3. j. & facta colatura adde mellis, & sacchari quantum sit sa-
 tis. Poteris et̄ inspecta semel medicamentorum huic vsui conuenientiū natura,
 variōs cuius parare potus: cuius gratia expende eis materiam præstare cortices
 radicis capparis, brusci, asparagi, salicis, graminis, apiij, cichorij, scariolæ: item
 hepaticam, adiantum, semen matatri, cinnamomum, & spicam: ex quibus iuxta
 diuersitatem indiuidualem varia effinges huic vsui medicamenta.

Sed quarto, quinto, aut sexto, quoq; die porrigere opus est, q̄ abstergerendi, &
 repurgandi infarctos meatus vires obtineant. Mihi tñ in principijs curationis
 antequā affectus in vetustatem degeneret, placuit semper dilutū ex decoctione
 radicis rubæ, & acetosæ, ana m. f. rumicis. 3. j. decoquantur in aqua stillatitia
 adianti & graminis, cuius cū saccaro, vel melle, aut passulis facta iterū leui e-
 bullitione. 3. iij. porrige. Est in hoc affectionis genere et̄ p̄sentaneū auxiliū rha-
 barbari dilutū in p̄dictis aquis expressum, vel in aqua cichorij, aut in sero lactis
 si caloris aliqua præsit suspicio: sit quidē rhabarbari quantitas. 3. f. vel 3. j. Pro-
 dest.

Adest decoctū eupatorij, & graminis cū cartami 3.j. & .f. vel succus eupatorij cū agarico, aut cartamo, quod antiqui plurimū probarunt. Eundem quoq; vsum præstat syrupus cichorij cōpositus, vel idem rhabarbari infusum cum 3.ij. succi vel syrupi cichorij simplicis, quibus admiscere agarici 3.j. vel 3.f. ex vfu semper fuit præsertim dū crassorum, & frigidorum copia superasse constiterit. In ijs vero feminis, quæ robustioris naturæ sunt, dilutum pseudorhabarbari in aqua cichorij, vel graminis, incredibilis est efficacia tertio quoq; die exhibitū. Cōfert et pillularū vsus, & earum præsertim, quæ recipiunt rhabarbari 3.j. agarici 3.ii. diagridij 3.iii. formentur quatuor pillulæ, quarum vnā tertio quoq; die porriges. Præstant quoq; & maxime sunt proficue, q̄ ex puluere pseudorhabarbari, rubæ, & acetosæ cum oximelite conficiuntur, quarum 3.j. & .f. semel in hebdomada porriges, vel 3.ij. tertio quoq; die. Quibus porro omnibus medicamētis, & syrupis necessum est addere roborandi, & repurgandi iecoris gratia aliquid eorū, quæ id possunt, cuius naturæ est trochiscus de eupatorio, dialacha, diarrhodon, trochiscus de rhabarbaro, de absynthio, vel diacarmuma. Verū ex ijs eligēda sunt minus gustui ingrata, minusq; calida, ne ceteris visceribus noceāt. Poteris insuper (haud inutiliter) porrigere opiatā, quæ recipit consenuæ radicis apij, florum acori, & adianti, ana 3.f. pulueris diarrhodonis, triasanthalorū, ana 3.ij. trochiscorum de eupatorio 3.j. cum syrupo de bisantijs fiat opiatā. Cuius capiat quantitatem 3.ij. postea bibat aquā stillatitiam radicum apij, & graminis: quorum omnium maiorem copiam reperies, & veram vtendi methodum li. 2. de præsid. indica. cap. de aperientibus.

Verum obseruare in hac curatione perpetuū oportet, maxime fore pficuum pmissa purgatione (si feminae habitus nō fuerit euidenter refrigeratus) sanguinē ex saluatella mittere, præsertim si calorem vigere in viscere persentiamus. Quod si aliqui menses inceperint, vtile quoq; erit eisdē sanguine ex talo misso euocare. Quibus factis, iecur & partes prope vterum inunges vnguento, quod recipit olei nardini, & amygdalarum amatarum, ana 3.ij. succi apij 3.j. coquant ad consumptionem succi, & adde spicæ nardi, squinanti, & asari, ana 3.j. seminis apij, petroselini, cyperi, & rosarum, ana 3.ij. ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum addito modico aceto. Aliud itē conficies, quod recipit succorū apij, petroselini, fœniculi, senecionum, & cichorij, ana 3.j. acetij 3.f. olei 3.iiij. olei absinthij 3.f. bulliant omnia ad consumptionē succorum, postea adde santhalorū omnium, & spicæ, ana 3.f. ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum. Profunt nō minus emplastra, q̄ recipiunt pulueris chamæmeli, meliloti, abrotoni, yuæ, ana 3.j. seminis apij, amæos, absinthij, ana 3.ij. spicæ 3.j. dissoluantur in succo fœniculi, & fiat emplastrum. Cui quoq; vsui fomentum parabis ex oleis cū modico aceto, vel ex decocto prædictarum herbarum, radicum, & seminum cū modico aceto: quæ omnia paulatim, & per interualla adhibēda sunt, ac repetitis alijs quæ aperiendi, & repurgandi iecur vires obtinere diximus. Interim tñ paulatinis vteris ex rhabarbaro, & agarico purgationibus, quibus profecto vtrunq; adimplebis scopum: nam & infarctos humores purgant, & viscidos, ac adherentes abstergunt, & ob id deobstruunt, & infarctū liberant.

Sanguine quidē (vt dictū est) improbē ad vterū descendente, & ob id redundante,

Si splem
obstruat
tur.

Pante, facilius longe splenē repleti, & obstrui cōtingit in p̄dictis virginibus, quoduis aliud viscus: nā prater id q̄ vitijis fermē ei dē lien tenatur, quibus he-
par, frequentius in obstructione (propter alimenti, quod attrahit specie, ac dū
accidit, copiosiorē in super & crassiorē esse sanguinē) corripit, vel scirrho, peul-
dubio affici cōtingit: quod nulla causa citius euenit, q̄ menstruis, vel hemor-
rhoidibus suppressis. Quō fit profectō, v̄ p̄dicta virgines, quibus menses non
probē prodeunt, p̄ter cōem, venarū obstructionem splenis quoq; frequentissi-
mam, ac non leuē patiantur. Quam prater id, q̄ ex lateris sinistri tumore oblo-
go tactui manifesto dignosces, monstrat et illius lateris grauis dolor ad iugulū
sinistrum veniens, difficultas respirandi, color faciei, & totius corporis subni-
ger, & plūbeus, halitus itē fœtidus. Alius ē sic affectis astringitur, & aliqñ ni-
gra excernit, corpus nonnihil emaciatur, tristis est fœmina, & cogitabunda,
ac fastidiosa, cui noctu erumpit sudor grauis, & venæ ad lienem nigricāt. Quæ
omnia ex Hip. videntur constare lib. de inter. affect. per hæc verba. Alius sple-
nis morbus fit in anno, veris maximē tēpore, verū a sanguine: quū enim re-
pletus fuerit splen sanguine, erumpit in ventrē, & dolores acuti in splenem, &
incidunt, & in mammā, & in clauiculam, & in humerū, & sub scapulum: color
autē corporis est plumbi formis. Tandem recenset alia signa, quæ retulimus,
& existimat esse grauissimum affectum, quod ego intelligendum arbitror, dū
in inflammationem commigrat, aut in difficultatem intestinorum. Quibus præ-
missis, scito, lienem coaffici ex mensium suppressione simul cum venis vtero vi-
cinis: quæ sanē causa est, vt difficulter curentur fœminæ sic affectæ: nā pressio-
res, & grauiore sunt ex melancholico sanguine obstructions, & curati diffi-
ciliores. Quapropter maturo consilio, & maxima diligentia curandū est, ne la-
borans, vel in icterū nigrum, vel in melancholicum corporis habitum, aut de-
lirium degeneret, quōd sic affectis accidisse frequenter conspiciamus.

Curandi
ratio.

*Nullus habet
venæ hemor-
rhoidales in
utero commu-
nitas. sed solum
in venâ commu-*

Primum itaq; curantis consilium sit, ventrem cassia, vel manna, vel catholi-
co, aut confectioe Ameci simplici emollire. quod licet alijs pharmacis Hipp.
loco citato efficere docuerit, hæc esse v̄ sui probatiora certū est: à quibus mox
sanguinē esse mittendū ex sinistri brachij basilica consulit, vel si placuerit, ex
eiusdē manus saluatella, parçē tamen. Quippe copiosas sanguinis detractiones
minimē perferunt splenis affectiones: menstruationis tñ tempore turissimum,
quinimō necessariū mihi videtur, ex sinistro talo sanguinē quoq; mittere. Verū
si menses ex ratione non prodierint, vtilius longē fore existimo per hemorroi-
des fœculentum illū sanguinē deponere, quibus quod superest, euacuamus, &
ab vtero, & venis ipsi proximis, & ab splene ipsa deriuatoriē deducimus. Nec
desunt quidē, qui inter antiquos venas post aures scindant, & sanguine, qui ef-
fluxit, lienem inungant, sine ratione quidē, sed non sine periculo. Veteres enim
naturalij quadam ratione, atq; beneficio constante crediderunt, superflū san-
guinem languenti membro prestare medicinam: quod sanē veterinarij Medi-
ci recensent, & exequuntur. Caterū constat certo experimento venas aper-
tas, quæ ad lienē nigricant in inueteratis lienis affectionibus maximē p̄fuisse.
Quibus uenis incredibili efficacia profunt hiruines affixæ, aut cucurbitæ cū
scarificatione: quæ auxilia uacuato satis corpore, uelut topica, sunt adhibenda.

Quo

- A** Quo facto maximo studio humorē leniter & blandē, sed perseverāter attenuare oportet: nam validiora medicamenta subito, cōfertim, vel sola, exhibita, plus humorem resiccant, durioresq; reddunt, q̄ q̄ tūtō emollire possint: quamobrē paulatim, & paulo validioribus purgare oportebit. Profunt itaq; primò melicratum, & potiones ex prunis damascenis, passulis, & radicibus cappariorum (nam quale est hepati absinthium, tale est lieni cortex capparis, & quale est hepatori eupatorium, tale est lieni scolopendrium) semine agnicasti, adianti, radice tamarisci, & seminibus illis maioribus, ac minoribus, cortice item, & radice salicis, genista, fragini, & alijs, quæ ad hepar dicta sunt. Sed conficies imprimis melicratum hac lege, corticis radice capparis ʒ. iiii. polipodij ʒ. ij. passularum sine acinis ʒ. j. prunorum, nu. x. fiat decoctum ad tertias, & facta colatura, dissolue mellis ʒ. iiii. Quo facto, primæ purgationes sint ex epithymo, folijs senæ, & hiera Gal. vel ea, q̄ ex descriptione Panchij apud Scribonium legitur, atq; etiam alijs, quæ c. de virg. melan. dicta sunt. Sed progrediendum ultra est in materiæ extenuatione: cui summōpere conducit aqua, quæ ē cotibus defluit, cum acun-
B tur enses cum melle, præsertim si in ea effernescat aliquod ex prædictis medicamentis: prodest & syrupus acetosus, adianti, & de pomis cum prædicta aqua exhibitus. Laudatur & usus capparum ex oleo, & aceto, verum in sceminis admittendus non est sine delectu. Quod si uti velis, hac lege parabis: excipe capparū li. ʒ. passularum ex Corinthio, si haberi possunt, lib. j. reponantur in lib. i. sacchari fusi aqua borraginis eum ʒ. f. scammonci in vase, cui adde aceti modicū, quæ lege tūtō eis vii poteris. Itaq; valentiora conveniunt medicamenta, q̄ in hepate, status etiam discutientia, mollientia, & aperientia, ut tamariscus, ebuli, pulvis scolopendriæ, brionia, cortex hædera, oximel ex radicibus, aqua graminis, lupulorum, borraginis, syrupus de scolopendria, de bisantijs, de epithymo cum aquis prædictis, vel decocto aliquo pro splene, ut fumarie, & gallitrici, additis paucis cinnamomo, santhalis, & alijs, quæ licet vrinas moueāt, huic quoq; vsui vtilia sunt. Nam licet diuretica non ita profint, quia à liene ad renes non ita comparata via est, tñ experimento didicimus lienem per vrinas non rarò expurgari: præter q̄ ea etiam, alia ratione iuuare possunt, nimirum, quia attenuant, & aperiunt, quod Hip. et lib. de inter. affect. consuluerat. Sed expendat hac in parte lector, aliud esse splenem obstructum simpliciter curare, & aliud esse id munus exequi in sceminis menstruo suppresso: nā cautē & blandioribus utendum est ijs, quæ vehementiora sunt admixtis. Purgare itē per inrerualla necessū est, & eisdem prorsus medicamentis, quæ adduximus c. de virg. & vid. melan. quā obrem consultō ea hac in parte prætereo. Sed arbitror hic quoq; prodesse, in-
C uaterato iam affectu, stibij præparati. g. iiii. porrigere.

Ceterū quia & flatus, & rugitus, & aquæ fluctuationes torquere huiusmodi sceminas non rarò assolent (partim ex indebito vitæ instituto, partim ex ipsa naturali natura, ita ut splenis, & meserei inflationē nō leuē æmulētur, quod debito vitæ moderamine mox subsidet, remanēte parte obstructa, aut scirrhusa in antiqua duritie) p̄ter dicta medicamenta clysterium vsū, tanq̄ maxime proficuum laudo, præsertim ex decocto capitis veruicini cū herbis, ac seminibus prædictis. Sed adhuc lōgē vtiliora sunt, q̄ exterius adhibentur pharnaca, non solū id boni præstantia, sed magnos etiam lienes absumantia. Imprimis tamen ventrē i-
 unges

medicamenta

si hinc exhibitio

*unguentum pro
indurato liene*

tamarix.

unges & splenem: quippe huius durities mollientibus, in scidentibus, & resolu-
uentibus curanda est, astringentia quoque admouenda, ut inde viscus roboretur,
iuxta leges adductas lib. de praesid. indic. cap. de emollientibus. Primitus id
facies unguento, quod recipit, olei de capparibus 3. j. medullae vituli, pinguedi-
nis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti, ana 3. ij. aceti 3. j. cera quantum sit satis,
ut fiat unguentum. Sed pretiosius conficies, si exceperis medullae cerui, aut cru-
ris vituli, butyri recentis, olei de capparibus, ana lib. s. ammoniaci in aceto liqua-
ti. 3. ij. aquae rosarum 3. iij. coquantur ad consumptionem praedictae aquae in bal-
neo mariae, quo deinceps inunges lienis regionem leui manu perfricante. Con-
ferunt etiam communiter indurato spleni radices lilij, maluae, branchae vrsinae,
& scillae, sed radices in oleo, & vino ad consumptionem vini ad formam empla-
stri impositae: in reliquis vero sufficit sola olei inunctio, si minus robustae fue-
rint. Minuit lienem non minus, ac ipsum aperit unguentum, quod recipit suc-
ci, summitatum sambuci, olei capparorum, & dialtheae, ana partes aequales, ce-
ra quantum sit satis. Praestat idem beneficium id, quod recipit radicem, & folio-
rum miricae, ana p. ij. infundantur in aceto, & ferueant, donec remaneat sola ter-
tia pars, tandem facta colatura, & expressione, adde tantundem olei capparor-
um, & iterum bulliant, donec euanescat acetum, & cum cera fiat unguentum.
Valet item aduersus lienis tumores, & obstructions aliud, quod recipit, mu-
cagginis altheae, & seminis eius extracte in vino albo 3. j. olei capparorum 3. j.
& s. adipis anatis. 3. s. pulueris cetrach. 3. ij. & fiat unguentum. Item aliud conficies
si acceperis olibani, ammoniaci, ana 3. j. dissoluantur in aceto scyllitico ad cras-
situdinem, deinde cum succo brassicae pistentur, & fiat emplastrum. Cui consimile
efficies, si acceperis ammoniacum, & oleum rosaceum, amygdalarum dulcium, de
lilijs, de cucumero asinino, et in quo scolopendrium incoxit, & oleum de
capparibus, ut cum ficibus pinguibus quantum cuiusque sit satis fiat emplastrum,
addita dialthea. Confert emplastrum melilotum, aut diaquilon, vel hyssopum
cerotum cum mucilaginis radicis altheae, lini, & fenugraeci. In viraginibus
autem & robustis feminis saepe splenis duritiem, ubi alijs praesidijs emollita
quodammodo fuerit, auferunt lapis molaris, pyrites, lateres, vel lapis alioque du-
rissimus, ubi aceto acerrimo candentes extinguantur, & vapor per infundibulum
ab splene suscipiatur. Conferre ite summopere mihi est relatum litum ex adipe
struthij, camelli, quo nullum efficacius fuerunt remedium reperiri.
Quod si inueterauerit affectus, in scirrimumque degenerauerit, tempestiue curare
studebis, ne maioris mali, ut cachexiae, vel hydropis sit praesidium. Quo tempore
in scidentia magis, tenuantia, emollientia, atque discutientia parti adhibenda sunt,
veluti est fofus, qui recipit radicem cucumeris agrestis, altheae, & liliorum, ana
3. j. corticum radicis capparibus, & tamarisci, ana 3. s. maluae, bis maluae, scolopendrij,
absinthij, an. m. j. seminis feniculi, lini, & fenugraeci, an. 3. s. florum chamemeli,
meliloti, & genistae, ana p. s. fiat decoctum in vino albo, & aqua cum modico aceto:
quo tertio, vel quarto quoque die partem fouebis, & mox cataplasma parti im-
pones, quod recipiat farinae seminis lini, & fenugraeci, ana 3. j. & s. farinae lupinorum
3. j. pulueris radicis ireos, & tamarisci, ana 3. ij. adipis vituli, & axugiae cuniculi,
an. 3. j. olei capparorum quantum sit satis, ut fiat cataplasma cum modico superioris de-
cocti. Verum si id displicuerit, imperabis linimentum ex mucilagine seminis fo-
nu-

A nigræci extractæ aqua scolopendriæ mensura. ʒ. ij. cui addes olei capparorū, & liliacei, ana ʒ. j. ammoniaci in aceto, & aqua dissoluti, ʒ. f. pulueris radicis brionium, & ireos, ana ʒ. ij. cū cera fiat linimentum. Quibus porro omnibus medicamentis semper aliquid admiscebis eorū, quæ menses mouere nata sunt: habita tñ feminei sexus consideratione, qui & mitiora, & mitioribus admixta expostulat medicamenta, per interualla, & à leuioribus facto exordio.

Solent quoq; non rarò virgines feminae, ex p̄dictis mensū vitijs, vel ex vsu prauorum ciborū, quod frequentissime virgines perdere solet, grauissimas pari in ventriculi, & meserei venis obstructiones. Nam sanguine ab uteris regurgitante venas meserei, iecori, & v̄triculo cōmunes, ac proximas repleri & obstrui necessū est: ex quarū obstructione finitimus suboritur affectus ei, quē in hypochondriaca melancholia reperiri diximus. Quippe in vtroque affectu venæ proximæ, & cōmunes ventriculo, & hepati, quas meserem membrū obtine re diximus, obstruuntur. Caterū dissidet virgineus affectus ex hac causa obortus ab hypochondriaca melancholia ex eadē quoq; proficiscente, quod in prædicta melancholia sanguis ille crassus dictis venis impactus, exurit & effertur: ex cuius halitibus caput & cor tentantur, fiuntq; subinde melancholici terrores & mœstitiæ. At in morbo virgineo, licet in eadē parte sanguis sit impactus, refrigeratur, & recrudescit, ac vniuersum affectū generat frigidum: ita vt à ventriculo, & hepate crudum subterfugiat alimentum, q̄ prædictarū obstructionū causa distribui minime possit: quò fit, vt subalbidus ille color in facie, & tota cūte efflorescat, soboles quidē, & euident signū crudorum humorū, & obstructionis. Dignosces eisdē partibus obstructiones inesse ex vomitibus pituitosis, ex frequenti nausea, & ciborum inappetentia, vel deprauatorū alimentorum appetitū, aut esū, anxietate & præcordiorum tensione, præsertim à cibo, ex animo item magis deiecto, & mœsto, ex vrina alba, & copiosiori: item quia sic affectæ falsa siti premuntur. Pulsat quidem in his minus caput, sed grauius, & diutius dolet, tument etiam oculi magis, & tota ferè facies.

B Cui sane affectioni medeberis, primò (præter obseruatissimam vitæ institutionem, quæ nihil crudum efficiat) sanguine misso, haudquaquam ex brachio, sed ex talo semel aut bis: nec tantum extrahes, quantum in reliquis obstructionibus. Quod si hemorrhoides, vel suppressæ fuerint, vel aliquando profluxisse comperiamus, ab eis sanguinē detrahes, præsertim ex illis, q̄ cū mesereo maiore habent cōmunionem: quas censeo esse interiores, quæ venarū meseraicarum sanguinolentæ propagines sunt. Quo facto, anteq̄ peculiarem mensium prouocationem, aut humoris vacuationē moliaris, scito, has feminas posse, ac debere curari per uomitus, quibus leuissimis auxilijs semel aut bis in hebdomada prouocatis (dū non instet menstruationis consuetū tēpus) blandè ac leniter p̄ interualla ventriculū, & mesereon p̄ infernā aluū purgabis, non casia, sed alijs, quæ minus flatuosa existant. Præstant quidē hunc usum catholicon, syrupus ex infusionibus rosarum, agaricus, pillulæ de mastiche, de agarico, de aloe, de hiera Gal. quibus per interualla ventriculū purgabis: ac inter vnā & alterā purgationē ministrabis syrupū de bisantijs, adiantū, epithymi, de duab. radicib. & de quaque cum modico aceto: mel itē rosaceū, & oximel simplex cū aliqua ex prædictis aquis, vel decoctis. Ex vsu interim est per eadē interualla diffusū agarici &

De mesereo, & ventriculo obstru-
ctis.

Differetia inter
virginem affe-
ctam & Melan-
cholicam
hanc Hypochondri-
acā.

Cura
di ratio.

Hæmorrhoides
de interiores
communis est
eius Meseris
et ad exte-
riores.

foliorum senæ in aqua graminis præbere, vel frequenter uti pillula vna mastichis, & pulueris hieræ Gal. vtilissimus quoq; est syrupus tertio, vel quarto quoque die. dosi. 3. ij. exhibitus, qui recipit quidem mercurialis, buglossæ, ana m. j. passularum sine granis 3. j. senæ orientalis, & medullæ cartami, ana 5. j. & s. agarici trochiscati, & ligati sex horarum spatio. 3. iij. fiat decoctio secundum artem, & facta colatura adde mellis, & sacchari quantum sit satis, ut fiat syrupus. Quibus profectò factis ad ea, quæ menses mouent, te conferes, sed interim in deobstruendis, & corroborandis ventriculo, & mesereo immorandum est vnguentis ex oleæ capparorum, de absinthio, & nardino cum modico vino, ac pulueribus diarrhodonis, & alijs, quæ superius retulimus, & c. de ventriculi accidentibus paulo inferius monstrabo. Sed oportet proculdubio huius causæ, & affectus maximam habere prouidentiam, ut qui frequentissimè accidat, & difficulter curetur, quòd ventriculus, ciborum officina semper obstructionibus fomentum præstet, & accidentium causam adaugeat.

De utero
obstructione.

Vteri verò obstructiones curare discas, dum virginæ affectus ab eisdem solis proficiscitur, c. de mensium suppressione. Quam sanè causam ex priuatione signorum aliarum causarum facillè dignoscas. quamobrem hac in parte superfedendum est ab eius peculiari curatione.

De auxilijs, quæ
proficiunt
sunt omnibus
causis huius
affectus.

Sunt quidem præter dicta auxilia, quæ singulis virginæ morbi causis proficiunt esse diximus, alia non pauca, nec parui momenti, quæ omnibus causis vtilia experimur: veluti exercitium: pillularum, quæ obstructiones aperiunt, & re purgant, quod in vijs infartum est, vsus etiam potiones, quæ id quoq; efficiunt, lapis bezoar, & vsus radices schorcioneræ. Inter quæ maiori efficacia beneficiū præstat chalybs præparatus, præstantissimum alioquæ auxilium. Quæ sanè oīa, licet virginæ affectui à quacunque causa prodeat, proficiunt sint, modus tamen & differentia causæ non paruum in aliquibus constituunt differentiam, ut tota ferè sanitatis ratio in eius cognitione, & prouidentia constituta sit. Sed in primis expendisse oportet vsum chalybis non esse temere, & protinus à principio aggrediendum. Quippe in his, quæ sic curantur, ocysime malum reuertitur. Sed considerandum est, num affectio firmata in aliquo viscere sit, & obstructio iam facta, ita ut colorem vitiet, & actionem lædat. Quod si ita sit, non omnino posthabita vteri prouidentia (utpote à quo affectus oritur) poteris quidè chalybe uti & alijs, quæ vehementer deobstruant: nam praualeat meserei iecoris, aut splenis obstructi indicatio ei, quæ ex vtero prodit. Verum si horum mēbrorum, non fuerit ita facta, ac inueterata affectio, ut ex optimo scēminæ colore cōstabit, coniiciendum est, vterum male affici, & ab auxilijs ipsi proficiunt incipiendum esse: ab ijs quidè, quæ simul deobstruant, & liquida sint, ac affectui vteri siue ex retento sanguine, aut semine prodeat correspondeant. Nam concuratio ea optima est, quæ à causa, & affectus principio initium sumit: ob id vtero primo prouidendum est, & mox affecto membro.

Curatio quæ
optima.

energij
modi.

Exercitium itaq; omnibus partibus obstructis proficuum esse experimento & ratione confirmatum est: nam triplex præstat beneficium in hoc opere, dum sanguine primus misso, & leui aliquo expurganti exhibito fit. Primum quidè excitat viscerū, & omnium partium calorem: quòd fit, ut si mox, ab eo laborans quie-

- A** quiescerit, crudorum succorum coctiones prosperè ad modum fiant. Quo solo præsidio plures fœminas ex grauissimis obstructionibus liberatas vidimus. Secundum etenim humorum commodam distributionem ab exercitio in eodem optime molitur natura: quippe dilatatis ex calore partibus, peruiæ facillè fiunt ad eam humorum distributionem, cui antea nullus aderat locus: qua in re ab exercitio non licet desistere donec parum sudare cœperint fœminæ: nam id est euidentis signum factæ ac scientis distributionis. Tertium quidem aperientibus pharmacis viam parat, ea nanque minimè possunt sua sponte partes peruadere abditas, licet sibi sint familiares, ut de scolopendrio, & eupatorio dictum est, nisi quodammodo dilatentur: quas proculdubio, calor exercitij adedò patulas reddit, ut facillè medicamento pateat aditus. Quãobrem necesse est, ante sumptionem cuiusvis aperientis pharmaci, fœminas parum exerceri, ac deinceps post sumptionem iterum & uehementius, ut ad partes primo exercitio apertas vis medicamenti, uel ipsum medicamentum permeare possit. Fiet tamen exercitium huic vsui proficuum summò manè celebrata precedentis noctis sufficienter coctione: in quo labore quo difficilior & accliuor fuerit exercitij locus, & fœmina maiore labore id peregerit, eo partes maiorem contrahent calorem, & comatius aperientur: à quo exercitio supersedendum est, reliquis totius diei & noctis partibus, ut medicamentum & natura sua munia commodius exequantur, atque hæc est exercitij lex & ratio.

Circa pillularum & reliquorum medicamentorum administratione nosse conuenit, ea, quæ in forma solida adhibentur, eis præcipue obstructionibus proficua esse, quæ in vetriculo & primis venis insunt: nam partes illas facillè attingit vis medicamenti: quippe si fluida sunt substantiæ, ocylissimè ab eisde prolabuntur. Sic pari ratione potiones & fluida pharmaca, licet omnibus partibus prosint, peculiariùs tamen iecori & spleni, quæ venas habeant angustas, & sedem abditam & longè à vis communibus distitam, ita ut necessum sit fluidæ & tenuis substantiæ esse medicamenta illuc ventura, & adhuc tenuiora aut fluidiora, quæ vterum.

- C** Est præter dicta aliud medicamenti genus omnibus etiam obstructionibus cœ, & maximè proficuum, quo multi medicorum passim in hoc affectu vtuntur: id sanè est calybis præparatus, cuius laudes & efficaciam nec satis nouerunt antiqui, nec iuniores experti sunt. Verum licet cœ sit fœminis obstructis præsidium, non tamen omnibus pari modo, neque eadem lege administrandum uenit. Nam quibus menses, & venæ vetriculo proximæ obstructæ sunt, primis diebus chalybem præparare, & admiscere oportet ijs, quæ vomitum quoque moueant: plerumque enim fœminæ sic affectæ, potissime hac uia sanitati restituntur. Quippe si uis medicamenti excrementitium, quod in ventre redundat, ad affectas obstructione partes deferatur, dubium non est, quin maius dānum id præsidium sit allaturum: ob id quidem uel diebus aliquot ante calybis sumptionem vomendum est, uel diebus intermedijs, aut vomitoriū aliquod primis diebus admiscendum, quibus tractatis, subtrahere uomitoriū a chalybis consortio oportebit. Cauere tamen fœminas ad uomitum pronas oportet, ne immodicè vomant, cuius ratione admiscendum est aliquid ventrem roborans. At ijs, quæ iecur obstructum habent, subtilius chalybè comminuere & præparare opus erit, semperque admiscere aliquid, quod a iecore per ventrem purgare natum sit cauentes, ne ulla ratione uomitum moueamus: nam

O 3 aut

quatuor exer-
citijs.

Chalybis præ-
paratus

aut morbus difficulter & cum grauissimis accidentibus beneficium suscepta-
bit, aut facili deinceps reuertetur. Sic profecto splene obstructo præmissa præ-
paratione, quam mox docebo, crassiori modo chalybem præparabis, admisce-
bisque ei quæ succum melancholicum expurgent: crassum enim chalybem me-
lancholici humores desyderant, ut pondere & abstersione humoris duritiæ su-
perare possit. Quamobrem aliquando oleo amygdalarum dulcium præpara-
mus & admiscemus, ut simul siccitatem & duritiem frenet. Quod equidem Ae-
tius insinasse videtur, qui crassiorem chalybem rusticis corporibus, utpote
melancholicis, adhibere iubet. Sed de chalybis præparatione, efficacia & viri-
bus, latius cap. de vtercirrho.

Præterea, in omnibus obstructionibus, quarum gratia dictum est, ante cha-
lybis exhibitionem prius vias præparare oportuisse, hoc vnum adseruare, mihi
per quam necessarium uidetur, nimirum, tenuius & leue aliquod ex chalybe
pharmacum statim initio curationis præmittendum esse: tum præparandi vias
& reliquum corpus gratia; tum verò, ut præcaueamus, ne subita mutatione ex
ualido pharmacho illata corpus mille (ut solet) accidentibus præmatur, quod
uel maioris mali causa est, uel redditus ipsius affectus. Quod præceptum cau-
tius obseruabis in ea splenis aut uteri uel iecoris duritiæ, quæ iam iam in schir-
ri naturam cõmeatum minatur: quo tempore, ut subsit locus ad maiorem &
efficaciorem chalybis compositionem, corpus aliquot antè diebus præparabis
eo modo quo paulo inferius referam.

Corpus itaque præparandi uia & ratio, triplex existit: prima quidem omni-
bus obstructis feminis communis, sed eis præsertim, quæ exercitium aliquod
moliri nequeunt ob impotentiam aut uitium mammarum, uteri aut ex calfacti
iecoris; quas præparare necessum est, ac exercitij defectum supplere potibus a-
quæ calidioris parum antea chalybis sumptionem: postmodum uerò exerci-
tium imperabis lenissimum, domi quidem & non subdito, facta solum placi-
dissima deambulatione, ac sumpto per intervalla calidissimæ aquæ haustu,
quo euidenter constar, vias laxiores fieri, & subinde aquæ calore dilatari, quod
facilius medicamentum permeare possit. Secunda uerò, cum obstructio circa
duritiem ac scirrhosam dispositionem existit, quo tempore corpus purgabis
primo accessu uel per uomitum, qua lege dictum est, uel per expurgans me-
dicamentum, idque leue, ne ad obstructas partes aliunde humores euocet, &
citra ullam syruporum præparationem qui proculdubio humoribus extenua-
tis fluentibusque ad obstructas particulas, pressiores & maiores moluntur
obstructiones: quin potius in hac curatione uice uersa incedendum est: quip-
pe ab assumpto pharmaco, syrupis uel aliquo leui præparatorio ex chalybe
confecto utendum erit. Tertia uerò (cum obstructio scirrhosæ dispositionis
particeps est) præparandi ratio, talis existit, qualis necessaria est, non ad vias
referandas solum, neque ad expurganda excrementa: quæ in uis ductuum ua-
gantur, sed ad humorem extenuandum, modicè, lentè ac paulatim emollien-
dum, quem facilius deinceps grauior & efficacior chalybis forma uel absterge-
re, uel deorsum ferre queat.

Inter alia, quæ hoc præparationis ministerium facili præstare possunt, expe-
rimiento didicimus, primum locum obtinere leue quoddam auxiliu præparatoriu,
quod

A quod sic conficies: excipe limaturę chalybis ʒ.iiij. quam limaturam ferro aliquo instrumento excipies, & igne candescere permittes, moxque projice in li. ij. aquę lupulorum, graminis, rubiæ, borraginis, aut per lapideum mortarium percolatę, vel alicuius fontis, qui aquam nanciscatur nitidissimam purissimā, & tenuem, & postea coletur, & iterum igniatur prædicta chalybis limatura, & sic septies facito: ac rursus summe totidem vncias noui chalybis, & eodem modo in prædicta aqua facito, idq; reiterato ter quatuorve facies, donec chalybis lib. j. consumpseris, & facta colatura adde syrupi violarum vel borraginis, aut mellis rosacei ʒ.iiij. cuius fœmina facto modico exercitio summo mane capiat ʒ. iiij. citra frigiditatem actualem, ac deinde perficiat exercitium lentę, paulatim, & moderatę. Postquam verò prædictum medicamentum ter quaterve aut pluries exhibueris prout affectus duritiem postulare cognoueris, ad efficacius (licet hoc plerunque in delicatioribus, ac puellis sufficere videatur) te conferes. Ex quo præsidio varias præparantium medicamentorum formas effingere, cuiuis facile erit facta plus vel minus chalybis extinctione, uel admixtis decoctis uel infusis, pharmacis referantibus & attenuantibus iuxta affectus indigentia. Verum si aliud (vt non raro accidit) ex obstructione vel scirrho visceris alicuius soluta fuerit, aut viscus aliquod steterit imbecillum, aliquod admiscebis medicamentum aperiendis obstructionibus idoneum, vel roborationi membrorum proficuum, quod chalybis excessum moderetur.

Sed antequam ad comodā & integram chalybis exhibitionem deueniamus, quę experimento in hac re dicimus, aperiere æquum esse diximus: constat quidem obseruatione delicatissimis fœminis, ijs præsertim, quibus cum hoc morbi genere aliquid melancholicū adiungitur, vel quid corruptum ex semine vitiatum cor affligit, summopere profuisse ad aperiendas obstructiones, compescēdosque venenose materię insultus, lapidis bezoar vsū, quę multis modis præstare possē cōpertum habeo. Primò quidē, lapide in subtilissimum puluerē redacto, & in aqua aperiendis obstructionibus idonea liquato: secundò admixto conseruę adianti, à qua modicum prædictę aquę ex chalybe extincto porrige: tertio ipsum lapidem prodesse comperies in tabellis cum pulueribus seminis agnicasti, rubiæ, cinnamomi, & sacchari confectum: quarto verò & vltimò maximopere proderit, si prædictum lapidem admiscueris alicui ex præparationibus chalybis. Cui consimile beneficium præstabis, si in præparationibus chalybis addideris electari de gemmis quantum sat sit, vt fœmina singulis diebusumat. ʒ. i. Caterum lapidis bezoar sat est vno quoque die. g. vj. sumpsisse, vel ad summum. vij. Quod si confectionem alchermes, vel de hiacintho, prædicto chalybi ad. ʒ. i. addideris, idem beneficium præstabis. Experimento etiam probatū habeo, radicē schorchionerę vino per noctē maceratā, & summo manē sumptam plurimas ab obstructionibus liberasse. Sed probo magis, ipsam aliqua ex supra dictis aquis & saccharo elixatā deuorare & residuā aquam desuper bibere, uel conditam saccharo parare decocto aliquo aperiendis obstructionibus, pficuo, vt id succi vel mutę (vt vulgari vtat vocabulo) quod post cōdituram superest, simul cū ipsa radice & pulueribus cinnamomi ingeratur. Quę sanē medicamentā prædicta fœminarum sorti, & alijs quę ita sunt animo deiecto & confracto, quod maiora medicamenta perferre non possint, censeo ex vsu maximē fore.

O 4 Verum

Verum si ventrem & mesereon obstructa esse copereris, præmisso preparato-
torio pharmaco, quale superius adduximus, aliud exhibeto his visceribus ob-
structis maxime proficuum, quod recipit, specierum diarrhodonis, diacurcumæ &
agarici trochiscati. ana. 3. j. medullæ cartami 3. ij. corticis radicis rumicis, ru-
beæ, & seminis duaci. ana. 3. j. & .f. gariophyllorum. 3. j. chalybis minutissimi &
vino præparati. 3. ij. mellis despumati quod sufficiat, ut fiat electarium, cuius ex-
hibe a. 3. ij. ad 3. iij. Quod si eo assumpto, laborans vomuerit, non est prohiben-
dum, nisi aliquod damnum timueris, aut diu vomitus persistat: quod vitium vi-
tare poteris purgata inferna aluo, & ablatis à compositione cartamo & agarico.
Ac si ulterius velis vomitum compescere, ab assumpto chalybe, vini albi odo-
ratissimi modicum ministrabis: partim, ut os abluat repurgetque à recrementis
chalybis, partim verò, ut nauseam compescat. Idque facies eodem ordine serua-
to singulis diebus, præmisso & posthabito convenienti exercitio.

Iecori quidem obstructo eadem componendi chalybem ratio mihi utilissima vi-
detur, ablatis tamen cartamo & agarico, quorum loco addito rhabarbari. 3. ij. & .f.
& nihil nocebit. 3. j. agari addere. Verum si prima, secunda vel interdum tertia die
fœmina vomuerit, prohibendum non est, ultra id verò, graue & inutile existit.
Sed pretiosior iecori æstimatur alia conficiendi chalybis ratio, quæ recipit: limatura
ipsius omni recremento lignoso exempto. lib. .f. quam vase vitreo excipe, addi-
tis vini albi optimi 3. viij. mox vas illud igni mollissimo appone, diligenter hic
& inde chalybem & vinum sursum ac deorsum agitando, tandem decem aut
duodecim ebullitiones feruere finito, quoadusque eius spumofum sursum fer-
ri videas, ac mediocriter crassescere conspicias, tunc spumofam ac pinguosam
chalybis partem, quæ feruore separatur simul cum vino in aliud vas transfun-
de, atque id quater facito ordine prædicto, nimirum, denuo aliam vini quantita-
tem conijce in eandem limaturam, & eodem modo feruere sine, parique ratione sepa-
rari, & pro tertio & quarto idem facies seruato prædicto ordine. Itaque vinum
cum prædicta quadruplici spuma quatuor coctionibus ex chalybe extracta
rursus igni appone, donec leuiter feruens mellis spissitudinem acquisierint: quo
tempore vsui seruari oportet, ex quo electarium hoc modo conficito: excipe se-
minis petroselini, dauci, & specierum diacurcumæ & diarrhodonis. an. 3. j. cinna-
momi. 3. j. chalybis modo dicto præparati. 3. vj. ex melle optimo & despumato
fiat electarium, cuius a. 3. iij. ad 3. v. summo mane præmisso leui exercitio, uel a-
quæ calidioris potu, præberi potest, & eundem ordinem in reliquis seruabis,
donec fœminam coloratiorem factam esse comperias: at puellis quæ uel ob-
struuntur, uel obestum terræ aut alterius rei similis decolores fiunt, optimum
efficitur medicamen, maximeque imbecillis & febriculosus.

Melancholicis uerò & splene obstructis, uel chalybē cum oleo amygdalarum dul-
ciū cōiter præparatū, uel cū speciebus diarrhodonis, scolopendriæ, foliorū se-
næ, & pulueris corticū capparis cōmixtum crassiori modo, & vulgariter præpara-
tum ministrabis. Verum quia ob viarum, quæ in splenē tendunt, angustiam, anfractus
& distantiam (licet humorum ratione, ut ex Aetio retulimus, crasso modo chaly-
bem præparare & limare oporteat) prædicta præparandi ratio aliquando inutilis fit, ac
in vomitus & alia accidentia fœminas deducit: ob id quidē aliam, quæ subtilior
est, & vsui cōmodior existit, scribere placuit, cuius descriptio talis est: excipe li-
maturæ

- A** maturæ chalybis lib. i. q̄ semel ablue aceto, & à recrementis expurga, postea facta colatura super pannū inspergito, & p̄ijce pulueris gariophyllorū. 3. s. q̄ per diē, & noctē eo modo sunt dimittenda, & mox ea excipere oportet vase aliquo vitreo, cui adde vini albi optimi 3. x. ac projice desuper limaturā cū pulueribus scolopendriæ, & alijs supradictis, aut intra ipsos, deinceps q̄ valide concutito cōmota vehementer phiala, mox tñ Soli feruenti expōne p̄ integrū diē, ac si hyems fuerit, in furnaria stupha, aut loco alio calido adserua. tandē octo, aut decē diebus, idē facies, donec limatura ipsa in vinū ferē liquetur, parumq; aut nihil in fundo resideat, sed veluti mixtū quoddā factum sit, cuius summo manē 3. ij. exhibeto, seruatis exercitio, & purgatione supradictis. Quod si velis vulgaris chalybem cōponere, ipsum pondere ij. aut iij. 3. cū modico rhabarbaro conserua rosarū admiscebis. Itē (& non vulgaris efficaciam) electariū efficies ex dialacha, melle, & chalybe ad mediocrē sp̄ilitudinē, exceptis chalybis 3. viij. dialachē 3. vj. mellis quantum sit satis, vt mediocrē nanciscatur consistentiam. Sunt & alij inter peritos Medicos, qui ad robusta corpora electarium diaphenicon, vel aliud cōsimilis efficaciam pondere ij. 3. cum 3. iij. chalybis admisceant. Alios etiā scimus, chalybē potabilē efficere, quē nisi antea experimento cōperiam, quantum profit ignoro: q̄ si id citra vehementis medicamenti admixtionē fieri posset, non displiceret: sed securior & vtilior mihi videtur aqua, q̄ excurrit à lapide, in quo acuntur enses, si centies extinxerit limaturā chalybis candentē, quā scimus magnos lienes liquari. Cæterū ne hiberno, aut nimis calido tēpore nobis desit p̄sidiū quo obstructis mederi possimus, alia licet effingere auxilia, quē eundē ferē vsū p̄stare possint, velut sunt syrūpi, qui vel ex scoria ferri, aut chalybis fiunt, aut ex rubea tinctorū, & pseudorhabarbaro. Prima igitur cōpositio syrūpi ex scoria ferri hoc modo fit. R. scoriæ ferri (sed probo magis scoriā chalybis) p̄paratæ 3. xij. passularum sine arilis. li. ij. infundantur per dies tres in lib. vj. aquæ & in fine bulliāt ad cōsumptionē tertiæ partis, & tūc adde origani, ameos vel iuniperi limati, ana p. j. bulliant parū & colentur, & ex colatura cū sufficenti faccharo fiat serapiū, cui incoquito in ligatura croci sine oleo 3. ij. Secūda fit ex eadē scoria, & eisdemmet rebus, croco excepto, & loco eius addito dialachæ rhabarbari electi puluerizati, & agarici trochiscati, ana 3. ij. q̄bus dū coquunt, aut saltē dū ab igne separantur ligatis, fiat eadē rōne syrūpus. Tertio vero modo fit ex rubeæ radicibus aqua lupulorum in qua scama ferri pluries fuerit extincta, diutius incoctis, & additis passulis, & croco, ad syrūpi formā post colaturam redactis. Quarto idem auxilium parabis ex pseudorhabarbaro, hoc est ex rhabarbaro monacorum appellato, nimirū ex radice eius decocta cū eisdem rebus, & facto ēt serapio. Ad primam tamen scoriæ confectiōē, ipsa lucidissima eligatur, & contundatur, & partes terreæ abijciantur; & totiens lauetur donec aqua exeat pura, & mox lauetur cū aceto fortissimo, deinde cōburatur super laminā ferreā, & extingatur in aceto, & cōbustio, ac extinctio fiant 4. vel 5. Verū non sat est in hoc opere quid & quo modo agendū sit nosse, sed expedit ēt non parum quousq; agendum sit. Quippe licet fœmina quodāmodo primis diebus rubicundior, agiliorq; appareat, non protinus subsistendū est ab vsu horū auxiliorū, sed eo vsq; perstare oportet, donec vel mēses fluant, si suppressi erant, vel certū sit minutissima adhuc vasa adapta esse, nec sat est semel accepisse, sed oportet

*Chalybe potabilis efficitur
gms. 3. vj. et
rubeæ*

*quatuor agēs
ob.*

tet bis, aut ter accipere, et si femina sana cōspiciatur, & cū hoc regulatissimā, & A
exquisitam agere vitam, ni velimus iterum obstructionem grauiorem fieri.

Verū ne desit huic malo p̄sidiū ex pillulis, & solidis pharmacis, ea reperies
v̄sui probatissima lib. 1. c. de mensium sup. §. de his, quæ uterum purgant.

Cæterum ne quid huic tractationi deesse uideat, utilissimū esse duxi lectore
monere, ne utcunq; & citra delectū ad p̄dicta electaria cōfigenda chalybē p̄pa-
rer: quippe iuxta corporū varietatē varias quoq; p̄parandi esse methodos, & ra-
tiones certū est. In primis expendat, ob nimis exquisitā chalybis triturationem
& cōminutionē ipsum commutari nonnunq̄ in argenti viui antiquā naturam:
quod fit, vt non pauca ex fœminis, quæ id sumunt, frequentissimē vomant, aut
aluū habeant turbatā. Quamobrem primò in trituratione diligenter obserua-
re oportet, an degenerauerit eius aliquid in argentum viuū, necne, idq; discas,
q̄ cōis p̄parandi ratio, quæ trituratione fit, leuissimam reddere eius substan-
tiam tenetur, argumentum quidem euident; nihil argenti ibidem adesse, & ar-
gumentum ēt non leue, q̄ huiusmodi medicamentum non pondere solū, sed
absterfione, & reliquis qualitatibus operatur. P̄parabis tñ chalybem aceto, si
humores crassi sint: secundò, vino, si fœmina frigidityte, & ventriculi visio
tissimum affecta sit: tertio quidem, si calidioris fuerit temperamenti, aqua rosa-
cea. Quam ēt legem & methodum adseruabis in admiscendis medicamentis, q̄
cuiq; fœminarum sorti, prout dictum est proficua fuerint. Tamen in hac re ex-
pendat lector chalybem, ita eis obstructionibus iecoris, quæ scirrhi naturā mi-
nantur, aut contrahunt (licet à Gal. & veteribus nulla fiat huius p̄sidi j mentio)
auferendis summopere esse proficuum, p̄sertim, si chalybi admiscueris ea me-
dicamenta, q̄ p̄terquam q̄ cal faciant, vt frigiditytas chalybis compescatur, ne
iecori officiat, aperiant quoque, roborent & visceris naturā respiciant, & tucā-
tur: p̄sertim, si lentē, paulatim, & à mitioribus factò initio, opus perfeceris. Et
vt in summa dicam, tanta est in chalybe vis & efficacia, vt magnos etiam lienis,
& vteri scirrhos, partim discutiendo, partim per aluū expurgando persanasse
visum sit. Atq; hæc sunt auxilia, quæ morbo virgineo proficua esse. ratione &
obseruatione cognoui.

Quis
res copio
siorē tra-
ctationē
reperies
c. de ute-
ri scir-
rho.

De vehemente pulsatione, quæ in arterijs dorsi in plerisq; fœminarum
reperitur. Cap. 7.



INTER pleraq; & eximia mala, quæ fœminis (licet non rarò in
viris potissimū melancholicis, reperiat) viduis maiori ex par-
te, aut virginibus succrescunt, vnū profectò est, q̄ oēs ferè con-
querantur de pulsu, naturali pulsationi vehementiore, anxie-
tate, ac tristi sensatione in hypochondrijs, & p̄sertim è regione
dorsi, vbi arteria, quæ secundum ipsum sita est, motū tangenti-
bus representat. Huius sanè affectionis parum, aut nihil scriptum reperies (li-
cet Cermison, tractatu de passionibus stomachi. c. 1. de pulsatione arteriæ infun-
do ventriculi, & Montagnana consilio 143. p̄sidia quædam huic malo, scrip-
serint, idq; breuiter) p̄terq̄ apud Areteum, virum inter Græcos sapientissi-
mum, qui de venæ concauæ acuto morbo lib. 2. de causis & signis acutorū, inte-
grū caput scripsit, quo videtur, huius affectionis quodāmodo meminisse. Docet
quidem

- A** quidem esse morbum quandam venae cauae maioris rami, qui cor etiam per sinistram eius partem ingreditur, quae dum morbo quouis ex plenitudine laborat, protinus si incalascit, arteriae secundum dorsum sita, damnum committat, cuius subinde motus in praecordiis, & e regione dorsi conspicuus fit. Est sententia huius viri in hunc modum, postquam praedictae venae ramificationem scripserat. Siquis enim aliquid de superiore vena caua cordi infixam in eam, quae iuxta spinam protenditur, aut a spina per iecur ad cor velit impellere, eundem descensum ascensumque inueniet. Haec igitur vena, ut arbitror (inquit) vniuersa aegritudines, & acutas, & validas patitur: nam tota una est, atque continua, a nonnullis autem Medicis ea pars duntaxat, quae secundum dorsum discurrit, agrotare creditur, quoniam eius, quae cor intrat, notae obscurae sunt, intra pectus enim rei nulli adhaerens, sed in pectore subleuata protenditur, denec transversum septum egressa cordi inseritur. Igitur, si quod ingens malum hanc venam corripiat, pectore ambiente delitescit. In hac itaque vena zetmata oriuntur. Sunt autem zetmata, diuturni affectus ex defluxu materiae pronenientes. Haec denique sunt huius auctoris verba, quae et in parte recenset ex affectionibus huius venae aliquem affectus ita acutos (praeter diuturnos, quos annumerat) suboriri, ut citissimam, & crudelem afferant mortem: tandem subdit paulo inferius. Quibusdam & arteria secundum dorsum inflammatur, quod pulsatio in alteris praecordiis manifestatur: nam & ipsa venae morborum particeps efficitur iuxta illam in sinistro latere posita, utpote ea, quae in omne corpus deducitur, nihil leuaminis afferente, neque cutem emolliente. Quam proculdubio sententiam si quis altius examinet, reperiet, arteriae huius pulsationem nil aliud esse, quam specimen & indicium morbi alicuius praedictae venae cauae, vel membri circumstantis, ut Aretaeus profitetur: quod vitium in praedictam quoque arteriam reiecit, ita ut ex vicinia ipsam vehementius cogat pulsare. Sic eadem prorsus ratione in feminis, quibus aliquod viscus obstructum inflammatumve steterit, idem malum suboritur: quod in melancholicis et viris plerumque reperies. In qua sane re scio Fernelium existimasse arterias quoque mesenterici dum inflammatur (maxime in hypocondriaca melancholia) huiusmodi subsultum praese ferre. Cuius viri sententiam solum arbitror veram esse in praedicta affectione. Quippe contingit (in feminis maxime) subsultum illum sentiri in toto ventre, & potissimum iuxta ipsius fundum usque ad umbilicum. Ceterum hanc motus speciem longe esse diuersam a praedictae arteriae motu arbitror, haec enim recta per dorsum vagatur, mouetur & sentitur: arteriae autem mesenterici non sic, sed hinc inde ad hypocondria magis vergentes. Qua occasione censeo Hip. dixisse. Quod si pulsus sit in hypocondriis maniam, aut perturbationem significat, praeterquam quod harum arteriarum motus longe minor est eo, qui iuxta dorsum sentitur. Quamobrem considerandum est duplicem in male affectis corporibus reperiri in ventris arteriis motum conspicuum, adhuc in his quae nondum macilenta existunt, unum quidem in melancholicis qui proxime ad deliramenta accedunt,isque maxime apparere in hypocondriis iuxta Hip. & Fernelij mentem: alterum vero iuxta dorsum, cuius mens est in hac parte meminisse. Quem et arbitratur idem Fernelius esse arteriam dilatam, seu varicosam, nam dum in arteria aneurisma aliquod efficitur, praedictum vitium fieri censet quoque: Ego tamen existimo arteriam, quae vehementer iuxta dorsum pulsat, neque varicosam fieri, neque aneurisma pati, sed potissimum

tissimā pulsationis rationē esse, q̄ nuper dixi, nec desunt q̄ eū morbū arbitrentur esse in figura, ob dilatātā plus iusto partē. Sed decipiūtur, quia pars illa nō dilatatur ex morbo, sed ex virtute dilatante, licet irritata à morbida causa: & ob id censeo veriorē esse primā sententiā, dūmodo p̄ inflammationē intelligamus sic eam inflāmationē. *Hogolim*, seu incensionē dictā: nam à reliqua inflāmationis specie in eis partibus, subsequitur mania, aut deliriū, quod Hip. intellexisse arbitror, dū dixit: Si pulsus insit in hypocondrijs, mania aut perturbationē significat. Ex quibus constare iam videtur, huius affectus naturā esse intēperamentum calidum, seu inflammationē p̄dictā arteriæ. Cæterum inflammationē hanc duplicis naturæ esse cōtingit: alterā quidē essentialē, hoc est, q̄ ipsamet arteria patitur, non aliunde accepto mali principio, sed ipsa primario affecta, q̄ grauissimorū accidentium soboles est, & mortis proximæ: alterā verò p̄ consensum ab affectione venæ magnæ, vel alterius propinqui visceris: cuius sortis esse creditur affectio, q̄ feminas vrget. Rursus eandē affectionē scimus fieri, aut subito & affatim, quæ grauissima infert accidentia, qualia Areteus recenset: aut lente, ac sensim, cuius sortis censeo esse eam affectionem, quam fœminæ, præsertim virgines, & viduæ perpetiuntur: ex viscerum obstructionibus, quo fit, vt neque citò interimat, neque plurimum affligat, vt paulo inferius monstrabo.

Verū, vtcunq; sit, vno è tribus modis arteriā hanc cōspiciuē, & vehemēter pulsare, certissimū mihi est. Primū quidē cū vena caua crasso, aut superexcalfacto sanguine plena, dū in grauiora accidentia nō degenerat, arteriæ huic, q̄ iuxta dorsum sita est, vitiiū cōicat, vt ex Aretei snia probatū superest. Quā sanē affectionē ex hac causa subortā, pludium esse maioris mali mihi non est dubiū: aut saltē si in sanguinis fluxum ex pulmone, aut in breuem mortē nō cōmigrat, vt idē autor refert, in maniam tñ aut tristē, & immedicabilē melancholiam, dubiū non est, quin ocysimē degeneret. Qui subsultus longissimē dissidet ab eo, quē in fœminis cōperimus. Secundò aut (quod frequentius in fœminis accidere cōstat) fit, cū ex visceris alicuius calore acri, & mordaci eadem quoque arteria incalescit, & ob id maiore motum repræsentat: quod nō rarò in gracilibus, & melancholicis fœminis ex sanguinis, vel alterius humoris, aut excrementi adustione conspicimus. Quippe cū his omnibus in viscerum, & meserei p̄sertim venis sanguinis fœculentus, vel humor, aut excrementū quoduis ex interna, aut externa causa exuratur, nulli fore dubiū arbitror, qn̄ certum sit arteriā illā simul cōpati, atq; exalferi, & ad maiores, ac vehementiores motus perpetuò excitari. Qua quidē in re hæc constituenda est differentiā, q̄ si causa externa, vel interna subito, & affatim huiusmodi calorē succendat, certum est, nō grandē solum arteria pulsationē efficere, sed grauius aliud malū, quod grandioris sit pludiū, vel citò interimat. Verum si altera, aut vtraque causa sensim, & paulatim viscera aggrediatur, verisimile est affectum, fieri connaturalē, & habituali cōgeneū, quo laborans sanus suo modo viuit, sine cōmunium actionū euidentī noxa, indies tamen vel corpore, vel moribus adēd mutatur, circa euidentem causam, vt non minimā inferat sibi suis, ac Medicis admirationem, visceribus distēperatis, ac perperam propria munia obeuntibus, improspērāq; alimentorū coctiōnem molientibus. Quibus sanē mirū nō est, si corpus in dies præter ætatis rationem deterius se habeat, ac cor triste, & metuens aliquando exarescat exoptetq; mori:

A mori, & in alia deliramenta prorumpat, aut anxietatē, & inquietudinē, vel rerū omnium sine euidenti causa tedium perpetiatur, citra membri alicuius conspicuū affectū, præterq̃ pulsantis illius arteriæ. Tertio verò, & vltimò prædicta arteriæ pulsatio conspicua efficitur, sine corporis gracilitate (quæ, vt Gale. refert lib. de pulsibus ad tyrones, causa est, q̃ arteria, quæ secundum dorsum sita existit, tangentibus abdomē motum repræsentet) ex visceris alicuius, aut venarū, q̃ alicui viscerum proximæ sunt, obstructione conspicua, & manifesta: quod plerunq; maiori virginū, aut viduarum parti accidere conspiciamus. Quā doctrinā intelliges verā esse, & ab alijs duabus causis diuersam, eò quod ex prædictis obstructionibus id malum oritur, modò incalescant humores obstruentes, vel obstructio ne detēti, modo secus. Quippe si præter id q̃ obstructio adest, inflammatio quoq; sit, dubium non est, quin maior fiat prædictæ arteriæ subsultus, vt in secūda causa nuper diximus. Verū si citra euidentem calorem infarcti sint humores aliqui in mesereo, vel quouis alio viscere, verū quoq; esse arbitror, ex tumore humorum obstruentiū arteriā comprimi, quæ cū durū quid, quale ante obstructionem, non attingebat, modo pertingat, facile vehementius pulsare sentimus: qđ fieri pōt vno ē duobus modis. Vno, q̃ rationi cōsonum videatur (licet amplius q̃ secundum naturam non pulset) arteriam, quæ rem aliquam duram, qualis obstructio est pertingit, longē apertius motum repræsentare, q̃ antea, dum re molli, & secundum naturam circumscripta erat: tum quia naturale arteriæ spatium obstructione impeditur, quam dum pertingit arteria ex continuitate rei duræ, quæ digitos et attingit, motum quoq; rei duræ digitis repræsentare certū est, quod anteq̃ ibidem esset durities, erat impossibile, eò q̃ ad tam distantissimam partē non peruenisset motus, nisi quid durum in medio esset, cuius cōtinuitate motus arteriæ ad tactum vsq; perueniret, repræsentaretq; maiorem motum: tū verò, quia arteria ob tensionem ex vicina plenitudine durior quodammodo, aut tensior apparet, cuius motus maiorem semper æmulatur figuram, q̃ re vera præstet. Secundò, eum motum contingit non solum maiore apparere, verū re vera esse, q̃ partes vicinæ obstructionis causa non possint, quantum fat est, ventilari (licet calor non creuerit, vt in secunda causa diximus) cogiturq; subinde arteria hæc huiusmodi defectum supplere, & ob id vehementius pulsare, præsertim si ipsi detrahatur ab obstructione spatij naturalis aliquid, vt causam reierat, maiorem apponit conatum, & subinde euidentiore efficit motū, eoq; magis, quod aliqua vicinarum partium incaluerit. Quamobrem censeo, in plerisq; virginibus obstructis huiusmodi subsultum ex hac causa reperiri.

Verū si quis certus exactē non fuerit ex prædicto subsultu, & causis, quas nuper diximus, signis amplius id dignoscet. Inquit enim Areteus loco nup citato loquens de ijs, quibus arteria incalescit. Cuius aut sic affectorū squalida, rugosa atq; aspera est, sed in partibus, p̃minētibus, atq; ossis, vt in cubitis, genibus, digitorūq; articulis magnis, talis cōspicitur; somni tumultuosi sūt, alius quibusdā nihil reddit, quibusdā exiguum acre, biliosum, lotium acre mordaxq; est, mens vtiq; his cōstat, sed quadam segnitate torpet, & corpus tale consumitur. His et accidit anxietas inquietudo, & omnium rerum insolens tediū, cibi et fastidiū caliditas p̃ totū corpus ad tempus, & per interualla, præcipuē in facie, & circa ipsum ascendens, sius, pulsus palpitans in præcordijs, qui dum nimis crescit,

Signa.

fit, in inceperit plerumque degenerat, præsertim cum malum ad eum creuerit, ut & cor per arteriam, & iecur, aut ventriculus per venas, & vasa meleraica cõpantantur. Haud ab re igitur (ut inquit Areteus li. 2. de curan. acu. pa. c. 7.) existimes eorum viscerum supremas partes maximè ad vitam facientes ægrotare. In quibus feminis sine dubio reperies eadem ferè signa, quæ cap. de Melancholia, & obstructionibus virg. & vid. scripsimus.

*Præsa-
gium.*

Tam grauis est huiusmodi affectio, tamque timore plena, & grauissimorum affectuum præsaga (quod verbo illo monstrauerat Areteus. Supremas partes maximè ad vitam facientes ægrotare) ut necessum sit, id cuique monstrare, ne periculi ignorantia morosè, & negligenter eiusdem curatione aggrediatur, aut incautè aliquid agat, quod causa deinceps sit maioris mali. Quo in affectu, ut triplex reperitur causa, ita quoque triplex existit præsagandi modus. Sic enim dum arteria pulsatur ex venæ cauæ sibi adhærescentis plenitudine, aut inflammatione grauissimum esse malum, & periculo plenum hæc verba monstrat Areteus. Quoniam sanguis copiosus erumpens vitam delet citissimè, per superiora quidem, per pulmones, & arteriam profluens, si in pectore fiat effractio, si iuxta principium in anum ventrem descendens, in intestinis continetur, atque adeo intestina replentur, quum prius quàm deiectus sanguis in conspectum detur, homines intereunt, & ventriculus sanguine redundat. Nascitur & circa venam phlegmone, quæ & ipsa, si magna sit, celeriter hominem tollit: ignis enim acer, mordaxque in ambabus cavitatibus inclusus accendatur, pauculusque duntaxat foris apparet, ut tangenti flamma tenuis esse videatur. Ac paulò inferius, ut magnitudinè periculi ostenderet, adducit specia lia huius mali signa dicens; Aeger quidem sese cõburi existimat, pulsatus arteriarum exigui sunt, creberrimi, ac veluti oppressi atque repulsi: frigus adest extremorum, sitis, aspera oris siccitas, facies decolor, rubet, omne corpus subrubidum est, præcordia dura sunt, atque reuulsa, dolor in dextra parte maior, & cum eo palpitatio in longitudinè ad ilia, usque perueniens. Et subdit paulò inferius. Decimo quarto die hi plerumque moriuntur: quibus morbus diutius trahitur, duplo longiore tempore pereunt. Quotcumque autem aut ab initio pusillam phlegmonem habent, aut magnam paulatim remittentem, mortem quidem euadunt, sed nondum morte liberantur: hi longo sanè tempore causo laborant, verum omnia periculosa iam desinunt, dolores, præcordiorum distensiones, & pulsuum malitia, & metis ignauia, adhuc tamen fastidiosi sunt, languētes, consilij inopes: simulque & ardor, & sitis, & lingua, orisque siccitas agrum discruciant, magnè respirant: verum si frigidam, quam plurimam affatim bibant, breui interuallo molestia leuantur, postmodum ipsis sitis accenditur, & sic in dies deteriores euadunt, donec morte corripiantur. Quam equidem affectionem non raro in viris, ac feminis accidere existimo, verum iecoris inflammationis effigie decepti non intelligimus: & ob id placuit, omnia quæ in ea reperiuntur, ad vnguem scribere, ut cautiore deinceps facti, attentius eandem intueamur. Secunda autem causa, & species huius mali, licet minoris sit periculi, haud letis est. Quippe dum ex inflammatione (dixerim phlogosi, seu incensione) vicinarum arteriarum partium, eadem vehementius pulsatur, mihi non est dubium quin laborans, nisi citò præueniatur, in melancholiam, maniam, aut perturbationem agatur, quod lib. 1. progn. his verbis dixerat Hippo. Si pulsus adsit in hypocondrijs, maniant aut perturbationem significat. Præterea periculum est,

ne

Ane in totius corporis consumptione femina extra febre comigret, q̄ cibi fastidia curatu difficillima cū genium, & totius corporis impotentia, q̄ breuissimè accedant. Item mœstitia grandis; & implacabilis sitis, quæ potu non solum non leuatur, sed rursus vehementius crescit, & nullis rebus leuamen suscepta: tandem quavis febricula superueniente, vel mox pereunt, vel in malū corporis habitum decidunt. Tertia verò causa, & species, & cognitu, & curatu facilior existit, ut quæ semota obstructione leuiter quoque senescat. Verum si diutius obstructions remorentur, nil mirum si uel incalescant, vel duriores, & immedicabiles factæ in aliquod ex prædictis malis affectionem migrare contingat: nam ocysimè in malum corporis habitum, vel hydropem non paucas incidisse scimus. Quippe crudi succi, qui non probè, obstructionis causa, purgantur, nutrimentalia, & præcepta membra adeò refrigerant, ut mirum non sit, si in hæc mala feminae promptissimè deferantur.

Pari prorsus ratione in hoc affectu tripartitū esse oportet curandi rationē, sicut causam, & affectū triplici diuisione distingi diximus. Sic prima mali species, q̄ ex dorsalis venæ, & arteriæ inflammatione pullulat, ut q̄ grauissima sit affectio, sedulā prærequirit diligentia, & maturum cōsiliū. In quo affectu præter tenuissimā, ac refrigerantem victus institutionem, vniuersam curationem in sanguine detrahendo sitam esse ex professo Areteus fatetur: inquit enim loco nuper citato. Venas itaq; in cubito protinus cedito, inultumq; sanguinis, sed nō semel totum mittito, vno & bis & ter & alio die, quò interim vires restaurentur repetito. Quæ profecto sententia videtur, omnem suam curā in sanguine detrahendo collocasse. Verum quia rationi consonum est, sicut in ardentissimis febribus, vires nimio calore periclitari, & laborantem animi deliquid, optimè videtur cōsultare, per vices, futuras esse sanguinis detractiones. Quo facto diligentia nō leui curandum est, ut & habitus refrigeretur, & reliquæ sanguinis, q̄ supersunt, cōterantur, quia cūm perdifficile sit vena scissa consumere, cucurbitulis dorso affixis cū grandiori sacificatione per cutim è regione partis affectæ deriuare opus est: quibus èt internæ partes, quæ calore excandescunt, refrigerari contingit. Atqui cū sic affecti refrigeratione non leui indigeant, q̄ in eorū visceribus veluti quidam ignis exæstuet, secunda indicatio docet in hoc affectu, frigidæ potibus, lactis vsu, & epithematis cauma in visceribus extinguere, antequā aut in acutissimam febrē comigret, aut succrescat, exaspereturve ea, quæ cum affectu præest. Sic affectis èt uerendum non est, copiosius frigidam porrigere, licet mox ab assumpto potu uomant. Manè uerò mulieris optimi temperamenti lac ministrabis ex ubere, aut mulctū, aut, ut Areteus consulit, ipsi lacti tertia aquæ parte addita: Nam & alimentis, & medicamenti vires obtinet. Cuius sanè loco apozemate aliquo frigido utendum est, confecto ex aqua hordei, cichorii, borraginis, acetosæ, buglossæ, schorcioneræ cum syrupo aliquo, uel ex frigido, uel ex modicè acidis. Quæ in re non displicebit prædictis aquis momentum succi agrestis, uel limonum acidorum, uel aceti cum saccharo addere, aut syrupū ex prædictis rebus confectum, uel ex acetosæ, aut similibus. Conferunt dorso epithemata, & cordi èt ex aqua rosacea, acetosæ, buglossæ, & succo pomorum acidorum, & dulcium, additis pulueribus santhalorū, coralli, diamargaritonis frigidi, & electarij de gemmis sine spēsibus, quibus si aceti modicū adieceris haud parum

CURANDI
DE RATIO.

parum profeceris: q̄ oīa filtro serico, aut panno mollissimo excepta p̄dictis partibus adhibeto. Caterū in hac affectione rarō, aut leuiter expurgantibus pharmacis vtendum est, quod hac interna viscera excalfacere nata sua sponte sint. Quamobrē inclinante iam affectione, si oris supererit amaritudo, ventris morfus, cibi fastidium, vel quoduis aliud signū, biliosi, aut alterius humoris soboles, māna, cassia fistula, aqua lactis, succo rosarū, aut syrupo ex infusionibus violarū, vel infuso aliquo senæ, leuiter corpus purgabis, cauens ne aliquod medicamentū acrius admisceas. Nā tantū Areteus ea præcauet, vt et si aliū astricta & arida nimis sit, blandioribus solū clysmatis ipsam emollire doceat, interdicens omnino, q̄ calida & acria existunt: ob id et refrigerantibus clysmatis viscerū caliditate cōpescere immisso per anum lacte, aqua hordei cū oleo rosarum & violarū. Præstat item mane sumere ʒ. iiii. aquæ stillatiæ radicū altheæ, vel seminum maluarum viridium cū ʒ. i. sacchari albilissimi, aut pūsanā optimē præparatam, vel aquā excremore hordei p̄ instillationem extractā, cum modico saccharo, præsertim si portulacæ aquā admiscueris. Eundem et vsum præstat lac quatuor seminum frigidorū maiorum, succus & decoctū cucurbitæ cū mucilaginibus psyllij, & seminis citoniorum. Conferunt non minus aquæ dulcis tepērata balnea, q̄ vel calorem compescant, vel sudorem huic affectioni vtilē alliciant in feminis verō nullum vtilius, neq; tutius reperies p̄sidium, q̄ frequentioribus crurum lauacris menses euocare, aut eorum defectu, ex venis tali copiosum sanguinē fundere. Sic profectō in vtroq; sexu incredibili quadā efficacia prodest, sanguinem phirudines ex hemorrhoidibus extrahere: nā, cum huiusmodi venæ cum venis dorsi, & meseraicis quodammodo cōes existant, dorsalis hæc affectio mira quadam celeritate subsidet, & quiescit extracto per hemorrhoides sanguine. Quod si iecur compati videatur, non minoris est momēti saluatellam dextræ manus scindere: & his omnibus factis, dorsum rosaceo vnguento, de cucurbitis, vel refrigeranti Gal. inungere.

Verū si ex sola distēperie, citra euidentē humorum augmentum affectus suboritur, eā omnino admittit curandi rationem, q̄ esse proficiam feminis ex humorū vstione melancholicis, dictū est. In quo sanē opere (pter victus institutionē, q̄ attemperet, & optimæ sit substantiæ) nulla prorsus, aut q̄ leuissima vacuatione vtendū est, nisi vel menses supprimantur, vel improspere p̄deat: quo tepore tali venas tundere oportebit, sin aliter, minimē, vel tantū dextræ manus saluatellam in scindere refrigerationis viscerū gratia. Fugiendum tñ omnino est in purgationibus ab electorijs, & validioribus pharmacis: quippe aut purgandū non est, aut q̄ leuissimis, qualia paulō superius adduximus: nā ea, q̄ calida, arida, vel acria sunt, mihi non est dubiū, quin graue damnum sint allatura, vt de rhabarbari infuso, diuturno experimento cōprobatum habeo, q̄ eo exhibito, vehementiores & maiores arteriæ subsultus cōpareant, & nihil fœmina excernat, & siticulosa, ac mille querelis plena euadat. Quamobrem in huiusmodi causa fugiendū esse ab eius vfu omnino arbitror, solūq; blandis agendū: vel si nihil excrementitium superesse cōperiamus, cibis optimi nutrimenti, & medicamentis teperationibus feruorē humorum, ac viscerum mitescere oportebit. Vnum tñ in hac curatione præcauere oportet, ne vel nimijs exercitijs corpus plurimum incalascet, vel in furorē fœmina agatur, aut cruditatibus scatenis in hypo-

hemorroidi
des in uenis
dorsi, et
mesaraicis,
quodammodo
comunes exi
stunt.

A hypocondriacam melancholiām perquam faciliē degeneret: tandē utiliū semper esse duxi, paucis, & probo uitæ instituto formā moderari, quā grandi medicamentorū turba exhibita, non solum non prodesse, uerum in grauiorēs, & in immedicabiles affectus corpus deferre.

Si autem ex uisceris alicuius obstructione (quod tertiam causam & speciem huius affectus cōplet) id malū suboriat, hoc unum in curatione pōculis habeto, nimirum. nullum auxiliij genus quicquā usquam pōtare, ni obstructionem prius curaueris: nā si obstructio illi potissimā causam præstat, certū est, veram curandi rationem à causæ ablatione principinm nancisci. Sic mille auxilijs à medicorum plurimis, tentatis, nullum leuamen formæ persenscunt, nisi obstructione curata: quo sanē opere subsultus delitescit, vel parum, aut nihil sensu percipitur. Quamobrē primò cuius nam visceris obstructio sit, expendes, cui opē attuleris, si eis prorsus auxilijs, q̄ c. præcedente adduximus, vsus fueris: qui bus aliquid attemperans admiscere cōueniet, ne arteriæ calor de obstruentium medicamentorum vi, & efficacia in maiorem intensiōem agatur. Ac sublata obstructione (cuius hac in parte iterum meminisse non est æquū omnino subsultum, si fortē remanserit, curabis, eadem prorsus methodo, & eisdem medicamentis, quæ reliquis duabus causis proficua esse, superius diximus.

De varijs ventriculi accidentibus ex utero.

Cap. 8.

DVM eò miseriæ fœmina deuenerit, sanguis menstruus, aut semē, vel utrunq; corrūpatur, non solum q̄ hucusq; diximus mala ipsi succrescere assolent, verū & multò plura, ac non minus grauiā. Nā cū (vt dictū est) uterus p̄cipuis corporis particulis confortium nō leue, aut cōtēndum obtineat, & ob id in cōsensum quoq; ferē oēs partes trahat, p̄sertim si aliquid ab eo in ipsas transfinitatur, sit p̄fectò, vt ventriculū ēt mille modis lædat, partim appetitū omnino ipsum priuādō, partim eum imminuendo, partim quidē ipsum cogendo ad ciborum abominatiōē, Quippe aliud est, non appetere, aliud diminutē appetere, & aliud quidē cibos abominari, & odio habere: aliqñ etenim præter inappetentiam horret animus viso alimento. Præter quæ vitia, aliud non leue virginibus ferē oībus, & reliquarum non paucis excitare uterus assolet, nimirum, deprauatarū rerum appetentiam. Vtq; tñ sit, harum affectionum naturā ad eā ventriculi partē, & facultatem pertinere censemus, cui appetendi munus incumbit: quò fit, vt os ventriculi affici necessum sit, idq; quatenus facultate appetendi fruitur. Verūm sicut diuersa huic parti insunt symptomata, ita quoq; diuersas in ea facultates pati credendum est: nam inappetentia, aut diminuta appetentia ad animalem facultatem referri debent: at verò hoc, vel illud appetere, vel odio habere, proculdubio ad facultatem naturalem appetitiuam. Nam cū similitudine sit naturalis appetitus ad indiuidui cōseruationem, & id sit cuiq; naturale, & insitū, ita quoq; eidem potentiæ pertinere deprauatē appetere existimandum est. Sūt quidem harum potentiarum vitia hæc, in genere noxæ earundem deprauarū

P aut

aut ex toto abolitarum, vel diminutè operantium. Proficiscitur tamè hoc symptomatum genus ex oris ventriculi intemperamento solo, vel cum affluxu rei alicuius præter naturam, ab vtero in ipsum ascendentis.

Præter dicta accidentia, ex ventriculo ipso ab eadem causa læso, alia non minoris momenti succrescere conspiciamus, cuius naturæ esse creditur vomitus, & singultus, quos mille modis fieri, & incredibili varietate mutari, euidenter constat: sicut symptomata esse secernentis ventriculi facultatis. Item mirabitur forsàn quispiam, si dolorum ipsius ventriculi varietatem, & vehementiâ diligenter intueatur: nam ab eisdem causis non rarò, vel dolore os eius premitur aliquando acri, & vehementi, ut in syncopem fœminam deferat, aliquando verò, adeo tristi, & molesto citra magnam vehementiam, ut mœstas & omni tædio affectas ipsas reddat, maximè eas, quæ meserei inflammatione, vel obstructione laborant: sic profectò, incredibili varietate ludentes solent perpeti dolores, ut scribi sit difficile. Verùm cum ferè omnium eadem sit curandi ratio, cum causa, & causæ principium sint idem: ob id hæc dixisse sit satis.

Causa. Vnam cōmunemq; causam hos omnes affectus nancisci cōpertū mihi est: nā halitus ille ex putrido semine, aut sanguine ascendēs, ptingens os vētriculi, appetentiæ vitia progignit, veniens verò ad ventriculi cauum, nausēā, vomitū, ac singultum proculdubio molitur. Verùm cū halitus vnus sit, addubitabit quidē aliquis, quanā ratione in vno eodemq; membro tot excitet accidentiū varietates. In qua quidē re ego existimo dum halitus in ventriculi cauitate inundat, vomitus necessario concitari, q̄ natura halitu irritata alimentū oē superueniens trudit. At dū huiusmodi halitus ventriculi tunicis fixi adhærent, necesse subinde est, fœminā perpetuò nausēabundā existere: affligitur enim tunc ventriculus & assiduo irritamento, nititur pellere, quod sibi approximari molestū p̄sentit. Sed si prædicti halitus substantiā ipsius ventriculi permeent, & in eius penitiora sese inferāt, singultum necessariū fieri cōperies: quippe ex maiori molestia, q̄ halitus inferunt, maiores cogitur natura conatus apponere, ita ut ventriculū conuellat concutiatq; spe excernendi nocuum. Cæterū si halitus ijdē eò malitiæ tendant, ut humores ventris, aut alimenta vitient, hæc eadem accidētia, sed longè grauiora, & alijs non minoribus admixta facilè cernes. Mouet quoq; idē halitus inappetentiam, ciborum abominationē, & deprauatorum appetitū, verùm diuersa ratione: nam dum halitus, qui ascendit, præterquā q̄ os ventriculi attingit, putridæ quoq; pinguis, & calidæ, sed multū humidæ naturæ existit, cibi abominationem efficere cōpos est: talia etenim sunt suapte natura idonea tedium, & subuersionē efficere, ut de pinguis, & crassis cibarijs cōpertū est. Quod et accidens in potu iam reperimus in illustri quadam fœmina, q̄ potum auersabatur: sicut in alia nullo modo posse potū admittere, quod protinus vomitu, & mille alijs accidentibus excādesceret, instar hydrophobici affectus, (licet hæc potum summopere ex postulasset) ita ut sexaginta diebus sine potu degerit. Verùm dum halitus ascendens, calidus nimis fuerit, sitibundā efficiet fœminam, plurimum tamen fastiditam: deijcit enim nimia, & putredinosa caliditas actum appetitiuæ potentiæ, licet bibendi cupiditatem adaugeat. Quod si aliquam

A aliquam aliā qualitatem deterrime conditionis præ se tulerit halitus, eiusdē nā appetitū suscitari necessum erit: sic proculdubio ex ustus, halitus, carbone, sicillimus, terram, frigidus & siccus, gypsum appetere cogit, & pari ratione alia fœda & deterrima modò cibaria sint, modò secus, quæ mira varietate fœminas sic affectas appetere scimus. Cuius rei multiplicitem siue cibi, siue potus sit, ad uariam & multigenam halitus conditionem reducendā esse arbitror: quibus accedit vitioforum succorum copia, quæ aut præfuit in corpore, aut occasione horum halituum in dies magis ac magis in corpore accrescit. Ex qua sanè consideratione prodit cā durationis horum affectuum, nā mirum profectò est, cur tandiu durent, cum totam eorum cām in halitus reiectam scripserimus: sed cā sunt humores prauī ventriculo adhærētes, qui vitium & putredinosam naturam ab halitibus ocysimè mutantur, ac diu adseruant, & malum subinde adaugent & tuentur. Sic dum præ nimia copia ventriculus aut aliqua eius pars distenditur, mirum non est, si dolore prematur, sicut dum acrimonia aut mordacitate eius aut alicuius prauī succi mordetur dissoluiturq;

B Huius affectionis signa exquirere superuacuum duxi, si quidem satis unumquodque se ipsum manifestat: sed in hac re scire tantum conuenit, nauseam, vomitum & singultum, ipsum ventriculum affectum esse monstrare: at appetitus uitia syncopem cardiacam, frequentem anxietatem, ac dolorem ventriculi os pati. Habet insuper hoc peculiare deprauatarum rerum appetitus, quod arguit intraneam, imbibitam & ferè habitualement halitus intemperiem & naturam in ore uentriculi: quod æmuletur conditionem naturalis temperamenti, & substantiæ partium, quæ sibi simile insita virtute appetunt. Si tamen fœmina huiusmodi accidentia perpeffa, nihil omnino inedia uel siti contabescat, vel imminuatur, scito, vniuersum corporis habitum humiditate nimia scatere, ac veluti connaturalem habere non leuem humorum crassorum copiam: quos proculdubio scimus diu citra cibum innoxie plures fœminas adseruasse: quod diligens medicus attento animo expendat, quippe ad præfagationem & curationem proficuum, summo opere erit. Humores enim hi diutissimè perferre possunt vim & actionem caloris, antequam in consumptionem carnis vel alterius vilis substantiæ calor ipse alimenti defectum irruat: quo fit, vt diu citra euidentem consumptionem fœminæ sic affectæ absque alimento viuant, dolorem uerò esse ex flatu vel humore, docet tensio, si flatus adsit, aut oris sapor vel uomitus, si humor, & qualis sit ostendit ipse qui vomendo excernitur.

Solent prædicta accidētia tam difficulter curari, vt nullis videantur auxilijs (quantumuis rōni consona sint) cedere: quapp Medici consilio destituti, omnino ab eorum curatione desistunt. Cuius difficultatis vniuersam rōnem pertinere cenfeo ad vteri uitia, q̄ cum præsidijs ventriculo adhibitis auferri nequeant, frustra medicus curationem aggredi tentat. Erit igitur in hoc affectu duplex curandi rō: altera, quæ vtero, membro nimirum primò affecto prouideat, altera vero, quæ uentriculo. Sed expendat lector in hac curatione, sepe uitium ab vtero mutuatum, fieri in ipso ventriculo per essentiam ex diuturno consensu, cui eo tpe omnis cura adhibenda est, antè quā vtero auxiliares præstemus manus. Ad primam igitur curandi rationem perueniendo, sanguini menstruo improbè ex

P 2 purga-

Signa

Cura
ratio.

purgato, primò prouidebis, sanguine quidem misso, plerunque tñ ex talo, modò menstruationis sit tēpus, modò secus: nā utcunque sit, studendum est uteri, plenitudinem deponere, & naturā ad partes consuetas euocare. Nec uerendum est, ventriculo fastidiente uel nauseabundo sanguinem demere: cām enim imprimis illidere oportet, ac de inceptis membris imbecillibus. prouidere. Sanguine itaq; p viribus & suppressionis mensium rōne euocato, insurgit protinus altera curandi rō, quæ status ventriculum ascendentes discutiat: rursus altera, quæ vētriculum euacuet, & post euacuationem firmet ac roboret. Nā, ut dictum est, vniuersa diuturnitatis huius affectus ratio, in superuacuis humoribus vētriculo in hærentibus consistit. Sic mox à sanguinis detractione leui pharmaco vētriculū purgabis, veluti māna, casia cū pulueribus diarrhodonis, vel modico agarico: syrupo itē rosarū solutiuo, pillulis mastichinis vel de hiera. Deinceps tñ adhibitis q̄ humores crassos inscindunt, & acres retundunt (quorum abundē meminimus cap. de epilepsia) deuenies protinus ad paulatinā purgationē, factam quidē pillulis de agarico, de aloē, aut ipsa aloē lota, de hiera simplici, de mastiche, vel cōpositis ex rhabarbaro, mastiche, agarico, & aloē pari mēsurā: ut si qd in vētre adhuc inhæserit, paulatim expurget: quò facilius quæ status discutit, locū obtineant. **Q**ua in re in primis vētrē inunges oleo nardino, de absinthio, de cinnamomo, de mentha, vel de naphtha, aut de abiete, vel balsamo, additis pulueribus diarrhodonis, absinthij, menthæ, cinnamomi, corticū citri, ligni aloēs, & seminis angelicæ, cū modico diamoscho, & diambra. Ex q̄bus facilē tibi erit, varia cōficere p̄sidia, q̄ ori ventriculi aut dorso apposita, maximi sint momēti. Prestat idem beneficiū frigidioribus fēminis decoctū radicis angelicæ cum saccharo summo mane ingestū: itē dilutum absinthij cum aromatico rosaceo, vel diarrhodone in tabellis cōfecto, sic cinnamomi stillatitia aqua, vel floris eius, maxime efficacit̄ esse credit̄. Ex vsu quoq; est pulueris agnicasti & cinnamomi, corticum citri, anisi, & cumini momentū ante cibū accipere. Sed efficacius reperies intus & extra adhibitū oleū cinnamomi, anisi, gariofillorū, & macis, aut piperis, q̄ sane arte chimica extracta nō parum prodesse scio. Clysteribus frequentioribus in hoc affectu utendū esse consulit rei rō: p̄sertim ijs, qui aliqd expurgēt, & status ab utero & vicinis partibus discutiant: qualia abundē superius reuulimus. Sed p̄stabit in hoc affectu bis semelue in hebdomada vomere, quod experimento didicimus utilissimū fore, à quo auxilio porrigenda sunt, q̄ reliquias conterere valeant, velut est theriaca, mithridatū, bolus magnitudine fabæ ex terbinthina cum modico rhabarbaro: itē radix angelicæ saccharo condita. Victū item oībus ministrabis optimi succi, & tenuioris substantiæ, potum verò ex aqua cinnamomi vel anisi, cum corticibus citri aut radice chinæ, quod magis probo: nec displicebit in his quæ frequenter animo deficiūt, aut facile resoluuntur, modico vī vino, uel saltem mica panis eo madida ante prandium, quo vires facilē reficiantur, & calor vegetior concitetur in ventre.

Verū, quia adhuc his oībus factis, affectio subsistere nequit, ex medicis nō pauci à curatione omnino desistūt ignorātes p̄cipuā curandī rōnem (ijs, q̄ diximus, p̄missis) consistere in ea uterī prouidentia, quæ status distrahat, discutiat, aut sursum ascendere prohibeat: interim tamen sanguine misso ex talo, quò humoris corrupti minor copia p̄stat. Quapropter crura, ventrem, & vniucr-

A & vniuersum corpus p̄fricare imperabis, & fœminam summo manẽ lento gradu exerceri, ac ventrem post exercitium inungere oleo anethino, liliorum alborum, chamæmeli, de croco, de baccis lauri, & in quo ferbuerint radices lilij vel angelicæ, vel semen agnicasti conuassatum, præsertim si eis admiscuetis instillationem ex theriaca, quam cap. de vteri suffocatione adduximus. Vtilissimum proculdubio existit tertio vel quarto die cucurbitam vmbilico adhibere, ac postmodum partem illam aliquo ex prædictis oleis cum theriaca & pulueribus feminis vel radice angelicæ inungere, ac deinceps emplastrum promatrice eidem parti apponere. Tandem ea, quæ semen corruptum extrahunt vel discutunt, vteri osculo adhibenda sunt eo ordine, quem diximus cap. de vteri suffocatione.

B Quodd si vitium magis in ore ventriculi præstiterit, frequentioribus pillulis ex hiera & mastiche, vel aloe vtendum est. velut si in fundo vigeat magis, vomitibus frequentioribus, hoc vno in omnibus semper adseruato, ne diu in euacuationibus persistamus: sed, vt Hipp. consulit, permittendum est, naturam aliquando oriri, ac liberam esse à medicamentorum vicinia, quæ non parum ipsam labefactant. Quippe hac ratione aliquantulum ab ipsis pharmacis leuata, ipsa sua sponte deinceps citra aliquod auxilium, maius præstat beneficium: in longissimis enim affectionibus vtendum est præsidii hac lege.

Verum si ex diutina halituum ab vtero ad ventriculum transmissione, ipse factus fuerit imbecillus, aded vt excrementa deinceps sibi generet eo vitio affecta, quo etiam si transmissio halituum cesset, affectionem insigniter non cessare conspiciamus, vniuersam curandi rationem ventriculo esse adhibendam euidenter constat. Quocirca eo tempore à ventriculi prouidentia eo modo, quem superius diximus, auspicanda est omnis curatio. Tamen si adhuc persistit halituum transmissio, & vitium vteri inueteratum fuerit, fontanellâ aperire in altero aut ambobus cunibus, vltimum præstantissimum & non raro experimento comprobatum existit auxilium. Prodest & doloribus quoque haustum aquæ feruentissimæ summo mane accipere vel vini odoriferi aut decocti, feminis angelicæ, quæ omnia facies purgato ventre, aut vomitu præmissio.

C *De varijs & grauissimis totius corporis & capitis doloribus ex vtero. Cap. 9.*



SORQVET non minùs fœminarum plerasque grauis & intolerabilis capitis, lumborum, & totius corporis dolor: quod quidem & imbecilles & inhabiles ad peculiaria munia existunt, & mœrentes ab omni instituto desistunt & oriantur nequeunt quicquam efficere. Sed in hoc etiam non parua reperitur differentia, licet symptomatis ratio & natura vna sit: nam multis caput cum maxima grauitate dolet, alijs cum tensione, nonnullis tamen cum acuto sensu, ita vt discindi aut perforari caput referant: in multis porro oculi adeo damnum persentiunt, vt vel proflire à caularia, uel disrumpi uideantur: plerisque tamen altera capitis pars afficitur, alijs totum caput. Sic quoque in crurium, lumborum & totius corporis doloribus contingit: pleræque enim totum corpus grauari persentiunt, aliæ exulcerari: nonnullæ disrum-

pi, & rursus non pauca referunt ipsa ossa frangi, sicut & alia lassitudine inuincibili premi. Alias autem non paucas reperies, quibus aliquod membrum peculiare affici dolore contingit, ut vel inflammatione, vel grandi humorum defluxu tentari videantur: multis hypocondria & totus venter adeo grauiter & frequenter dolent, ut curuæ incedant, vel distendi citra maximum dolorem non possint. Quæ omnia in tantum solent feminas affligere, ut absque peculiari aliquo auxilio diu persistere nequeant. Atqui cum harum omnium passionum ratio in dolore consistat (qui vel ex distemperie sola, aut cum affluxu materiae, vel ex soluta unitate proficisci habet) consulto, cui morborum generi speciatim referre mereatur, subiiceo.

Licet ex uno uteri consensu hæc omnia accidentia proficisci certum sit, diuersa tamen ratione ab iis, quæ superius retulimus, sunt. Nam vel halitus ascendens putridus ab utero, causam præstat huic malo, ubi per venas ad musculosas nervosas, membranaceas, ac sentientes corporis particulas deuenit: vel ex redundante vitioso sanguine ipsius uteri, ac regurgitante ad singulas vel plures, aut præcipuas corporis venas: quarum ratione facta in musculis ac membranosis & nervosis partibus læsione cruciatus maximos excitari est necessum. Itaque ex utero duplex insurgit causa: altera quidē, halitiosa: altera verò regurgitans ab utero vitiosus humor: utraq; tamen ex una cōi causa proficiscens, nimirum ex improba sanguinis menstrui vel seminis expurgatione. Caterum dolorum diuersitas ex natura seu conditione halitus vel humoris, sentientes partes peruadētis, proficiscitur, ita ut copiosus humor grauitatē, acris & mordax, vlceris sensum, flatulenta substantia tensionē in parte dolente efficere nata sint. Sic pars dolens membranosa, tensiuo dolori obnoxior existit, sicut quauis partium suarum sortitur doloris differentiā, ut abunde dictum est lib. nō de præsid. indica. in methodo vniuersali. Sed accidunt omnino frequentius hi dolores in cap. potissimum in parte eius arteriosa: quæ hæc facilius dilatazione & compressionē hos, halitus trahere & suscipere nata sit. Quod fit, ut maiori ex parte capitis dolores pulsatorii sint, quod expedisse ad curationē maximi semper fuit momenti. Cōtingūt insuper in parte eius postica obuenas & arterias quæ iuxta dorsum eā partē adēūt, ut alibi latius diximus, & Hip. visum est, lib. 7. pop. tex. 64. dicti dolores capitis ex utero castoreū sedat, & per totā sententiā, mira profert. Idē fatetur, lib. 5. popu. in historia mulieris, cui caput nihil proficientibus auxiliis dolebat, quæ solū subductiuis bene olētibus, utero appositis iuuabatur. Quib. accedit alia causa nimirum immodicus lixiuia, fortioris usus, vel alterius rei quæ vehementius pilorum nigritiē frenet, ad hesus. Quæ sanē occasione immedicabiliter haud paucas salutē perdidisse vidimus. Succedit his causis tertia prædictis grauior, quæ ex habituali cerebri, vel alius cuius membri principalis in caput mittentis, imbecillitate ab humiditate, nimia proficiscēte originē trahit, ex qua sanē dispositione reumaticos à Galeno appellatos affectus fieri proculdubio arbitror, ut ex eius verbis aperte colligit, lib. de sanguinis, mi. c. 7. & 1. phar. ge. c. 6. cuius et mali Hipp. meminisse constat, & li. de gland. & de locis in hoīe, licet verbis oscuris. Itaque constat his tribus modis feminas, capite & toto corpore adeo pertinaciter & moleste dolore, ut vix ferri id malū aut curari possit. Quippe ex quauis harum causarum si adeo persistit, ut habitum parti inducat, mirum non est si reumaticus prodeat affectus, quæ adeo

egre

A egre curabilem existimat Gal. ut mirum non sit, si nos arbitremur, morbum gallicū de huius reumatici affectus forte depromptum fuisse. Prodit itaque ex hac triplici causa, triplex quoque in cerebro vel dolente parte affectio, quarum una sicca, adeo fixa, & habitualis, ex lixiuio ac suffumigijs, ut nullis præfidijs cedere visa sit: quin eisdem non raro exacerbatur, & crescit. Secunda humida, & habitualis quoque; adeo pertinax, & grauis, ut quam simillima morbo gallico existat, mille fluxionibus plena. Tertia verò eius naturæ & temperamenti facti vel fientis, qualis fuerit halitus qui ab utero in caput effertur: quem adeo variū arbitramur esse, ut scribi ac designari minime possit. Quæ sanè oīa expendisse oportebit ad rectam medendi rationē aucupandam. Denique licet hic halituū, aut humorum corruptorum comineatus ab utero in reliquas partes (ubi alios affectus quoque fieri dictum est) causa existat: differt tñ hæc affectio a reliquis, quia in hac, peculiari quadam conditione, halitus seu humor venas ipsas subingreditur, & partem, in quam vena illa inferitur, prædictis doloribus afficit: etiam si aliquando contingat in partes corporis cauas, hos halitus sese insinua-

B re, subindeque maximos & grauissimos dolores concitare velut in ventriculo, intestinis, utero ac vesica frequenter contingit: sed longè quidem frequentius in vena magna, quæ iuxta dorsum sita est, cuius occasione, dum nimia plenitudine turget, siue ex flatu, siue ex humore sit, cenſeo proculdubio maiorem prædictorū dolorum partem proficisci, cuius et ediscere prouidentiam conuenit.

Sunt quidē hi affectus talis naturæ, quod sua sponte sese facili ostendunt. Sic enim omnibus simul hoc est cōe, ut menses ex toto auferri, vel sensibilibus imminui, aut aliter vitari, & subinde infimam ventris regionē nō leui murmurio habeant affici: quod ostēdunt grauiora accidentia, quæ mēſibus inst itibus, fluxibus, vel nuper egressis succrescūt: præsertim si imminuta fuit facta purgatio. Qd̄ facili innotescet ex dolore uteri, lūborū grauitate, ac deniq; ex alijs signis, quæ antehabitis cap. retulimus: quæ sanè oīa attestantur, uterū esse illorū malorū potissimā causam. Flatū tamē, aut vitiosum copiosumvè, sanguinē esse eò cognoscēs, q̄ flatu citra grauitatē, cū tensione tamē, dolorē efficit: at humor cū grauitate, erosione & acrimonia dolores inducit. Qd̄ si humor terrestris crassiusve, aut melancholicus extiterit, veluti cōfringi dolore corpus & ossa videtur: (quibus haud difficulter causam distingues in hoc malo; si diligenti cōsideratione q̄ diximus, expenderis: nā habitum iā cōtraxisse & factum fuisse reumaticum affectum cōperies) tum ex diuturnitate, tum verò quia præmissa adhuc cōueniēti curatione facillimè reuertitur affectio, aut ipsi minime cedit. Itē siccū fuisse habitū, ex vnitāte, accidētū præstantia atque fixatione: humidum ex diuersitate partū q̄ afficiūtur, & mille fluxionū generibus præmūtur, vel ex mōstruosa halitus natura proficiscente, ob varietatē accidētū & dolorū, quorū neutrū alteri respōdet. Tā frequenter hæc vitia virginibus ac reliquis omnibus accidere cōspicimus, ut necesse sit præstō illis esse auxilijs, si velimus eas à frequentissimis doloribus, & nos ab importunissimis querimonijs eruere. Quamobrē primò

Incuratione expēdere oportet, sint ne humores an flatu, q̄ affectū cōcitāt: qd̄ ex doloris persistētia, aut subita mutatione facili interstingues. Quippe dum flatu mali causa ē, vniuersā eius curā di rōnē, utero p̄stabis, frictionibus toti corpori adhibitis, & præcipuē parti dolēti, inunctionibus et vnguentis, & alijs p̄fidijs,

Signa.

Cura. talis.

que flatus discutiendi vim obtineant, quales nunc sunt ex balsamo, ex oleo sacro, A
 cinnamomi, de spico, de rore marino, conferunt theriacem inunctiones, vel emplastrum aliquod confectum ex gummi thecamacha vel carana, thure & myrrha cum modico succo angelicæ, sic & potus ex decocto herbarum calidarum & quas carminativas appellant, & suffumigia & alia eius naturæ. Itæ est regione venarum uel arteriarum, quæ magis dolet, summopere confert appositum cerotum ex caranna & aliquo ex prædictis oleis confectum: quod temporibus adhibitum scimus non parui esse momenti, nisi malum ita parte dolente inueteratum fuerit, ut ex habitu pars ipsa etiam aliquid paruum generet, quod deinceps à quavis occasione in graues dolores commigret. Quo tempore præmissa uteri prouidentia (quam mox referam) paulatim particulam purgare & corroborare conueniet ijs, quæ cap. de purgatione particulari, & de corroborantibus auxilijs lib. de indic. & hoc etiam opere cap. de epilepsia diximus. Uterum itaque respicere oportet, in cuius curatione à sanguinis missione aspiciendum est, sed ut plurimum uenis tali incisio, extractoque sufficienter sanguine, verum in hac causa parcius quam in alia. Quo facto, utrum inungere conueniat ijs, quæ flatum discutiant, oleis, unguentis, fomentis, & emplastris pro matrice, cap. B
 de uteri suffocatione scriptis: quem quoque usum præstant cucurbitæ umbilico frequenter appositæ. In quo sanè affectu non minus pessarijs utaris, quam in alijs hucusque dictis. Sed in huius affectus curatione non minorem sanitatis partem reperies in clysterii usu: quos carminandi flatus ac purgandi uteri gratia, compones. In quibus itæ affectibus purgationes ex mercuriali plurimum prodesse constat: confert item crura abluere, ac in aquam calidam sæpe immergere pedes. Præ sunt itæ & balnea sulphurea uel ex dulci aqua calida. Ex aliquo ex usu est decocto ligni guaiaci, sparte parellæ uel radicis chine sudare. Sed utilius longè est, omni arte menses euocare, ut suo loco abunde diximus. At uerò flatus & à parte & ab utero facilius & tutius, quam quouis alio præsidio, moderato exercitio auferes. Quod si humorè ab utero ad caput, uel quauis aliam corporis particulam regurgitalle cognoueris (quod ex grauitate & signis plenitudinis in eadem parte uel in toto facile deprehendes) potissima curandi ratio erit, sanguinis detractio ex altero, aut utroque; brachio, uel scissa iecoris uena in dextra manu. Tempore tamen quo prorumpere menses solent, uel si prædierint, sed diminutè: iterum sanguinem fundes ex uenis tali. C
 Ceterum in hoc affectu retrahere deriuare & euacuare per infimas partes, necessum est, ante quidem quam plenitudo uteri in totum corpus commigret, nisi dolores in cruribus steterint, quo tempore raro & maxima cum præmeditatione, uel nunquam sanguinem ex talo fundes. Quo facto, humoris ideam ac naturam inspicias, ac si melancholici sanguinis abundantia caput uel corpus dolere compereris, nullum medicamentum eligens ita efficax adhibere poteris, quam hircines hemorrhoidibus affigere, quæ melancholicum sanguinem alliciant. Quippe inter omnes sanguinis detractiones, hoc habet proprium ea, quæ per hircines fit, ut more eligentis medicamenti humorem melancholicum seligat, simulque plenitudinem demat uenarum illarum situ & commoditate, atque natura sanguinis contenti. Quamobrem sanguine hac lege misso, si quod humoris melancholici supererit, paulatinis purgationibus minues, ut cap. de uirg. & vidu. me' anch. dictum est. Hoc tamen unum adseruabis in huius mali purgationibus, quod si in toto corpore dolores fuerint, plena omnino purgatione uteris: præsertim si humores biliosi ac tenues fuerint: paulatina

A paulatina verò & p interualla, si fixi ac pmanentes in aliquo loco steterint, donec vitiosam plenitudinē depositam fuisse constet: potissimum quidem, si humores crassi, viscosi & tenaces sint. Deinceps quidem introductam in partē dolentem distemperiem corriges, roborabisq; membrum ipsum: aded enim variæ & omnigenæ naturæ halitus esse solent, vt modò frigidam, modo verò calidam & humidam, & quq; siccam distemperiem in parte generent. Sic profectò iuxta cuiusq; conditionem calida, aut frigida adhibebis, sed profunt frequentius calida, quò fit, vt ea, quæ superius statibus discutientis idonea esse diximus, his quoque doloribus proficua esse comperiamus: velut sunt inunctiones, emplastra ex gummi thecamacha, & caranna, balsamo, ac oleis calidis, quæ retulimus. Profunt & leues frictiones, moderatum continuūq; exercitium, & tandem balnea ex sulphure, præsertim si in tumore pars dolore affecta attollatur. Verum, quia millies in hoc opere ea, quæ vtero mandati, & membro cuius ab eo recipienti, prodesse possunt, dicta sunt, eò quidem in hoc cap. silentio prætermittito: nam facillima sunt, si quis exactè legat, quæ hucusq; diximus. Verum si habituales distemperiem caput contraxisse comperias, eamq; siccam esse scias, expende nullis vacuationibus esse vtendum, sed omni arte caput humectabis, tam balneis quam foveis & aliis linimentis, quæ ex oleo seminum melonum & cucurbitarum fieri possunt, & ex mucilaginis, & aliis quæ hæcticis corporibus prodesse scimus, quæ ob id hac in parte subtriceo. Qd si reumatica facta sit affectio, mihi non est dubiū, quin velut morbus gallicus curari desideret, sudorificis & syrupis ex ligno guayaco confectis, & tandem aliis vacuationū generibus quæ huic vsui proficua fore scimus. At si eandē reumaticā affectionem nō ex in temperamento habitualiter humido, seu ex partis alicuius vel totius corporis imbecillitate, proficisci cōperiamus, ita vt vel pars susceptet præ impotentia, vel aliis trāsmittat quod crudū vel prauè alteratū cōficit, tunc proculdubio roborantibus potius agendū est, quā vllō vacantiū genere, si Gal. credimus. lib. de sang. missione, qui tñ parca sanguinis detractionē concedit, vel leuem purgationē: cū hoc tñ quia id qd indies aggregatur, credendū est futurū esse affectionū multarū causā, vacuatione aliqua paulatina & quæ diu facta prodesse possit ré agere oportet. Qd fit vt dum caput malum habitum contraxerit, ex vsu fit, fontanellam in brachiis aperire, sicut dū vterus per trāsmissionem in caput mandat, easdem cruribus affixere, præsentaneū & vltimū auxiliū existit. Si tamen dolor alicui parti fixus sit vel irradiationis modo caput infestet, experimento fidissimo compertum habeo, ferro candenti partem illam leui vlcere vrere, idq; maximè si pericraneum dolere nobis compertum sit, quippe hoc auxilio facillimè cedere constat, quod multis aliis non cessit.

De pruritu & furore vteri, ac de symptomate turpitudinis. Cap. 10.

INTER eos affectus, quos vterum pati scimus, quatenus pars simplex & similis est, primū obtinet locū distēperies, ea præsertim, quæ peculiarē quendam affectū sibi vēdicat ac efficit: eumq; quodammodo medium inter vteri affectus ipsi pertinētes, vt simplex pars est, & inter eos, qui eidē referūtur, vt membrū agit organicum. Talis proculdubio est vterinus furor cuius natura partū pertinet ad naturalem vteri appetitum ex vitato temperamento

ramento laesum, partim verò ad cerebrū ipsum, qđ vterus in cōfortiū quoq; alli-
cit. Est itaq; vterinus furor (vt ab ipso initio sumā, nā eo exposito reliquā ei pſi-
miles affectiones innotescunt facillē) immodicū & effrene coeundi desiderium
adēd validū & inextinguibile, vt in furorē, & deliramentū cōmigrare fœmina
videat ob excedentē nimis & insatiabilē appetitū. In quo affectu cōsiderare in
primis oportet, qualis morbus vigeat, qđ symptomata insint, & à qbus prodeant
causis. Morbū itaq; Aetius calidā vteri distēperie iure optimo cēset, qđ ego existi-
mo nō quāleūq; esse, sed excedentē, & ferē habitualē, & cū hoc malignā, qđ
ex verbis eiusdē auctoris facillē ē colliges. Quā quidē distēperie in ea parte re-
sidere est cōiectandū, in qua maximē appetitus viget, instar priapismi in viris.
Nā licet tota vteri substantia naturalē habeat attrahendi semen appetitū, testes
tū ipsius, & partes sibi p̄ximas, ac deniq; vniuersum vteri collū, & potissime ei⁹
osculū appetitu coeūdi pollere, ac eo delectari certū est: quas partes calore ma-
ximo vigere in hoc affectu subinde oportet. Ex quo sanē intēperamento p̄di-
ctis partibus radicato, prodit immoderantia appetitus, veluti in ore ventriculi
ex calore sitis, & ex frigore fames p̄ficisci fert. Cū enim naturalis appetitus in-
surgat mediante calore moderato, ita quoq; crescit idē appetitus ad pensum ca-
loris adaucti, sed nō cuiuscunq; nisi eius tantū, qđ p̄ter id, qđ naturā modū exce-
dat, cōnaturalis ē factus sit, & more naturalis appetitū quoq; efficiat. Quippe
vti fames canina, aut sitis insatiabilis sūt in ore ventriculi; ita & in partibus vte-
ri ob p̄dictā causam coeundi desiderii implacabile insurgit, qđ nullo coitu seda-
tur, neq; quiescit, iuuante hāc actionē certo quodā humiditatis modo simul cū
calore p̄dicto, vt à febrili calore dissidere constet. Cui ē adiūgit (vt integra sub-
sit huius affectus natura) restrictum cerebri potentiarum error, proficiscens qui-
dē ex halitibus ab exusto semine menstruo prodeuntibus, qui dum caput ascē-
dunt, furorem in mente concitant, & irrationalem hunc appetitum: quam-
obrem vterinum furorem huiusmodi affectum medici appellant.

Huic profectō quā simillimas nō paucas reperies in fœminis affectiones,
quarum ē antiqui auctores meminerunt. Inuenies quidem satyriasi p̄similem
affectum, quem in viris quoq; priapismum appellant: est etenim coeundi insa-
tiabile desiderium cū maximo pudendarū partiū tumore ac dolore. Verū in-
ter alias differentias, quibus satyriasi à priapismo differre scimus, ea potissima
est qđ in satyriasi colis non inuitus & flatulento spiritu, qđ eius arterias neruum-
que fistulosum abundē repleat sed ex lasciuia quadā libidinis tentigine irrita-
tur: quod in fœminis quam rarissimē accidit: atq; id ex falso, vt in viris etiam,
humore, vel acri affluente contrahitur. ob quem adēd magnū in genitali pruri-
tum doloremq; sentiunt vt manum locis naturalibus cōtinuō admoueant, & in-
genti veneris desiderio contabescant. Sed affectus hī ab vteri furore euidenter
dissident, qđ in hoc sola distēperies appetitū excitet cū leui acrium humorum
affluxu: at in satyriasi & priapismo, ex plenitudine humorū ac flatuum adeo tu-
ment partes, vt tentiginē & conuulsionē pati videantur: licet satyriasis ex appe-
titi, priapismus verò ex vitio arteriāe potius & cauitatū, principiū sortiatur. Ex
quo sequitur, cruciari fœminas sic affectas pruritu ac doloribus maximis, ēt si
quodammodo delectari videantur, veluti in furore contingit. Areteus tū cen-
set, veram satyriasi fœminas non obtinere, qđ ego etiam verum esse arbitror,
sed

A sed illi aliqd p simile eis accidere, vt cū p dicta partes adeo turgent, crescunt, & rigent, q extra pminere videant. Quē proculdubio affectū cenſeo ab antiquioribus nymphotomiā appellari: affectionē quidē, virorū ſatyriaſi p ſimilem, licet nymphotomia nō ſit affectus nomē re vera, ſed curationis affectus manuali in-
 cisionē facte: cū hoc tñ Moſchio Græcus hoc nomen p affectū vſurpat, forſan, vt ſeparet affectū à nymphā, q partis affecta nomenclatura eſt. Nī vt ſatyriaſis à Satyris, quos poete fingunt, appellata eſt: ita prorſus & nymphotomiā in fœ-
 minis à nymphis dictā exiſtimo. Apud anatomicos. n. nymphæ appellantur par-
 tes qdam carnoſæ, q gallorū criſtis p ſimiles exiſtentes, ppe os vteri in eius cer-
 uice aſtant: quas poete referebant p ſaltus & nemora ſatyros quærere. In qbus
 proculdubio venereorum delicias cōſtare, ac turgere magis aſſerunt: licet Gal.
 li. 5. de vſu part. p dictā nymphā ad os vteri tutandum fabrefactā à natura dixe-
 rit. Cū hoc tñ vtrunq; vſum obtinere ſcimus. Quas partes dum eo crescunt, q
 prominere, & extra pelli videant, huiusmodi nymphotomiā efficiere exiſtimo:
 q affectionē antiqui parte pminente reſciſſa, citra diſtinctionē curabāt, ſed ſal-
 lunē longē iudicio noſtro: nā caro illa nō creſcit ex addita carne ſemp, ſed ex
 humore; & ob id ſcindere alienū vī à curandi rōne, niſi cū vitium in magnitu-
 dine partis pter modū conſiſterit. Hunc affectū multi ſymptoma turpitudinis
 appellarunt: cuius ēt noīs aliā affectionē refert Arereus, q nymphem appellat,
 alterius quidē partis morbū, nā ſubſtantia qdam eſt muſculoſa, aut pelliculo-
 ſa; ſupra alarum pudendi cōmiſſurā ſita; quo loco vrinarius meatus exiſtit. Quā
 in quibuſdī fœminis refert ad tantā magnitudinē creſcere, vt deformitatem ac
 pudorē inducat: eamq; ēt ex contactu veſtium, & ex appetitu tantū erigi, vt
 ad venerē & coitū fœminas ſic affectas turgere maximē efficiat. Ob id quidem
 antequā creſcat, ſcindi iubet idē autor, & hanc eandē particulam arbitror, anti-
 quos reſcindendū fore, cenſuiſſe, & nō aliā nymphotomiam appellatam. Ego
 aut hanc affectionē eam eſſe cenſeo, in qua Medici fœminas in viros migrare
 exiſtimant: licet aliter id malum ēt (vt multi fabulantur) fieri poſſit. Quas profe-
 ctō affectiones potius ad vteri prolapſionē, quam ad aliud mali genus ego re-
 ducere, ēt ſi barba fœminis plerunq; adnaſcatur, ſummū alioqui caloris effer-
 ueſcentis, & intēſtiuz mēſiū ſuppreſſionis indicium. Inquit. n. Hipp. li. 6. po-
 pu. par. 6. In abderis Phaëthufa Pytheæ vxor priore quidē tēpore fœcūda erat,
 cū aut maritus ipſius in exilium abiſſet, menſes multo tēpore ſuppreſſi ſunt,
 poſtea dolores & rubores ad articulos obortū ſunt: hæc aut vbi cōtigiffent, &
 corpus virile factū eſt, & hyſſuta penitus euasiſt, & barbā produxit, & vox aspe-
 ra facta eſt. Refert ēt idē autor de Gorgipi vxore in thoſo, eundem ſucceſſum.
 Cuius rei non leuia reperiuntur apud antiquos & preſtatiſſimos viros testi-
 monia, q ob rōnem à me adductam conſultō prætered. Quid ſi quis contrariū cre-
 dere voluerit, non ueto: ſiquidem in annalibus Licinio, Craſſo, Caſſio, Lōgino,
 cōſulibus. Caſini puerum ex virgine ſub parētibus effectū, in deſertāq; haruſpi
 cum iuſſu in ſulā delatum, digniſſimos auctores lectiſſe cōpertum eſt. Atqui
 Lucinus, Mucianus, Argis viſum à ſe Ariſtontē, cui Areſtuſe nomē prius fuiſſet,
 nupſiſſe ēt, num mox, & barbā, & virilitatem ſuperueniſſe, vxoremq; fauſtē
 duxiſſe prodidit. Eiūſdē ſortis, & Smyrnæ puerum ſeſe nouiſſe refert. Quin ēt
 illud ſatis mirari nequeo, quod Plinius in Africa in marē cōmutatum, q pridie
 fœmella

Nymphotomia

fœmella fuerat, nuptiarū die Lucium, Cossitum, Trisditanum ciuem vidisse se **A** affirmat. Sed missa hæc facio; & ad institutum redeo. Põit itaq; nymphæa Arethæi turpitudinis quoq; symptoma appellari, sed differt profectò ab alia nymphæa, seu nymphotomia perperā appellata, loco & vehemētia symptomatis: vtraque tñ differt abvterino furore, quia in ipso solū tum ēt naturali mō genitalia nō prominent, neq; erecta crescunt, vt in prædictis duabus dictū est. Sed differt ēt vterinus furor à satyriasi, q̃ in hac partes internæ, vt q̃ ex humore turgeant, semper cū delectatione doleant, quia seminis flatus & humoris nō parua portio affluit, & nō expurgatur, & frictione ac scalptione maior decumbit vteri vtrō furore partes nō dolent, quod in ea nymphotomia, q̃ ex vbertate flatus, seminis & caloris prodit, solet cōtingere, ēt si promineant pudendæ partes: nā more erectionis naturalis, pudēdi virilis partes illæ extēduntur & prominēt. Quippe quibusdā fœminis frequentissimū est hoc symptoma, præsertim cū diu à viris abstinuerint, & ob aliquā occasionem hoc affectu tētantur: satyriasis enim si qñ accidit, semper fœminis præter naturā existit. Est & alia affectionis natura prædictis simillima, quā matricis feruorē antiqui appellarunt: qñ nimirum vniuersa vteri substantia & totū subinde corpus eisdem affectionibus premuntur, quibus pudendas partes in vteri feruore ac satyriasi affici diximus. Tunc enim cū dolore & lumborū grauitate, horripilatione, fastidio & vrinæ, aut excrementorū alui suppressione, fœmina turget ad coitum, quem summopere desiderat, sed ob dolores & accidentia pertimescit valde. Huic quoq; affectioni reduces pudēdi pruritū, licet ad sensum tactus potius reduci posse videatur: nā rarò absq; coeundi desiderio accidere existimamus: quapropter ad turpitudinis symptoma potius referendum esse cēsui. Est. n. pruritus vteri stimulus quidā scalpēdi seu confricandi partes pudendas, ex quo prodit, partē ad coeundi appetitū gliscere, q̃ ex prædicta perfrictione humores & calor ad partem magis euocentur, ac seminis receptacula & semē ipsum vehemētius moueantur. Quò fit, vt licet affectio ex pruritu incipiat, facile subinde & frequenter in prædictū symptoma degeneret, ita vt coeundi appetitus aded crescat, qd̃ satiari minimē possit, sed turgens & in verecunda turpiter se degat fœmina: q̃ proculdubio causā me compulit hoc accidens ad turpitudinis symptoma reducere: licet hoc turpitudinis symptoma ob aliā causā sic fuerit appellatū. Hēt quidem vteri pruritus tāquam peculiare causam, humores biliosos, acres, salios, nitrosos & adustos, qui ad vteri collū & partes pudendas confluentes prædictū calorē & pruritum excitant. **C**

Causa.

Affectiones verò, quas hoc cap. disputandas suscepimus, causas habent, quæ distemperie calidā natæ sunt excitare, eas potissimum, quæ calorem ferē factum ac naturali per similem efficere possunt. Diximus naturali persimile, quatenus ad stabilitatem pertinet, nō quidem quantum ad conditionem & qualitates, q̃ efficaciorē & acriorē esse necessum sit. Hūc sanē calorem efficit semen genitale in propriis locis copiosum, calidum vel corruptū existens: nam dū in aliā qualitatē mutatur, alia & longē diuersa parit accidentia. Verò furorem efficiat, lenis mordacitatis participes esse, opus est, vt acrimonia illa naturali simillima (licet adauctior sit) appetitū excitet ingētē & præter naturā, qualis causā existit. Præstat his causis principiū naturalis fœminarum temperies calida & humida, cæterū humiditate acri & biliosa, qualē nigrioris coloris virgines obtinere solent,

- A** lent, quas salaces & lasciuas esse comperimus: item iuuenilis aetas, vita otiosa loquelis & inspectionibus lasciuis plena: ciborum vitiosorum, eorum praesertim quod semen uberius gignunt, usus; & omnia denique, quae aut semen augent, calfaciunt, iritant vel putridum efficiunt. Prodit quoque ex semine sic affecto ad feminam appetitum causa: nam ut Aetius optime aduertit, per spinalem medullam & vasa ad cerebrum pertingentia, ab exusto semine aliquid ascendit, quod in furorē feminam agere, natum est. Sed cum vterinus is furor aliquando cum desipientia, aliquando citra ipsam, cum sola videlicet impudentia, aut cum pudore succrescat: ideo cuiusque causam considerare oportebit. Fieri etenim cum desipientia appetitum hunc effrenem ex putrido halitu à semine putrido elato, iam diximus: at fieri citra desipientiam, ex solo semine excalfacto contingit: ex quo pudice feminae id accedens etiam persentiscunt, sed proferre praeter pudorem non audent, quin potius praeter appetitum contabescunt semine excalfacto corpus exsiccate. Praedictum quidem appetitum crescere cum impudentia & audacia, quae femineum pudorem praesertim virginium excedat, arbitror fieri ex connaturali vteri ipsius & totius corporis calido intemperamento; ex quo ad tantam feritatem aguntur feminae, ut omnibus posthabeis, virum non solum appetere, verum sectari publice audeant.

Signa harum affectionum, nisi pudore famineo occultentur, manifesta admodum sunt: nam in omnibus alijs uteri affectibus feminae uel mutae, uel taciturnae uel mactae existunt: in his vero contra, garrulae, iracundae, inquietae, nihilque aliud imaginantes aut loquentes, quam de virorum consortio, de coitu & alijs rebus inhonestis & lasciuis, quibus perpetuo delectantur. Quod si pudore impeditur huiusmodi furorē cohibeant, gaudent tamen his rebus auditis, & alijs, quae inhoneste sunt, ac veluti sopitae pendunt ab ore narrantis, & licet ipsae nihil loquantur, cum hoc tamen gaudent, praesertim si impudicus & occultus tactus accedat, quem uel cum pudore admittunt, uel non fugiunt, turgentque eo tempore pudendae partes, & ex tactu delectatione maxima afficiuntur. Noscet tamen à putrido semine affectu proficisci, ex desipientia & inquietudine: ab eodem excalfacto, à gestu & vultu uiris grato & amico: ex connaturali temperamento, ab impudentia, & insolita audacia ad lasciuos actus, quos antea praeter pueritiam non gustauerat.

Constitues curandi rationem magna diligentia: nam praeter id, quod haec affectiones: inhoneste, indecetes ac turpes sunt, maiorum accidentium praeludium existunt & causa. Sic profecto, si cognoueris praedictis signis feminam calido semine abutere, uitae institutum omnino mutabis, uictu tenui, parco, pauci nutrimenti & frigido exhibito. Ieiunium enim & abstinentiam imperare necessum est, non solum a cibis & potu uini, verum & a loquelis & inspectionibus impudicis. Liberos item feminae cinges plumbea lamina, & potum aquae copiosiorē exhibe, idque paulatim facito: in mutationibus. n. subitis, quod sua sponte salubre foret, morbosum efficitur. Sic profecto plures cum se hoc uitio tetari persentiunt, ex inordinata & inconsiderata abstinentia in grauiora mala dilabuntur hoc symptomate minime curato. Quamobrem paulatim ac sensim natium habitum & intemperamentum mutare oportebit, ut citra sensibile damnum curationis finem consequaris. In qua sane re feminam decet, se ieiunijs & orationibus dare, solitudini, aut consortio sancto & honesto, a quo uirtutum ac temperantiae exemplum discat, & tandem omnibus

Signa.

Curandae ratio.

bus modis carnē macerare oportebit, sanguinē minuere & attemperare, ut tēpe
perato ac diminuto semine, affectio sua spōte quiescat. Viētū aut frigidum hac
in parte scribere tāquam notum & importunum nolui: nemo. n. tam insanā mē
tis est, qui corpus oībus modis inanire nesciat, & uiētū refrigeratē porrigere, ac
oēm verborum confortijq; luxum circūcidere. Quēd si uel ex uiētū uel labo
rioso partu, uel aliqua alia cā, quæ extrinsecus uel intrinsecus pudendarū par
tium ac totius corporis calorem augere nata sit, affectio hæc suboritur: verē
dum non est, omni arte corpus refrigerare. Primò quidem si biliosus redunda
uerit humor, syrupis ipsū præparabis & cholagogis pharmacis expurgabis.
Verū si citra humoris affluxum aut ubertatem distemperies sola uigeat, apoze
matis, clysteribus, balneis aquæ dulcis, fomētis ex eadē, & decocto herbarū fri
gidarum, pudendi calorē uel totius corporis mitigabis, sicut largioribus aquæ
potibus: item sanguine pauco per interualla ex talo uel dextra saluatella extra
cto. Id ē beneficium præstabis inunctionibus dorso adhibitis ex vnguēto rosa
ceo, ex refrigeratē Gal. ex vnguēto cucurbitarū superpositis folijs plantaginis,
violarū & salicis, ac reliquis, q̄ refrigerādī virtutē obtineant. Cauens ne ea ut
ro adhibeas, ne uel menstrua plus iusto supprimantur, uel in aliud malum ex
nimia frigiditate uterus decidat: satius enim est humores & totum corpus per
frigerare, ut inde sumpto principio uterus, pudendæ partes refrigerentur,
quā uero ipso frigidiore facto, fœminam in grauius malum deferre.

*Cuius
et copio
siorē ira
rationē
reperies
c. de uirg.
et sciv
rbo.*

At si ex corrupto semine appetitus is insatiabilis ac delirus insurgat, eo tpe, li
cēt fœmina desipiat, omnis diligētia, omnisq; cura utero adhibēda est. Primū
enim sanguinē minues ex brachijs, mox ex talo: nā si ita feceris, & habitū refri
gerabis, corpus minues, & si qd in uteri uasis corruptū immoratur, uena scissa
facilē educitur. Quo facto, feruor ocyssimē extinguitur, p̄sertim si uitæ institutū
accedat, pauci, frigidi & tenuioris nutrimentū: ieiuniū itē, solitudo, aer frigidus,
solum frigidum, quo decūbat, aqua frigida irroratum. Utatur quoq; fœmina
sic affecta lactucis, scariolis, cucurbitis, & alijs, q̄ sanguinē minuere & refrige
rare nata sunt. Inter quæ ad genituræ effluuia & aduersus ueneris ludibria in sō
nis & vigilia, semē lactucæ plurimū ualere scribunt multi: sicut de rosa hortēsi
rubra saccharo cōdita ē fertur: cui malo non minus portulaca mansa & come
sta remedio esse solet, sicut melonum frequentior usus. Quibus factis, corpus à
biliosis humoribus ac cremētis & à salia pituita bis aut semel purgabis, deinceps
tū dorsum & lumbos frigidis asperginibus & unguētis refrigerabis. Fo
menta item aquæ dulcis tepidæ primū, deinde frigidæ pudibūdīs partibus adhi
bebis: post hæc aut aquæ dulcis balneis uteris. Adhibet Actius utero, si ex semi
ne corrupto affectio pdeat, ceratū ex cardamono & nitro, tu uerò simul eis uti
tur, q̄ superius cap. de suffocatione diximus semini extrahēdo & imminuendo
esse proficua. Sic per os ea, q̄ semen minuant, ac refrigerent, adhibeto, donec af
fectionē quiescisse uideas: nam si ex semine corrupto uitū prodeat, haud aliter,
q̄ epilepsia ex utero prodiens, curationem desiderat. Quā itē rōne prodest mer
curialis lumbis & dorso applicita, aut lenticula palustris cum eadem mercuria
li pectini appositā: cerusa etiā cū aqua trita uel succus lenticulæ palustris, cucur
bitarū & eadē cerusa: pessus ex succo plantaginis & portulacæ, uel lamina plū
bea lumbis adhibita. Sed inter oīa auxilia primas tenet ad seminis excretionē
& attem-

A & attemperamentum balneum aquæ dulcis, aqua ad umbilicum vsq; pertingēte, perfricatis leuiter vteri partibus longè à pudendis, ut aquæ tepore pars attingeretur, & madore laxior fiat, decidatq; sua sponte seminale excrementum: cauendum tamen est, ne titillationem moueas, ac pruritum, id enim minimè licet, sed solum quantum aquæ tepor laxauerit, ita ut manus nil aliud præstet, q̃ leuem aquæ subingressum ad penitiores partes, quod tantum aqua operetur, quantum aliud auxilium ex ijs, quæ semen expurgant.

Pruritus verò ac turpitudinis affectio, curandi rationē à sanguinis detractio-
ne anspicant, nisi quid peculiare obstiterit: initium tamen sumes à basilica dextri lateris, mox ad tali uenas deuenies, tandem in processu temporis ex saluatella dextra sanguinem fundes. At sanguine missò humectantem, & refrigerantem uictum ac potum institues: præsertim si cibis addideris succum portulacæ, aut decoctum eius, & agnicasti. Postea insuper syrupis, & apozematibus uteris frigidis, quibus addes, quæ acrimoniam retundant, velut est hordei cremor, amyllum, mucilago psyllij, vel seminis citoniorū, maluarum, & althææ cum syrupo papaueris, & semine eius, & agnicasti, ac nenupharis, uel decocto eorum. Idem præstat syrupus uiolarum, uel de portulaca cum aqua lactis, aut hordei, uel succus foliorum salicis cū aqua portulacæ, & saccharo. Quibus præmissis, ad humorum purgationem accedes, quam facito rhabarbari infuso ex aqua lactis, uel portulacæ cum syrupo ex infusionibus rosarum, aut uiolarum, manna, & frequenti cassiæ fistulæ usu cum decocto hordei, vel aqua cichorij. Quo facto pro succi redundantis copia, & natura, partes pudendas aqua tepida frequenter abluere oportet, quod præsentaneum esse auxilium arbitror. Cōuenit quoq; balneis aquæ dulcis totum corpus committere, ac per interualla paulatim purgare. Præterea, dorsum unguentis rosaceo, uel refrigerante inungere proficuum est, sicut refrigerare lamina plúbea, & clysmatis refrigerantibus uti, cum femina dormitura est. Interim etiam, in uterum infundere oportet decoctum florum salicis, & lentium sine cortice cū trochiscis de camphora, uel colirio elbo Rasis, quod dissolues in lachryma uitis, uel eandem lachrymam solū infundes: est autem lachryma id, quod uitibus amputatis instillat. Prodest non minus decoctum foliorum oliuæ, & radicis lapati. Ablues quoque vterū, & pudendum lauacro, quod recipit lactis ʒ. iiii. aquæ marinæ ʒ. ij. mellis ʒ. j. confert, & lac ipsum, uel acaciæ succus, aut lentis, aut granati, uel foliorum uiolæ: item malum granatum aqua portulacæ decoctum, & cataplasmatibus forma impositū cum succo aristolochiæ, & decoctum ex omnibus his factum, quo pudendas partes abluere est opus. Quod si hoc minime profuisse constet, doloresq; & symptomata cessent, signum erit euidentis deformitatem illam ex carne crescentem fieri potius quàm ex affluente humore: quo tempore ad scissionem illius partis ueniendum erit, ut Actius optimè scripsit.



*Affectus
naturalis*

MORBO S quoq; in situ vterū pati, & mille modis à sua sede di-
moueri diuturna obseruatione cōperimus, non minus q̃ que-
uis alia particula, quę aut alijs alligatur, aut in aliarum medio
sita est, nulli alteri continua, licet multis contigua existat. Mo-
uetur itaq; vterus, & à propria sede prolabi videtur in omne
situs dimensionem: sursum quidem, vt in vteri suffocatione di-
ctum est: ad latera: antrorsum & retrorsum: & vltimò deorsum prolabitur, ita
vt extra promineat factus strutij camelli ouo persimilis. Quas viciati situs diffe-
rentias in duo tantum capita diuidere est in animo, atq; in hoc primo solū eius
meminero mutationis, quę deorsum vergit, & foris pendet: aliarum verò seq.
cap. nam diuersas habent à prædictis causas, & diuersam longè curationē ex-
quirunt. Quum igitur vteri corpus per scēminæ pudendum erumpit, & pendēs
prædicta figura affectum fuerit: vteri procidentia appellatur. Quem situm non
adipiscitur vterus, q̃ ex toto (vt Aetius quibusdam vitio uertit) à ligamentis so-
lutus procidat, sed quia ligamentis laxioribus factis, facile sua sponte labi vsq;
ad illam partem permittitur. Inquit enim Hip. lib. de natura mul. Si vteri in lo-
co non manserint, quò prolapsi fuerint, dolores exhibent, & incōspicui fiunt.
Quando verò imminēt velut sedes prolapsa, & cūm quidem supina decubue-
rit, in loco manent, cum autem surrexerit, aut se inclinauerit, aut aliàs se cōmo-
uerit, exeūt. Cuius doctrinæ gratia expendere oportet, vterum vinculis vndiq;
alligatum esse, ante nimirum, retro, supernè, infernè, dextrā, sinistrā, obliquè ad
colla, & inguina, ossi pubis, ilio, & sacro, per tunicam à peritonæo dextra, &
sinistra parte quoq; connexū: magnis vasis per arterias, & venas, p̃sertim sper-
maticas, & apophysim peritonæi, spinali medullæ per nervos, recto intestino p̃
fibras quasdam tenues, vesicæ per alias, sed plures, & laxiores, ossi pubis, p̃ vin-
cula laxa. Quibus sic premis, in memoriam reuocare oportet Platonis fragmē-
tum de motu animali, vtero adscripto, quem tan q̃ animal vorax moueri putat
in omnem situs dimensionem. Scimus tamen, vterum naturaliter, vt semē exci-
piat, hiare, & naturaliter quoq; ipso suscepto constringi: sursum et moueri, nō
tamen sponte, sed vasis plenis renelli, ac inflari, vt in suffocatione diximus. Cō-
torqueri similiter interdum assolet ob abscessum, vel inflammationē, vel vim
aliquam illatam, vt post partum quibusdam scēminis accidere cōperimus. De-
orsum autem mouetur, vel (vt rectius loquar) procidit, cum peritonæū, ac vin-
cula à peritonæo, vel quę ad dorsum tendunt, laxantur, vel rūpūntur, vel fun-
dum vteri inuertitur, vt extra pudendum prolabatur: Sunt igitur tres affectus
vteri præcipui ex deprauato motu, vnde varia admirandaq; symptomata subse-
quuntur, suffocatio, contorsio, & procidentia: ceterum de procidentia mens est
hac in parte tantum agere. Cuius nomine et intelligimus prominentiam vteri,
cūm videlicet, ad alas vsq; pudendi sese vterus extendit, ac prominet, extra ve-
rò non pendet: quę sanè duæ affectiones consimilem obtinent curandi rationē.
Verūm in hoc affectu iam constabit tres procidentię species reperiri: vnam, qñ
collum in vuluam procidit: alteram verò, quando ipsius vteri fundum, ac to-
tum corpus in collum excidit, & videtur velut glans viri rubens sese ostendēs
in ore

A in ore pudendi cum conspicuo foramine: tertiam, quando membrana eius interna euerfa, extra prominet, quo tempore rugosa apparet pars appendens, nonnumquam verò strutiij camelli ovo perfmilis. Atq; hæc est vera vteri procidentie ratio, quàm morbum in situ perünere existimandum est.

Procidit quidem vterus à multis causis, vt Hipp. testatur lib. 2. de morb. mul. nā inquit. Porro omnis occasio vteros propellere pōt, si quid malè hēant. Nā & à frigore pedū ac lumborū, & à saltatione, & terrote, & lignorū sectione, & cursu ad accliuē ac decliuē locū, & ab alijs multis propellunt. Sed his externis p-terminis, prolabi contingit laxatis vinculis, quibus vterus alicui mēbro adiungit, mouet, nutrit, idq; vel refrigerato vtero, aut collecta tum in corpore, tū in acetabulis ipsis mucosa substantia, vñ grauior factus in propria sede vinculis cōtineri nō pōt. Qd̄ vitū senibus subinde magis accidit, & ijs, q̄ ex instituto vite (quales sunt lotrices, mulierculæ) nudos diu in frigida pedes continent, aut in frigido lapide diutiùs sedent, vel aerē frigidiorē excipiunt, maximè in puerperio aut menstruo fluente, qd̄ eo tpe vteri vtraq; pars magis hiet. Procidit quoque nō minùs praua fœtus extractione, violenta secundinæ depulsione, spiritus cohibitione, immensi oneris sublatione, plaga, partuū frequentia, animi affectibus, p̄sertim irā t̄i vehemēti, vt in peritoneū aliqd̄ disrumpat, laxeturve aliqd̄ vinculorum ad ossa pubis. Arist. enim. 7. de hist. animal. c. 2. scribit, quibusdam coeundi desiderio, aut longiore veneris abstinentia vterum excidisse. Ego autē existimo in viraginibus, & viro orbatis id accidere, in quibus non vteri fundū sed collum tantum prominet, ex quo viros fuisse factas multi autumant, vt ex Hipp. mente de Phaethusa superius retulimus: q̄ diximus, ad vteri procidentia esse referendā. Cuius affectionis cās lib. 2. popul. recenset aliter Hipp. dicēs; Si extra pudendum os vterorum exciderit, vtpote ceruicē vterorum prope pudendū sita & ampla existēte, sit aut̄ hoc magis sterilibus, cōtingitq; maximè ex defatigatione, cum mulier laborauerit, & vteri calfacti fuerint, ac exsudarint, tunc eueritur os ipsorum p̄ ceruicē, ut quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē sit loco, q̄ in priori tpe, & ubi hoc cōtingerit, p̄cedunt uteri foras ad frigus, & osculū ipsorum auersum prodit. Has quidem cās ad vnguē tenere oportet, ut iuxta cuiusq; vim & naturā cuiq; auxiliū peculiare, & pficuum adhibere possis. Sed dimitto istā mationē aut solutā eius unitatē; nā alteri⁹ sūt cōsiderōnis.

Studebis plurimū in dignoscēdis principijs, ne ī hoc affectu decipiaris. Itaq; sāguis plurimus erūpit, deinde dolor magnus partiū, qbus cōnectit̄ uterus, illū nimirū, lumborū, ossis sacri, hypogastrii, & pudendi subsequitur. In quo grauitas & tumor oui forma, sed magnitudine varia pro affectus uteri, & colli eius amplitudine uisui & tactui apparet. Stercus & urina sæpe supprimunt̄ à tumore uteri, rectū intestinū & vesicæ collū cōprimēte: febris interdū comitat̄, interdū cōuulsio ex ipsius partis frigore: grauitas seu glomerix fili ī pudēdo muliebri sentit̄. Si ligamenta itē humore multo laxata sint, indolenter excidit: p̄cessit̄ uictus rō humidior, & usus largior fructuū aut pisciū recētū, uita otiosa & pudendū humore multo semp̄ madet. Quod si ligamēta putrida sint, sanies putris & uirulēta simul effluit. Recēset quoq; Hip. Huius mali signa li. 2. de mor. mul. dicēs. Si uteri extra naturā p̄gressi fuerint, febrilis calor hēt pudendū & imū uētrē, & urina frequēter & paulatim instillat, & pudendum uehementer mordeat.

Q Tri-

Causa

Signa.

Curandi
ratio.

Triplex in hoc affectu insurgit curandi ratio. una quidem, quod uterum ad proprium locum reducere docet; altera, quod reductum tueri, & efficere quominus iterum decidat ablata causa, quod prolapsionem excitabat; tertia vero & ultima, quod ipsum uterum reductum astringit, roborat, ac in propria sede firmat, à quacunque causa prolapsos oriatum. Primum itaque ad commodam reductionem si quid urinae, uel excrementorum in uesica, aut intestinis induratum retentumque fuerit, protinus euacubis. Nam cum inter pelicam, & rectum intestinum sedes uteris fortuitur, si partes illae tensionem, aut plenitudine afficiantur, ad pristinum locum remeare neque uteris, renitente partium duritie. Quod facto, apte collocanda mulier est, sublatris coxis innitens di latius, & reflexis poplitibus. Inbet quidem Hipp. lib. 2. de mor. mul. pedes ad scalam alligari, ut caput deorsum uergat. Caterum si tensa fuerit pars prolapsa, emollienda prius, si frigida, calfacienda, fouendaque est, ac ultimo si inflammata, antea curandi. Oleo itaque tepido, ac butyro mitefcenda est, & calido decocto ex beta, malua, althea, & fenugræco, ac semine lini, ad diu sumino, aniso, baccis lauri, chamæmelo, & similibus. Ac postquam prima, aut altera die calida steterit, & tractabilis uteri pars prominens, hac lege in sinu manibus reponenda est. Lanam accipito conuolutam figura, & crassitudine muliebri pudendo respondente, quod tenui lino circundabis, intingesque uno diluto hypocistidis succo, & in uterum mittes, reprimens totum uterum prolapsum blandè, ac leniter, quoad tota moles intra sinum recipiatur, postquam in proprio loco, quod curatione adduxisse Hipp. constat lib. 2. de mor. mul. hæc uerba: Hanc quod maxime quiescere oportet, & non moueri lectum ad pedes altiore stratum, & ipsè uti uelut in superioribus, & cum acerbis infusis inspergere, & grati colentia suffire, sub nares autem odorata, & malum punicum in medio per umbilicum perforato, & in ipso picæ, quod maxime congruat, cum uino tepescito, & non ualde premens, quod penitissime apponito. Rursus de eadem re lib. 2. de mor. mul. hæc referi uerba: Quum igitur sic habueris myrti, baccas, & loti ramenta in aqua coquito, & aqua per noctem sub dio exponito, atque sic frigidissimam pudendo affundito. Quam sanè curationem moliri, dubitare plurimum, nisi ardore immodico femina infestaretur. Quibus factis, imponendum est de super lanae inuolucrum uino astringenti madidum, à quo totum pectus spongia ex posca compressa integito. Tandem sic reducto utero, mulierem reclinabis, crura extensa, & coaptata habentem, ita ut alterum alteri cruci incubat. Antè tamen quod uterum in suam sedem reposueris, astringentibus, aut glutinantibus (si ex causa procatartica, quod continuum soluat, affectio prodeat) ipsum inspergere, ac inungere, uel fouere oportebit, ne protinus decidat. Cuius generis, perculdubio est aluminis decoctum ex uino ac utero, oleum lycionum myrtinum, & puluis gallæ, balaustris, malicoris, glandis, nucis compressis, rosarum rubearum, mastichis, acaciæ, hypocistidos, & sanguinis draconis. Encathismatis est uteris ex posca, aut ex aqua, in qua decoxeris lentiscum, myrtum, coria mali granati, & rosas. Postquam illi nièda est pars prolapsa acacia uino soluta, & gallarum puluere. Quibus perculdubio uteris, dum nup egressus fuerit uteris, nam si diu percidit, & pars frigida, uel pallida iam steterit, tepidè fouenda prius est. Postmodum uero uterum repones elatis, diductis, & succussis crucibus, & clunibus, ut in calculo urinæ suppressere docet Gal. 1. de locis affect. uel manu gracili, oleo mastichino, aut alio astringenti, uel graecolenti inuncta. Reduces quoque uterum siliibus, umbilico, aut sub mammis cucurbitas cum multa

A multa flamma affixeris: nec defunt qui lumbis & regione vmbilici eadem affi-
gant. Consultit, & Hip. lib. 2. de morbis mul. diglus altius in os immittis vomitu
excitare cum aqua lentum, melle, & aceto, vt tur sum renellauit vterus. Quam
gratia prestant vincula ad brachiorum articulos dolorifica. Item graues odores,
qualis spirat ambra, muscus, gallia muscata, alipta muscata, & his similia vari-
bus continenter admoda, donec vterus, vt affolet, moueatur. Sic in partibus pu-
dendis profunt admota, q̄ fetida sunt, & ingrati odoris, vt suffitus ex vngue tan-
rino, ex sagapeho, galbano, & huius naturae alijs. Conficiuntur nō minoris co-
modi vnguento, cerata, & emplastra, q̄ inguinibus adinuenienda sunt, ad lica-
te-
rebinthina, ladano, mastiche, spica, gariophyllis, ambra, & musco. Cōfert ē re-
gione vmbilici lana succida aceto in cocta, vel sacculus ex methastro super re-
gula ignita exalfectus, vino austero paulo interim affuso. A quib. corpus (cru-
ribus, parum elatis) locatum non est diu in spatio, adseruato, curans ne alius
pigrasit, aut dura, nec nimis lubrica, q̄ illa vterum per se precipitet: hanc verò
membranas vterū colligantes laxet. Deinceps quidem emplastrum diaphenico
B ventri adhibebis. Verū si pars, q̄ excidit, corrupta putridave exiterit, abscissa
parte inutili reliquam curatione veluti in esthiomeneo administrabis. Verū si
prædicta abscissio nō suffecerit, vt corruptio vterus nō serpar, caustico medica-
mento partē putridā vres, quō citius secedat aut ferro candenti, idq̄ q̄ rarissimè
& cautē facies: ne si imprudenter vtaris, in conuulsionē aut aliud grauius malū,
femina deferat: & quia vterus varijs partibus cōmunis efficitur ob nernos, &
vasa, q̄ hēt. Alimentis vtatur femina siccis, calidis, tenuibus, & boni succi pro-
funt, & lentes ex corticate cum astringentibus in cocta. Scribunt itē, vterū sta-
tim in suam sedē reuocare cū vino austero sumptā, cornu cerui vsti, foliorum
lauri siccorū, & myrti an. 3. j. Allium ē tritum aqua solutū forū vterū repellit:
& vrica recens trita emplastro ventri imposita, vterū retrahit: althea cum oleo
& adipe coturnicis cocta huic, & alijs simillimis prodesse plurimū fertur.

C Prolapsum vterum in suam sedem retractum præcauebis quominus iterum
prolabatur, ablata prolapsionis causa. Quapropter mox à dictis auxilijs prou-
dendū est, vel corpori vniuerso in vterū mandati, vel ventriculo, aut vtero ipsi
præhumido, aut sua sponte malè affecto. Quod si sanguinē redundare comper-
tum sit ex pleno pulsu, febre, femina habitu, suppressa vacuatione, vitē institu-
to, & faciei rubore, sanguinē ex brachio protinus mittes, præsertim si quod ex
vtero decidit, calidū fuerit, & vterus ipse inflammatione, dolore, calore ac tumo-
re tentatus. Sed quia plerunq; vteri ligamenta madore imbuta laxantur medi-
camentis, q̄ aquosos, & pituitosos humores repurgent, exsiccare corpus, & vte-
rum oportebit: leuiter itē, & blandē, ne medicamentorum, aut corporis vi vte-
rus excidat. Cuius auxilij loco, multis rationibus proficiū est, frequentioribus
vomitus vti: nū, quia vterum sursum retrahūt: tum quia humores ab vtero re-
uellunt: nū verò quia pituitosos, & fluidos faciliē expurgant. Quod profecto bis
in hebdomada tutò facies exhibitis leuioribus vomitorijs, quale est decoctum
raphani, seminis eius, anisi, aut feniculi cū modico oximelite, aut syrupo ex no-
uem infusionibus: præsertim si inter medijs diebus adhibueris clysteria, quæ
calfaciendi, & exsiccandi vires habent, qualia ex vino, aut decocto a pue,

Q 2 cum

cum dauceo, aniso, chamamelo, cumino, anetho, menthastro, & similibus cum
 melle rosaceo citra pinguosam admixtionem. Inseffiones item parabis ex eisdem
 herbis, & alijs similibus cum vino feruefactis: vel sacculos eadem materia con-
 stantes, & calidos actu, vino irroratos aut aridos. Exteriùs supra vteri regionē,
 & inguina adhibebis cerata, emplastra, inunctiones, & oia alia, q̄ superiùs retin-
 limus, additis folijs, & baccis lauri cū ligno aloes, cinnamomo, pulegio, & simi-
 libus in puluerē redactis. Inunges quoq; ismū ventrem balsamo, oleo de Apa-
 ricio apud nros sic appellato: de cinnamomo, de absinthio, de baccis lauri, vel
 alio, in quo ferbuerint lignū aloes, anisum, daucū, cinnamomū, & flores roris
 marini. Suffumigabis pari rōne fēminam eisdem rebus, vt & fumo, & virtute
 cōbustorū, pars exsicceatur, & ad nativum statū redeat. Si tñ hæc oia minùs pro-
 ficere videantur, balnea aquarū sulphurearū consulto, hæc. n. efficacissima sūt.
 Aut, si mauis, consentiente toto corpore, vel transmittente humida excrementa
 in vterum, fontanellā in altero brachiorū adaperies. Caterū vtero primaria
 affectione inadido, & ob id prolapsa, in altero crurū poteris aperire. Ego aut in
 vteri prolapsione ex nimio vteri vel totius corporis madore, aut ex albis vteri
 purgamentis, vel ex frigore aut humiditate externa proficiscēte, nullū aliud vti-
 lius, & tutius presidiū adinuēni, q̄ decocto radices chinæ, ligni sancti, vel sparte
 parellæ corpus lētē & diu sudare, quominus corpus cōtabescat, & citra damnum
 magis exsicceatur. Quē quoq; vsum præstat largioris decocti ex p̄dictis citra su-
 dorē vsus. Prouidendū, his omnibus factis, adhuc est, ne iterū decidat: difficul-
 ter etenim curatur, dum huic vitio assuescit. Ob id necessum est oī arte vteri os-
 culum roborare, astringere ac firmare, ne ocysimè iterum dilabatur. Cui vsus
 pessus conficiendus est ex lana, vino austero madefacta, & pulueribus ex radi-
 ce balauſtij, nuce cupressi, rosæ, & cypero: vel ex eisdem, additis pulueribus ma-
 stichis, thuris, ladani, & picis: aut ex eadē lana cū albumine oui, & pulueribus
 sanguinis draconis: q̄ si odores foetidos in summitate pessi reposueris, faciliùs
 re ages. Reperies et apud Græcum Moschionē pessarium huic muneri cōfectū,
 qd recipit croci, & syp̄i. an. 3. ij. medullæ ceruinæ 3. ij. resinæ terebentinæ 3. j. adi-
 pis anseris, gelaminū ouorum elixarū 3. j. olei irini, & rosarū quantum sis satis.
 Aliud et efformat idem autor, qd recipit ceræ puniceæ obolū. j. adipis anseris, &
 medullæ cerui ana. obo. j. & s. syp̄i, 3. iij. quibus vtendum præsertim est, cum
 vterus duritie, vel tensione dilet. Sed vtilitatis non contemnendæ est ad firman-
 dū vterum pessulus, q̄ excipit assæ fatidæ, myrrhæ, thuris, mastichis quantū sit
 satis, postea misceantur cū oleo laurino, & adde lauendulæ 3. j. & s. baccarum
 lauri. 3. f. Pectinem quoq; ac lumbos, lana, bōbace aut spongijs imbutis oxicra-
 to contegemus, & ne concidat, alligabimus. Cui itē vsui confert emplastrū, qd
 recipit galbani. 3. j. & s. myrrhæ, thuris an. 3. ij. terebentinæ. 3. f. seminis lauedu-
 lę, & sanguinis draconis. an. 3. j. pulueris rosatū, coralli, & myrtilorū. an. 3. ij. mo-
 schi. 3. f. misceantur, & extendantur in linteo vel corio tenui. Consimilem huic
 vsum præstat emplastrum contra rupturam, vnguentum Comitissæ, emplastrū
 de mastiche rubrum, desiccauū cum radice cyperi: vel emplastrum diaphē-
 nicon. Sed prodest non parum confectum peculiariter ex lauedula, bistorta, fo-
 lijs, & baccis lauri, adiecta protiuicula myrrhæ, thuris cū cortice, & mastichis,
 & alijs q̄ consimilem facultatem habent. Profunt item inseffiones, quę excipiāt

corū

A corticis pini. ʒ. iij. corticis thuris. ʒ. i. corticis querci. ʒ. iij. hordei, absynthij. ana. m. j. rosarū rubearū, balauſtiarum, florū ſtachados. ana. p. j. fiat decoctū in aqua ferrata & vino aſtringenti, cuius aliquā portionē cum ſyringa in vterū infundes, ſi minari caſum perſenſeris: ſed inſtrumentū ex lana conſectū prædicto decocto madidū in eandē partē inferes. Ex quibus, & alijs emplaſtrum confice, & vteri regioni ac inguinibus apponito, parabiſq; id hoc modo: excipe foliorū myrti, lentſci, ſummitatū rubi, quercus vel pyri agreſtis. ana. m. j. corticis quercus & malignanati, ana. ʒ. iij. gallari, ſpongiæ, biſſortæ & pentaphylli. ana. ʒ. iij. centauri minoris, rosarū rubearū, floris anthos & ſaluiæ. ana. p. j. fiat decoctum in aqua & vino rubro vel aceto, ex quo ſumes quantū ſit ſatis, vt cū farina volatili, farina lentium, puluere thuris, chamemeli & ſanguinis draconis fiat emplaſtrum, vel cataplaſma. Item emplaſtris pro matrice vtendū eſt, vt ipſam roborent ac firmet, qualia ſunt, quæ recipiunt aliptæ muſcatæ, galliæ muſcatæ, ana. ʒ. iij. ambra, muſci. ana. g. v. vtriuſque ſtyracis. ana. ʒ. j. ſ. refinæ electæ. ʒ. iij. miſceantur cum oleo de ſtyrace, & fiat emplaſtrum. Quæ omnia ſi nō profuerint, extremum, & vltimum præſidium erit zona Hipp. quæ acingulo zonam habet a parte poſteriori per perineum adductam in anteriorem partem ad idem cingulum iuxta pubē arcet. Alij quidem ē ſubere ouales formas inductas cera, & quaſi pediculo alligatas immittūt in ſinū pudendi, alligantque coxis inunctas oleis & vnguētis aſtringentibus. Atque hæc dixiſſe ſit ſatis. Nec mirandū proſectū eſt, me in hoc cap. eiufdē indicationis varijs in partibus remedia attuliſſe: nā morbi conditio id in præſidiorū vſu docebit proficiū & neceſſarium fore.

De auerſione, ſeu recurſu vteri ad varias partes. Cap. 12.

DICTVM eſt præcedenti cap. vterum ad ſuperna ferri, aut extra ſinum pudendi prolabi, vel intra corpus manētem ad varias partes inclinari, retorqueri & auerti. Quem ſanē motum; ad varias partes factum, vteri auerſionem Hipp. & medici omnes antiqui appellarunt. Cuius idem Hipp. mille in locis meminit, ſed ſpecialius lib. 2. de morb. mul. per hæc verba, Dico autem cum vteri ex loco moti fuerint, alio aliàs allabuntur, ad quæcunque verò locum allapſi fuerint, dolores ingentes incumbunt. Et ſi quis veſicam contingat, dolorem exhibet, & vrinam non ſuſcipiunt, neque genituram in ſeipſos trahunt, & ambo dolent, & ſi non celeres ſolutiones fiant, vteri poſtea ſuppurantur iuxta eoſdem locos, ſi ad ipſos recurrerint. Contingit autem hoc & in laterum mollitudine & in inguinibus & ſupra pectinem. Refert etiā eodem loco & lib. de natu. mul. varias partes, ad quas vterus irruere poteſt, quas paulò inferius recenſebo. Vtēq; in vterus deſlectatur, morbuſ conſtituit in deprauata figura, aut ſitu: cæterum ſymptomata, varia admodū ſunt pro cauſæ varietate & loco, in quem irruit vterus. Conſtat enim ex Hipp. nō ſolū verſus inſtrumenta reſpirationi ſeruiētia vterū inclinari, ſed in ſecur etiā, in ſplenē, ventriculū, veſicam, inteſtina, præſertim in colon rectū, acileō, in coxédices quoque & in crura, lūbos, ac in omnes partes his vicinas. Hæc etenim retractiones intelligēdas eſſe arbitror eo modo, quo diximus Gal. cap. de hyſterico affectu intelligere. Quippe credendū nō eſt, vterū

Q 3 illuc

illuc recurrere derelicta propria sede, sed in seipsum conuelli, & partem in quam simulat adire, in consensum trahere, aut versus illam partem, flatu aut humore impleri, eamq; summopere ledere.

Causa.

Causas huius deprauati motus, qui vteri situm vitari simulat, primus omnium recenset Hipp. lib. 2. de morb. mul. per hæc verba. Porro omnis occasio vteros propellere potest, si quid malè habeat: nā & à frigore pedum ac lumborum & à saltatione & terrore, & lignorū sectione, & cursu ad accliuē locum, & ab alijs multis propelluntur. Proinde hæc considerare oportet, ad totū corpus respectu habito, cum præsentēs morbi affuerint, propter talia enim omnia necesse est, plus aut minus ægrotare, & postquam hæc reluxerint, maximè hac parte repentini morbi manifesti fiunt. Quum igitur hæc aduenerint, penitus ex tota homine deprehendere oportet: nam quæcunque perfrigerationes crurum, aut stupefactiones ex frigore fiunt, hæc omnes etiam in vterorum morbis vteros eleuant. Quæ equidē sententia constare videtur, solas externas causas Hipp. numerasse: cæterum Gal. lib. 6. de lo. aff. cap. 5. & Aetius à Gal. transcriptis verbis: specialiores causas per hæc verba referunt. Suppressis membris necesse est venas & arterias ad vterum tendentes repleri: nam sanguis vsque ad vasa oscula accurrit quidem, verum intra vterum prodire non potest, aut eò quod nimia crassitudine osculis impingitur, & grumosus fit, aut q̃ ipsæ oscula clausa sint, & transitum impediunt, ita vt venæ humore refertæ extendantur, & vicinos vteri appendices humectent, quorum extensione vterus retrahitur, si itaq; ex vtraq; parte æqualis retractio fiat, reclinatio aut reuulsio recursus vteri æqualis contingit, & ad superna vergit: si verò in alteram partem maior retractio fiat, alterū ē visceribus his causa est, splen videlicet aut hepar, quorum venæ superfluo sanguine extantæ à suis partibus vterū retrahunt, hepaticæ venæ à dextris, splenicæ à sinistris, prout alteræ magis fuerint repletæ, quippe dū non fit æqualis vtraq; repletio, sed maior in vna quæ in altera apparet, quæ magis repleta est, illa magis intenditur, contrahiturq; & mox partem aliam quæ melior est, ad se rapit, aded vt vterus versus illam distorqueatur. Quibus proculdubio sententijs externas, & internas causas huius affectionis euidenter constare arbitror, sicut rationem etiam, quæ vterus cū afficitur, magis in vnam quam in aliam partem reuelatur. Constat igitur ex omnibus causis, quæ alteram vteri partem, & vasa ac ligamenta ad illam partem pertinentia, tensione aut conuulsione afficere possunt, modò frigus rigens ac densans partem sit, modò labor tendens, modò humorum vbertas distendens, affectus prædictos posse proficisci. Addit insuper Gal. lib. 2. de cau. pul. cap. 11. alias distorsionis vteri causas, qualis est inflatio, scirrhusus tumor, tuberculum, aut abscessus, siccitas aut frigus nimis corrugantes aut tendentes vterum. Frequenter enim conspiciamus, & puerperis ex frigore, & virginibus ex mensium defectu, ac omnibus alijs ob prædictas causas hæc mala accidere.

Signa.

Signa quidē affectus in genere, recensuerat Hipp. li. 2. de mor. mul. loco citato per hæc verba. Ad quæcunq; verò locū allapsi fuerint, dolores ingentes incubunt, & si quis vesicā cōtingat, dolorem exhibet, & vrinam non suscipiunt, neque genitura in seipsas trahūt, & ambo dolēt. Cui cōsimilē sententiā adduxerat dolores exhibēt, & incōspicui fiūt. Ceterū specialius oportet, ad quā partē vterus decubuerit,

A debuerit nosse, qđ pulchrè mille in locis docuerat Hipp. quę oīa ego referā, in-
 tio sūpto à recurſu in caput. Inq̃t enim lib. de natu. mul. Si ad caput cōuerſi fue-
 rint vteri, ſignū hoc eſt. Venas in naſo & ſub oculis dolere vī. Et iterū ſubdit li.
 2. de mor. mul. Quū ad caput cōuerſi fuerint vteri, & hac parte ſuffocatio deſi-
 nit, caput grauatur, verū alijs alicubi, aliās finis hī, ſignū autē eſt. Venas in naſo, &
 partes ſub oculis dolere dicunt, & ſopor altior tenet, & ſpumat vbi leuius ha-
 buerit. Ad iecur quoq; recurrere idē docet Hipp. lib. de mor. mul. dicēs. Si verò
 ad hepar cōuerſi fuerint vteri, mulier de repente voce deſtituitur, & dētes con-
 ſerſi ſūt, & color liuidus fit, de repente verò hec patif ſana exiſtēs: cōtingit autē
 maximē virginibus antiquis, & viduis, q̃ pepererunt aliqñ, & viduitatē agunt:
 maximē verò contingit oīno nō ferentibus vterū, & ſterilibus ex partu. Ad la-
 tus aliqñ vterū procūbere ex eodē autore diſces lib. de natu. mul. his verbis. Si
 vteri ad latus allapſi fuerint, tuſſis detinet, & dolor ſub latuſ, & vterus durus ue-
 lut pila inſidet, & ad contractū dolet nelut ab ulcere, & cōtabeſcit, & vī perip-
 neumonia eſſe, & cōuellit, & gibboſa fit, & menſes omninō nō apparēt q̃ buſ-
 dā verò prius conſpecti euaneſcunt: cui conſimilē ſententiā adduxerat. lib. 2.
 de morb. mul. Verū ſi in lūbos uterus irruat, ſignis adductis prædicto loco ab
 Hipp. diſces: inq̃t enim, Si verò in lūbis fuerint vteri, aut in lateris mollitudine,
 & ſpiritus ſublimis inerit, & ſuffocatio habeat, & anhelatio deſa ipſā corripit,
 & moueri nō vult. Cuius ēt mali ſigna adducit Aetius dicēs. Si verò retro aut in
 frā inclināt, torpor ac difficilis vtriuſq; motus ſeq̃tur: ſape ēt motus penitus in-
 tercipitur, & ingens nexat dolor: alius quoq; ſupprimīt, neq; clyſterē admittit,
 niſi genibus innitatur agra. ſtatus itē retinent, & dolores inter ſedendū actiun-
 tur, p̃ſerū ſi uerſus anum reclinatio contigerit. Quòd ſi ad coxendicē uterus
 deuenerit, cognosces facīlē ſignis, quæ Hipp. aſſert lib. 2. de mor. mul. dicens.
 Si circumuerſi fuerint vteri ex parte ad dextrā partē, & puerperij purgamēta nō
 ſiant, & dolor imū uentrē habet & lūbos & laterum mollitudinē, & dextrū crus
 grauatur, & torpor occupat, & non tremit. Et ſubdit paulò inferius. Si vteri ad
 ſiniſtrā partē, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac vehemēs habet lumbos
 & laterū mollitudines, ac ipſum crus claudicat. Idē fareſ lib. 2. popu. pa. 4. tex. 5.
 dicens; Stymargi famula Idumea erat, cū peperiſſet filiā, os vteri contortum eſt,
 & in coxam & crus, dolor. Quam etiā ſententiā Aetius per hæc uerba retulerat.
C In utrā uerò partē uterus declinauerit, digitorū admotione, & ſeq̃ntibus ſignis
 agnoſcemus. Si. n. in obliquū declinauerit, propinqui femoris diſtenſio, dolor,
 perfrigeratio, impedimentū, & torpor indicio erit. Irruere in uentrē vterū quo
 que cognosces ex uerbis eiūſdē Hipp. lib. de natu. mul. quę in hūc modū ſe ha-
 bent. Si vteri ad uentrē nutauerint, dolor acutus & uehemens coxendices, &
 lūbos ac laterū mollitudinē habet, & crus claudicat. Cognoscere docet etiam
 idē autor eodē lib. ad ſedē irruere, dicens. Si vteri ad ſedē cōuerſi fuerint, & ſe-
 ceſſus ſecedere p̃hibuerint, dolores habent ad lūbos & imū uentrē & ilia. Cui
 conſimilē ſententiā adducit lib. 2. de mor. mu. dicens. Si uerò ad ſedē conuertāt
 vteri, ſeceſſus recrementa impediunt, & dolores occupāt lūbos, & imū uentrē,
 & inteſtinū rectū ac podicē. Quòd ſi ad inguina plapſi fuerint, idē quoq; autor
 internoſcere docet eodē loco dicēs. Si uerò incubāt i inguina & meatus vringē,
 dolores fiunt fortes, & torpor in cruribus, & urinae meatus obſurant, & urinā

non emittit. Solet etiam vterus ad pedes & crura conuelli: quod Hipp. his ver-
bis manifestat. Si ad crura & pedes conuersi fuerint, ex hoc cognoscet: magnus
pedum digitus conuellitur sub ungues, & dolor crura ac femora tenet. Verum
si vteri os obtorqueri contingat, menses, ut Hipp. inquit lib. de natu. mul. occul-
tantur nunc prius apparentes, & non similes fiunt, sed deteriores, & pauciores
quam antea & genitura non admittitur. Atque hæc sunt proculdubio signa,
quibus vnamquamque vteri peruersionem rimari oportet: in quibus equidem
& Hipp. locis expendendum est, huiusmodi retractiones intelligendas esse, si-
mul & Hipp. loca, non quod vterus illuc pervadat, sed ea lege, quam in huius
cap. principio, & cap. de vteri suffio. adduximus.

*Curan-
di ratio.*

Quantum facessant negotij prædictæ affectiones, quam et sint frequentes, &
perperam intellectæ, nemo sanæ mentis dubitabit, si attento animo feminarum
querimonias & affectus intueatur: multa etenim referunt se pati accidentia, quæ
ad vterorum peruersionem reducenda essent, si medicus ea diligenti animo expe-
disset: quod fit, ut ex ea negligentia pendeat ipsas pati & conquiri mille modis ci-
tra vllum præsidium, præsertim cum tanta diligentia, & cura has vteri peruersiones Hipp.
tractauerit. Ob id profecto oportet primo quacunque vterorum peruersionem
Hipp. scribit, docere, ut ab eius documentis sumpto principio, curandi ratione fa-
cilius civilis inuenire liceat. Inquit. n. lib. de natu. mul. loquens de vterorum in-
clinatione ad caput. Hanc calida multa lauare oportet etiam in capite, lauro &
myrto in aqua incoctis & caput unguento rosaceo illinias, & odorata subter suf-
fiatur, & brassicæ edat, & succum absorbeat. Quas et curare docet lib. 2. de mor.
mul. velut ex vtero suffocatas. Sic cum ad iecur vterus allabatur, loco nup. citato
hanc refert curandi rationem. Quum sic habuerit, tumorem ab hepate cum manu in-
fra leuiter detrudito, & præcordia cum fascia deligato & os aperito, vinum verò odo-
ratissimum infundito: quoniam sanè et graueolentia ad nares adhibere ac suffire con-
uenit, ad vteros verò odorata, & suffimenta. Et postquam sic curaueris, pharmacum
deorsum purgans bibendum dare oportet: si quidem biliosa fuerit, quod bile
purgat: si verò pituitosa, quod pituita. Et dum ad latus vterus procumbit, hæc re-
fert loco nuper citato. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibere
dum dato, & multa calida lauato, & retractoris quicunque admiserit adhibeto. Quam
sanè curationem iterum retulerat lib. de natu. mul. Eadem ferè curandi methodum,
dum ad lumbos vergit, adducit lib. 2. de mor. mul. dicens: Quum sic habuerit, phar-
macum bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis verò deorsum,
& totum corpus fouero, præsertim vteros leniter, & calida bis indie lauato. Sed pa-
rum antea eodè lib. de eadè affectione loquens hæc verba refert: Sulphur aut bi-
tumen, aut cicuta, aut myrrham terito, & melle cocto affusso glandulam longam
efformato atque crassam, eamque in sedem indito. Itè eodem loco paulo inferius,
consimilem in lumbis recenset affectionem, sed longè dolorosiores, & quæ con-
uulsionem aut contractionem crurium affert cum acutis alui doloribus, & vrinæ stil-
licidio, atque animi debilitate. Quo casu, oleum in vteros infundere iubet, & fo-
mentum adhibere, & multa aqua calida lauare, & in oleum & in aquam desidere,
& suffire graueolentibus præ inferna: ac post hæc omnia iubet, sedato dolore, pharma-
cum sursum purgans dare, quo casu interdicat ventris purgationem donec ex toto
affectio quiescat. In coxendicium verò reclinatone lib. 2. de mor. mul. inquit: Quum
sic ha-

A sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & postera die sufficere, recensetq; & frigidum & altringens suffumigium cum oleo. Et eadē ferē verba refert lib. de nat. mul. in curatione reuulsionis vteri in ventrē. Sed li. 2. de mor. mul. loquens de prolapsione in coxā, hæc refert. Si vteri cōtingit coxā, & incubāt, dura ac solida fit coxa ad lateris mollitudinē, & dolores in i ventris ad ipsam lateris mollitudinē, & lumbos ac crura dolor incidit, ac extēdit, & suppuratur, & lineamētis opus habent, & pereunt, nisi quid feces aut vras. Verū cum in sedē vterus irruit, curari iubet Hipp. lib. de mor. mul. lauacris, & fomētis, dicēs; Quū sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, & lumbis fomētum adhibere, & postea graueolētia subter suffire, & apponere q̄ purgāt & impellūt vteros, & bibenda dare q̄cūq; libenter admiserit ex maximē cōserētibus. Quo ēt modo curare iubet fēminas, q̄bus ī pectinē vterus incumbit: in quauis enim obliquitate & vteri extorsione lib. de natu. mul. consulit pharmacū sursum purgans p̄bere, & vterū fouere, nisi dum in coxendicē vergit, & ibidē suppurat, vt Hipp. refert 5. Aphor. inquit. n. Si vterus in coxā vergens ad suppurationem veniat, necesse est emmoton fieri: ego etenim periūssimorū in græca lingua consilio, interpretor verbū illud, emmoton, hoc est, vlcus sinuosum fieri: quo tpe nō pharmacis expurgātibus, sed ijs, q̄ pus ad extimas partes euocēt, & postmodū q̄ vlcus repurgēt, adhibēda sunt. Verū enim uero, si ad pedes aut crura prolābatur, multa calida lauare iubet, & fouere, ac suffire modo dicto. Hęc itaq; sunt in vniuersum circa vteri auersionē, Hip. curationes, quas cōsultō scribere studui.

Actius quidem ex his omnibus vnā colligit curandi rōnem, cunctis cōem, q̄ in hunc modū scribit; Quomocunq; igitur vterus retractus ac inclinatus fuerit eodē modo velut inflammationes in exacerbationib. curare oportet: in remissionibus at & declinationibus magis emollientibus vtendū est. Perseuerātē verō affectione, ijs, q̄ ex alto trahere, & corporis habitum mutare possunt. Sed his missis triplicē in hac affectione peritus Medicus tenet obseruare curandi rōnē: vnā q̄ dē incipiente affectu, q̄ tū mitigationē accidētū & vteri reductionē docet: alterā, cessantibus symptomatis, q̄ emollientibus, & ijs, q̄ blandē partē dolentē & cōuulsam laxent, vt cedat obstetrici vterū tractāt: tertiā verō, q̄ cām retractionis ex toto auferat. A qua quidē, si interna fuerit, velut plenitudo aut cacochimia, principiū curationis auspicari oportet: nā sanguinis plenitudine existente in vtero, citra cunctationem ex talo sanguinem fundere oportebit, p̄sertim immorātibus aut imminutis mēsis. Si vtero totū corpus affectioni cōsentiat, ex brachio sanguinē mittes. Sic prorsus cacochimia p̄ualēte in vtero, p̄ infernā aluū purgabis, sicut vomitū excitabis, vetriculo malē affecto. Verū si citra cui dētē plenitudinē aut cacochimiā affectio suboriat, a mitigatione ordiēdū est. Mitigare quidem accidētia ijs poteris, quæ Hip. scripsisse diximus, & ijs ēt, q̄ nos subinde c. p̄cedenti adduximus, prouidentes partū dolētī fomētis ex oleo liliorū, amygdalarum dulciū, de semine lini, & angelicæ, ac pinguedinibus galinæ, vituli, & cruriū cerui. Itē decocto althææ, seminis lini, fœnugræci, chamæmeli, meliloti, artemisiæ & similiū. Laxabis quoq; tēsam partē frequentioribus balneis, in scissionibus, fomētis & inunctionibus p̄dictis. Cæterum si hæc nō p̄fuerint, instituta p̄ba victus rōne, parca & optimi nutrimenti, tū cū modico vino, p̄sertim si ex cā aliqua procacitica affectus oriat, potissimū frigida, ad alia

te

te protinus conferes, & animo considerabis feminae habitum, vitae institutum, & tandem omnia ea, quae praecesserunt. Quod si ex his cognoueris, sanguinem re-
 dundare, aut menses non probe fluere, vel minus fluere (vt de Stimargi famula
 lib. 2. pop. par. 4. text. 5. scripserat Hipp. dicens liberata est iuxta talum secta ve-
 na) sanguinem ex talo mittes, nisi vteri retractione ad intestina, ac vesicam vel ad
 pedes fuerit: nam per id tps tutius est, ex brachio ipsum extrahere, praecipue si tpus
 menstruationis non instauerit. At si ex ijs, q̄ diximus, certum tibi fuerit, prauis
 humoribus femina abundare, purgationem protinus instituere teneris: in pitui-
 tosis pharmaco exhibito, qd̄ pituita purget, & in biliosis quod bilem. Seruabis
 tamen hac in re legem testimonij Hipp. adductam, nimirum q̄ in ea vteri auer-
 sione, q̄ ad infimiores sit partes, semper q̄ per vomitum purgent adhibeamus, vt
 & vterus retrahatur, & quod tensionem auersioneq̄; efficit, expurgemus: in ijs
 verò, q̄ ad supernas partes magis fiunt, q̄ per infernam aluum purgant, sunt ad-
 hibenda. Vteri etiam osculo appones pessaria ex mercuriali, theriaca & oleo li-
 liorum alborum, & post inunctiones superius adductas, cucurbitam grandem
 parti laesa aut vmbilico affigito. Dum aut lumbos & media ventris partem vte-
 rus irruit, ea pharmaca porrigere oportet, q̄ per vtramq; aluum expurgare na-
 ta sint, vt in multis vteri auersionibus Hipp. consuluisse constat: qualiter verò
 id fieri debeat, dictum est superius. Vt cunq; tñ sit, tensam partem vteri, blandis
 obstetricis manibus oleis perfricando ac comprimendo emollire, soluere stu-
 dendum est, donec tensionem ac dolorem quieuisse comperiamus, vel digitis
 per pudendum immissis si fortè os vteri distorqueatur: aut cucurbitis vmbilico
 apposis & emplastris pro matrice, ac suffimentis odoratis per vterum, & foeti-
 dis iuxta nares: quod quidem suffumigiũ maximi esse momenti experimur. Sic
 etenim vtendum est omnibus alijs, q̄ vterum tẽsum laxare habent & emollire:
 tandem ad experimenta obstetricũ veniendum est, ex quibus saepe nõ parũ vti-
 litatis in medicina reperitur. Praeterea in omnibus retractionibus vmbilico ap-
 ponere q̄ rebur & firmitudinem, vtero p̄stāt, uelut sunt emplastra pro matrice,
 q̄ ea lege conficies, q̄ retractionis cā p̄scripserit: nam flatus & frigiditas calida
 & tenuium partium exoptat: plenitudo, post euacuationem discutientia humo-
 rem: malignitas alexipharmaca vt theriacam, tandem omnis vteri retractione ad
 suum locum facillime refluit magnetis usu, maxime si vmbilico affigat. Sed in
 hoc specialem feminae conditionẽ intueri oportet quippe ex his nõnullae styra-
 celi quida, aliae galbano, aliae thecamaca, plures carana, & pleraq; odoratis gau-
 det & latant: quibus si alia adhibeas et pro rōne cāe ex usu uideant, nil proficies.

*magnetis u
 sul, laeicid
 uum foem
 uum reuert.*

De vteri imbecillitate.

Cap. 13.



ULTIS modis posse uterum imbecillitati, ijs omnibus com-
 pertum esse reor, quibus notũ est, quae sint vteri ipsius officia
 & quales actiones: nam iuxta quemcunq; actum, mille occasio-
 nibus à debito deflecti ac deficere cōspicimus. Sic primò qua-
 tenus pars simplex est, conficiendi ac commutandi proprium
 alimentũ munere, labefactari solet: quò fit, ut multis humidi-
 tatibus & superfluis purgamentis abudet, potentijs naturalibus lãgudioribus
 ractis.

A factis. Deficit et in communibus officiis, & quatenus instrumentale membrum est, præ impotentia earum facultatum, quarum munus est opera illa exequi. Inprimis continens vasorum vis, impotens redditur, quo tpe vel menses assiduo fluore dilabuntur, vel frequenter, & per crebra intervalla, vitio eiusdem facultatis nequeuntis onus continere, vel secernentis potentia irritata. Prolabitur quoque vel proprium semen, vel a viro susceptum: ut si concepisse videatur femina, post aliquot dies semen explodit, vel tentuiter efformatum fetum continere nequit, sed primis mensibus, dum aliquam gravitatem genitura nanciscitur, primo, secundo, aut tertio ad summum mense excernitur. Pari quoque ratione femina sic affecta virorum concubitu aut non amat, aut fastidit, quod si coacta viro iungatur nec delectatur, nec per sentit quicquam. Itaque et affectionem, uteri imbecillitatem appellamus, in qua uterus sua munia vel debilitat, vel omnino non operatur. Tamen licet in plerisque uteri affectionibus, ipsum in aliquo suorum munerum labefactari contingat, non tamen ob id uteri imbecillitatem, eum affectum nuncupamus, sed dum nullo affectu in utero sensibilibus existente, facultates temperamentorum vitio potissimum labuntur.

B Sunt quidem huius imbecillitatis duæ speciales causæ, una, quæ naturam uteri temperiem evertit versus aliquam quatuor qualitatum primarum: altera vero, nimius uteri labor, & spirituum vitalium ac caloris innati resolutio, velut in laborioso partu, aut frequentia abortu vel partu contingere solet, ut Aetius optime *Causa*, advertit: & ob id soluto nativo calore, robur quoque naturale deficere necesse est. Sic sane primæ quatuor qualitates, ubi modum naturæ, & debitæ temperiei excederint, robur uteri proculdubio deiciunt. Nosse tamen in hac re convenit non omnes distemperies quavis imbecillitatem posse efficere, sed unamquamque propriam, & determinatam. Quippe caliditas plus trahit ad uterum, quam conficere possit: ac si minus trahat, non conficit quidem, sed adurit, vel quovis alio vitio conspurcat. Frigiditas ne minimam quidem alimenti quantitatem conficere potest, & ob id crudis humiditatibus uterum abundare cogit. Siccitas porro sanguinem retinet, vel menstruum, vel semen plusquam oporteat, & ob inclementiam caloris siccitati ad iuncti nil conficit, sed exsiccat ut Hippocritus. Aphor. dixit text. 60. Humiditas autem neque sanguinem, neque semen contineri permittit, neque fetum adhuc: præterquam quod feminam viris ingratam ac citra ullam delectationem affectam reddit: & tandem in reliquis uteri officiis alia non pauca accidentia molitur.

C Dignosces proculdubio affectum in genere, ex fastidio veneris, ex flatu excretionis pudendum, ex errabundis mensibus, ex seminis prolapsione, & abortus frequentia. Menstruorum et tempore, pectinis, lumborum, & crurium gravitas adest, & ventriculus male habet, ex quo vaporibus ad caput delatis, aliquando deliria accidunt: & in summa similes vexationes ipsæ, quæ ab uteri strangulatione prodeunt, sustinent. Cæterum cognosces ex laborioso partu vel abortu imbecillitatem proficisci, sumpta ab assistentibus, & laborante relatione; ac simili modo, si ex partus frequentia succrescat, quod ostendit non minus totius corporis languor, sed potissimum laborum, & crurium. Caliditate malo causam præstare cognosces, quod partes pudende præcalide existunt, & reliquum corpus caliditate pollet: menses fiunt quæ paucissimi, & cum dolore, & nimia caliditate prodeuntes, ita ut pudenda mulieris exulcerent, quæ vero per uterum excernuntur, fetida, & nigriora existunt, & ob nimiam acrimoniam nullum servant ordinem, irritata, ab erosione, natura.

Fit

Fit quoq; fœmina ex hoc intemperamēto sicca & calidissima, & cū cōt, nō delectatur, q̄ vterus doleat. Frigiditatē verò prædominari discet obstetrix ex tactu oris vteri & pudendorū, mucore enī & pituita plena existunt, & os vteri veluti solidū sit ac sine sensu, ita vt obstetricis digitū persentire nequeat. Torpēt quidē inguina & partes prope os sacrū, & lūbi ac fœmore & crura: fœmina etiā pigrē incedit & tarda sit ad omnē motū: flatibus abundat, quos frequenter per vteri osculū excernit, ex quo prodit ex toto ablatas vel diminutas videri facultatum actiones, ita vt menses præ crassitudine omnino supprimantur, & prorsus sic affectæ, non concipiant: nā vt inquit Hipp. 5. Aphor. Quæcūq; frigidos & spissos habent vteros, hē non cōcipiunt. Verū fœminæ, q̄ humiditate plurima pollent, madidas flaccidasq; habēt pudēdas partes, mēses decolores & aquosi pdeunt: coitū non appetunt, nec, si cogantur, delectationē vllā sentiunt & semen statim projiciunt. Quæcūq; enim humidos habent vteros, inquit Hip. nō cōcipiunt, quod si semen retineant, mox abortiunt. Mœstē etiā sunt huiusmodi fœminæ, taciturnæ, ad omnē motum laxæ & impotentes ac veluti confractæ. Siccitatem quidē, ex his contrarijs facillē dignoscēs: quippe fœmina gracilis est, laboribus plurimū dedita, & menses q̄ paucissimos habens: hirsuta & ad venerē tardissima, & parū primo accessu delectatur, postmodū verò dū excitatur, difficulter quiescit ac subidet coeundi desiderii. Quæ oīa considerasse oportebit, vt seruata naturali vteri tēperie & ad pristinū statū reducta, vires facultatū elucescāt.

*Curan-
di ratio.*

Etiā si tanq̄ causam imbecillitatis vteri recēserim caloris, aut siccitatis intemperamentū, credendū cū hoc est, id me potius fecisse, vt earū qualitātū, cū in vtero à medio recedūt, curationē adscriberē, quā quod existimē prædictas imbecillitatis species hæc intemperamenta posse primo & per se efficere, licet alia non leuia accidētia quotidie inferant: præterquā q̄ & natiuo calore resolutō & spiritibus vitalibus dissipatis: calor plerunq; adeo vteri vires labefactat, vt deinceps ppria munia exequi minimē valeat, sicut cōstat conceptū impedire dissipato suscepto semine, vel laxatis meatibus statim pfuso, aut mēstruo nimis crasso facto, pp inuersionē, vel apertis nimīū venis prolapsō. Erit itaq; imbecillitatis triplex modus: vnus quidē agente aliqua distēperie, qua propriæ virtutis actus deficiat, cui primò subueniendū est: alter facultatibus ipsis lāgudioribus factis ex diminuto calore & resolutis spiritibus: vltimus verò, cū vteri corpus & substantia, laxior, mollior & infirmior ad ppria munia exequenda existit. Quæ sanē vitia & alia nō pauca vt quis mitigare possit, sūpto initio à caloris excessu, imprimis victū frigidū porrigere tenet, qualis ex lactucis, scariolis, borragine, cucurbita ac melonibus parari multis modis pōt: ex pullorū itē carne, & potu aq̄ hordeo seruofactæ. Cui vsui fore proficuū existimo, sanguinē ex venis tali, aut ex saluatella dextræ manus fundere, parē tñ, ne præsidio & morbo vires dissipent. Itē gratia cōpescendi calorē, frenandiq; humores calidos, studendū est singulis diebus exhibere syrupū cichorii, rosarū, portulacē, & violarū, ac decoctū hordei cū saccharo, tandē ijs, quæ bilē purgant, corpus inanire, vel paulatim exhibito rhabarbari diluto eū aqua lactis, hordei aut cichorii, vel exhibita cassia fistula, vel electario hamech sine scāmoneo & colocintide confectō, q̄ maximi p̄tiji in hac re & similibus arbitror esse. Quo facto, dorsū inungere oportebit vnguento rosaceo, vel refrigeratū ex Galeno, aut eo, q̄ ex cucurbitulis paratur: eadem

Adem ratione confert, vterum illinere oleo violarum vel de semine cucurbitæ, aut fouere decocto maluarū, hordei, rosarum, & violarum lana, vel spōgia, aut vesica excepto. Prodest quoq; mercurialis cū lentūcula palauistri, lumbis, & pectini imposita: item cerusa aqua trita, vel cum mucilagibus pſyllij liquata. **C**autere tñ oportet, ne vterus nimium refrigeretur, ob idq; necesse est sensim, paulatim, & per intervalla hæc adhiberi. Balnea item aquæ dulcis hunc vteri calorem plurimum cōpescere scio: quem nō minus exstinguit pessus ex albumine oui, adipe anserino, & oleo violarum cum g.v. opij. Quod si solā caliditatem vigere cognoueris, vt ex nimia pudendarum partiū frictione, exercitio, vel alia causa euidenti contingere solet, alterantibus solis vtendum est, citra sanguinis detractionem, aut expurgationem. Verū si diu durauerit huiusmodi distemperies, etiam si ex prædicta causa contrahatur, coniectandum est, humores quoq; calidos euocasse, aut effecisse, & vtendum est prædictis auxilijs.

Siccitatem calori finitimam (quæ ex alimenti consumptione, vteri duritie ipsum ad concipiendum inutilem, & imbecillum reddit) corriges per humida alimenta optimi, plurimi ac facillimi nutrimenti: ac per fatus, & infusiones aquæ dulcis, aut decocti alicuius humectantis: & per inunctiones ex oleo amygdalarum dulcium & sesamino, vel de semine melonum: ac per metrenchitas ex eisdem oleis, ex lacte, vel decocto aliquo pingui.

Verū tamen si frigiditas imbecillitati causam præstiterit, considerandum primò est, an sola existat, vel cum humorum frigidorum præsentia: quod frequentius accidere conspiciamus. Quod si hoc vltimum fortè sit, prouidendum est, ne ex calidorum adhibitione maiorem humorum copiam à toto corpore ad vterum euocemus, ac rursus ne eos, qui per vterum vagantur, fusos tenuioresvè factos, in maius malum prorumpere contingat. Quamobrem primò vniuersum corpus vacuare oportet ijs pharmacis, quæ pituitam expurgent, exhibito prius per aliquot dies melle rosaceo, à quo vniuersum corpus summo manè fricari ac exerceri conuenit. Si tñ ex ventriculo vterum humores susceperit cognouerimus, vomitibus illi prouidendum est origani aut thymi decocto ante, & post cibum, ac deniq; oī studio ab eo pituitā euacuare bis terve in hebdomada vomendo, studendum est. Verū sine hæc quidē profuisse videantur, vterum ipsum purgabis p ea medicamenta, quæ id munus per epicrasim præstare nata sunt. Cuius naturæ sunt aloes, agaricus, hiera simplex Gal. cartā pulpa, vel pillulæ ex prædictis pharmacis cōfectæ. Quem et vsum præstant incredibili efficacia terebinthina abietis lota cum modico rhabarbaro. Quibus factis, ad ea medicamenta confugiendum est, q̄ vterum, & ventriculum calfaciant, simulq; humoris frigidi reliquias conterant ac digerant, veluti decoctum cumini, anisi, pulegij, piperis, epithymi, dauci, perroselini, castorei, & seminis ac radicis angelicæ. Præstat et puluis ex eisdem confectus, ac facta leui super ventrem inunctione, sparsus. Ex usu quoq; est theriaca, mitridatum, & pleraq; alia ex ijs, quæ cap. de epilepsia ex utero, præstare diximus. Confert, & puluis corticis citri, aranciorum, & gariophyllorum, uel pastilli ex eisdem confecti cum modico saccharo, & cinnamomo. Post q̄ uentriculum foueto ex uino, uel aqua calida, in qua ferbuerint artemisia, ruta, saluia, cinnamomum, ciminū, pulegium, cyperus, acorū, & radices ac semina angelicæ. Ex usu quoq; est uentriculū pecti-

nem

ne, & inguina inungere oleo irino, amatyeno, cyperino, de angelica, liliorum, ruta, & de baccis lauri: sed pretiosius est, qđ ex cinnamomo cōficitur, aut qđ ex angelica herba viridi cū radicibus, & paucō semine paratur: vel de aniso, de gariohyllis, de nuce muscata, oleo piperino, vel macis, qđ oīa extracta duplici vase, facta prius aromatū in aqua, & vini pari portione, sufficēti maceratione, mirū in modum prodesse scio, verū si ex his vltimis cum modico vino aliquid sumatur maius te prāstiturū beneficiū existima. Quibus inunctionibus aliqñ admiscere oportebit aquā mulsam, aut marinā cum modico aceto: qđ omnia molli lana, vel spongia, aut vesica sunt excipienda, calidāq; actū adhibenda: quorum sanē quantitātē, aut efficacīā adaugebis, vel minues, prout affectus grauior, vel diuturnior, aut faciliior, vel nouiter factus fuerit. Postquā autē hac adhibueris, nō erit abs re suffumigijs, & euaporationibus vti, sumptis per arundinē, aut infessionē. Quas conficies ex eisdem herbis ac rebus, quibus pulueres, & fomenta constare diximus: additis ex styrace, & alijs aromatis calidis quantū sat sit. Item pessaria ministrabis, qđ ex calfacere, & expurgare vterum possint, qualia conficiuntur ex succo mercurialis cū aliquo ex prādictis pulueribus, styrace, theriaca, aloe, & agarico cū modico melle. Regioni ē vteri, & vmbilico admoouere oportet emplastra, cerata, & sacculos, qđ & vterū calfaciant, & roborent, qualia antea recēsuimus, & mō referā, si prius dixero quid aduersus humiditatē agēdū sit. Antē tñ scito, balnea ex sulphure incredibili efficacīa vteros frigidos sanare.

Humiditatē quidē, & madorem vteri haud dissimili mō curabis: quippe totū corpus purgare prius, fricare, exercere, & tenuē, & exsiccatē victū, atq; parū potū ex decocto sparte parellae, aut radicis chinae, vel cinnamomi, aut anisi cōfectū porrigere procul dubio oportebit. Purgabis quidē primō hiera, pillulis aggregatiuis, agarico, rhabarbaro, aloe, electario indo, vel diaphenico. Quo facto, vomere, sed frequētius, qđ in frigida distemperie, opus erit: rariū tñ fomētis & balneis prāterquā sulphureis, vti cōceditur: liberalius tñ licet suffire, vel sicca fomēta, & sacculos adhibere: quos cōficies ex sale, millio, chamæmello, anetho, pulegio, artemisia, thymo, cinnamomo, ruta, baccis lauri, & stercore caprino. Ex quib. emplastra cū vino, & melle cōficere poteris, & cerata cū oleis supradictis, ladano, therebinthina. Cauēdū tñ est, ne statim à principio pharmaca hac astringētia, & resiccātia adhibeamus: nā corpore impuro existēte, nō parū lædent humoribus pter naturā modū detētis, & ad principales sedes irruētibus. Quare prius purgādū est, & mox prādictis, & astringētibus vtendū, quale est decoctū lētisci, & myrti, rosatū, summitatū rubi, & poligoni: quo sanē decocto & pos sūpto, & exteriū adhibito nō parū pfeceris. Itaq; vltis medēdi rō erit, inūdātē à toto corpore, à vētriculo, & ab utero ipso humiditatē prius minuere, postea resiccātibus, qđ superest discentere, ac ebibere. Tñ qđ sepe sufficere nequit, cōprimere, qđ ad os nuluē cōfluit necessum subinde erit. Quod si aliūde in uterum humiditatem cōfluere noneris, astringētibus potionibus post dictā methodū uteris, veluti est myrti bacca, vel malicorium cū uino, & alia nō pauca, qđ li. i. c. de mēstruo fluore diximus. Prodest quoq; exteriū uterō adhibere adipē anserinū cū aniso triū, lana exceptū: theriacā itē, mitridatū, vel suffumigia, quae ad mēses sistendos illie reuulimus. Sed ultimō in frigida, & humida uteri distemperie nil tutius, aut utilius reperies, qđ sulphurea balnea: quanquā corpus uni-

uer-

A uerſum ſudare ligno guayaco, ſparta parella, radice china, uel ſyrupo ex eiſdē, aniſo, & ſemine angelicæ confecto, ſummopere proficuum comperimus. Si tamen hæc non prodeſſe videantur, ad fontanellas conſugiendum eſt, quas cruribus eſſe aperiendas cenſeo.

Sed vltra ea, q̄ aduerſus qualitates, & cauſas, q̄ vterum imbecillant, pugnare habent, multa quidē ſunt, q̄ vterum ipſum roborant, vel præſtantia, quod illi defuerit, vel adimplentia eiꝯ munus, & officiũ. Sic vterũ roboramus euectis calore, ſanguine, & ſpiritibus, & firmata ac ſtabilita vteri ſubſtantia: cuiꝯ naturæ creduntur eſſe omnia aromata, q̄ & modicum calorem, aut parum vltra modicum habent, & quodammodo firmare, cõprimere, & ſtabilire vterum ſunt nata. Cui ſanē vſui reperiẽs vtilẽ eſſe oēs gummi ſpecies, ſiue q̄ ex Indijs aſportentur, ſiue q̄ apud nos naſcantur, & cerata itē ac emplaſtra pro matrice, q̄ vulgari ter in officiis parantur, & nos cap. de epilepſia abunde adduximus, & ferè reliqua, q̄ ex gummoſa ſubſtantia, ladano, pice, reſina, vel terobinthina cum pulueribus aromatum, & oleis ex ruſis ſiccis, narcifſo, cinnamomo, de baccis

B lauri, de lilij, de angelica, de mentaſtro, de ſtyrace, de iaſminis, de naphtha, & alij, q̄ cõſimilẽ habent virtutē, paſſim cõficiuntur, & ipſam liquid i ſtyracē. Sed maxime quod recipit olei iaſminorũ, aniſi, & cinnamomi, ac gariophyllorum, arte chimica extracti, ana ꝑ. j. ceræ, & ladani. q. ſ. v. fiat cum reſina, ceratũ. Roborant itē theriaca, mithridatum cũ diamoſcho, diambra, gallia muſcata, alypta muſcata: moſcus, ambra, zibetũ, & deniq; ea emplaſtra, q̄ p matrice ex his, & pulueribus ſupra dictis cõficiuntur, & in pleriq; huiꝯ operis c. variẽ cõpoſita reperiẽs: maxime quod recipit, pulueris granæ, & gariophyllorum, an. ꝑ. j. ſ. pulueris roſarum, coralli, & angelicæ, an. ꝑ. j. pulueris maſtices, & ſanguinis dracõnis, an. ꝑ. j. ambre, & muſci, an. g. x. ladani depurati, & ceræ. q. ſ. v. fiat emplaſtrũ: roborat quidē mirum in modum, & genituræ retentioni opitulat, renibus adhibitum, & ppe inguina, ac vmbilico. Robur quoq; vterõ addunt ſacculi ex herbis ſiccis, ex aromatis, & pulueribus. Sed efficaciffimẽ id beneficiũ præſtat cucurbitula, frictio, fomentum, & ſuffius; & vltimò aſtringentia prædictis aromatis admixta, q̄ cõprimẽtis facultatis, & cõtentricis deiectionis munus ſuppleant, & exe-

C quantur. Quorum oĩum maximã ſiluiã, c. de ſiſtendis menſibus reperiẽs, ex quibus & nuper dictis facilẽ tibi erit varia effingere medicamenta. Hoc itē vnũ in omni corroboracione adſeruabis, ꝑ ſi imbecillitas in diſtẽperie, q̄ actum facultatis præſternat, ſita præcipuẽ ſit, ijs maxime vtendum erit auxilijs, q̄ aduerſus diſtẽperie iuxta cuiꝯq; naturam pugnent, eo quẽ diximus; modo: verum ſi debilitas in ſpirituum reſolutione, aut caloris innati diſpendio cõſtiterit, vt defellis, & laborioſis ſceminis, & ijs, quæ frequenter pariunt, accidere ſcimus: ijs, quæ calfaciant caloremq; & ſpiritus ad vterum euocent, aut vicẽ caloris innati gerant, vtendum eſt. Si verò vteri ſubſtantia laxior facta fuerit, minusq; firma, ac robuſta ad actiones, quàm par ſit, aſtringentibus ſtudentum eſt id munus adimplere. Quas equidem medendi rationes qui exactẽ nouerit, facilẽ prædictis diſcet vti pharmacis, & ex eis, quẽ vſui propria fuerint, eligere, & cõponere, aut mutare, vel addere, aut demere, iuxta ſceminæ, aut vteri affecti, vel affectus conditionem: quod ſi hæc ignorauerit, fateatur ſe non poſſe, etiamſi mille noſcat medicamenta vtero proficua, aliquod vtile, aut neceſſarium effingere.

De

De varijs vteri doloribus.

Cap. 14.



IN CREDIBILE profectò est, quali & quanta dolorum varietate circa vterum, & eius partes conqueri fœminas conspiciamus: ita vt sine alterius affectus à quo dolor oriatur, qui peculiarem prærequirat curationem complicatione, solus ipse dolor suam curandi, aut (vt rectius loquar) mitigandi rationem expostulet. Frequenti enim obseruatione nobis còpertum est, et si dolorie vehementissimi sint & grauissimi, affectionem tamen, seu solutionem contnsui leuissimam, aut q̃ paruissimam, doloribus solum proficiscētibus fœuissimis ex partis dolentis natura, vel ex causæ malitia, quæ hac potius ratione, q̃ vt continuum dilacerante, dolorem excitat, leuissima facta solutione. Cui consimilem dolorem in hemicranea & alijs importunis capitis doloribus, frequentissimè reperimus: qui sanè ex leui humoris, vel halitus portione sola ipsorum malitia grauissimos cruciatus excitat. Quod proculdubio in vtero frequentius adhuc contingere est æquum: nam & causæ maligniores, & venenosiores ibidem existunt, & particula non obtusioris sensus. Itaq; de his tantū doloribus hoc in loco agere, mihi est in animo, qui vterum affligūt citra affectus complicationem, qui peculiari sui rationem requirat prouidentiam, uelut est inflammatio vteri, ulcus, inflatio, & alij consimiles morbi, quorū inferius meminero, & dolorum, qui ab eis proficiscuntur.

Causa.

Dolet quidem vterus citra manifestum affectū, ad quem dolor reduci possit (præter dolorē ex sanguine menstruo non fluente, aut improbè expurgato, cuius curationem adduximus lib. 1. cap. proprio) ex halitus à semine, sanguineve menstruo corrupti malitia, vel ex eorundem copia, quæ aut distendat vteri vasa, aut abradat, & mordicet eadem & vteri corpus. Non quidem vtcunque, sed addita et venenosa affectione, quæ doloris malitiam adaugeat, & animi quoq; passionem maiorem inferat, ita vt nullis videatur auxilijs cedere. Dolet itē vterus ex grumoso sanguine, qui dolorem proculdubio duobus modis inferre habet: primò ratione corpulentia, qua angusta vteri vasa permeare nequit: quo fit vt in via manens, fixos, & acutissimos inferat cruciatus: si uerò permeet, non minores, caterū uagos, à quibus aliquando quiescit, præsertim grumoso sanguine excreto: secundò lædit grumofus sanguis uitio & malitia non leui, quamobrem dolore simul & animi accidentibus & anxietate fœmina premit. Alijs quidem uterus ex inæquali plenitudine dolet, eò quòd in diuersis partibus diuersam obtineat plenitudinis rationem, & copiam, quod plerunq; acerbissimi doloris causa existit. Sunt quoq; fœminarum nō pauca, præsertim inter uiduas, & eas, quæ ante uiro assuetæ, nunc se abstinēt, quibus dolores, & cruciatus ex coitus priuatione succrescant: quippe semen præter consuetudinē retentum corrumpi, & uasa plus iusto dilatari ac tristari, delectationis et defectu contingit, quòd semen illud uterū lædere malitia & copia necessum sit. Item plerisq; dolor accidit ex acribus & erodētibus humoribus cū sāguine mēstruo dilabētibus, q̃ aut copia & acrimonia mordacitate illata, cū uteri aut pudēdorū pruritu, dolores ingētes, potissimū mēstruo instante, inferuat. Nec minus dolore

Alore afficiuntur foeminarū quaedā, dum viro accedunt, si uterus à qualibet causa intumuerit. Quod Moschio lib. Gynæciorum, c. 19. exprimit dicens: Si mulieris loci doluerint, aut vulua p coitum punctiones senserit, sciant, sibi vuluā in tumore esse, magis tñ in interiore parte, q̄ foris (& subdit) Huius rei signum est tale: oculorum anguli dolebunt, & facies ignea plusq̄ pallida, & hoc vitium erit bescunt medico fateri. Qd sanè malum existimo plerunq; fieri in foeminis, quae obstructione vteri, p̄sertim colli eius, laborant, ob plenitudinē quidem pudendarum partium, & vteri ex sanguine propter obstructionē ibi dē immorantem: quippe dum quiescunt partes illae etsi plenitudine premantur, non dolent, ceterum motu coitus exercitio, dolent: haud secus q̄ in lassitudinibus, in quibus maiores sunt moto corpore cruciatus, q̄ quiescente. Sic etenim in huiusmodi foeminis plerunq; sanguis profluit, vt refert Hip. lib. de sterilib. dicens: Si verò à coitu inum ventrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen tuls i & muscum mollem, & adipē anserinum, mixta ac molli lana excepta imposita. Quod vitium, dum sanguis prosilit, cenfeo in extimis corporis partibus esse potius, q̄ in intimis. Eandem prorsus affectionem humores acres, sed in parua quantitate, efficere cōperimus, quos dum virile pudendum mouet, certum est graues dolores excitari. Solent quoq; cruciatus haud leues efficere externae causae, veluti frigiditas aeris, vtcunq; uterum subingrediatur: itē infessus in loco frigido, aut nimis humido, ablutio pedum intēpestiua ex aqua frigida, uel nudis pedibus in loco frigido stare: maximè dum menstrua fluunt, aut mulier à partu purgatur. Nā ut 14. de usu partium Gal. testatur c. 3. uteri ceruix recta, & adaper ta est, cum aliis temporibus rugosa, & plicata existat, quod ut 3. de facul. na. c. 3. ait, plurimum facit, ut facilius sit frigori aditus. Potus et frigidae intempestiuus, maximè si foemina calidior ex tempore, aut exercitio, uel igne steterit. Aceti & acidularum rerum usus, aut lactucae, vel acetariorum immoderantia. Quibus proculdubio causis, & alijs non paucis, quas breuitati consulens praetermitto, dolores, qui iure sibi curationem exposcunt, fieri comperimus.

C Nosse q̄ studet huius affectionis causas, primò doloris modū expendat opus est: mox durationē: ultimò symptomata, q̄ illi accidunt: nā ex his tribus facile in causa cognitionē deueniet. Dolores ex copioso flatu dignosces ex tēsiua doloris cōditione, ex rugitu inferioris ventris, & ex cruciatibus, ac exacerbationibus p̄ interualla factis. Qd optimè Hipp. insinuas se cōstat, p̄ haec uerba: Si dolor solum fuerit vehemens, & uiolentus, caligo in uteris inest, & flatus nō exit, sed iste hic manet, malum. Qu i et causam cognoscere docet idē autor li. 2. nuper adducto dicens: Si uentus in uteris fuerit, flatus exit, & stridet, & tota intumescit, & febris habet, & ardor, & adhuc ualde exilit p̄ dolore, & uirū nō admittit, & agrè fert coitū, & erigi non pōt, & uelut onus graue ipsi in uteris iacet, & caput dolor, et anxia est, et loqui non pōt: si uerò dolor accesserit, clamat, et dolet oīa, et lumbos, et pubē, & sedē, et urina supprimitur, et uenter suffocatur, et mori cupit, et p̄cordia distenduntur, et stomachus mordetur, et os amarum est, & uomit acida, et pura, ac meraca, et frequenter ructat, ac melius habet, sin minus intumescit, et si attingeris, renititur, et dolet. Proficisci et huiusmodi dolores ob malam flatus qualitatem scimus, & ex animi aliquo uitio, inquietudine, anxietate, iactatione, et exolutione. Grumosū esse sanguinē inter alia signa, dignosces

R ex

ex dolore cū tenesmo vteri, & frequēti ēt vrina: nā cū natura nitat grumofum il-
 lud expellere, idq; ob loci angustia nequeat, semp conat natura munus exple-
 re: vnde ob assiduū conatū, partes vicinē quoq; tenesmo affici haud rarō cōtin-
 git, pter q̄ qd dolores acutissimi, veluti si palo, aut acuto aliquo stillo vterus p-
 foret, plerunq; suboriuntur. Quod ēt agnosces, ex eō qd dolores fixi sunt, & in
 vna parte pmanentes, nisi aliqd grumofum excernatur: nā co tēpore licet vehe-
 mētes quoq; sint, p interualla tñ repetunt: quod quidē ab ijs, q̄ excernunt, si gru-
 mosa sint, haud difficulter cognosces. Verū quia nō solū corpulentia, sed &
 malitia saepe grauiore dolores sanguis grumofus cōcitare solet, id ēt cōiectam
 dum erit ex animi accidentibus, q̄ mox succrescunt, & potissima sunt malē qua-
 litatis indicia. Quod si dolor ex coitus priuatione suboriatur, hysteriis accide-
 tibus, & signis, & ex pgressa vni cōsuetudine facillē dignosces. Si tñ dum viro
 fa mina accedit, vterus doluerit, plenitudinē illarum partium esse causam, ex tu-
 more pudendarū perdisces, sicut ex prurito cum dolore humoris acrimoniam,
 nisi vlcus, aut inflāmatio, vel angustā, & durā cicatrices ex pgresso vlcere cau-
 sam praestiterint, quod ex proprijs signis facillē erit exquirere. At si ab externa
 causa dolorosa affectio prodeat, ex relatione signum tibi queres.

Curandi
 ratio.

quaedam
 medica pēp-
 anodyna saxe-
 pūae coacta
 ut calore ita
 tempore ut
 calorem nō pa-
 tiant quā
 similitudine
 aut calorem
 pūae cal-
 facientium
 anodyna nō
 saxe-
 anodyna

Cū in symptomatū mitigatione triplex sit medendi rō: altera, q̄ causam illi-
 dit: secunda, q̄ morbū, immediatā symptomatum causam, curat: tertia verō, quē
 citra causę, & morbi respectū, tantummodo symptomati puidet, mitigatq; eius
 inclementia: ob id quidē hac in parte eius tātum, q̄ symptomata mitigat, aliquo
 habito respectu ad causas, meminisse cōuenit. Sunt etenim medicamēta sedatiua
 dolores, quādā quā oībus profunt à quacūq; causa pificiantur: q̄ calore ita
 tēperato cōstat, vt calori nostro nativo, q̄ simillima sint, aut saltē primum calfa-
 ciunt: re affectarum tristitiā, molestāq; sensationē abolent. Expedit tñ tenuiū esse par-
 titiū hac pharmaca, nihilq; habere astrictionis, vt pariter euacuent, rarefaciāt,
 extenuent, digerant, cōcoquant, & æquabilē, sensum, & moderatione quadam
 materiā & partē dolore vexatā, reddant. Huius quidē generis sunt oleum dul-
 ce ætate mediū, chamæmelinum, de semine lini, amygdalarum dulciū, & lūbri-
 corum: itē sambucinum, sesaminum, butyrum, lana succida, vitellus oui, ac mu-
 liebre, pinguedo porci, vituli, gallinæ, anseris, cuniculi, decoctō altheę, maluę,
 violarum, lilij, seminis lini, fœnu græci, & huius naturæ pleraq;. Hæc nanq; vt
 latius li. 2. nostro de indic. diximus, sibi peculiarē operādi rationē habēt, oībus
 quidē causis, & tēperaturis cōem. Aliud ēt pēculiaris obtinent, nimirū, q̄ nul-
 lum habent tēpus circūscriptum, quo magis adhiberi desiderent, q̄ in alio, li-
 cēt tutiora sint corpore, utcūq; vacuo, cum hoc tñ plenis quōque corporibus
 profunt. Habent insuper pēculiaris aliquid videlicet, aliqn solum esse anody-
 na, cum dolorem tantum mitigant, aliqn verō esse affectum sanantia: nam pter
 id q̄ partem parant, vt minus sit dolori apta, affectus quoq; causam æquabilio-
 rem mitioremq; duplici ratione reddunt: tum ex similitudine, quā cum nō-
 stro calore habent, quā acrimoniam, & quemuis excessum retundunt: tum ve-
 rō, quod primo calfacientium ordine constituantur, & ob id per insensilē ha-
 litum lenitē, quod in parte dolente continetur, discutiunt. Itaq; primo in quo
 nis dolore mitigandi gratia, & oleis fomentis, & emplastris, aut ceratis ex ijs,

quē

A qua superius retulimus vtendū est, pmissio tñ enemate, qđ cōsimiles hēat vires. Alterū verō anodynorum genus eorū est medicamentorū, q̄ contra doloris causam ē directo pugnare habent: nā euacuant, digeruntq; quod in parte cōten- tum est, & dum quantitatis, aut qualitatis, rōne dolor excitatur, certant quidem aduersus vniuscuiusq; excessum, frigidā calfaciendo, & calidā refrigerando: ac si venenosa steterit, malā qualitātē corrigendo. Quamobrem nosse oportet cu- iusq; doloris causas, vt iuxta cuiusvis naturam proficua auxilia adhibeamus.

Sic dū ex flatus copia nobis cōperū fuerit vterum dolere, p̄dictis verō ano- dynis ea cōmiscere studendū est, q̄ aduersus causam pugnant: & sensim immi- nuta anodynorum copia, solis q̄ causam superant adhibitis, p̄dicta ratione in- stitues, donec aut ad expurgans medicamentum, aut ad sanguinis detractionē, si affectus postulauerit, deuenias. Quae sanē opera iuxta eas partes facies, q̄ vte- ro sint p̄ximiores, vt Hip. v̄ cōsulare li. 6. pop. par. 6. tex. 5. dicens; In doloribus p̄ximum ventrē aperire: nā eo tēpore, nisi quid aliud phibuerit ab his venis, & p̄ eas partes, q̄ vtero sint viciniore, euacuādum est. Primum itaq; clysterē inij- cies ex decocto althææ, anethi, feminis lini, chamæmeli, feminis, & radicis an- gelicæ, menthastri, & artemisæ, additis melle, & hiera picra cū oleis anethi, li- liorū alborū, chamæmeli, de semine lini, de baccis lauri, & alijs huius cōditio- nis. Vel in ipsum vterū inijcies decoctū origani, petroselinī, nigellæ, cumini, san- suchi, iuniperi, dauci, helenij, apij, anethi, anisi, sp̄cæ nardi, nucis, cinnamomi, smyrnij cū modico vino. Mox à clystere iniecto, si affectus nō quieuerit, fomentis ex p̄dicto decocto vtendū erit spōgia plurimū expressa, aut velica exceptis. Itē inunctionibus vteris ex eisdē oleis cū oleo cinnamomi, vel amygdalarum dul- ciū, in quo semina, & radix angelicæ ferbuerint: p̄stat & oleū de naphtha, de ias- minis, de styrace, & balsamo. Præter hæc, emplastra vtero adhibebis ex p̄dictis herbis in puluerē redactis, decocto aliquo flatus discutiente ex cumini, aniso, anetho, galanga, gariophyllis, & similibus cōfecto. Idē quoq; beneficiū p̄stabis si ex pulueribus nup̄ dictis, & ouorū vitellis cū oleo liliorum alborū cataplas- ma cōfeceris: quē vsū p̄stat euaporatio ex p̄dicto decocto excepta: itē cucurbi- tula cū multa flāma ventri imposita, si menstruæ purgationes nō instent, neque fluant. Maximi ēt semper fuit momenti, vmbilico emplastrū aliquod p̄ matrice affigere, cōfectum quidē ex tecamacha, & caranña, styrace liquida, balsamo, la- dano, cinnamomo, & pulueribus radicis, & feminis angelicæ cū oleo de baccis lauri, de cinnamomo, & cū gallia, alypta, terebenthinā, ac cera. Vel vtrunq; ven- trē inungēs oleo de angelica, de aniso, de cinnamomo, de gariophyllis, & de pi- pere vel p̄dictorū aromatu, aquā arte chimica instillatā porriges. Præstat nō mi- norē gratiā siccorū fomentorū vsus ex lineis, & laneis pannis sup̄ calfactis, ex sacculis quoq; cōfectis ex puluerib. herbarū, seminū, florū, & radicū, quas nup̄ diximus. Qđ si hæc prodesse nō videantur, vtitur consilio Hip. li. de nat. mul. di- centis: Si vterus dolet alij caput integrū, & nitrum tostū, & cuminum teritū, & melle subacta subdito. Cuius ēt p̄cepto paulō inferius suffitibus ex peucedā- no, aristolochia, panace, & similibus vtendū est, vel enaporationib. ex decocto ligni guayaci, qđ maximi esse momēti arbitror, p̄sertim si femina morbi galli- ci naturā redoleat. De yride quoq; fert, i. sam pur are pessō impositam, ac eius dolores sedare, vel emplastro admoti: menses itē euocare, & abortum facere.

R 2

Quia

Quia tamen ex pituitosis recrementis, vel flatus eleuantur, vel vterus dolet, ob id ea clysteria sunt adhibenda, quæ cap. de vteri hydrope scripsimus, maximè si addideris vinum, vel in decoctione, cortices fabarum, & lupinorum, aut lixiuix aliquid, si laborans valde sit humecta, fugiendumq; ab his quæ sal recipiunt, ne ocysimè ad excretionem vrgeant.

Si tñ febris accesserit, quæ neq; calore proprio id mitigare possit, neq; remedijs affectio cedat, ad sanguinis detractionem confugiendum est, præcipuè ex partibus superioribus, si menses nō instauerint: nam eo tpe ex venis tali mittendus est, ne dolorū vehementia vterus inflammatione periclitetur. Quod si neq; febris neq; ardor, neq; menses imminētes instauerint, ad purgationem ex hiera simplici Gal. pilulis de mastiche, aut syrupo ex infusionibus rosarū cū modico agarico deueniendū esse consulit curandi ratio: q̄ docet plus præualere crassos, & viscidos humores, à quibus flatus eleuantur, q̄ calidum, & discutientū phar macorū vehemētiam, q̄ sepe maius damnum, q̄ incommodum sequi soleat, corpore, aut vtero impuris existentibus; Si verò aliquid eorum, q̄ flatus discutunt præbere volueris, nil subinde nocebis, veluti est vini optimi parum, vel decoctum seminis anisi, cumini, dauci, gariophyllorū, cinnamomi, & similiū, maximè si calidū actu sumatur. Prodest, & puluis prædictorum seminū, vel dianis son, diaciminō, & aliorum, q̄ his sunt simillima. Sed ex vsu inter oīa potissimū est aqua vitæ modicum, vel aqua cinnamomi, q̄ à Lusitanorum Indijs asportatur, ex flore ipsius arboris, aut ex cortice instillata: quæ èt apud nos chimica arte ex cinnamomo extrahitur. Verūm si ex flatus acrimonia, aut malitia dolores concitentur, veris anodynīs vtendū quoq; est, admixtis tñ alexipharmacis calidis, cuius naturæ est theriaca, mithridatū, semen angelicæ, vel eius radix, & huius naturæ alia, quæ superius cap. de hystericis affectibus à nobis dicta sunt. Quem quoq; vsū præstat oleum cinnamomi, angelicæ, garyofillorum, piperis, & anisi, quæ etiam deuorata ex vino, prodesse scimus; Sed maximè aquam ex theriaca extractam, cuius meminimus, lib. de febre maligna.

Si tñ ex grumoso sanguine cōcretōve, aut efficiēte inæqualē plenitudinē vterus doleat: præter quā q̄ huius causæ quoq; meminimus, lib. 1. ca. de menstruo cū accidētib. id proculdubio semper est in curatione obseruādū, vt partes vteri laxētur, & viæ patētiores fiāt, & sanguis tenuior, ac plenitudo æquabilis reddatur. Qd fieri oportet, vt Aetius cōsulit li. 4. Ser. 4. c. 63. p ea medicamēta, q̄ cū vapore humido calfaciāt, & modicè attenuēt: ob id fēminā in loco calido reponi iubet, & femora ac vteri regionē vaporib. fomentis, inūctionib. & balneis modicè calfacere. Ceterū si prædictæ plenitudinis aliquid superesse cognouerimus, sanguine prius missō, vt c. adducto diximus, ad eadē auxilia cōfugiemus cōnates euaporationib. partes dilatare, laxareq; eadē inunctionib. & modicè attenuātib. pharmacis grumofum sanguinē attenuare, & insecindere. Quamobrem adhibitis decoctis, q̄ mox attulimus, veniendū est ad inūctiones ex oleo de croco de spica, de vitellis ouorū, de lilij, amygdalarū dulciū, & de semine lini, maximè si in his duob. vltimis ferbuerint mēthastrū, anethū, semen aut radix angelicæ, cortices citri, aut cinnamomū. Conferunt euaporationes ex prædictis herbis aqua, & oleo decoctis: itē fomenta, & sacculus, ex eisdem. Theriaca quoq; prodest vmbilico, & imo ventri illita cum oleo sesamino, naphthæ vel de croco.

Sed

A Sed euaporationes huic vsui cōmodiores conficiuntur ex iure pingui galli veteris decocti cum multo croco, & cinnamomo, gariophyllis, semine lini, althea, & fœnu græco, qđ maximi fore momenti existimo. Præstat possumere haustum aquæ feruentissimæ, vel decoctū seminis angelicæ: itē theriacæ 3. j. aut 3. s. cum vino, vel p̄dicto decocto, vel iure galli veteris ex croco, cinnamomo, passulis, & ciceribus cōfecto, vel aquā theriacalē, aut cinnamomi, anisi, gariophyllorū, & dauci, quas arte chimica in duplici vase extrahes. Rutā quoq; (inquit Aetius) tritā, ac melle excerptā & panno lineo inductā pubi, ac pectini impositā, pdesse cōperimus: sicut & clysteria ex p̄dictis decoctis, ruta, fœnu græco, & aliquo ex p̄dictis oleis admixto. Cōferunt potissimū in plenitudine inæquali cucurbitulæ citra scarificationē inguinibus, ac femoribus adhibite, vel si hæc nō pfuerint, cum scarificatione ex vsu erunt: sicut hircudines parti scarificatæ affixæ, sed p̄cipuē hemorrhoidibus. Verū si huic affectioni aliquod animi pathema succrescat, per alexipharmaca superius adducta mitigare oportebit.

B Dolores autem, qui ex erodentium, & mordacium humorum præsentia suboriuntur, nullo alio auxilio citius mitigabis, q̄ potibus & fomentis humidis, & calidis, earum p̄sertim rerum, q̄ mulcebrē, & mucilaginosam obtineat substantiā. Ob id quidē prodesse scimus infusiones decocti fœnugræci, seminis lini, altheæ, ac radicū maluarum, & altheæ cum semine citoniorum, & psyllij. Itē fomenta ex eodē decocto: inunctiones ex pinguedinibus, & oleo amygdalarū dulcium, sesamino, de semine melonum, & cucurbitæ, potissimum si in eis mucilaginem seminis citoniorum, & psyllij extraxeris. Conferunt et clysteria ex p̄dictis, potus item aquæ calidæ, aut vsus amyli. Quod si hæc minus q̄ par sit, p̄sint, ad purgationem citō te conferes, quam institues iuxta ideam humoris peccantis: qua facta eisdem vitur auxilijs, & per intervalla iterum corpus purgabis, sed præstat pessus, qui recipit opij aliquid dum diu ibidem nō immoretur: prodest qui paratur ex decocto capitum papaueris in p̄aso, vel oleo rosarum cum medulla ceruina. Itē vnguentum rosaceum cum suco plantaginis, & intibi. Deniq; vniuersa mitigandi ratio in hac causa stat in attemperamēto humorum, reuulsa eorum acrimonia, ac in mixtione alicuius optimæ substantiæ cum humore acri, & mordaci, ac vltimō in expurgatione superabundantis succi. Sic profectō in hac & reliquis dolorum causis victum institues, in flatibus tenuē, & calfacientē, in hac verō causa, optimi & multi nutrimenti, ceterum fluidioris substantiæ; reliqua verō ad victum pertinentia, causæ natura monstrabit.

C His tñ, quibus uterus dolet ob viri accessum, subuenire oportet iuxta naturā causæ dolorē, aut tumorē excitantis. Sic etenim si ex tumore intus recōdito dolor suboriatur, p̄ter generalē prouidentia, peculiariter huic malo medeberis, vt Moschio libro Gynæciorum docet his verbis: Mulieris lac, q̄ masculini peperit, cum oleo rosaceo æqualiter misce, & calefacito, & hinc fac pessarium de lana molli, & appone vsq; ad caput vuluæ. Verum si sanguis à coitu exeat, p̄ceptū Hip. seruare oportet, qui lib. de sterilib. vt superius retulimus, inquit; Si verō à coitu immū ventrē dolet, & sanguis recēs ipsi apparet, lini semen tritum & muscam mollē, & adipē anserinū mixta, ac molli lana excepta imposito. Reliqua verō p̄ causā rōne ministrabis, sed nullum aliud auxilium efficacius reperies, quā sanguinis detractionem ex hemorrhoidibus, vel ex talo, maximē cum san-

guinis abundantia in uteri collo, malo causam præstiterit, à quo quæ emol-
liant, & digerant pefaria administrabis, vel ea quæ vterum leuiter expurgent.

Curabis verò eas, quæ ex aliqua externa causa dolent, si pugnaveris aduer-
sus cuiusque causæ naturam oppositis auxilijs. Calfacere enim vterum per cly-
steria, inunctiones, & fomenta, ex usu omnibus fuit: & ob id inspecta causæ
natura, facillè cuius erit, proficua auxilia excogitare.

Veruntamen si his omnibus factis, adhuc perstare dolores (ex quavis causa
prodeant) videantur: tertio anodynorum genere uti erit necessum, quo narco-
tica auxilia contineri dictum est. Eò enim vehementiæ dolores sæpe veniunt,
ut nullum aliud subsit refugium, quàm ad hæc stupefacientia pharmaca deue-
nire: & ob id ad philonium Persicum, aut Romanum, vel syrupum papaveris
confugiendum est, ea lege quam nos adduximus, lib. 2. nostro de præsid. indi-
ca. ad quem locum confugiendum est.

De vteri hydropis.

Cap. 15.



INTER omnes antiquos viros specialius Aetium vteri hy-
dropis meminisse constat. Quam sanè affectionem finitimam
ei, quæ in ventre fit, esse proficitur, eamque fieri ex aquoso
humore, à sanguine menstruo retento, procreato censet, ac
generationis modum explicat, dicens. Vesicas in vtero præ-
dicto humore aquoso plenas gigni, quibus vterum in tumo-
rem eleuari necesse est. Ego amen hydropem vteri diligenter considerans cen-
seo, in extremitatibus vasorum, quæ ad vterum terminantur, aut prope ipsa os-
cula ex humore illo aquoso per vasa sanguine menstruo obstructa, instillante,
fieri pelliculam quandam, vnam aut plures, quæ tunicae vteri adhærescentes,
postea mucore quodam implentur, indiesque a prædictorum vasorum osculis
maiores huius humoris, aut excrementi copiam recipiunt, & vterum ac infi-
mam ventris regionem in tumorem hydropi similem eleuant. Quem equidem
tumorem aliquando in toto ventre apparere, aliquando in altera eius parte
conspicimus, iuxta locum, cui prædictæ pelliculae adhærent. Item posse fieri
ex Arabum sententia inter tunicas ipsius vteri, aut (ut rectius loquar) modo tu-
moris pituitosi, in tunica ipsiusmet vteri, sicut fit in testibus aquosus tumor,
evidenter constare arbitror. Est sanè morbus in magnitudine, qui & difficulter
curatur, & multorum accidentium causa existit, quem etiam scimus constare
ex inundante humore pituitoso, crasso, viscido, & in vasis uteri copiosius ad-
hærescente. Quippe obstructis vasorum osculis ex prædicto humore, nil mirū,
si ob eius redundantiam totus uterus in tumorem eleuetur: maximè in fœmi-
nis, quæ aut pravis cibus utuntur, aut ex partu malè corpus gubernarunt. Alijs
quoque accidit pseudohydrops, cum videlicet in rugis, aut sinibus uteri pitui-
tosum aliquid & viscidum adhæret ea copia, quæ in tumorem maiorem ute-
rum eleuari cogat: quod vitium in ijs, quæ a partu, vel a mensium immodico
fluxu plurimum potus, & alimenti ingesserunt, contingere scimus.

Causa.

Causam Aetius arbitratur tñ esse diuturnam mensiū suppressionem citra cō-
ceptum: quā proculdubio potissimam esse inficiabitur nemo. Cū hoc tamen
confi-

A considerandum est, suppressos menses huic malo non utcumque causam prestare, sed dum humiditates abundant viscidæ, quæ in uteri tunicas instillantes adherescunt, quæ in pelliculæ naturam degenerant, quam postmodum aquosa substantia replet. Cui quoque malo causam prestat femina in victu, & potu intemperatissima, cuius iecur caliditate pollet, quanta necessum est inesse, ut resolutis partibus tenuibus illius humoris, concresecat predicta tunica: quippe raro, et si diu menses in feminis supprimantur, hanc affectionem reperiri contingit, quod non semper hæc omnes causæ in unum coeant. Fit et (ut dictum est) hoc malum ex inundante humore frigido intra uteri vasa ea copia, quæ uterum in tumorem eleuare possit: ite ex eodem humore in rugis, & cauitatibus uteri redundante. Dimitto ex flatu quoque fieri posse, quia id non ad hydropem, sed ad inflationem pertinere creditur. Contingit non minus ex vera hydropse fieri, aqua ex sinuosa, & abdominis regione, cæco, & latente itinere in uterum prolabente: aliquando ex iecore, aut splene vitiat, velut vera hydrops: ac frequenter à vena cava in uterum sanguinis serum instillante principium fortitur.

B Docet quidem Hipp. lib. 1. de morb. mul. signa, quibus in cognitione huius affectus facile deuenire possumus, simulque causas recenset: inquit enim; Si aqua intercus uteris adnascatur, menses pauciores, & prauis fiunt, & ante tempus deficiunt, Signa. & imus venter intumescit, & mammae solidae, molles fiunt, & lac nullum, & putat se in uentre habere, & ex his cognoscet quod aqua intercus est. Sed & in uterorum osculo significationem de se præbet, ad tactum enim gracile, & humidum apparet, & rigor ac febris corripit: quanto magis tempus processerit, tanto magis dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem ac inguina, (& subdit.) Hic morbus ex abortu fit, sed ex alijs causis, & cum menses fuerint occultati, contingit et non raro pregnantibus, cuius affectionis eodem lib. hæc uerba refert; Si hydrops in uteris fiat, menses pauciores fiunt ac deteriores, & per longius tempus, & pauciores quod oportet, aut paulo plures, & uenter intumescit, & locus supra pectinem, & tibiæ, & lumbi. Vbi uero multum temporis processerit, & in uentre habuerit, corrumpit ac eiecit, & aqua cum ipso fœtu affunditur, & mulier perit; moritur, sanguis aut corrumpitur, & aquosus redditur. Prædictis quidem consimilia uerba idem autor refert lib. 2. de morb. mul. dicens; Aqua intercus si in uteris fiat, menses prodeunt arenosi, & aquosi, & non ualde cruenti, intumescit, & uterus, & uenæ, & propinquissimæ partes, & pregnans fit, deinde suffocatur, & mammae fluunt, & imus uenter durus est, ac intumescit, & omnis circum circa locus, & dolet, si quis ipsum attingit, & febris ac stridor dentium corripit, & dolor uehemens laterum mollitudinem ac lumbos, & semen in somnis effundit, & peius habet. Tamen præter hæc signa, quæ ab Hipp. afferuntur, distinguens etiam uteri hydropem ac cognoscet, quod femina sic affecta, plerumque boni est coloris, & in cæteris sana, quia iecur in ea affectione non patitur: uerum si id compati et contingat, mirum non est, si & color mutetur, & ipsa deterius se habeat, tanquam ex complicato malo. Vt uterius item cognoscet non ex tumore solum, sed et quod imam uentris regionem occupet tumore extenso iuxta uteri amplitudinem, ad differentiam tumoris ex fœtu, qui acuminatam efficit figuram. Est præterea is tumor latus ad differentiam tumoris, qui ex scirrho, aut qua uis alia uteri duritie proficiscitur: status quidem si præsumunt, murmur in utero uagatur.

R 4 Caterum

Ceterum, ut dissideat ab uteri inflammatione, gravitate ambulando infert, **A**
 & non lenē spirandi difficultatē, & alia non contēnenda cordis, & cerebri ac-
 cidētia, & aliqñ aquosum quid p pudendum instillat. Itē in hac affectiōe alui
 excrementa, graueolētia sunt, & menses aut oīdō supprimūtur, aut inordinatē
 procedunt: & nonnunquā, maximē vehementia aliqua præcedēte, corpuscula
 quædā prodeūt alba, fetida, mucosa, aut aquosa, syncera, aut sanguini pauco,
 tenui, aquoso, aut subalbido admixta. Differt ēt à vero ventris hydrope, tumor-
 ris loco, quia in eo venter primò intumescit superiore eius parte: in hoc verò,
 primo in parte inferiore: atq; ex illo ad imas partes descendit paulatim, in hoc
 verò sensim crescit, & ad supremas partes irrepit: in illo præcessit aliqua causa,
 quæ iecori vitium intulerit: in hoc, citra ipsam: ēt si (ut dictum est) à vero hydrope
 nonnunquā proficiatur. Quod si color vitietur, sanguinis quoq; fontē vitari
 constabit. In illo ēt color mutabitur ad pallidum aut plumbeum, vel subalbi-
 dū, in hoc verò fœmina boni sæpe est coloris, & aliquandiu rubicūdior existit
 ex sanguinis retēti copia. In illo itē pedes in tumorē eleuātur, in hoc verò ma-
 nus, & māmē intumescūt: ēt si, in illo nō solū crura, sed & totū corpus motui, &
 reliquis actionib. ineptū, & languidū ac deiectū efficiatur, in hoc quidē crura **B**
 præ uteri pondere ad motū veluti impedita existunt, quia supra inguina incū-
 bit tumefactus. Dissidet ab inflatione uteri, quia, in inflatione uter us tactui tē-
 sus apparet, in hoc verò mollis, & flaccidus. Distinguitur ēt à tumore inflāma-
 tionis uteri, dolore, febre, & alijs innumeris accidentibus. Vltimò tñ in aliqui-
 bus plurimū aqua p vterum effunditur: qua excreta affectio subsidet, & venter
 detumescit. Curandi rō in huiusmodi affectu apertē monstratur ab Hip. lib. de
 nat. mul. p hæc verba; Si aqua intercus in uteris suboriatur, menses pauciores, &
 deteriores fiūt, deinde repente deficiunt, & venter intumescit, & mammae siccae
 fiunt, & reliqua malē habet, & in ventre sibi habere vī; & ex his cognosces qđ
 aqua inter cutē laborat. Sed in ore vterorum significationē de se præbet, tangē-
 tibus aut gracile apparet, & calor, & aqua ipsam corripit. Quam autem tps am-
 pliūs processerit, dolor imum ventrē, & lūbos ac laterū mollitudinē occupat.
 Ac postmodū eadem parte inquit. Hic morbus maximē fit ex abortu, accidit itē
 ex alijs. Præter hæc aut signa, & causas, curationē docēs, sic inquit; Cū sic ha-
 buerit, calida lauare oportet, & tepefactoria adhibere, donec dolor sedetur: **C**
 pharmacum aut deorsum purgans bibendū dare oportet, post pharmacū verò,
 vteros bubuli stercoris fomento fouere: & postea medicamentū cū cantharide
 præparatū apponere; & interpositis tribus diebus, id qđ cū felle paratur. Quib.
 proculdubio verbis bellissimē exprimit peculiare curadi rōnem, eam reducēs
 ad mitigationē doloris, purgationē eius quod redundat, ac discussionem eius,
 quod ventri hæret: à quibus itē menses promovere iubet, & mercuriali plurimū
 vii. Verūm ex hac methodo indicatione sumpta, dū incipit, docetur primò san-
 guinem mittere: siue ex suppressis mensibus oriatur (quo tpe ex talo fieri est ne-
 cessum) siue plenitudo subsequatur vtero prædicto mō obstrueto, ac si plenitu-
 do magna fuerit, nullū erit inconueniens ante tali scissionem sanguinē ex bra-
 chio mittere, dū id parciū fiat: instituta prius optima victus rōne, exsiccatē ni-
 mirū, modicē cal facietē, & tenuis substantiæ. Potus sit ex decocto cinnamomi,
 seminis angelicæ, vel saxifragiæ nræ, aut indice, quā sassafrasam appellant, aut
 indum

Curan-
di ratio.

sassafrasam
in Hydrope
uteri

- A** indū feniculū. Quibus factis, modicè corpus purgare oportet ab ijs excremētis aut humoribus, q̄ per primam corporis regionem vagantur, manna, casia fistulari cū puluere anisi, hiera simplici Gal. aut syrupo ex infusionibus, vbi subit deinceps locus pleniori curationi. Quam diuidere (deposita v̄dictū est, vtrāq; plenitudine) in duo t̄m membra æquū est: vnum quidem continet ea auxilia, quæ vniuersi corporis pituitā, & humores crassos sensim, & paulatim vel coquere, vel euacuare, vel resoluerē habent: secundū verò ea, q̄ vteri tumore aut aperiant, aut discentiunt. Circa primum itaq; vbi subit phlegmagogis medicamentis locus, administrabis primò mel rosaceum, oximelitem. Syrupū de artemisia, de duabus aut quinque radicibus, & aquis gallitrici, geniste, gentiane, angelice, saxifragie, feniculi, myricæ, & similibus; à quibus pillulis de mastiche, de agarico, de hiera vti poteris, vel ipso agarico trochiscato cū diacatholicone, vel dissoluto in syrupo infusionū rosarum, aut in ipsa infusione antequā cōficiatur syrupus. Cui quoq; vsui adhibere poteris electariū indū, vel diaphæniconis aliquid, iuxta laborantis naturā, & vires: quibus inspectis, aliquā māsā ex supradictis pillulis succo ireos efformare poteris. Prædictos itē humores p̄ interualla vomēdo purgabis semel aut bis ī hebdomada, exhibito leni aliquo vomitorio: quo fortassis vi, & impetu facto, nō erit ab re pelliculas rūpi, & per vterū, aquosum humorē prolabi. Purgare quoq; p̄ vrinā, & vterum ipsum prædictos humores curandū est, velut facies exhibito medicamēto, qđ recipit pulegij. 3. j. cum modico piperis, aut gentiane vel origani 3. ij. seminis dauci, vel smyrnij. 3. j. cum aqua mulsā formentur bucellæ, quarū summo manē sumat, 3. ij. aut 3. j. In cibis t̄m admiscere oportet aliquid huius, qui recipit hyssopi. 3. j. pulegij. 3. ij. origani, cumini, an. 3. j. seminis amii, spicæ nardi, ana. g. xij. salis rosti. 3. j. misce, & vtere pro cibariorū salsamento. Id quoq; bonū præstat mane singulis diebus sumere decoctum calamenti, pulegij, rubræ tinctorū, sabine, leuistici, & artemisie cū saccharo, & melle facta leni ebullitione: ceterū fabina q̄ paucissimū inijcito. Conferunt non minūs pleraq; ex ijs, q̄ in hydropicis aquas educunt, velut aqua raphani, saxifragie, gallitrici, & modicū decocti radicis ireos in hydromelite leuiter facti. A quibus sanè medicamentis ad robusta exercitia laborantē deduces: nā hæc nō solum qđ in venis, & in ambitu corporis frigidū, crassum ac uiscidum hæret, calore dissoluere p̄nt, verū, & totum id, qđ in vtero continetur, ruptis exercitij vehementia pelliculis, fundunt penitus. Balneis t̄m naturalibus ex sulphure uel alumine laborantem cōmites: qđ si ad manum nō sint, ea domi parato decoctis ex lauro, cardamomo, pulegio, thymo, calamintha, cucumere asinino, genista, saxifragia, angelica, gallitrico, pilosella, milio solis, dauco, ruta, artemisia, mercuriali, & similibus. Interim t̄m dum hæc fiunt, imo ventri adhibeto q̄ aquas, & frigidos humores dissipant: quæ proculdubio secundā indicationē cōplere diximus: veluti sunt emplastra ex radicibus aut folijs ebuli, vel inunctio ex oleo irino aut laurino, in quo incoquatur ebulus ipse: itē unguēto ex succo eiusdē ebuli, uel sambuci. Sed peculiari efficacia prodest emplastrum de baccis lauri, & de stercore caprino, aut bouino: conferunt, & inunctiones ac fomēta præcedenti cap. adducta, additis oleis de radicibus lilij, aut ebuli, de cinnamomo, de pipere, de aniso, de angelica, de gariophyllis, quæ sanè arte chimica probè extracta mire prodesse scimus, sicut per

vtr: vni.

Balneor. Art.
frat. vni.

per os sumpta pondere. 3. j. cum vino, aut stillatitia ex eisdem aromatis aqua. In A
 vterum infundenda sunt; q̄ menses ciunt, & sanguinem euocant, vt sunt deco-
 cta granorum gnidij, vel ipsum granū gnidiū cū modico melle, & oleo irino,
 vel ipsum oleum cū alumine: ac si in vteri sinu pituita redūdauerit, addere de-
 cocto oportet gnidij g. x. cū modico melle, vel agarici aliquid: nam dū in venis
 prædicta pituita inest, per ea, q̄ menses, & vrinas, & vomitum aut aluū mouet,
 tutius vacuabis: eam verò, q̄ intra vterum alicui parti adhæret, per pharmaca,
 quæ abstergunt, & abluunt: cæterū si in pelliculis conclusa maneat, per ea, q̄ rū-
 punt, vel apposita, q̄ exterius humorē ebibunt, qualia sunt, quæ nuper adduxi-
 mus. Itaq; ablues vterum aliquo ex prædictis decoctis cū melle, aut saccharo, si
 putredinē, aut calorē in ipso præesse comperiamus. Clysteria ēt, quæ apud ple-
 rosq; scriptores hydropicis proficua habentur, maximi momēti fore arbitror,
 potissimū si ab ipsis pessaria adhibeas, q̄ ex semine mercurialis cū modica myr-
 rha, sale ac melle cōficiūtur. Fiunt, & alia maioris momēti ex colocintidis 3. s. sa-
 lis 3. j. carnis pinguiū caricarū. 3. j. Alia item fortiora cōficies ex ciclamine, eu-
 phorbio, nigella, esula: q̄ sanē omnia alijs mitioribus esse admiscēda cōsulo. Fe-
 runt insuper nō cōtemnendi auctores, 3. s. ellebori albi lana exceptā, & vtero im-
 positam, protinus plurimā aquā extrahere. Sic, & aliud pessariū cōficies, qd̄ re-
 cepit, seminis mercurialis masculi q. s. myrrhæ modicū, salis, & mellis modicū,
 & lana excipiātur. Reperies profectō alia nō pauca apud Aētū, quib. liberē vū-
 poteris, si aut tēperaueris, aut alijs mitioribus admiscueris, aut eorū quantitatē
 imminueris. Vltimo tñ si neq; hæc oīa prodesse videantur, fontanellam altero,
 aut ambobus cruribus adaperies, p̄ quā natura aquosum illū humorē paulatim
 instillādo expurget, qd̄ protuldubio proficiū, & necessariū sūmopere auxiliū
 fesse arbitror. Qd̄ si ante placuerit sibi optimē præparatū g. iij. adhibere: ex vsu
 acies, at si probē cesserit, iterato eo vteris: nec mirū erit si solo hoc præsidio, vē-
 ter dissoluatur, si femina anhelosa nō fuerit, & pitui tē plurimū redundauerit.

De vteri inflatione.

Cap. 16.



ONTINGIT quoq; fœminis non paucis vterum inflatuosum C
 tumorem eleuari, qui (præterquam, quod morbus est in figura ex
 quantitate adauctā) ab vteri hydrope, & ei consimilibus affectio-
 nibus non leui differentia dissidet, vt ex Gal. 14. metho. apertē vi-
 detur constare: nam inquit; Inflationes verò ex flatuoso spiritu
 collecto nascuntur aliàs sub cute, aliàs sub membranis, quæ ossibus circundan-
 tur, aut musculos viscerumve aliquod includuntur. Porro colligitur aliquan-
 do etiam non parum in ventriculo, & intestinis, itemq; in medio spatio horum,
 & peritonæi. Quò fit, vt constet differre ab hydrope, cuius locus est inter omen-
 tum, & peritonæum. Differt quoque inflatio ab œdemate, quod appressa digi-
 tis non retineat vestigium, sed sonitum veluti tympanum reddat. Erit igitur
 vteri inflatio tumor prætor naturam ventris inferioris ex vtero in tumorem
 seu magnitudinem maiorem, à flatibus ibidem inclusis eleuato: qui sanē (spiri-
 tus, aut in vteri cavitāte, aut in poris, & vasis eius recondi, & immorari habet.
 Causa. Causam verò huius tumoris esse flatuosā substantiā ambiget nemo, præterquā
 q̄ Hip.

A q. Hip. id ex professio docet, li. 7. popu. dicēs; Plurimas vteri affectiones flatus faciūt, signū sūt ructus, & strepitus circa vētrē & lūborū, tumores & dolores circa renes & cōxas. Ex qua snia haud obscurē cōstabit, si verū est plurimas vteri affectiones flatus efficere, quantō rectius inflationē. Sed posse flatum ipsum varias nācisci causas euidenter pbat Gal. li. 3. de cau. sympt. dicens: Flatuū generatio est in ipsis, q̄ in vētre sunt, locis, succis, q̄busdā pituitosis, vel cibis inibi de ficiēte calore in halitū solutis: q̄ppe sincera frigiditas prorsus halitū non facit, qd̄ scilicet ea oīa, neq; attenuat, neq; cōficit, neq; alimentū dissoluit: fortis autē calor cum lōgo intervallo nutrimentum superer, amplius q̄ p̄ halitu generando id attenuat, nisi tñ flatuosum sit natura. Et vt clarius, reddat suae doctrinae institutū, adducit exēplum dicēs: Quēadmodum. n. externis rebus videmus, vt frigidissima cōstitutio, maximē spirante borea, aerē sereniorē reddit, ac calidissima p̄ astatē constitutio ambientē nos aerē purum efficit, mediae verō constitutiones nebulas pariunt: ita in animantibus accidunt. Neq; n. calor p̄ extremam imbecillitatē, neq; cū vehementer sunt ei vires, sed cū mediū inter has affectiones obtinet, flatum gignere pōt. Et subdit paulō inferiūs. At calor, q̄ in cibos agit quidē, ceterum diminutē, is eos quodāmodo soluit, nō tñ prorsus conficit, atq; hinc oritur flatuosus spiritus. Atq; is cū p̄ os excernitur, ructum creat, cū p̄ sedē, sonorum silentemve flatū, cum verō neutra parte emittit, symptoma creat, qd̄ inflatio vocatur. Itaq; ad eduliorū naturā, et ad caloris impotentia flatū causam reducendā fore censet. Quo fit, vt in vtero quoq; eadē rōne flatus ipsum distendentes, et in tumore eleuantes gignantur: facto nimirū vtero ab aliqua causa externa, vel interna solitō imbecilliore, vel humore crasso, et frigido ibidem p̄ter naturā retento. Quibus etenim causis accedunt quoq; externae. nā vulgatū est medicis, p̄cussione, aut ictum vterum imbecillitatē. Sic ambientis frigiditas, q̄ menstrualē, vel quotidianum effluxum phibeat, p̄sertim, si incautē a partui viuat fēmina, & vtcunq; frigiri se exponat, qd̄ tunc magis accidit, cum in vteri orificio sanguis grumosus impingitur. Itē partus frequentia, vel nimius labor, aut vteri ad aliquē suum cōuersio, vt naturalis effluxus prosperē fieri nō possit. Præterea menstruorum retentio diuturna, si tantā copiam regulare nequeat natura, aut retentorū crassities, et frigiditas, quibus naturalis calor sufficere nequeat id quoq; d̄num moliri proculdubio possunt. Quod ēt non minus alimentorū crassorum, frigidorum et flatulentorum vsus efficere poterit: vel intempestius aquae frigidae potus. Neq; oīno tradendum est obliuioni, posse quoq; id malū fieri ex iccoris vitio, sicut tympania, quod ex hac causa prodire cōperies ex iccoris vitii signis, q̄ superius adduximus. Sunt et huic affectioni cōcausae q̄dā, q̄ potissimē ad inflationē efficiendā concurrunt, velut est retentio huius flatus ex quauis causa genitus sit. At retentionem hanc moliantur duae aliae causae, nimirum dēstitas, seu spissitudo partis, vbi flatus intercluditur, aut ipsius vaporis, seu spiritus crassities, quarum causarum altera discussionem interdicat, altera verō renuit. Quae proculdubio dogmata Gal. loco citato 2. 4. 13. metho: et flau. li. 4. his verbis manifestant. Membrorum densitas, cum spiritus simul crassities efficit, vt idem spiritus non dissipetur, quo fit vt inflatio parti accidat.

Docet Hip. p̄dictam affectionem cognoscere lib. de nat. mul. haec referēs verba. Si inflati fuerint vteri, et venter attollitur, ac inflatur, et pedes intumescunt,

&

*sine mphi
giditay fla
cum Symp*

*retentio fla
tus huius
fēcioris
causa est.*

& caua faciei partes. Color verò iniocondus fit, & menses nō fiunt, & genitura hoc tēpore nō fit, & anhelat, & anxīa mōret, & cum surrexerit, ac progressa fuerit, erecta ceruicis respiratio ipsam tenet, & quicquid ederit, aut biberit, ipsam molestat, & gemit, & magis agrē tristatur, q̄ priusquā ederit, saepe verò ē suffocatur. Cui consimilē snām li. 2. de morb. mul. in hunc modum refert. Si vteri in flatu fuerint, venter attollitur, & inflatur, ac sonitum edet, & pedes, ac caua faciei partes intumescunt, & dolor iniocondus fit, & menses occultantur, & genitura hoc tēpore nō manet intus, & anhelat spumatq; ac anxīa est, & cum experscitur ex somno, recta ceruice spiratio ipsam corripit, & quicquid ederit, aut bibit, ipsam molestat, & suspirat, ac tristatur magis. q̄ priusquā edat, & suffocat, & nerui contrahuntur, & vteri, ac vesicae dolent, & manus contactum non admittunt, neq; lorium emittunt, neq; geniturā admittunt. Sed prāter hēc signa, sufficere quodammodo videbantur, prādictam affectionem cognosces ex ventris inferioris, & pectinis tumore, quē si tetigeris, sicut in tympanite, sonitū percipies cum dolore, extensio tñ, & qui ad pectinē, & inguina, & aliquando ad septum transversum, & ventriculū pertingere solet. Qui dolor prāterq̄ quod non semper eadem vehemētia viget, pungenti similis existit, & ad varias partes permutatur, ita vt lūbos, & caput ēt petere visum sit. Quod si in caua vteri parte steterit flatus, rugitus in ipso persentiuntur, perinde ac in intestinis, & aliquñ cum crepitu per pudendū excernuntur: vrina itē accidit suppressio, & vigilia, prāsertim vigente menstruo. Verū si in angustis porositatibus ac rugis sit, dolores vehementiores fient, diuturniores, & agrē curabiles existent. Studendum ultra est, hanc vteri inflationem à tympania distinguere. Contingit quidem in hac mitior sitis, quam in tympania, & vires minus labuntur, & corpus minus deiectum est, ac prēsidia magis prosunt; & superiores corporis partes non ita extenuantur ac in vera tympania. Item hēc per intervalla crescit, aut decrescit, & quodammodo videtur posse curari, illa verò minimē.

Curan-
di ratio.

In hoc quidem affectu prāmittam Hip. lib. de natu. mul. adductā curandi methodum, quam paucissimis verbis depinxisse constat, dicens; Cū sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & calida lauato, ac fomētū adhibeto: interposito verò tpe quodam, apponito ea, à quibus purgetur, & non mordeatur. Frequentissimē verò totum corpus foueto, tum aut, & sub pudēda & odorata sufficiantur, sub nares aut graecolentia, & potiones dato, quē vteros purgant, & ad locum compellunt. Qua sententia vī primō docere, opus esse crudos succos, à quibus flatus eleuantur, ex purganti pharmaco euacuare, mox fomentis flatus ad partes extimas euocare, ac resolvere; & si quid humoris in vtero superest, ipsum per vteri regionem educere, & calidis suffribus flatus in vtero cōtentos resolvere. Verū ne quid huic tractationi deesse videatur, specialius curationē hanc expendere oportet, initio sumpto à quodā Gal. documēto in curādis inflationib. 14. metho. adducto: inquit enim; Inflationū oīum diuersa ab œdematis curatio est: & paulo inferiūs subdit; Indicatio autem curationis oīum est, vt qđ prāter naturā est, vacuetur, in quocūq; id cōtineatur. Propria verò post hēc cōe est, vt tenuissimis, & calidissimis potestate medicamētis: atque veniculo quidē, & visceribus oleū, qđ tenuiū est partiū, quodcūq; hēt incoctam,

- A** Etā, aut aliquid calidorum seminū, cuiusmodi sunt cumini, & apij, & petroseli ni id prestabit. Aliqñ verò, & cucurbita magna bis ter ve sine incisione medio ventre affixa. Ataq; hæc est Gal. medendi rō. Cum hoc tñ si quis velit recta curadi methodo uti, primò expendat, qualis pcessit flatus causa, q̄ triplicē à principio huius ca. cōstituimus, videlicet, occlusionē eorū, q̄ expurgari solēt, & humidorū copiā, ac vteri ipsius impotetiā. Sic proculdubio curationis scopus erit caloris substantiā roborare, crassam materiā, & eius vaporē extenuare, & meatus vteri, in quo vaporosus ille spiritus cōtinetur, aperire. Porro posteriora duonepe, densi corporis rarefactionē, & crassi spiritus attenuationē, iisdē oīno auxilijs assequemur: medicamētis sanē tenuitate partiū pollētib. siue extenuatib. & calfacientibus, iuxta partis affectū & dignitatē, & spiritus crassitiē. Quamobrē pro cuiusq; natura curadi methodū scribere opus erit. Sic dū sola vteri imbecillitas, & caloris innati paupertas flatus causa extiterint, solis ijs, q̄ flatus carminādi ac digerēdi vires habeāt, mox à principio huius affectus vtendū est, velut sunt calidæ inunctiones, fomēta, cucurbitæ, clysteres, & huius census pleraq; q̄ cap. præcedenti, & aliās sæpe diximus. Expurgantia etenim medicamēta, prævalente huiusmodi causa, plus habent vires deijcere, & flatus augere, q̄ beneficiū aliud præstare. Ob quam ētrōnē in prædicta causa modicē calidis, & multo tpe adhibitis vteris, ne facultatibus factis imbecillioribus ex immodica calfacientiū immoderantia crescat indies affectio magis. Verū si ex frigore ambiētis, aut potius, id malū oriatur, audacius calfactorijs vti poteris, qualia paulò inferiùs referā. At si ex suppressione mensiū vterū inflari contingat, mihi non est dubiū, quin vniuersam curandi rōnem à sanguinis detractione auspicari oporteat: parē tñ, ne malū ob id augeri cōtingat. Tandem deposita, q̄ ex obstructione pullulauerat, plenitudine, ad ea, q̄ flatus discutiunt, deuēniendū est, admixtis subinde, quæ laxare, & obstructas vias aperire nata sint, vt simul affectionis causam, & affectū auferamus. Quod si ex crassis humoribus, frigidis ac difficulter coctilibus affectio suboriat, prius leui facta purgatione ex hiera, pilulis mastichinis, vel agarico, elephanginis, aureis, & reliquis huius naturæ, item & clysterib. frequentiorib. ex hiera cōposita cū succo mercurialis, & alijs, q̄ flatus discutiāt, vtēdū deinceps est iisdē pharmacis, q̄ flatus discutere nata sunt, admixtis tñ, vel prius adhibitis (q̄ rectius est) medicamentis, q̄ incindāt, attenuent, & abstergant, vt simul humorē, & flatū ad vltiorē euacuationē præparemus. Sed sedādi doloris gratia multi probarūt, 4. 5. olei amygdalarū, præsertim amaranū à quibus humorū præparationi innitendū est. Qua in re vtendum erit decocto cicerū alterato cū cepis, apio hortensi, qd̄ vulgò petroselinum appellatur, calaminta, ruta, & cumino. Cui ētrōnē, & corroborādæ uirtutis gratia utendū est quibusdā speciebus aromaticis, & cōfectionib. ac electarijs huic rei dicatis, vt sunt diacimīnō, dianisōn, aromaticū rosaceum, & sequens cōfectio, q̄ recipit pulueris anisi, maratri, carui, dauci, cimini, baccarū lauri, singulorū, 5. l. gario-phyllosū, cubebarū, piperis longi, seminis tutæ, sing. 3. j. liquiritiæ, 3. l. galægæ, zingiberis an. 3. ij. anisi saccharo incruktati, 3. ij. sacchari li. l. fiat cōfectio in tabellis. Seruabis tñ hoc unum in oībus causis, vt semper in quibusq; medicamētis anodynorū aliquid admisceas: quippe hæc præter alia bona, q̄ præstant, partem flatu dissentā, æquabilem reddunt ac disponunt, vt dolori sit minùs obnoxia.

xia. Ad flatus igitur discussionem deueniendo, q̄ vna est & cōis prædictis oībus
causis, seclufa causarum prouidentia, eo, quo dictū est, modo: in primis vterum
inunges oleo chamæmeli, liliorum alborū, anethi, rutæ, vel eo, quo incoxeris
ciminū, anisum, hypericon, costum, casia, gariophyllū, cinnamomū, & his si-
millima: itē prodest, & infessio corū. Parabis eadem rōne fomenta ex eisdē oleis
vesica exceptis, vel ex decocto rutæ, dauci, menthastri, seminis angelicæ, artemi-
siæ, gariophyllorū, pulegij, calamēti, aut seminū prædictarū herbarū. Lixiuam
quoq; ex cineribus parare poteris, & spōgia exceptā vtero frequenter adhibe-
to. Aut inunctio ex oleis cinnamomi anisi angelicæ, gariophyllorū, & pipere,
vel baccarū iuniperi, aut vinū q̄ ardens chinista, ex iuniperi, sabine, edere, aut
lauri baccis conficiunt, q̄ ego in hac re magni momenti fore censēo. Cui ēt ma-
lo, & huic simillimis patari olea pnt, aut vina, vel stillatiua aque ex ligno gua-
yaco ex corticib. eius, ex ebēno vel loto, & nō minoris efficaciz ex gūmi aliquo
aut cōcretis lacrimis, vt succino, ammoniaco, thure, styrace, terebētina cōfectū
pretiosius arbitror. Sic, & balsamū præstat: & aqua vitæ, aut aqua theriachalis,
cuius meminimus lib. de cur. feb. mali. q̄ mille modis chimistæ artis periti pa-
rāt, ceterū hac in parte duas tm̄ eius cōpositiōnes scribā: vt & huic affectioni, &
similib. præstare possint. Prima itaq; recipit cardamomi, piperis albi, & longi,
an. 3. f. galagæ, macis, gariophyllorū, granorū paradisi, an. 3. v. ligni aloes. 3. j. zin-
giberis. 3. iij. cinnamomi cubebarū, an. 3. iij. maioranæ, roris marini, menthæ,
pulegij, rutæ, saluiæ, nardi, asparragi, rosarū, rubearū, an. m. f. seminis cumini a-
grestis, 5. f. anisi, fēniculi, an. 3. j. seminis coriandri, sinapis, a. 3. j. seminis peoniæ
& cumini Romani, an. 3. j. seminis radicū enulæ cāpanæ, yridis, an. 5. j. foliorum
angelicæ, pimpinellæ, dōronici, an. 3. i. dittami, 3. iij. sacchari candi albi, li. 2. sin-
gula conterantur, & ex vino generoso quinquies distilato, macerentur, in fimo
vel aqua calida diebus. 14. Deinde in alembico vitreo diligēter argilla cooper-
to, instillantur: & aqua instillatione extracta, iterum super feces mittatur, & in-
stilletur, quod quinquies facito: & postea adijce croci orientalis, 3. j. musci, &
ambra, an. ij. foliorum auri, 3. iij. Cuius guttulas tres, ex aqua buglosæ adhibe-
to. Alia verò sic paratur: excipe radicū angelicæ, tormentillæ, zedoariæ, pim-
pinellæ, enulæ cāpane: dittami, an. 3. ij. cinnamomi, 5. f. santhali rubei, & lutei,
corticū citri, an. 3. j. theriacæ, & mitridati, an. 3. ij. mosci, 3. j. f. q̄ omnia modo præ-
dicto macerentur, & ter solū instillantur. Quarum sanē aquarū in feminis frigi-
dis, flatulentisq; affectionis, vt in hydropē, imbecillitate vteri, & similib. magn⁹
est vsus. Itē cucurbita singulis dieb. vmbilico affixa incredibili efficaciaz iuuat:
quam consilio Aetij aliqñ scarificabis, quod mihi haud innutile vī. Profunt, &
cataplasmata ex carycis, hyssopo, & nitro, vel ex eodem hyssopo, baccis lauri,
stercore caprino, & alijs, q̄ cap. præcedenti diximus. Utendum præterea est em-
plastro, qđ recipit bdellij, gūmi arabici, an. 5. j. seminis rutæ, seminis agnicasti,
centauri, abrotani, origani, calamēti, casia lignæ, ameos, an. 5. j. & f. terebinthi-
næ quantū sit satis, vt fiat emplastrum duplex, quorū aliud parti antice: & aliud
postice, adhibero. Prodest, & emplastrū ex trifera cū theriaca, & pulueribus dia-
ciminii, & dianisi cōfectū. Idē quoq; beneficiū præstat decoctū, quod recipit ani-
si, maratri, & cinerū lignorū tauri, quantū sufficiat, & fiat decoctū exceptū spō-
gia, aut filtro, & ventri inferiori, adhibeto. Pari modo sacculos madentes eodē
decocto,

A decocto, vel siccos appones, quos cōficiēs ex parietaria, ruta, absinthio, artemisia hederā terrestri, abrotano, nepeta, foliis agnicasti, origano, calamēto, pulegio, sampſuco, thymo & serpyllo. Ex quibus ēt herbis balneum parabis nō parū profectū vtile: sicut eadem rōne sunt naturalia ex sulphure, vt Aetius aperitē consulit, calidū primò adhibētū, mox verò frigidū, vt calorē retrocessione resolutio fiat maior, dūmodo sensim in frigidā aquā femina ingrediatur. Sumat itē sic affecta mulier diaciminon, dianison, diacalamēthe, dialpermatō, & diacurcumā: sed vtilius est placētulas, aut morsulos hac lege conficere, accipe specierū diacurcumā, diacimini, an. 3. iij. sacchari albiſſimi li. f. liquētur saccharū succo rutae limpidiori, & in morsules digerito, à balneo vel summo mane vnū ingerat femina cū modico vino. Ex vsū quoq; est theriaca cū vino, vel aqua cinnamomi, anisi, radicis angelicæ, gariophyllorū, & macis, tā extracta per alembicum, q̄ per decoctionē parata. Vtatur, & summo mane decocto radicis angelicæ cū aromatico rosaceo, vel vino ex artemisia decocto, aut semine agnicasti, vel origani. Itē maximi pretij est potus hoc mō paratus, accipe malorum persicorum nucleos. xx. pistillo tunde cū ouorū duobus luteis, quibus adde galāge, cinnamomi, piperis lōgi, zingiberis, gariophyllorū, croci, nucis myristice, ana. obolum. j. adde demū saccharū, & vinum tenue meracissimū, & oīa feruere paululū finito, & calidū præbeto, præsertim facta leui residētia. Pessuli deniq; vtero adhibiti viles existunt ex ruta, & melle ac nitro formati, item ex ficubus pinguibus cū ciminō, & spūmā nitri. Item alij, qui emolliendi virtutem habēt, hoc mō parati: bdellij, 3. i. & xylobalsami, carpobalsami, costi. an. 3. j. origani cimini. an. 3. f. cōfice pessulos cū oleo nardino, & rutaceo, q̄ nocte integra in locellis persistāt. Per metranthitā verò in vterū infundendū est decoctum origani, foliorū viticis, rutæ, an. m. f. coquito in vini albi, & olei, lib. j. ferueatq; vsque ad consumptionem vini, in colatura dissolue hieræ pricræ. 3. f. Refert ēt Dioscorides, apiū, & intus immisſum, vel exteriū adhibētum, aut cōmanducatum, omnibus prodesse inflationibus, repurgato utero, & flatibus discussis. Quod ēt fertur de asparagis, addito in eorū cōdimētis cumino, & aniso. Sic, & de roris marini semine cum pipere, & vino epoto scribitur. Velut de ruta ēt si luestri, cuius folia trita, oleoq; liliorum incocta cum adipe gallinæ, vel anseris, si calida antrosum, & retrorsum vtero in modum emplastri apponatur, sicut bibitum malnarum semē, aut exteriū vino illitum. Quibus sanē auxilijs in exacerbationib. vt necessitas poposcerit, vti poteris, sicut purgationibus, sanguinis detractione, & alijs, dum affectus aliqn̄ subsidere cognouerimus: nam vtraq; curandi rō per intervalla fieri desiderat. Verum ante oīa, omni exercitio moderato feminam cōmittes, & illi alimenta attenuantia, & flatūs discutientia adhibebis, paucissimosq; potus, eosq; discutientes porriges. Quod si hæc prodesse non videantur, balneis sulphureis, bituminosis, aut salſuginosis feminā cōmittes, tādē si malum vrgeat, & flatum intra uterum inclusum comperias, grandem cucurbitam cum multa flāma adhibebis, citra sacrficationē: quod si in vterum aliquid crassif sanguinis, præesse cognoueris, consilio Aetij vteris, qui ipsam scarificare iubet. quod arbitror proficuum summopere futurum, præsertim si prius cucurbitā aliqua violētia detraxeris bis aut ter, vt maiori efficacia flatūs discutiantur.

De



VM inflammationis nomine apud Galen. lib. 2. de arte cur. ad Glau. duo constet posse subintelligi, humidam nimirum inflammationē, & siccam: quarum porro, quæ humida est, ex calida fluxione vterum occupante, ortum ducit; sicca verò, quando nullo humore influente calor naturalis illius partis efferuescit, donec febris partis dici iure optimo mereatur. ob id profectò distinxisse prius oportet, cuius earum meminisse hac in parte sit in animo. Quia in re asserimus, vteri inflammationem hac in parte nos appellare tumorem illius partis ex affluente humore in substantiam eius, à quavis causa prouenientem: nam vterum ipsum in tumorem eleuari posse, vel ex hydropē, vel ex flatu, vel ex collectione, antea dictum est: quas equidem non esse inflammationes euidenter constat. Itaque dum vteri substantia ipsa plus iusto à fluente humore impletur, non equidem in vniuerso vteri corpore, sed in aliqua eius parte, inflammationem fieri, & appellari, censemus affectum sanè ad deprauatam figuram, & magnitudinem pertinentem, cui ob id soluta vnitas, ac distemperies associantur. Denique nomine inflammationis hoc loco eam dumtaxat intelligi volumus, qui fluxionis sanguineæ soboles est, in vteri corpus, & substantiam maxime incidens: in qua dolor est vehemens, rubor per summa uigens, calor velut deurens, tensio, renixus, & cum malum creuerit, pulsationis sensus: quem sanè affectum phlegmonem græci appellant. Neque credendum quidem est, solum ex sanguine vterum in prædictum affectum deuenire posse: nam id quoque contingit redundante cum ipso sanguine flaua bile, vel pituita, vel melancholico succo, ita vt & nomen, & accidentia humoris, cum sanguine exuperantis, accipiat. Præterea considerandum est, an humor, qui fluit (quicumque ille sit) iam computruerit, an in membro confectus vitietur, corrumpaturve: crassum, aut tenue, optimum, aut acre, vt Galen. libro secundo, de arte curandi ad Glau. optimè distinxisse videtur. Contingit etiam verum inflammari parte eius antica, qua vesicæ adhæret, vel postica, quæ recto intestino coniungitur, vel in parte quidem superna, & fundo, ac vltimò in ceruice, eius osculo, & prope pudendum. Sed collectionis harum partium Moschionem, & Cleopatram meminisse quoque constat libro gyneci, cap. vigesimoprimum, dicentes: Ex præcedente nimio furore aliquando in pinaculis ipsis, aliquando in sinu mulieris, aliquando in orificio matricis, vel intus in ipsa matrice collectionis emergitur cum febribus, vigilijs, dolore, horrore, & cum horrore punctiones, & grauedines pro locis, in quibus emerferit, collectio, & neque vrina, neque stercorea impediuntur. Pedes etiam cum corpore difficillimè mouentur: nam & aliquando magnitudine collectionis tumor supra pectinem inuenitur digito obstetricis. Illæ verò, quæ in alto sunt, minus quidem doloris habent, & digito apprehendi non possunt: frequentius tamen organo patefacto mulierum, oculis videntur, & sudores in fronte, & in ceruice calidi, & abundantes occurrunt. Qua sententia constat cōplexos fuisse causas, signa & partium affectarum differentias: quæ omnia plurimum ad curationem profutura arbitramur.

Causæ

A Cause tñ partim interiores, partim exteriores in hoc malo reperiunt: ille qui dē, pter ipsius impotentia, qua facilis ad recipiendum efficitur, velut tenuis est ac feruens sanguis, ex caua vena p exiles eius propagines in ipsam met vuluam pfusus: non quidē in eius ceruicē, aut cauum, ardoremq; & putredinē exptus, vt cōiter oēs inflāmationes fieri assolent, quas ex sanguine, demum pituita, bile flaua, aut atra gigni solere scimus. Sed in vtero specialius fit, cū multus sanguis affluit ad mensium purgationes, vel post partum retentus, q inflāmationē, pculdubio, & putredinē parit. Cum hoc tñ credendum nō est, semen quantūuis retineatur, & putrescat, inflāmationē efficere posse, etiamsi conuulsiones, & suffocationē, ac grauissima alia accidentia pariat: quippe semen nō defert, neq; viget in ea parte, in qua licet putrescat, altereturve, collectionē, seu tumore pter naturā efficere non pōt. Constat igitur, plerunq; hoc malū fieri ex mēstruo sanguine, q in maiori quantitate abundet, & vtero sit nutrimentū, res alioqui ad inflāmationes necessaria: siquidē p easdē uenas defertur ad partes excrementū, p quas alimentum, aut id, quod superest, deuehitur. Sed tñ duob. modis fieri hac in parte inflāmationē constat: ex sanguine nimirum, q ab alimento redundat, aut uititur, vel ex mēstruo improbē purgato, aut intēpestiuē, & plurimum retento, sicut ex alijs vteri purgamentis (q salubriter uterus excernere assolent) dū pter modum supprimuntur. Altera uerō inflāmationis causa est, q pdictis principium motus, & occasionē p̄stare habet, uelut est plaga, ictus, aut mensiū suppressio: frigus itē cōprimens, & coarctans uteri uasā, & eorum oscula, uteri quoque inflatio, vel laboriosus partus, uel abortus, vt Gal. li. de humor. apertē docere vī. Quod et fieri contingit ex frequentiore cōcubitu, qui vteri virium metas excederit: durior itē sedes, longissima & intenta ambulatio, p̄sertim mensibus instantibus. Verum quia ex causa, & loci affecti diuersitate frequentissimē accidit tumoris naturā, & conditionē uariari, & in alias tumoris species inflāmationē degenerare, iuxta humoris peccantis ideā, ob id coniectandum est, interdum ex ea tumore durum sensusq; expertē fieri, rarius cancerum, sepius tñ abscessum, vel cresipelas, aut oedemata, aliqñ in extimis, nonnunq in intimis, ac ceruice, osculi, uel eius corpore, vel in latus, vel plures partes, aut anticam, vel posticam supernam, q verticulum conscendit, vel infimam, quē in rectum intestinum vergit, partem, quorum omnium signa expendisse oportebit.

C Primō statim accessu in fēminis hoc affectu laborantibus pcipies muliebriū locorum, pubis, imi ventris, ac lumborū dolores ardētes, q ad inguina, coxas, latera & costas ēt porrectus, vsq; ad clauiculas persentitur: ac ob septi transuersi cōpressionē, si magna fuerit, vteri suffocatio accedit, sin aliter, magna spirandi difficultas, q aliqñ imperitos medicos decipit, existimantes pleuritidis naturā referre, ob ignorationē consensūs vteri cum septo transuerso, & clauicula. integitur. n. peritoneo, & eo solo firmatur, ac retinetur à parte superiore; quare dū vltra modum distenditur, hæc ēt mēbra comprimi necessum est. Verū anteq hinc discedam, referendū mihi est, qualia huius affectionis signa attulerit Hip. qui lib. de mor. mul. 2. hæc scripta reliquit: Si vteri inflammati fuerint, menses obiorquentur, & ceruix multis tenuibus venulis ad telarum aranearū similitudinem variegatur, & febris est acuta, & mentem præcellens, & menses parui, ac pauci ipsi comparent: quum uerō quid comederit, reuomit, & dolor occupat

S imum

imum ventrem, & lumbos, & animo linquitur, & per totum corpus perfrige-
 ratur, venter aut nunc durus, nunc mollis est, & incenditur, & attollitur, & pu-
 tat se in ventre habere. Quoque verò ventris moles vacua apparet (quod ego in-
 telligo dum affectus in hydropem mutatur) & alius aqua impletur, & umbili-
 cus prominet, & osculum gracile fit, & de repente apparent menses stridentes,
 & pauci ac prauī, & attenuatur circa clauiculas, & collū, & pedes intumescūt,
 & praesertim pedum extremitates: horrēt et partes circa pudendum, pungitur,
 caput dolet, & sinciput, caligo adest, & sudor frontis, extreme partes refrigerā-
 tur ac tremunt, & sopor profundus aliquā occupat, & audire non pōt, neq; reli-
 qui sensus operantur. Quibus proculdubio simillima signa adducit eodē loco
 paulō inferius, studens monstrare vteri erysypelas. Nec mirum videri debet, tā
 esse varia huiusmodi signa, siquidem id proficiscitur ex vteri natura, & ipsius
 vario consortio, ac diuerso, & omnigeno corporis apparatu. Lib. tñ de nat. mul.
 dum ex partu occasione sumit inflāmatiō, hęc verba scripta reperiuntur. Si ex
 partu vteri fuerint inflāmati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest, ex vē-
 tre verò nunquam deficit calor, & sitit, & coxas dolet, & vēter imus fortiter in-
 tumescit, & alius turbatur: secessus, aut est malus, aut olidus, & calor vehemēs
 corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta sinciput est, & vētris stomachus nō
 pōt trahere cibos ac potus, & concoquere nequit. Qua in parte paulō inferius
 eandē affectionē refert, & curationem suo mōre scribit. Verūm prēter hęc Hip.
 signa specialius rem expendere oportebit. Sic profectō hūic affectui perpetuō
 febris succrescit ardentissima, sicut in alijs inflāmatiōibus, ceterū in hac pe-
 culiariū pp maximum consensum cum corde per arterias. Quod ē lib. de hu-
 mor. testatus est Gal. sed praecipuē, lib. 6. popu. part. 1. com. 2. dicens. Cū tñ in
 vteri phlegmone haud ita multum accidere cernitur, licet febres validae vehē-
 mentes, & calidae concitentur, ob quas lingua veluti à fuligine denigrescat: &
 subdit, Calidas aut vehēmentesque febres ex vteri phlegmone accendi, nemi-
 nem in artis operibus versatum, praeterit: ac reddens rōnem refert id fieri, quia
 vterus plurimas grādiffimasque venas habet, in quibus, aut prope ipsas si san-
 guis putrescat, febrem succendi, de synocharum genere necessum est. Sequitur
 & in hoc affectu grauissimus capitis dolor, isque maximē in sincipite, qđ lib. et
 de hum. dixerat idem Gal. sed clariū lib. 6. pop. parte 1. com. 2. nam referens id
 fieri ex vaporibus à putrescente sanguine elatis, inquit, Verūm capite quauis de
 causa horum vaporum pleno, grauitates maximē in sincipite, hominem vexā-
 tes apparere illis, quibus artis opera curae sunt: & subdit. Primū igitur vapo-
 res illos calidos proximē dictos, per arterias in caput subuolare, ratio ostendit,
 ipsasque arterias per collum ab vtraque vocati infundibuli parte, recta in sin-
 ciput discurrentes videre licet. Ac postmodum rationem cōtexit, pp quam va-
 rij, & acerbissimi fiant dolores, nimirum pp varietatem ac sensibilitatem par-
 tium capitis internam structuram efformantium: vnde oculos quoque dolere
 contingit, sicut ceruices conuelli, & pedū ac manuum articulos. Alui item, &
 vesicae excrementa ob calorem, & siccitatem, & cavitatem, compressionē, coar-
 ctationemve retineri contingit. Venter ex consensu grauiter dolet, ita vt
 aliquā cardialgiā inferat. Pulsus parui fiunt, crebri, & ab exsolutione debiles.
 Verūm in principio inflāmatiōis errantes, & vibrantes, & aliquā ob febris
 vehemen-

A vehementiam magni celeres, & crebri, quibus diluitur in Gal. dictis controuersia, lib. de cau. pul. & alibi. Quod si in penitiorib. locis uterus inflammatur, acutissimis doloribus excruciat cum anxietate, & ex solutione contingit; si tamen in conspicuis, & externalis partibus affectio succrescat, omni ex parte pulsatorie dolet; quæ sanè signa diuersis inflammationis temporibus, diuersimodè apparere contingit, vt paulò inferiùs docebo. Posteriore in super vteri parte inflammata, partes circa umbilicum dolere, & aliquando in tumorem eleuari cernimus, sed dolor circa lumbos excruciat magis, & alui excrementa ægriùs excernuntur, canini stercoreis speciem referentia. Sic vbi cavitatis, aut fundum inflammatur, imi ventris acutus dolor ostendit, vt ne contactum quidem foris admittere videatur, atq; uterus plerumque ad inflammatum locum retrahitur; & ob id, os & collum eius auertuntur, differtque ab vterina suffocatione, ex febre ardentissima, & intenso partis calore. Si vteri anterior pars inflammatione tentetur, vrinæ difficultas, aut stillicidium subsequitur, & grauis in partibus umbilico finitimis, & inferioribus dolor, & si digitus in os vteri submittatur, occurrit ad tactum durum, clausum, feruens, ac retractum, præsertim si in ipso, aut in collo fuerit inflammatio: quod etiam dolore, duritie, & calore à conceptu distingues. Lateribus verò vteri inflammatis inguina tenduntur, & crura grauius, & ægrè mouentur, & quibusdam crus ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat, quin etiam in coxam dolor transsit, & in eadem parte cum grauitate sentitur, vt ex Gal. constare videtur, 6. de lo. aff. cap. 4.

Cæterum fieri inflammationem ex sanguine cognosces, q̃ lingua nigrescat, delirium sequatur, vrina rubescat, aut subrubra existat cum liuore, pulsus magnus, plenus, vndosus, & venæ oēs tument. Flauam aut bilé dominati, ex oculis, qui colorem corticis maliciti referunt, cognosces: sitis quoq; ingens adest, inquietudo, & anxietas maior. Verum tñ dum pus fieri incipit, dolores pulsantes, & febres augeri, est necessum: q̃ frequentes cum horrore sub vespërâ incurfant, & accessiones inordinatas habent. Accidit, & singultus, & prædictorū accidentium intensio, atque ipsa inflammatione augescente, sequuntur animi deliquium, exolutio, torpor pedum, genuū perfrigeratio, & extremarum partium sudor, conuulsio colli, pulsus exigui, & crebri, tandem delirium, & dentium rugitus. Quæ sanè omnia, purè confecto aliquantulum cessare videbuntur, & iterum inualefcere, vbi abscessus rumpitur: ac tunc quidem modò vrina mō alius, modò vtraque supprimitur: nonnunquā pubes intumescit, & profluentis cuiusdam rei, inundatio percipitur, vbi abscessus maior fuerit. Si tñ hæc eadem perstiterint viribus vtunque labentibus, pulsibus inæqualibus ac debilibus, mortem potius quàm suppurationem vereri oportet. In scirrhum tñ inflammationem migrare cognosces, quia febris dolorque, & symptomata leuiora existunt, sic tamen vt tumor, & renixus grauitasque permaneant, totumque corpus non solum crura ad omnes vitæ functiones segniter moueatur.

Ex quo proculdubio affectu his grauissimis accidētib. cōiuncto, vereri oportet moriē, vt Hipp. protulit, lib. 1. de morb. mul. dicēs perniciosum esse morbū, & a quo vix aliqua euadit fœmina, aut in graue aliquod malum degenerat: nā decretum est, apud omnes autores, grauissimas esse vteri inflammationes, cum hoc tamen, quæ eius ceruicem obsident, facilius curari possunt: quæ verò

S 2 totum

totum affligunt vterum, nullo modo: sicut quæ fundum siue sinum eius occu-
pant, periculose admodum sunt, quia ægrius, & tardius curationem admittunt
in quibus omnibus conuulsiones superuenientes periculose sunt, & græues.
Quod si erisypelatis particeps sit inflammatio, & fœmina grauida, lethale esse
Hipp. lib. 5. pop. text. 43. refert: quanquam text. eiusdem, lib. 20. de vera inflam-
matione dubitatum sit, viuere ne possit fœtus: quod intelligendum est, de gran-
di, & venenosa, idq; ob febris, quæ succenditur, vehementiam.

CURATIO
DE VIRO.

Cum statutum firmatumq; sit in recta medendi rōne, et si affectus eiusdem sit
naturæ, in eius curatione, partis situm, locū per quem adhiberi auxilia, aut fie-
ri euacuationes debeant, monstrare, & partis naturā auxiliorū materiā selige-
re, & ab alijs partib. affectis distincta exposcere: ob id profectō licet inflammatio
vnius naturæ sit in oībus partibus, in vtero tñ si steterit, non à quauis parte in-
distinguitur exposcit sanguinem fundi, aut quamuis aliam vacuationem fieri: quæ
prima, & cōmunissima omnium phlegmonarum curandi via est. Quamobrē in
hac curatione præmittere partis cōsiderationē oportet, & mox affectus indica-
tionē rimari. Vniuersa etenim curandi phlegmones rō, in prohibitione eius, B
qd fit, & ablatione eius, qd factum est, cōsistit, licet alijs verbis id quoq; Gal.
proferat, dicens; Prohibemus quidē futurum, si corporis apparatū euacuationi
bus iuxta eius naturā factis minuerimus; ac rursus si id, quod ab eo iā in motu
& fluxu ad partē est concitatum, ad diuersam, & maximē contrariam partē tra-
xerimus. Quod verō factū est, & in parte receptū, ab ea repellimus, & per eā di-
scutimus: aut in eadē suppuramus. Primum quidē fit frigidis, & cōprimētib. us
secundum calidis, & digerētib. vltimum verō calidis ē, sed emplasticis me-
dicamentis: quibus omnibus admiscēda sunt, q̄ mitigandi vires obtineant. Qua
propter, prohibita in principio omni immoderantia (vt à prima indicatione
initū sumā) ne furiosius humores intro irruant, vt Hipp. est præceptū, li. 4. pop.
part. 4. ac. prohibitis ēt crurum frictionibus, omni tñ quiete imperata, & alui
excrementis leuiter depositis, victum omnino tennem porrigemus. Transactis
tñ primis diebus, oua sorbilia, aut amygdalarū ex cremore hordei, vel amyllum, C
aut panem lotum, vel pullorum carnem imperabimus: sic in potu aquam hor-
dei, vel sacchari, aut decoctū radice scorcioneræ, vel aquā auro ignito sepius
feruefactā porriges. Quibus, vt par est, administratis ēt si affectio sit in partibus
inferioribus, à basilica alterius, vel vtriusq; brachij primò sanguinē detrahē
oportebit iuxta vires, ætatē, habitum, aut anni tēpus. Quod sanē dogma perpe-
tuū sit in hac curatione, nisi aut ex abortu, laborioso ve partu, vel nimia sangui-
nis profusione (à quacunq; parte sit) inflammationem prodire nobis cōpertū
fuerit. Huius rei rō est, quia cōiectabile vī à supernis partibus, & sanguinis fon-
te fluxionē concitari, aut plenitudinē præesse, quam si prius nō deposueris, vel
longissimē à parte affecta retraxeris, maiorem proculdubio in eadem parte flu-
xionem concitabis. Itaq; retractionis, & plenitudinis deponendæ gratia, pri-
mò brachiorum venas tundere oportebit: deinceps verò habito respectu ad id,
quod ad partem inflammatam fluxit, vel fluere iam iā minatur, quod in venis
insit parū affectæ proximis, sanguinē fundere ex malleolis opus erit. Quo sensu
Gal. intelliges, q̄ li. de sang. mis. c. 18. & li. 13. meth. c. 11. cōstāter affirmat in vte-
ri inflammationib. venas, q̄ in talo sitæ sunt, scindendas esse. Cui decreto dicimus
aliud

A aliud esse deriuationē intēdere, q̄ ex proximis partibus fieri desiderat, aliud retractionē aut plenitudinis euacuationē, q̄ vel ex distantioribus, vel eis, quæ originē ac magnis venis propinquæ sunt, exercenda venit. Quā sniam hoc mō intelligendam esse Gal. consuluit lib. 2. ad Glau. ca. 2. dicens; Veluti in locis muliebribus in contrariū trahas, si eas, quæ in cubito sunt, secueris venas, aut māmilibus cucurbitas apposueris, vel manus calfeceris & fricueris atq; ligaueris. Deriuabis aut, si eas, quæ poplitibus aut tali, venas dissecueris, & cucurbitas coxis applicaueris, & crura calfeceris atq; perfricueris & ligaueris. Verum si aut parua fuerit inflāmatio, vel corpus non plurimū plenum, aut menses instauerint, sat erit uenas tali inscindere. Est quoq; Aetii decretum, cucurbitulas cū scarificatione dorso affigere, quas tunc adhibebis, cū dorsum plurimū doluerit; quæ coniectabile est, per uenas dorso adhærescentes, sanguinem ad vterum delabi.

Verum quia cuiusvis partis inflāmationes assolent aliorum humorum p̄ter sanguinem, non parū sibi admixtū obtinere, ob id facta sanguinis detractiōne sufficiente, pensandū est, an alijs etiam auxilijs pugnandū sit aduersus humoris redundantiam. In quo planē casu nil tutius aut commodius reperies, q̄ rarō aut nunquā expurgantibus vti: nā ad infimas partes, ubi affectus viget & dolores, euocant humores alibi existentes. Quod si efficere tunc tēporis aliquid noluēris, leuissimō aliquo pharmino purgabis. Nec displicet hac in re Auic. scia, qui vomere hūmōi scēminas iubet; quod duplici rōne factum esse censeo; & retractionis, reuulsionisve gratia, & vt humores superuacui per distantissimā ab affecta parte regionē excernantur. Ceterū si aliqui syrupis & portionibus vti ex mali vehementia cogaris, fugiendum omnino est ab ijs, quæ menses mouere possint, sed eos tantum porriges, qui aduersus humoris cum sanguine redūdantis conditionem pugnent. At si facta affectus inclinatione, cognoueris aliquem ex p̄dictis humoribus dominari, aut p̄esse, seligenti pharmino, mitiori tñ facto, cū purgabis, cauens ne pharminum sit ex ijs, quæ scāmoneum vel colocintidē recipiunt: sunt enim hæc plurimū huic affectioni aduersa. Nosti iam ex ijs, q̄ antea diximus, quæ biliosis aut pituitosis vel melancholicis prodesse possint.

C Sanguinis igitur detractiōne, vel lenioris pharmini exhibitione p̄missa, ad ea auxilia ueniendum esse consulit rei ratio, quæ quodammodo vltiorem affluxum ac augmentum impedire nata sint: & si quid factum est, per insensibile halitum discutiant. Imprimis, enim si erysipelatis inflāmatio particeps fuerit, quod ex igneo calore percipies cataplasmate uteris, quod recipit vitis pampinos, plantaginē, polygonum, portulacam, intubum, & umbilicum ueneris, quæ omnia pistata mediocriter calida & panno excepta, prodesse non parum solent. Infundes etiam in vterum succum aut stillatiuam aquam p̄dictarum herbarum, & postmodum inunctionem ex oleo rosarum & myrti cum pauco aceto parabis: cui si addideris succum plantaginis, summitatum vitis, semperuij, jacti consimilium, plurimū profueris. Quod etiam beneficium prestabis clysterium usu, dum eorum quātitas quam minima sit, ne uteri compressione actiores cōcites dolores. Id facies, si acceperis radicem altheæ ꝓ.ij. maluę, uiolarum, florum cucurbitæ, cucumeris vel peponum m. j. lactuca vel solam foliorum, m. j. prunorū numero xij. seminis lini ꝓ. f. florum uiolarum ꝓ. ij. decoquantur secundum artem, & ex decocto accipe ꝓ. vj. olei uiolacei vel rosarum

3. iij. & infunde. Quo facto vtendum est cataplasmate à Gal. lib. 2. ad Glan. cons-
 tructo ex succo semperuiui, sapa, vino austero, farina hordei & balauistijs, vel
 ex cortice maligranati. Præstat quoque incipiente phlegmone, auxilium, quod
 recipit succi plantaginis, folani ana. 3. vj. aceri 3. sanguinis draconis, boli arabe-
 ni ana. 3. f. olei rosarum 3. iij. quæ omnia panis excepta calida parui affectus im-
 ponienda sunt. Verum si astus maximus fuerit, præstat emplastrum ad aquilonem cum
 rosaceo liquefactum in vase plumbeo, addito plantaginis, auferens & intibi
 succo, facta ebullitione vsque ad spissitudinem. Item antiquiorum sententia est
 stat, forum ex decocto cupressi, oleo rosaceo, & modico melle vtilem esse. Con-
 fert etiam mitigandi doloris gratia vnguentum, quod recipit cere alba 3. iij.
 medullæ cerui 3. j. adipis anseris 3. j. & seroci g. x. Quem quoque vsum præstat
 foris confectus ex decocto, quod recipit radices altheæ, maluarum & violarum
 ana. m. j. florum violarum, chamæmeli & meliloui ana. p. j. fiat decoctum, & con-
 tundantur herbe, ac per cribrum transmittantur, facto fori, predictis additis
 ne hordei, & seminis lini, & olei rosarum quantum sit satis, vt fiat cataplasma.
 Sed mitius id conficies ex micca panis cum lacte & oleo chamæmeli. Præter
 hæc autem, si nihil aut parum erisypelatis phlegmoni in esse cognoueris, adhi-
 bebis cataplasmata ex farina hordei, seminis lini, fenugreci, vitellis ouorum af-
 satis cum rosaceo, & decocto capium papaueris & meliloui, adiecto modico vi-
 no vel modice illico aceto: cuius consimile efficies ex palmulis vino incoctis, fari-
 na hordei & oleo rosaceo. Item ex rosis, lentibus sine cortice, balauistijs, planta-
 gine, mucore pulicaris herbe, folano, labro, veneris, sedo, ramentis encurbitæ,
 cum hordeacea, farina & oleo myrtuno ac rosaceo. Quibus omnibus admiscere
 oportet, si affectio vigorem adire cognoueris, quæ modice discutendi & dirigē-
 di vires habeant, velut est farina volatilis, seminis lini, fenugraci, chamæmeli,
 vel ipsius oleum, & ouorum lutea.

Quod si dolor plurimum eo tpe vrgeat, mitigare omni arte studendum est,
 maxime vnguento, qd recipit farina hordei & fabarum ana. 3. f. malua & viola-
 rum post coctionem pistatarum ana. 3. j. caphura 3. f. macerentur oia succo aut stilla-
 titio liquore labri veneris, & facta expressione adde olei rosarum 3. iij. bulliat
 ad consumptionem expressionis, & addita axungia anatis & cera fiat unguentum.
 Cui consimile efficies, si acceperis chamæmeli, radices altheæ, seminis lini, fe-
 nugreci ana 3. j. caricarum pinguium numero viij. dactylorum nu. vj. terantur q
 possunt, & quippe ouorum luteis admisceantur, quibus adde violarum deco-
 ctum cum rosaceo, & facto emplastro, pubi apponito, digerit. n. & dolores mit-
 tigt. Verum si adhuc doloris urgentia persistit, uteri osculo apponito pessä-
 riū hac lege cōfectū. Papauer viride tūdes & exprimes, cuius 3. iij. admiscebis,
 3. x. sapa, & coq; ad medietatē, & linteo exprime, & adde myrrhē & galbani, a-
 na 3. j. tetrio, & postmodū adde medullæ ceruinæ & adipis anserinæ ana partes
 æquales, & iterū coque, & pessarium confice. Vteri etiam osculo adhibenda sūt
 pessaria, q præter id, quod dolores leniant, quodammodo aut repellant aut dige-
 rant, iuxta ipsius phlegmonis atatem, in primis quidem ex polygono, sedo, inti-
 bo, umbilico ueneris, portulaca, plantagine, ac pampinis contulis cum rosaceo
 aut lentiscino oleo, vel de vitellis ouorum, anlesis pinguedine & exiguo croco.

Cæterum si sedare dolores præter id studeris, hoc modo facies, fenugra-
 cum

A cum mellefacito & prima ac secunda aqua diffusa, cum tertia pura ac dulci coquito & excolato, & adipem anserinum addito, quod omnia ad prunas liquari finito, & ubi frige facta fuerint, pessarium confice & butyro recenti inunge. Quod si dolor plurimum creuerit, lachrymæ papaveris exiguum cum lacte muliebri, & succo fœnugræci apponito: alii et id admisceant rosaceo, ouo, & adipi. Eunt præterea huic vsui utiles dilutiones per metraquitein, maximè ex decocto, quod recipi rosarum rubearum, lentium cortice reiecto, plantaginis, labri veneris, solani, & intibi ana m. j. & lentium p. coquito ad tertias, & in uterum prolice 3. illi. Idem quoque facies ex lacte muliebri cum rosaceo uel ex decocto hordei cum syrupo rosarum, portulacæ aut saccharo. Præstat eundem usum oleum rosaceum solum, vel cum albumine oui: item aquarum arnoglossæ, coriandri viridis, aut hordei infundes, uel decoctum papaveris aut oleum eius, præsertim si id adhibueris prope os uteri. Confert non minus collyrium album Rasis cum lacte mulieris, uel aliquo ex prædictis succis, Virgineis tamen sedere facito in prædictis decoctis, uel in eo, quod conficies ex decocto fœnugræci, seminis lini, maluarum, capitum papaveris ac hordei: uerum in his, quæ acriorem habent calorem, maximè circa morbi initia ex aqua modicè calida cum oleo rosaceo infusus fiant.

B Quod si, ut dictum est, inflammatio inclinare coeperit, etiâ per uterinos chlysteres, pessaria & infusus, ad ea venies, quæ laxare & discutere possunt. Quæ inter prædictis decoctis addito fœnugræcum, altheam, semine lini, mûcaginem psyllii, & seminis citoniorum, pulegium, sisimbrium & saluam, quæ immergere feminam usque ad imum ventrem aliquando opus erit: & a balneo uentri apponeres hordeaceam farinam cum fœnugræco semini lini aqua mulla incoctam. Quo facto ad ea, quæ magis digerunt (cautè tamen & sensim) veniendum est, cuius naturæ est cataplasma, quod recipit radices liliorum & bisnallæ ana 3. in maluarum m. j. artemisii m. f. florum chamæmeli & meliloti ana p. j. coquantur, & ut supra dictum est, pistentur & contundantur, quibus adde farinæ fabarum & hordei ana quantum sufficiat, pinguedinis porcine & butyri recentis ana 3. ii. olei chamæmeli & liliorum ana 3. j. misce & cataplasma confice. Item huic vsui utile est pessarium ex carycis pinguibus cum modico oleo & pinguedine gallinæ ac pulueribus chamæmeli, sisimbrii, samplici cum medulla crurium utili & ladano ac styrace. In vera tamen declinatione emplastrum ex meliloto: vel addito diaquilone adhibere poteris.

C At si neque his omnibus, neque aliis, quæ passim proficua experimur, in declinationem affectus uenire comperiamus, rationi consonum ut suppurationi naturam intentam esse, ut ex antedictis signis facile colliges: quibus accedit inæqualis horror & doloris exacerbatio, iuxta illud Hipp. dum pus conficit. Postremò uero ad suppurationem perducto tumore, impetus accidentium aliquantulum remittitur. Quo tempore ne in schirrhosam duritiem & ægrè curabilem affectus degeneret, aut ne puris virulentia maius malum accersat, post maturitatem ruptionem quoque breuiter moliri oportet: ne diutius ibidem persistens pus maximam uteri partem corrodat. Quod facies adhibitis imo uentri cataplasmatibus ex fœnugræco, semine lini, farina triticea, ficibus elixis & terebinthina. Sed artificiosius conficies hoc modo: excipe chamæmeli, meliloti, fœnugræci, seminis lini & radices altheæ ana 3. j. caricarum pinguium, nu. viij. dactylorum, nu. xj. redigantur in puluerem

q̄ possunt, & adde nitellos ouorum nu. v. & cum aqua decoctionis violarū fiat **A**
 cataplasma, addito oleo rosaceo: qđ si immorari suppurationē cōperiamus, cō-
 lumbini stercoris 3. viij. addere oportet. Itē iuuandē suppurationis gratia, en-
 chatismatis, & infessionibus vtendum est, p̄sertim pudēdi sinu adhibita spōgia,
 aut suscepto vapore p̄ infundibulum ex decocto, cui vires insint trahendi, &
 emolliendi qualia superius abundē diximus. Si tñ caloris tantum persenserit,
 ut calidorū usum uerearis, emplastrū cōficiēs ex unguento rosaceo, maluis, &
 radicibus althēae incōctis, & extractis p̄ fetā cū puluerib. scenu græco, uel solū
 ex butyro, & maluis, aut ex rosaceo unguento, & carne radicū althēae. Quibus
 suppuratione facta, abscessum dirumpere studebis, uel motu aliquo uehementi,
 uel si ad pudēdum irruat, ruptorio instrumēto partis situ idoneo, cuius chirur-
 giā, & modum pulchrē docuit Aetius li. 4. Ser. 4. c. 86. quōbrē illuc recurrēdū
 esse censui. Dignosces autē diruptionis tēpus, q̄ cruciatus saepenumero aciores,
 stimulosi, & quasi cum aculeis inscindere videantur, caloresq; vehementiores
 molestant: urina supprimitur, interdum & oletum: aliquñ tumor circa pubē ap-
 parer, & tanq̄ exudationis sensus cum abscessus grandior fuerit. Neq; alia uia
 diruptionē curare oportet, q̄ corporis motu, uel adhibitis pessarijs, quā rum-
 pendī vires habeant, uelut est illud, quod recipit adipis asinerini 3. ij. resinā, te-
 rebinthinā, ana 3. j. pulueris rutæ, & nitri, ana 3. s. iridis illiricæ 3. j. & cum lana
 fiat pessarium. Cui simillima ex prædictis alijs parare poteris.

Rupto uerō abscessu, qđ ex eo cognosces, q̄ pus excerni cōpit, & dolores,
 ac tumor subsidere, uidendum primō est, ad q̄ partē ruptio facta fuerit: nā con-
 tingit nō rarō ex vesicā uicina ad eum rumpi, & cum urina pus excerni. Sic ex
 cōsortio cum recto intestino, p̄ ipsum quoq; pus excerni conspiciamus, maxi-
 mē si inflāmatio uteri, partes extimas attingat. Dum uerō pus urinae admixtum
 excernitur, lacte utendum est asinino, & emulsionibus seminum cucumeris &
 melonum: itē decocto hordei, & quatuor seminum frigidorum maiorū, muc-
 lagine & serapio ex his cōfecto; sero lactis cum saccharo & syrupo uiolaceo.
 Neq; erit ab re uti casia fistula p̄ interualla cum semine melonum, & saccharo.
 Si tñ p̄ rectum intestinum pus excerni uideas, frequentibus utitur clysterib. ex
 aqua mulsa, uel ex aqua hordei cum saccharo, si caloris sensus p̄fuerit, aut ex
 aqua plātaginis cū alumine & saccharo, cauēs ne aliqđ oleosum admiscēs. Cū **C**
 hoc tñ cōficiēs alium ex decocto lentium, & malorum punicorum cum rosis,
 & saccharo, aut olei momēto, si exosionē ex puris acrimonia fieri cōpereris. Vl-
 cus uerō uteri p̄ ea, q̄ abluant, & calorē attēperent curabis. Ablues quidē aqua
 mulsa, aqua hordei cum saccharo, lacte cum dupla aqua ordeī, aut mulsa por-
 tione, uel lacte ipso cum aqua lentium, aut seminum maluarum & saccharo: Itē
 tremor hordei, quē maximi momenti, cum aqua aluminosa admixtum, esse cē-
 semus, aut ipsa aqua aluminosa, uel aqua portulacæ cum sero lactis, aut aliqua
 instillata p̄ duplex vas ex his rebus nuper dictis. Verum si fors tulerit abscessū
 rumpi inter intestina, & utrum ipsum, euocanda ad extimas partes materia est,
 & cuius attenuāda scalpello, ferroq; ignito aperienda, & ut Aetius cōsultat, post
 apertionē ea figura locabis sceminā, qua residuum puris commoditate situs, sua
 sponte defluat: deinceps uerō aqua mulsa sectionem lauare oportet bis terve in
 die, & uelut alia ulcera deinceps curare, ut c. de uteri ulceribus discēs.

Quod

A Quodd si inflammatio œdematis particeps sit, aut pituita plurimum abundet, verendum quidem est, sanguinem detrahere, vel cum præmeditatione faciendum: postmodum verò ad emplastra, infusions, fots, ac pessos veniendum est, quæ cap. de vteri hydrope retulimus. Caterum frequentius purgabis, idq; magis per vomitum, quàm in vera, & exquisita inflammatione.

De scirrholo vteri timore.

Cap. 18.

C VM perdifficile sit huiusmodi affectum curare, si factus iã sit, & uter-
rus ex propria natura, ac menstruationis officio ei maximè sit obno-
xius (quod caro eiusdè crassa existat, & fluxiones semel acceptas te-
naciter seruet) ob id pfectò non leui diligentia, neq; oscitanter femi-
nas sic affectas tractare oportet. Scirrhi igitur natura durities quædã est vix sen-
tiens, vt ex Gal. constare vñ 2. ad Glau. proindeq; scirrhum nominamus tumore
durum, q sine dolore est, non tñ omnino sine sensu, vt ex eodè constat 14. methi-
cum hoc tñ exquisitus, sensu oĩno doloroso caret, vt Gal. refert lib. diffinit; di-
cens: Scirrhus tumor est corporis cum duritie, & gravitate, & mouendi difficul-
tate. Ex quibus finitionibus constat, scirrhi duplicè esse naturã, vt li. 1. c. vlt. abũ
dè dictum est: alter quidem est exquisitus, & non exquisitus alter. Vtunque tñ
sit, duobus modis vterum scirrho affici obseruauimus, nempe cum totum eius
corpus in duritiem degenerat, vel altera tantum pars; ex quibus morbi natura,
& particula affecta faciliè innoscit. Huic èt modo aliud non dissimile Paulus
adiunxit, quod scleroma appellat: & ob id scirrho adiungere placuit, q con-
similem obtineat curã di rōnem. Scleroma (inquit) cōforme est scirrho, circa vul-
uæ ceruicē magna ex parte consistens, tumorem quidē habens eodè pacto, sed
minus durum cum dolore mediocri. Est sanè vterq; affectus morbus in magni-
tudine, cum in genere tumorum pter naturã consistat: cui èt conuenit, morbu
esse in intemperie frigida, vt apud Gal. 5. simp. c. 6. & 8. legitur, ac in soluta etiã
continuitate. Verum si quis re penitus examinet, reperi et faciliè, duos uteri tu-
mores longè inter se differre: quippe eorum nonnulli statim ab initio naturam
scirrhi referunt: alij ex mutata, & indurata inflāmatione ortum habent: q sanè
differentiã ex humoris conditione contrahunt, ut mox probabo. Cōstat pterea
C alios differre loci affecti ratione: nam aliqñ uteri ceruix quodãmodo (ut Paulus
docet) induratur: qñq; verò vterus ipse in scirrhu intumescit, vel ima eius pars,
quam frequentius affici, scimus: quandoq; pars eius interna: quæ pfecto affe-
ctio molam uteri emulatur: nonnunquamq; extima eius superficies.

Huius porro affectus duplices existunt causæ: quædam. n. sua sponte ex qua-
nis materia scirrhum veluti manu faciunt: alia verò materiale principium præ-
stant. Sic etenim ex inflammatione, q longè à scirrhi natura dissidet, Medicorũ
imperitia duobus modis induratos tumores proficisci cōperimus: vno, vt Gal.
refert 2. ad Glau. cum vehementer inflammationes, aut erysipelata astringunt,
& refrigerant: induratur etenim hac via humor, & frequentissimè in immedi-
cabilem duritiem cōmigrat: alio verò, cum vehementer calida, ac discussoria
medicamenta intempestiuè tumoribus adhibent: quibus proculdubio tenne,
ac vaporosum faciliè euolat, crassum verò & terreste cōpactum, ac durius effi-
citur. Itaq; vt Paulus scribit, obdurefcit vterus qñq; sanè repente nulla pspicua

occa-

*duplex scir-
rhus*

Causa.

*dupliciter n
medici ex
inflāmatione
inducitur sci-
rrhus.*

Crassa materia in nostris corporibus fit quia omni aetate

occasione plerumque verò ex inflammatione, quæ processit & soluta non est, neque A
dissipata, neque in abscessu permutata. Materia tamen habet humores crassam, le-
vis, terrestris, ac difficulter solubile, qualis existit melancholia naturalis, quæ verum &
exquisitum scirrhum efficere nata est: tandem ex quavis alia quæ crassa quoque &
terrestris sit, scirrhum fieri, ceterum illegitimum, constat. Fieri etenim hæc crassa
materia in nostris corporibus, quatuor modis apud Gal. & veteres oēs comper-
tum habemus: primo quidem, dum melancholia naturalis ex aliqua occasione
aduritur, aut putrescit, & fit tunc teporis exquisita bilis atra. Quam sanè càm ple-
rūque reperies in feminis melancholico sanguine abundantibus, & improbe
à mēstruo purgatis. Probat quidē Gal. hanc sententiam 14. metho. & lib. de atrabile,
& possimū 4. Aphor. comm. 21. & eodem 14. metho. dicens, Siquidem hic hu-
mor, ubi amplius incaluerit aut per putredinem, aut febrem, inflammationem-
ve nigram efficit bilem: quæ quidem frigida est, quia terrestris, sed tamen caloris
non expers, quemadmodum cinis & acetum, ut in dysenteria ab eo humore or-
ta, conspicimus. Itaque, facile est hoc malum feminis, quibus ex feculento san-
guine vterus non purgatur, accidere, quia ibidem cōculcatus, sanguis incalcescit &
facile in duros humores sensim & paulatim migrat (quod deterius est) in universi
vteri duritiem: quia universi uteri venas eodem humore abundare contingit,
in id necessum est: secundo etenim modo succrescit eis crassus humor in corpori-
bus ex aliorum humorum adustione, velut ex flauabile contingit, quæ cæleo re-
periri biliosis feminis, iis præsertim, quæ diutius & vehementius se se estivo exi-
stente Sole exercitijs dederunt: in quibus biliosum humorem aduri oportet, ac
febres & alia vitia concitari, quæ postmodum in scirrhosos tumores degenerant,
idque maxime in vtero, tū quia ibidem maior copia biliosi sanguinis ex mēstrui na-
tura redundat: tū verò, quia vterus ocysimè incalcescit ab exercitio: & cum non ex-
purgetur superfluo sanguine, nisi singulis mensibus, & fortasse improspere, ob
id facilius aduritur, & in scirrhosam duritiem commigrat. Quod pari lege contingit,
si sanguis aut pituita in corpore redundauerint, & eò incaluerint, donec ferro-
re aut putredine contraxerint. Tertiò verò crassus humor in corpore accrescit,
dū ex frigidityte in lapidosam duritiem mutatur: ut cum ab imperitijs Medicis, vel
Chirurgis erisypelata & inflammationes, aut quivis alius tumor ex naturali-
bus humoribus factus, ad motis extrinsecus præsidij, vehementer refrigerant,
astringunturque. Tunc enim totum id, quod in eis subtile erat, dissipatum vi valèter
digerendum, reliquum plus iusto desiccatum, lapidosam duritiem postmodum
ex medicamentorum frigidityte consequitur. Quod sanè non minus feminis
accidisse constat: nam dum uteri calore aut sanguinis, aut bilis abundantia labo-
rant, frigori sese imprudenter exponentes, aut potu utentes frigidiori, uterum
subito indurum tumorem elevari conspicimus nulla alia rōne, quæ superabunda-
tibus humoribus (à quibus fortasse resoluta erat tenuior pars ob dictum calo-
rem) conerescit, densis crassioribus ac frigidioribus factis. Quartò denique & ul-
timò melancholia non naturalis insurgit, quando alius humor ipsi melanco-
lia naturali permisceatur, maxime pituita, cuius adhefu melancholia, tenacior
& crassior efficitur. Quod item non raro feminis accidere scimus ex vitæ in-
temperantia & ciborum frigidorum usu: quæ lege mixta melancholia in
predictum affectum non raro degenerat. Argue hæc sunt in universum qua-
tuor

A tuor materiales causæ, quas ad veram medenditationem expendisse oportet. *signa.*

Nosces aut morbum ipsum in genere ex tumore duro tactui *cōspicuo*, ac citra dolorem: indicat. n. tumor seipsum manifeste. Præter id femina sic affecta, ad motū tarda existit, non quidē solum crurium vitio, sed & vniuersi corporis, qd desidra ad exequenda munia corripitur. Accidit in superficialibus (si se recte non gerant) malus & aquosus corporis habitus: & plerumque in principio mēstruis ex toto priuantur, aut diminutos habent, & crescente malo magno sanguinis fluore, saltem per intervalla vexantur, apertis plus iusto venarum & ut hīs, aut vero nequeunte suscipere & continere consuetam sanguinis copiam.

Ceterū an ætiallo glutinoso; huiusmodi ad pituitoso origine dicat, vel ex nigabile, q̄ veluti fex sanguinis existit; ex partis colore, vti mens est Gal. lib. de iunio. præ. nat. e. v. o. facile distingues: qd si nō signū huiusmodi existit. Quæ obfē ex corporis colore facilius dignosces: namque si ex bile nigra oriatur, color totius corporis ad nigriorem declinat; si vero ex crassa ac lenta pituita, ad subalbū, vel ad plūbi colorem vergit. Iteur etenim quales in se hēt humores, tales qdē toti corpori præstat, & tales in affectam partē delabi necessum est. Sic, procul

B dubio Gal. lib. de lo. aff. ex solo colore refert cognovisse splenē an iecur affectu esset. Cui equidē affectioni nō raro adiūgit oris foetidissimus odor, aut ipsius exulceratio vel genū impotentia, q̄ oia in stomachi, & vel *feceteris* splenis & ventriculi gravissima affectione; plerumq; succrescunt, ex halitibus reus & vitio sis ab adusta bile aut vitio iecoris vel squalido corporis habitu illud ascendit. *ex colore corporis cognoscitur humor peccas.* *obstructione.* *distinguebā signa scirrhi amo h*

C Quibus signis adtingere oportet ante actū vitæ rationē, cibonū usum, cuiusq; humoris redundantis propria signa, etatē & peculiare femina naturam, & habitū, ut osum facta coniectura in humoris redundantis cognitionem facilius devenire possis. Sed in huius affectionis dignoscione nō parū cōtingit medicos decipi, quippe cum affinis ei sit uteri mola vel scirrhus splenis tumor, ob id diligētia interno sciendū est; ne in curatiōe aberremus, vtrū horū sit, sed distingues huiusmodi affectū à mola saltim ab ea, q̄ utero adheret, qd in calicet mēses pdeat, nō in ordinatē, ut in hōe affectu, in qua aut supprimitur, aut ordinē habent si fluat, eo qd ex uteri venis nō pauce tumore obturent, ita ut nō ea tuto possint expurgari: in mola vero aut nō fluūt, aut inordinatē, idq; aut copiosi, aut parvis quā par sit. Itē mola dū femina stat, in os pubis incumbit & mamme turgent lacte, in scirrhus vero, extenuatur, & tumor non procedit, licet hinc inde mutetur ad uteri quoq; mutationem. Præterea ab splene indurato distingues, quia licet ad varias partes splenē decedat, variosq; situs mutet, emuleturq; aliorum viscerum obstructions, ut non raro in hoc uteri affectu contingit, non tñ ob id credendū est, splenis tumorem esse, quia is vel corporis vitiat colorem, qd si id non faciat, quia solum iecoris affectiones id de iure habent, lædit tñ vel mentem, vel alium ex melancholicis generat affectum, quo monstrat splenem præuē suo officio uti: affectionē vero esse in uteri corpore & nō in ceruice distingues, quod in coxam & dorsum plerumque uteris incumbat; ibidemq; dolorem ferat, at in ceruice esse, quia a viri accessu plerumque offenditur, & obstetricis digito attingitur malum, & apparet osculum durum: item quia frequenter ab incumbente vel comprimente tumore vesica, si in superiori colli parte sit tumor, lædit; aut rectū intestinū, si infima eius pars, vel alterū inguē, si i altero latere affectio existat.

Sed

ap indurati hene.

curatio Sed præter hæc, in quocunq; latere decubuerit laborans, illic quoq; tumorem adire citra dolorem, signum est non lene huius mali, vt Hip. refert, s. popu. in historia vxoris Gorgiæ, in qua equidem, etiam recenset affectionis causam, nimirum menstruorum per quadriennium suppressionem, & quod magis mirandū est, cum hoc concepisse: ceterū postea ex diutina profusione sanguinis a partu, male habuisse, tandem molā postea proiecisse, postquam sana facta fuit.

Etiā si scirrhus vnicam obtineat morbi rationem, vnamq; naturam, non id credendum est, vnica solum via curari posse: nam pro ratione causæ mouentis, & naturæ materie, & generationis modi, variare etiam medendi rationem opus erit. Sic in legitimo, & vero scirrho triplex insurgit curandi scopus: primus quidem viuendi formam præscribit: secundus materiam antecedentem, quæ morbum frequenter adaugere solet, tollendam monet: tertius verò humoris in tumore iam contenti, & indurati vacuationem nobis insinuat. Qd̄ sanè opus, quia affectio in utero est, nō solum medicamentis extrinsecus adhibitis perfici debet, verū eis, q̄ in potu sumuntur, vim habentibus aperiendi atq; extergendi eū, qui in viscere continetur, humore, vt de scirrho iecoris, 14. meth. c. 4. Gal. refert. Ad primum igitur scopū deueniendo, eam vitam scēmina degat, quæ nihil melancholici congerat: ob id summa diligentia curandū est, vt eos sucos gignat, qui ex toto sint, melancholico succo contrarij. Quamobrē, victus rationem eis, q̄ scirrho laborant, sobriam, moderatam, humidam, & q̄ ad moderatē calidā inclinet instituito: porrigens alimenta boni succi, & probū sanguinem gignentia: panem non plurimū coctum, vinū vel tenue, vel admodum dilutum, aut nullum, sed lupulorum aquā, vel schorchioneræ, aut ferratā, vel in aqua aurum sæpius extingatur, oua itē forbilis, pullos, capos, gallinas, & oīum iura p̄beto. Existunt quoq; vtilis capreoli iuuenis, & viuli lacteūs carnes: ex oleribus lupulū, borraginē, buglosū, atq; id genus alia p̄bere poteris.

Quibus præmissis, secūds scopus docet, mox ad materiæ antecedētis purgationē deueniendū esse, ni prius sanguinis nigrioris abundantia nos compulerit ex saluatella sinistra sanguinem fundere, aut ex talo, si mēses deficiāt, vel ex hæmorrhoidibus quod magis probō: nā præterquam q̄ hirudines per has sanguinem feculentum euacuant, à parte quoq; affecta, saltem à uenis utero proximis plurimū deriuare natae sunt. Quo facto medicamēto purganti, qd̄ bilē atrā educat, vteris, prius tñ præparatis uis & humore. Sunt aut hæc epithymum, sena folia, polipodium, fumaria & lupulus. Item casia fistula, myrobalani indi dilutū lapidis lazuli præparati pōdere. g. vj. cū syrupo ex nouem infusionibus niolarū, diasenæ, diacatholicon, hiera Rufi, sed præcipuē cōfectio amech sine scāmo-neo & colocintide: vel si affectio inueterata fuerit ac melācholia plurimum & crassū in corpore redūdauerit, g. iij. p̄parati sibi jmo porrigere potes, cōsideratis prius scēminæ uiribus & habitu ad patiēdū robusto. Et facta semel pleniori purgatione, tutissimū erit cōsiliū paulatim humorem expurgare: nā in scēminis plenius hūc humore purgare, raro usū uenit. Sic. n. ex aqua lactis uel lupulorū facto decocto senæ, mirū in modū pdest, uel ex p̄dicto decocto saccharo & prunis damascenis facta cōserua. Alia qd̄ plurima cap. de melan. uirg. & uidu. reperies, q̄ huic usui p̄ficua fore spero, iterq; primū locū tenet syrupus de scoria ferri cōfectus, uel aliqua ex p̄parationib. chalybis, ut paulo inferiūs sū mōstratur.

Sed

- A** Sed monet tertius scopus interim dū hæc fuit, ad cōmunissimam præcipuāq; omnium tumorum curationem deuenire: q̄ sanè consistere in vacuatione eius, quod in parte continetur, nullum ambigere arbitror: circa q̄ maximè attentum te esse oportet. Quippe si id opus oscitāter aggesseris, facile in duritiem veluti lapideam, tumorem deduces, si temerè resoluētib. vtaris. Verū si plus, q̄ par est, tumorem ipsum emollieris, periculum proculdubio imminet, ne aut materia intus contenta corrumpatur, aut scirrhus in malignū cancrum degeneret: q̄ sanè mala vteri scirrhi q̄ citissimè accidere solent. Insequi enim hæc in re Gal. & antiquorum dogma oportebit, nimirum q̄ scirrhosis tumoribus nullum vehementer exalfaciens siccansq̄ue medicamentum, applicetur: neq; solū, id qd̄ emolliendi atq; humectandi vires habeat. Quod. n. (inquit Gal. 2. ad Glau.) superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit, qd̄ verò minimū, plus quā oportet, exsiccatur. Sic Aut. alternatis vicibus, modò emollientibus, mō digerentibus per halitum vtendum esse, in his humoribus asserebat. Scripsimus autem nos lib. 2. de indica. auxil. qua via, & ratione induratos tumores emollire oporteat. Interim tamen à principio ijs vti oportet medicamentis, quæ aduersus duritiem pugnent, iuxta ipsius conditionem, & naturam.

Sic scirrhosam duritiem ex melancholia contractā emolliunt, q̄ verè emollientia non sunt: nā duris ex cōgelatione tumorib. proficua esse cōstat: sed mixtā, vt inquit Gal. lib. 5. simpl. facultatē habentia: hoc est, constantia ex tenuibus partibus, vt locus affectus in abscondito situs, & induratorū ratio exposcere videntur: nā emollientia sola permeare non pnt: calida, & tenuium partiū plurimū dissipabunt tenuioris humoris partē: quo fit, vt ea miscere cōueniat. Sic Rasis, 7. ad Almanf. ad scirrhosam duritiem vtilissimū parauit, medicamentū, qd̄ recipit bdellij, ammoniaci, galbani, singulorū partes equales, terantur in mortario cū oleo de ben. & liliorum, deinde adijce mucilagīnū fœnugræci, seminis lini, sicutum quantum sit satis, vt fiat linimentum, vel addita cera, emplastrum. Cōmendat quoq; Gal. li. 14. meth. radicē arboreſcentis maluæ, anserino, vel gallinaceo adipe liquatam, contusam, & cataplasmatīs forma impositā. Cōfert etiā aliud, qd̄ recipit butyri recentis, pinguedinis porci, anatis, & anseris an. 3. j. olei amygdalarū dulciū, & liliorū an 3. iij. mucilaginis seminis fœnugræci extracti e cū uino albo, 3. j. terebinthinæ, & ceræ quantum sit satis. Verū antequam aliquo ex his præſidijs vtamur, fouenda pars est decocto, q̄ recipit radicū liliorū, his maluæ, & althææ, an. 3. f. maluarum m. j. artemisiæ, vel nepetæ m. f. caricarū pinguium, nu. x. seminis lini, fœnugræci, ana 3. ij. florū chamemeli, violarum, meliloti, an. p. j. fiat decoctio in aqua, & oleo dulci, qua semel aut bis in die vtitor: ex cuius est subsidientia pistata, & per ſetā extracta, vtilissimum parabis cataplasma. Idē beneficiū præstabis fomento ex oleo liliorum calido, amygdalarū dulciū, de myrrha, & de styrace. Vtilissimum quoq; est insedere in prædicto decocto, ibidemq; aliquantulū permanere: sic ex prædicto decocto, & oleis clystera parabis, q̄ maximi fore momenti arbitror. Hoc tñ in his præſidijs seruare oportebit, vt initium facias ab his fomētis, in sessionibus, vnguētis, & emplastris blandioribus: ob idq; hunc ordinem seruare oportet, vt primò adhibeas qd̄ recipit olei liliorum, & chamemeli, an. 3. ij. adipis anatis, medullæ cruris vituli, & cerui, an. 3. j. bdellij. i vino liquati, 3. iij. luteū oui affati; quibus adde ex postea, 3. f. cuius

*cur emolliet
hæc que sunt te
nuia partia
sic admixta.*

f. cuius p. metrachitā in uterū aliquid infundes. Quo facto, alio uteris, pituita A
 præsertim dominante, qd recipit thuris, ammoniaci, an. 3. j. mastichis, castorei,
 stactes, adipis anatis, & olei chamæmeli, an. 3. ij. gūmi in hydromelite liquen-
 tur, & in yterū inijciuntur, aut extrā applicentur. Nec placet in hoc affectu
 pellos adhibere, et si ab antiquioribus commendentur: nam aut suspectos es-
 se, si efficaces sint, cenfeo, aut nullius momenti, si mitiores. Quibus factis, si ni-
 hil tumorē durū remitti videas, iterū ad vnguenta, & emplastra te conferes,
 præsertim ad illud, qd recipit opopanax, bdellij, ammoniaci, an. 3. j. styracis,
 myrrhæ, an. 3. f. propoleos, 3. j. radices iridis, 3. j. croci, 3. f. dissoluantur lacrimæ
 in oleo liliorum, amygdalarum dulcium, & vino decoctionis maluarū, & de-
 purentur: quibus adde ceræ, & terebinthinæ quantum sit satis, vt fiat vnguen-
 tum. Post aliquod verò tps, emplastrum conficies ex diaquilon cum gummis,
 vel vnguentum filij zachariæ cum plumbo vsto, aut aliud ex eodem plumbo,
 & radicibus althææ coctis, pistatis, & extractis per setam, additis pulueribus
 marchasitarum: ex lythargirio itē, oleo rosaceo, & prædicta carne radicū al-
 thææ cū modica cera, & alia quæ lib. 2. de indic. huic vsui proficua adduximus.

Quod si scirrhus tumor ex illegitimis fuerit, tunc quidem q̄ fundunt, & le- B
 uiter calfaciunt medicamēta adhibenda sunt, admixtis, q̄ tenuium sunt partiū.
 In primis. n. vteris illiniatur oleo sabino, qd omniū est tenuissimum, vel iasmi-
 norū, aut naphthæ: post q̄ ammoniacum aceto dissolutum adhibebis, & adipēs,
 ac pinguedines calidiores, vt simul qd congelatum est, soluant, & qd solutum
 fuerit, digerant: quippe q̄ ex frigidi tate induruerunt, sic curari exposcunt. Cui
 vsui proficuū est, vnguentum, qd recipit folia capparis, q̄ infundantur in aqua,
 donec emollescant, & terātur cū eis folia caulis cū hydromelite decocta, & ex-
 tracta p. setam, & cū cera fiat vnguentū. Verunt si scirrhus ex admotis medica-
 mētis, vehemēter digerētibus temerēq; adhibitis factū fuisse cōperies, ea medi-
 camēta proficua erunt, q̄ plurimū humectent, emolliant, & modicē calfaciant,
 veluti est oleū dulce, vel amygdalarū dulciū, decoctū maluarū, liquatis in eo-
 dē pinguedinibus, vel adiectis oleis p̄dictis, quib. frequēter partē fouere opus
 est. Idē beneficiū præstat oleū, in quo ferbuerint maluæ, violæ, aut radices al-
 thææ: vel adiectæ fuerint mucilagines, ex quib. & pinguedinib. conficere apta
 huic affectioni pharmaca. facile tibi erit: præsertim si locū ex lib. 2. nō nuper C
 adductū curiosē legeris. Quib. adhibitis, reiteratisq; fomētis, nō erit admodum
 difficile induratos scirrhos emollire, potissimū si induratorū affectio diuturna
 nō fuerit: na eo statu tutius est, totū negotiū optimo vitæ instituto cōmittere, q̄
 ex importuna curatione, affectionē in cancerum mutare. Veriti. n. sunt Gal. Pau-
 lus, & Auic. ne ex inconsiderata auxiliorum administratione, granius aliquod
 & incurabilius malū accedat. Consulunt quidē scirrhosis affectionibus nullū
 vehemēter exalfaciens, siccansve medicamentū esse adhibendū: mihi tñ ad-
 dere placet, neque diutius, et si leue sit nullum item, quod solū humectandi, &
 emolliendi vim obtineat. Verū si femina biliosa fuerit habitus, & exusti rēpe-
 ramēti, aut melancholica, p. adustionem facta, ad aquæ dulcis balnea cōfugiē-
 dū esse consulo, nisi status copia vetuerit: quo tpe in sessionibus vtendū esse de-
 coctis aquæ ferratæ cū herbis, quæ vim habeant temperadi, & emolliendi: fu-
 giendū quidē a suffumigijs, aut pessarijs, quæ uterū purgent, licet ea, quæ emol-
 liant

A liant ac leuiter digerant, proficua esse constet. At in eo scirrho, qui aut pituitæ particeps est, aut ex melancholia naturali factus, verendum non est, ad aluminosa balnea confugere, licet mihi magis ex usu videantur quæ ferrea sunt, vel eorum loco infusiones aqua ferrata, & prædictis herbis decocta. Quia tamen hanc affectionem difficilis esse curationis experimento didicimus, ob id ad maiora auxilia confugiendum esse consulti rei difficultas. Interea profectò, quæ scirrhosam vteri duritiem emolliunt, nil citius eam conterere inuenies, quam chalibis usum, quo sanè vel magnos lienes, & lapidosas vteri durities, promptè liquari vidimus. Cæterum quia plerumque observatione potius, quam ratione, hoc præsidio plerique vtiuntur: ob id quidem (licet lib. 2. de præsid. ind. & cap. præcedenti, de virg. obst. eius meminimus) hac in parte, paulò latius eius vim, & operandi modum ac differentias recensebo.

B Vulgatum est apud plerumque Medicos, in curandis obstructionibus, ut antea diximus, chalibis limaturam cum leui aliqua præparatione, quæ eius substantiam non mutet, præbere. Alij quidem, ipsum aceto præparant, donec in tenuissimum pollinem commigret: alij rursus oleo, & multæ aqua vel vino, & ferè omnes mille alijs medicamentis admiscunt: tandem quisque suam parandiratione laudat, contemnuntque reliquas. Quod censeo proficisci ex ignorantia legum, & rationis, qua ferrum obstructis mederi possit: & quid vnumquodque corpus, & affectionis varietas, iure sibi exoptulet. Quæ profectò omnia si dixerò, constabit, quibus hæc, & cui illa præparandi, & conficiendi forma, ex usu sit.

C Ferrum itaque & chalibis, non ob id, quod pondere obstructas partes permeet infarctui liberat, sed ut sæpius à me dictum est, quod vim habet non leuem abstergendi, & repurgandi obstructos meatus, cui et operi addenda est vis purgandi non leuis, qua fruatur ob maximam copiam sulphuris, & mercurij quam habet: quia hæc sunt omnia metallorum principia. Et cum ferrum sit rudius inter omnia metalla, hæc ob id plurimum de materia horum principiorum: quibus profectò habet liquandi, fundendi, & attenuandi quod viscidum, & crassum est (ac materia existit obstructionum) maximam vim, & efficaciam: quo fit ut facile purgandi vires habeat: non quidem quales medicamentum trahens, sed ratione, & modo supra dictis, licet dum id copiosius efficit, per vomitum, & infernam aluum abunde purgare visum sit. Quod sanè dogma euidentè argumento probari potest, quod chimicæ artis professores, ut ex ferro, adstringendis fluxibus, idoneum parent medicamentum, quod crocum Martis appellant, illud, igne sæpius adhibito, ab omni sulphureo recremento, & mercurio, bellissimè expurgant, quibus alioqui existentibus mordacis, & venenosa est conditionis, & non parum purgat, aut vomitum mouet, haud secus, quod quouis aliud medicamentum: non quidem quod trahat, sed quod liquet, & fundat prædictos humores: quo fit ut facile ipsis per urinam, vomitum, aut aluum euocatis, lente, & paulatim, ab infarctu liberet ac deobstruat.

Quo tanquam uerissimo chimistarum, & eorum qui de re rustica scripserunt fundamento supposito, aliud non minoris momenti licet præmittere: nimirum in ferro duobus modis sulphur, & mercurium, in propria substantia obtineri: uno quatenus est iam uera eius ferri substantia: alterum uerò, ueluti futurum (ut sic loquar) alimentum, quod crudius, crassius, & perniciosius est, ex quo non leuia scimus suboriri accidentia his, qui eo utuntur.

Tertio

*Calibis faculis**quomodo Chalibis uisum moueat obstructiones*

Tertio expédédū est, eā sulphuris, & mercurij substantiā (q̄ cocta, natīua, & p̄pria facta est) verā vim, & efficacīā purgandi (vt dictū est) obtinere, reliquā vero nō nisi corrumpendi, & alterādi, idq; non parū: quā profectō rōne, rei natura duce, qui hoc p̄sidio primitus vti fuerunt, chalibem p̄parare antea studuerūt, ut separarēt à chalibe ipso, quod crudū, & alienū est, vt mox docebo.

*Chalibis uir
separetur.*

Quibus iactis fundamentis infertur, aliud esse ferrum p̄parare, vt fluxū alui, aut alterius partis sistere possit; aliud verò, ut partes obstructas ab infarctu liberet, ac repurget. Nā chimistæ, ut aluum sistat, ex toto nituntur uim sulphuris, & argenti uiui auferre, extinguere, & separare, & ob id ipsum grandi igne, aut aqua ualida conterunt, donec in crocum Martis cōmutent: quo sanē p̄sidio ualidissimē fluxus quiuis sistitur, & flascidæ partes roborantur. Verū q̄ meatus repurgare, & aperire obstructiones nituntur, non hoc, sed partem eius, q̄ repurgat, exquirunt: quod si aliquis dixerit, ob id integris suis uiribus esse adhibendum, & non utcunq; mutatum, aut depuratum: huic dicimus, plus damni subleui qui ex parte illa excrementitia, q̄ ex maiori purgatione beneficium: p̄terquā quod forsan minus purgabit, quia ocyus descendit, & nullum habet ad operandum locum: quapropter, sic chalibem oportet p̄parare, ut quod excrementum, & extraneum est, separetur, manente parte purgatiua, & abstergente.

Crocus Martis

*Aqua Chalibeata
pro sistēdi
ribus quomodo
separetur.*

Sic proculdubio, tribus modis chalibē p̄paramus, uno collecta in alio medicamento p̄dicta parte purgatiua, citra aliā chalibis substantiā, ut fit, chalibis limaturis candentibus sēpissimē in aquā, uel liquore alium immisissis, cui p̄culdubio, vim purgandi, & repurgandi non leuē p̄stant, maximē si aqua prius ferbuerit aliquo medicamento affectioni, & parti proficuo. Monere tñ hac in parte lectores oportet, ut cum aquā fluxibus sistendis, ex chalibe extincto, parare student, primam aquā abijciant, utq; uim purgatiuam non minimā sortiāt, & reliquam usui seruent. P̄paratur secundo modo citra ignis vim aut actionem, comminuta liquata, & abscissa recrementitia illa parte, aqua uitæ, aut acetō, donec ex toto yniuersa limaturæ substantia cōminuatur, quippe acetum, totū illud quod extraneum est, ocyssimē conterit, relicta parte natīua: nec obstat erugo quæ acquiritur, quam igne faciliē separabis, aut aqua feruentissima, & oleo, uel oleo solo, maximē cū admiscemus purgatiua medicamēta, & alia quæ vim chalibis adaugent. Tertio verò ignē sēpissimē cōburente partē illā superfluā, manente puriore, & uiliore, corrigimus, vt fit ex limaturis acuum, aut armorum, uel alterius chalibis qui vim ignis sēpius experitur, maximē si post limaturā iterū pluries succendatur, & extingatur, oleo amygdalarum, aut uino quod magis probo. Quo fit vt semper magis probem chalibis limaturam, in delicatioribus: in alijs verò ferri, p̄missa aliqua ex dictis p̄parationibus.

His suppositis, iuxta has tres p̄parandi vias, & rōnes, cōsiderandū est, quā harū scēminæ laborantis corpus expostulet. Nam scēminæ quibus obstructiones in vijs ductuum (dixerim in extremitatibus vasorum, q̄ in ipsas tendūt) existūt, aut quæuis alia durities cui hoc p̄sidio opus sit, chalibis limatura leuissima p̄paratione, & diadragacanto admixto cum melle adhiberi pōt, p̄ferim si corpus robustū fuerit, vt Aetius cōsultat, aut p̄cesserit, aliquod ex leuioribus pharmacis, chalibe ēt confectis: tūc potissimum, cum scirrhusa affectio est. At ubi in penitioribus uenis, & abditis corporis sedibus obstructo fuerit, chalibē minu-

A minutissimè, & vel acerrimo aceto præparare oportet, & alijs medicamentis, q̃ vim habeant purgadi, & attrahendi admiscere opus est, vt & vis chalibis citius, & penitus permeet, & ipsiusmet substantia (salte per vias prope iecur) puadat. Quo quidem fit, vt ipso liquante fundenteq; & abstergente, ac trahentibus reli quis medicamentis, q̃ expurgant admixto, qd obstructũ est, facile aperiatur, ab infarctu q̃ liberet, humore obstruente ab eisdem partibus secedere. Præterea in scirrhis earundem partium affectionibus & antiquatis obstructionibus, vinũ aut aqua, in qua sepius ferrum extinctum sit, vel mirè prodest, vel saltem viam disponit ceteris chalibis p̃sidijs. Quæ pp in scirrroso vteri tumore, primitus, p̃dicta aqua vti cõuenit, decocta quidem asplenio, mirica, asparagis, coruicibus capparis, folijs lenæ & cinnamomo: cui decocto addere poteris medicamenta, q̃ partem in qua obstructio aut scirrhus dispositio viget, respiciant. Postea vero ferri limatura ed vsq; extinguat, quod pinguedinem q̃dam supernatantẽ conspiciamus. Cuius si non suffecerit vsus, ad syrupũ de schoria ferri deveniendũ est: nam eũ in hac affectione non liceat laborioso vti exercitio (vt postulat p̃sidijs cõditio) ob partis affecta situm, & ne nimio exercitij calore in cãrosam naturam commigret, vtiora sunt liquida pharinaca. Ac sine id quidem suffecerit, ad chalibem aceto præparatum peruenire oportet: & vltimo ad crassiorem, admixtis alijs medicamentis, vt dictum est capite de virginum obstructionibus.

De vteri cancro. Cap. 19.



Infortunium quidem miserabile est, dũ eò mali vterus deuenit, vt cancerũ cõtraxisse, iam comperitũ sit, maximè si vteri collo innascatur: exulceratur enim citius, qd in omni desperatione negocium esse situm, ostendit. Cancrum tñ esse duplicẽ, euidenter norunt oēs. vnum sine vlcere; alterum verò vlcera. Ille quidem nil aliud est, q̃ tumor durus, inæqualis, rotundus, venosus, id est, venas habes in circuitu turgidas, liuescens siue fuscus: & vt Paul. refert, colore magis, q̃ inflammationes nigricans: calidus, sed non adeo vt inflammationes, subito accrescens, laborantes maximè fatigans, & perpetuo ferè dolore affligens. Vlceratus verò cancer est vlcus, qd p̃ter dolorem tumoremq; inæquale conspicitur, plurima ex parte sordidum labris p̃tumidis cõstans, aspectu horrendum, & concreta humorum colluue nigratum. Quod quidem, vt inqt Paul. videtur fœculentum, liuidum atq; interdum et subrubrum, & cruentũ apparet: sanies inde manat continuò tenuis, aquosa, nigra aut fulua, graniter olēs: appellatũ aut huiusmodi affectum lupũ, quia carnes auiũ, si illi aponat, absumit.

Hæc igitur est horum affectuũ natura, quos in fœminarum vteris plerũq; *Causa:* su boriri scimus, si materia ibidem vratur. Sed vterq; affectus principium nanciscitur à mēstruo sanguine copioso, diu in vtero retento, cuius crassa pars, dum in vteri substantia senlim & paulatina congestione aggregatur, in scirrhũ degenerat: ex quo humore ibidẽ exusto, vel aliunde torrido, & ex calfacto adueniente, cancer orit̃: nec non ex eodem sanguine serosiore, tenuiore, & acriore facto ad superficiem tumida partis illabente, venis circumstantibus exulcerationẽ fouentibus. Cuius si plura scire velis, caput vltimũ lib. huius operis primi, legito.

T Primo

Primò diligenter examina, an scirrhus in cancrum degenerare nitatur, qd fa-
cile discies, si cum prius esset sine dolore tumor, dolorem denuò sentiat femina
ob caliditatem, & acrimoniam humoris in cancrum iam iam defluentis. Cui ite
adiungitur dolor circa inguina, imum ventrem, abdomē ac lumbos: moles, in-
tus, veluti pondus aliquod grauius esse videtur, febrisq; ei adiungit, remissior
tamen, quàm in phlegmone. In his etiā sceminis tumor circa hystera ostium
durus, varius, tumens, colore feculentus, rubicundusque deprehenditur. Red-
ditur insuper in hoc malo scemina nauseabunda, fortasse ex retro ipsius odore,
ventri communicato, & exacerbatur locus manuum attrectatione: ac, vt Celsus
refert lib. 5. circa locum cancro affectum, quidam ictus quasi punctim illati, sen-
tiuntur: interdum etiam eadem pars torpet, interdum quidem dolet, & interdū
dolore vacuat. Caterū exulcerati cognosces ex his omnibus accidentibus, in-
tensioribus factis, ac diu perseverantibus: nam coniectabile est (si quidem alia
signa rimari non concedit loci affecti situs in imo ventris reconditus,) acrem,
mordacem, & copiosum humorem, qui hęc concitat accidentia, id iam iam ef-
fecturum. Verū exulceratum esse solum cognosces ex sanie, quæ emanat te-
nuis, aquosa, nigra, fulua, & grauius olens. Fluit etiā nonnunquam sanguis,
& si vas aliquod grande abraditur, sæpe tam copiosè profunditur, vt mortem
maturius afferre posse credendū sit. Cognosces id malum insuper ex lenta fe-
bricula, ex fastidio, ex inquietudine, ex animi angore, ex maxillarum rubedi-
ne, pudendorum ardore, fetore ac dolore: quæ sanè omnia facile ostendunt
maligni huius affectus naturam & conditionem.

*Curan-
di ratio.*

Quantum difficultatis secum ad curationem afferat cancri conditio, nemo
profecto, qui artis operibus studium dederit, ignorare poterit. Quam diffi-
cultatem ex propria affectus natura proficisci scimus, & quia in principijs fre-
quentissimè multi id malum negligunt, quod dum incipiat, nullam, aut levis-
simam inferat molestiam: quo sanè tempore eius incrementū prohibere haud
difficile esset. Quamobrem cum huiusmodi affectus ferè ex propria natura &
loci incommoditate incurabilis videatur, & omnino incurabilior, si exulce-
rationem sortiatur: satis me fecisse arbitror, si prohibuero non vlcerati exul-
cerationem, & vlcerati incrementum. Occultos etenim cancras, quales exi-
stimamus qui in vtero sunt, tutius esse duxit Hippo. non curare, quòd curati
citius pereant: ob id quidem blandè & leniter ipsos tractare opus est, quippe à
medicamentorum intempestiua adhibitione facillimè exacerbantur, & omni-
no immedicabiles fiunt. Hac equidem ratione incipientem cancrum sic pri-
mò curabis, vt & melancholici adustique succi generationem inhibeas, ac si
quid genitum est, minuere sensim & paulatim studeas: secundò verò, & vlti-
mò, quòd in duro tumore continetur, vel paulatim digeras, vel quominus ad-
augeatur, cures.

Circa primam curandi rationem, quā in hoc affectu potissimā esse arbitror,
ea alimenta ministrari iube, quæ refrigerandi, & humectandi vim sortita, pbū
ac tenuem succum generent, inhibeantq; omnem succi serositatem, calfactionē
& inustionem. Qua victus ratione instituita, simul cū eo viuendi mō, qui quie-
ti omnino deditus sit, considerandū mox est, an affectio ex aliqua suppressa na-
cuatione principium traxerit, veluti à mēsisbus aut hæmorrhoidibus suppressis, à
qua-

A quarum prouocatione principium curationis auspicari oportet, ni tanta in corpore fuerit, ex hac, uel quauis alia causa, sanguinis copia, q̄ primò cogat ipsum ex dextra, uel sinistra basilica fundere: si ætas, uires, ac melancholicus habitus non uetuerint. Quo facto paulatim, ac sensim menses, aut hæmorrhoides hirsudinibus euocabis, quod præsentaneum est in uteri cancro auxilium. Mox tamen humoris acrimoniam, & inustionem frenare opus erit, & ipsum sensim, ac leniter euacuare. Quam gratiam præstat seri lactis usus, & serapium ex borragine, ex buglosso, ex portulaca, ex lupulis cum eisdem aquis, inter alia tamen pharmaca, quæ ad melancholici succi curationem proficua esse antea diximus illud à Gale. 14. metho. maximè probatur, quod ex epithymo conficitur: nam epithymi 3. iij. in sero lactis, nullave si tertio quoque die exhibeas, plurimum prodesse comperies: maximè si dilutum præpares ex pari quantitate epithymi, & foliorum senæ, ita ut cuiusque 3. iij. infundas, & cal fieri sinas in 3. vj. aquæ borraginis, facta postmodum uehementi expressione. Ex quo etiam decocto cum saccharo prunas damascenas condito, & carui vj. quibus sex dragmæ senæ respondeant: tertio quoque die laboranti porrigito. Purgabis insuper hos humores cōfectione amech sine scammonco, & colocintide, pondere 3. vij. cū 3. j. & .s. pulueris epithymi, uel senæ, & utilius quidem erit, si loco epithymi bibat desuper seri lactis ex infusione epithymi 3. iij. uel tantundem syrupi ex infusionibus uolarum. Quibus purgationibus innitendum est, donec succi melancholici exuperantiam dempsisse constet. Tumori subinde prouidendū est, ut disentiatur, uel saltem non crescat: adhibitis in principio affectus extrinsecus, & per uteri osculum, quæ moderatissimè refrigerent, & astringant, minimèq; mordacia existant: talia etenim solum huiusmodi affectibus idonea sunt: nam quæ imbecilles uires habent, omnino ab humoris uehementia uincuntur, quæ uerò ualentiora sunt, tenuiores sanguinis partes, uel digerunt, uel trādūt, crassioribus ibidem factis impactioribus. Quamobrem primo partem inunges oleo rosaceo, myrtino, omphancino, & aquis plantaginis, & solatri, uel facto ex prædictis fomento, uel emplastro cum farina, aut unguento cum modica cera. Cui et ipsi Gal. li. 2. ad Glaucl. scripsit medicamentum ex pōpholige, & succo solani, & emplastro diapalma confectum. Paratur, & aliud, quod recipit olei rosarum 3. v. succi granorum rubrorum solani 3. iij. cerusæ lotæ 3. ij. plumbi usti, & loti, tuiæ præparatæ, ana 3. j. thuris 3. s. ceræ albæ 3. v. misce, & lento igne fiat unguentum. Mirabilis est efficaciam censetur id, quod recipit olei omphancini, aut rosacei 3. viij. agitentur sub sole in mortario plumbeo, donec nigrescat, crassescatq; cui adde lythargirij lib. s. cerusæ tantundem, & cum cera fiat unguentum. Verum quia non raro hanc affectionem exacerbari conspiciamus, à leuissimis quibusdam causis, prouidendum quidem est exacerbationi, & doloribus. Consolatur quidem scēminas exacerbatione affectas malua, aut althea in mulla macerata colliquataque, dum pauco rosaceo cataplasmatas instar, parti adhibentur. Lenit etiam cataplasma ex dactylis passio incoctis, ouorum putaminibus, atque farina adiectis, uel aliud ex papauere cum coriandro, & eandem farina, ac sereos confectū. Itē mitigant maluæ folia cum lacte mulieris trita, & rosaceo cerato, uel ungueto excepta. Deinceps uerò ad ea, quæ superius diximus, iterū e. lē deueniendum, consulit rei ratio, & facta sufficienti purgatione, iterū

T 2 unguen-

vnguento ex lytargirio, & cerusa cum rosaceo confecto vitior. Cui item vsui
 aliud sic parato: excipe olei rosarum, vel nenupharis, aut papaueris, ʒ. j. ceræ,
 ʒ. l. camphoræ, ʒ. j. & sliquefiat cera, & camphora puluerizata, vltimo loco ap-
 ponatur, quibus adde aquæ rosarum modicum, & concrelescere finito. Est, &
 efficacissimum oleum ouorum frequentius ductum, & agitatum in mortario
 plumbeo, donec spissitudinem acquirat: item cinis cancrorum fluuiatiliū lo-
 cus in aqua solani, admixtis pulueribus ex plumbo, vel antimonio cum cera,
 & oleo rosaceo efformato vnguento: quod sanè medicamentum, vlcetatis can-
 cris prodesse omnes fatentur: sicut succus solani, aut plantaginis solus, vel cum
 oleo omphacino, in mortario plumbeo ad spissitudinem agitatus. Quod si vl-
 cerari durities ceperit, metallicis pharmacis liberalius vtendum est: sed miti-
 gationis gratia infusiones ministrabis ex aqua decoctionis psyllij, papaueris
 albi, nenupharis, & violarum: præstant, & omnia pharmaca, quæ huic vsui
 proficua scripsimus lib. 1. cap. vltimo de cancris mammarum. Tamen in hoc
 malo prædictorum pharmacorum aliquid inijcere in vterum, ad mitigationem
 & vlcis medelam, necessum plerunque existit: tale quidem est aqua decoctio
 nis camphoræ, nenupharis, papaueris albi, & rosarum rubearum, maximè si
 prædictam aquam in mortario plumbeo antea agitaueris: ac si dolor id videat-
 ur exposcere, addito hyoscyami modico: nam sæpe ne rabientes fiant laboran-
 tes, vtile fit præsidium, & non mediocre leuamen præstat. Confert, & lac mu-
 liebre, aut asininum, ac plantaginis cremor tepidus, & si sanguis prodierit,
 plantago cum pauco thure: Omnium autem efficacissimum est, quod recipit
 spumæ argenti lotæ, ʒ. vj. thuris, hyssopi, adipis porcelli, butyri recentis ac ce-
 ræ, ana ʒ. ij. rosacei, ʒ. iij. spumam argenti contritam in cremore sereos, lique-
 factis reliquis inijce. Sed probatissimi vsus existit medicamentum, quod reci-
 pit succi solani purioris, aut ipsius liquoris stillatiij, ʒ. vj. muiæ præparatæ,
 plumbi vsti ana ʒ. j. & s. camphoræ, ʒ. l. moueantur cum pistillo in mortario
 diutissimè, & proijciantur in vterum. Fertur quoque maximi momenti esse
 præsidium, quod recipit scabiosæ, caprifolij, anethi, plantaginis, oleti humani
 æquas partes, vtantur omnia; quorum cineris, ʒ. iij. excipiantur, & ʒ. vj. liquoris
 stillatiij solani, ducanturque in mortario, & proijciantur. Quod si hæc pro-
 desse non videantur, ad chimica auxilia veniendum esse consilii rei magnitu-
 do, & malignitas, inter quæ mirabile censetur oleum scibij, cuius extractio-
 nem docet latè Andernacus libro, eius operis 2. fol. 722. quem vsum quoque
 præstant aquæ, & olea ex alijs mineralibus extracta, dum lentè, mixtura alio-
 rum prius facta, & scim id fiat; ne grauiori facta exulceratione, oculus
 malum crescat. Atque hæc sunt, quæ mihi videntur sufficere in
 tam graui malo, ad maioris præcautionem: nam de chirur-
 gi operatione aliquid dicere non studui, eò quòd
 conspicuæ tantum partes cam admit-
 tant, & hæc, à quibus in to-
 tum cancer ab-
 scindi po-
 test.

De vie-

A

De vteri vlceribus. Cap. 20.

VTERI exulcerationem proculdubio constat, difficillimæ esse curationis, non solum ratione humidioris, sordidiorisq; loci: quæ omnia vlceri curando, sunt aduersa: sed ex loci etiam incommoditate, reconditaque vlcis sede, ac vltimo ex abdita causæ ratione, & vlcum varia differentia. Cuius difficultatis diluendæ gratia, prius hæc omnia expendisse opus erit. Reperitur igitur in vtero vlcum diuersitas, à causa, & ab accidentibus sumpto principio, & à loco. Ratione quidem causæ, vlcus in vtero succrescit virulentum, sordidum, corrosiuum, cauernosum, fistulosum, aut carnosum. Quæ verò ab accidentibus, sumuntur differentia: sunt velut vlcus distemperatum, dolorosum, cum tumore aliquo præter naturam, cum contusione, vel carne superflua: quibus multi addunt vlcus cacoethe, vel malignum, ac sordidum etiam. Quibus accedit alia vlcis differentia, nimirum incipiendo, vel ex suppurato, ac disrupto abscessu: ex quo, & alijs, quæ nuper retulimus loci etiam differentia emanat, vt in scirrho, & inflammatione dictum est. Verum animaduersione dignum iudico, ad quam partem abscessus apertione molitur: quippe nonnunquam ad ipsum ventriculi fundum, & cauum, & pus eo tempore per vteri osculum excurrit, aliquando ad vesicam, nimirum quum eius antica pars præfuit inflammata, & tunc cum urina pus excernitur, sicut aliquando per rectum intestinum, dum videlicet postica pars inflammata præfuit. Constat etiam ad intestina aliquando pus defluxisse, inter ipsa quidem & peritonum.

Causæ tamen, quæ has vlcum differentias efficere nata sunt, lib. de humo. à Gal. summatim colliguntur: inquit. n. Et vlcatur sæpe vterus ex difficili partu, aut fœtu extracto, aut corrupto, vel ab acris medicamentis, aut à fluxu, aut à ruptis abscessibus, atq; interdum in cancrum delinit. Quo sanè loco, & vlcis, & eius diuersitatis causas recenset: quippe partis, & cetera, quæ Gal. annumerat, continuu soluere nata esse constat. Verum ob excrementum ex natura loci redundans, & ob humorum affluxum, vlcus versus humoris qualitatem distemperatum fieri contingit: dolorosum ex acrimonia: cum tumore ex humoris copia affluente, cacoethe, fistulosum, corrosiuum, aut sordidum, ex loci spurcicia, vel ex humoris malitia, aut partis impotentia. Quæ tamen vitia ex abscessu improbè repurgato, oriri non rarò contingit, sicut ex medicamentis, quibus erodendi, atque exulcerandi vires insunt. Sic quoq; ex lue venerea originem haud rarò trahunt, ac frequentissimè ob excrementa retenta, & putrefacta circa vteri locellos, & rugas. Quarum sanè causarum mille in locis Hip. meminisse constat, præsertim lib. 1. de morb. mulier. qua parte inquit; Si verò puerperæ aliqua pudendi pars obturata fuerit, iam enim etiam hoc cognoui: si exulceratum fuerit os pudendi, vbi sanè vlcus fuerit in partu à pueri exitu violatum, simile quid sit vlcis superficiali, ac feruenti. Clarius tñ lib. eodè hæc refert dicens: Morbus corripit ex abortu, si q̄ corrupto, aut putrefacto intus puero non fuerit expurgata, & calor totum corpus tenet. Corripit et ex fluxibus, & si in ipsis acris fuerint, & biliosa mordeant. Itè eodem lib. refert. Mor-

T 3 bus

bus autem maxime corripit ex partu, si quid in ipsis diuulsum computruit: ite
ex abortu, & alias sua sponte. Refert quoque idem autor alias causas lib. de steri-
lib: per hæc verba: Si vlcus vteri factum fuerit ab affectione aliqua ex relatis
(remulat enim omnes superius adductas) & non statim sanatum, sed impurum
factum fuerit, permanet vlcus ad multum tempus.

*Signa
ulcerum,
& cau-
sarum.*

Non est admodum difficile, utrum esse exulceratum, nosse: nam id palam osten-
dunt recrementa, dolores, ac pus reiectum. Sic etenim in plerisque loci ratione
punctorius apparet dolor, qui est in incipite molestus viget, & in ligamentis, ac
radicibus oculorum, & in manibus quoque, ac digitis. Quæ tamen ab vlcere prodeunt
putrida, quæcumque ierint, dolore afficiunt, calfaciunt, exulcerant, aut pruritus
mouent. Verum cognosces qualis fuerit causa, qualisve vteri natura, ac status,
ex ijs, quæ prodeunt. Cuius rei gratia præmittere oportet, sordida prodire, quæ ab
vlcere ex frigido abscessu facta, instillant: quæ verò post inflammationem à san-
guine, & post erisipelata supersunt, virulenta, & depascentia fiunt: quæ post scir-
rhum, gangtenosa, quæ post morbum gallicum, dissepulotica, & chironia. Qui-
bus cognitis, expendisse oportet, vlcus inflammatum, exiguum quid sanguino-
lentum, & fœculentum cum ingenti dolore plerumque; excernere: si tamen sordidius
fuerit vlcus, ichores cum minori labore excernuntur: at si depascendo serpit,
detraximi odoris fluxum emittit, atrum & cum maximis laboribus. Itæ si exul-
ceratio ex sanguine, vel flauabile perueniat, dolor erit acerbissimus, pungens
cum ardore, & febre: ex falsa pituita si prodeat, pruritus intolerabiles parti acci-
dunt, & paucum, aut nullum excrementum ab vtero profluit, idque cum fetore,
acrimonia, & paucò sanguine; quæ si ex inundante humiditate ichori per simile
vlcus fiat, maior subinde spirabit fœtor, & purgamenta erunt tenuiora, & copio-
siora. Verum si quæ excernuntur, sicut fex vini sint, vlcus cancrosum esse con-
iectandum est, si exit sanies, sicut lotura carnis recens macerata, menstrua suppu-
rari. conijcimus, vlcusque ob id fieri. At si quod excernitur, liuidum, viride, ni-
grumve fuerit, & cum dolore exierit, vlcera esse cacoethæ, corrosiua, ac fistu-
losa certum est. Causæ verò externæ facile sui notitiam præbent: nam si ex aliquo
acri pharmaco vlcus prodeat, statim aliquo præfidioleni iniecto cessant affec-
tio, & dolores. Reliquas verò causas ex interrogatione perdisces. Vlcus tamè
esse purum coniectabis, cum humor paucus, candidus, æqualis, crassus, & mi-
nimè fœtidus exierit. Quæ procul dubio signa omnia varijs in locis Hip. cõple-
xum fuisse constat, maxime verò cum lib. 1. de mor. mul. de vlcere ex partu ver-
ba facies inquit, Cum purgatio ipsi prodierit, velut spina per vteros transire vi-
detur, & calor ipsam corripit, ac maxime ventrem inuadit: & si attingatur pars
infra vmbilicum dolet, velut si purum nervosum vlcus attingat, post dolores
fortes alias, atque alias in vteros incidunt: & febris aliquando ad contactum ma-
nus debilis, & alias atque alias puerperij purgamenta pdeunt maligna, purulen-
ta, & graueolentia: & subdit. Si verò puerperæ aliqua pudendi pars obturata
fuerit, iam enim hoc cognoui, si vlceratum fuerit os pudendi: ubi sanè vlcera-
tum fuerit in partu à pueri exitu violatum, simile quid sit vlceri superficiario,
ac feruenti, & ualde inflammatur, & labia præ inflammatione inter se conci-
dunt, & se mutuo contingunt, vipote quæ sunt exulcerata: sed & frigus fit, &
ambo labia clausa sunt, constringentia purgationem relictam: Si verò prodiret
purga-

A purgatio, ulcera non conclusa essent. Quibus consimilia verba, ceterum generaliora eodem lib. refert dicens; Si uteri fuerint exulcerati, sanguis, & pus purgatur, & faecor grauis oboritur, & dolor acutus corripit lumbos, & inguina, & imum ventris, & dolor sursum procedit ad laterum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas, aliquando et ad clauiculas peruenit, & mordetur, & caput vehementer dolet, & delirat. Progressu vero temporis tota intumescit, & debilitas ipsam corripit, & animi deliquium, & febris tenuis, & perfrigeratio, intumescunt autem maxime crura. Quo etiam loco paulo inferius de eadem re verba faciens, sic profert; Si uteri exulcerati fuerint, & sanguis, & pus, & serosa sanies fluit, putrescentibus enim uteris, morbus ab ipsis fit, & uenter imus eleuat, & attenuatur, & ad contractum dolet, uelut ulcere praesente, & febres, ac fremitus ipsam occupat, & dolor acutus ac uehemens inuadit pudenda, & pubem, & imum uentrem, & lateris mollitudinem ac lumbos. Vehementis tamen exulcerationis signa referens, inquit; Si uero uehementer exulcerati fuerint, sanguis & pus purgatur, & dolor fit grauis; & cum dolor apprehenderit, ueluti a partus dolore, fiunt ea, quae circa fluxum contingere solent; & cum tempus affuerit, crura, & pedes intumescunt. Docet quoque Hipp. per consensum ne, an proprio uteri affectus morbus oriatur, eodem lib. dicens. Cognosces autem, an ab ipsis uteris sint, hoc modo, quod enim exulcerantur, purgationem exhibent purulentam, & compactam; quod uero non ab ipsis, tenuem & saniosam. Lib. tamen de sterilibus inquit, Si ulcus uteri factum fuerit ab affectione aliqua ex relatis, & non statim sanatum, sed impurum factum fuerit, permanet ulcus ad multum tempus, male olet mulier, & quandoque sanies male olens; ipsi ex pudendo fluit, & quoad uero sanie ulcus habuerit, in uentre non concipit, non enim concipiunt uteri genituram; hinc autem menses sano modo procedunt, uerum ex contactu, & interrogatione, maxime clarum fit de relatis. Atque haec sunt quae uteri ulcus, & eius causas ostendere sunt nara: quibus similia non pauca affert Hipp. lib. 3. de mor. mul.

B Quantum facebant negotij in curatione uteri ulcera, ostendit euidenter ne uacea ipsius uteri substantia, quae semel exulcerata, difficulter coalescit ac regeneratur, & ipsius etiam natura, & conditio, quam in susceptandis totius corporis recrementis idoneam fecisse naturam constat: quamobrem nulla uteri ulcera contemnenda esse arbitror, ea maxime, quae in occulto loco sita existunt. Quod etiam Hipp. magnificisse legimus, lib. 1. de mor. mul. per haec uerba; Oportet autem curationem ulcerum in uteris exacte facere, ut quae in tenera, & subtili sensu praedita sint parte, & in neruosa cauitate. Verum antequam rationale mendendi uiam aggrediar, placent aliquot Hippo. loca hic scribere, quibus uidetur uniuersam huius mali curationem complexum fuisse: inquit. lib. 1. de mor. mulic. Quaecunque exulcerationes in uteris fiunt ex abortu aut alia quauis causa, eas omnes respectu ad totum corpus facta, curare oportet, quaecunque curatione opus habere uisum fuerit, siue ex uniuerso corpore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis uteris. Qua sententia constat, ab uniuersali corporis prouidentia principium curationis esse aulpicandum. Eodem tantum libro specialius loquens, haec scribit; Curare uero oportet ulcera, uel uterinae ea, quae in reliquo corpore sunt: nimirum ut inflammatione arceas, & repurges, & repleas, & ad cicatricem perducas.

*Cur. m.
di. 1. 119.*

C T 4 Danda

Dada autem est aqua in potu, vinum minimè, cibos item paucos ac minimè multos exhibeto. Sed ad particularem causæ considerationem deueniens, eadem parte sic scribit; Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharmacos eas curare oportet, & dare quod sursum, & deorsum purget, primum autem sursum. Tandem eadem parte adamussin curationem scribit, repetitam consulens purgationem, præmissa victus institutione conuenienti: ac si fluxio his non quæuerit, mitescendam esse consulit dicens; Si verò ad hanc diætam fluxiones non discedant, pauciores tamen fiant, & vehementer mordeant, & ea, quæ fluunt, bilis fuerit, ac falsugo, & non solum internas partes, sed etiam externas exulcerent, diætam transmutare oportet, & totam humectare, quo fluxiones, quàm aquosissimæ fiant, & minimè mordaces, balneis multis calidis: aliaque his consimilia eodem loco recenset. Postea verò ad curationem vlcis solo vteri vitio prodeuntis rediens, corpus non esse pharmacis purgandum consulit, sed colluendum tantum. Quod si sordidum extiterit vlcus (inquit) & proserpant, ac proximum locum mordeant, purgato, & nouam carnem producto, & carnem ad cicatricem perducto: facile enim resoluuntur, & maligna fiunt, & frequenter lauato. Sed lib. de natu. mul. plurima recenset medicamenta huic vsui, & prædictis proficua, quæ sanè diligenti, & studioso medico exquirenda præmittito scribens interim, quæ vsui probatiora comperio, initio sumpto ab ea communissima curandi ratione, quam Hipp. scripsisse diximus.

His præmissis, expendendum primo est an abscessus qui suppuratur, ad intestina, & peritoneum vergat: nam eo tempore, dum pus in hoc spatio continetur, vnanimi omnium auctorum consensu constat, abdomen esse incidendum scalpello, aut cædenti ferro, à quo opere, & doloribus, ac sanguine sedato, vlcus velut simplex curari debet, vt mox docebo. Sic profectò pure vergente in vesicæ velut vesicæ vlcera curationem exoptat: cuius ratione Aetius, & Paulus lactis vsus, & seminum frigidorum expressiones summopere laudant. At si ad rectum intestinum pus defluerit, ablui, & quodammodo roborari, & adstringi in principio intestinum opus erit, mox vero, sicut dysenteria auxilium expostulat. Verum si vlcus fiat in vteri sinu, tunc communis vlcis indicatio exercenda venit.

Est igitur vlcis cuiusque loci duplex ad curationem indicatio: vna illi propria quæ vlcus est, cuius postremo loco meminero: altera verò, quæ vlcus curare docet habito respectu ad causam, vel accidens quoduis vlcis adiunctum. Porro duplex in huiusmodi complicatis dispositionibus consilium est, vt Gal. docet 14. metho. nempe, vt vel huiusmodi affectus è corpore prorsus eximas, vel incommo- dum, quod inferunt vincas. Verum hoc (inquit) vbi exiguus planè affectus est, fieri licet: vbi magnus est, duci ad cicatricem vlcus prius non poterit, quàm illi affectui remedium, attuleris. Ob id profectò instituta victus, ac viuendi ratione, vt expostulauerit humoris superabundantis natura, redundantes succos, si sanguini adiuncti fuerint, scissa in brachio vena, vt vires perferre visum fuerit, & vlcus, ac vteri ardor poposcerint, minues. Quo facto, præmissis serapijs humori redundanti proficuis, protinus, & per interualla purgabis cholagogis si bilis flaua, phlegmagogis, si pituita redūdauerit, & sic de reliquis pro cuiusque natura. Cum tamen necessum sit in principio curationis, longè à parte affecta humores distrahere, vt Hipp. est consilium, vomitibus ipsos oportet persu-
perna

A perua expurgare, ab uteroq; distrahere vinctis: & brachiorum vel partium superiorum frictionibus. At si uteri intemperies causam imbecillitatis utero præstiterit, ob quam facillimè humores erodentes ipse susceperit: medicamentis utero proficuis adiniscenda sunt, quæ aduersus distemperiem pugnent, vt mox docebo. Solet quidem influxione quauis ad uterum, peculiare esse præsidium sudorem mouere, ni femina admodum fuerit squalida, vel humores nimis exedentes, maximè si, gallicæ luis admixtum quid cognoueris. Sinaliter, balneis aquæ dulcis ipsam committes, vt sudore excitato distrahatur, euacueturq; materia, quæ redundat, simulq; mitescat: atque hæc est aduersus morbosum apparatus curandi seu præcauendi ratio. Quibus factis, ad curationem vlcusis deuoties, quam facito iuxta naturam accidentis ei coniuncti, vt Gale. magna cum diligentia consulit, & exequitur lib. 4. metho.

Quod si vlcus squalens, siccumq; esse ex recrementorum defectu cognoueris, bis die ipsum ablues aqua tepida per metrenchitam infusâ, cui addes sacchari parum, pitisanæ etiam cremorem infundito, aut aquam hordei cum saccharo, vel aquam, aut succum portulacæ. Verum si ex copiosa humiditate,

*Si vlcus
adungatur
di-
stemp-
nes.*

B quæ per uterum excidat, compereris, vlcus debito esse humidius, contraria omnino instituenda est curandi ratio, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda: aqua verò nullatenus admouenda est: verum quia lauare est opus, vinum vel decoctum austera alicuius herbarum præparandum. Quem usum præstabit aqua ex ligni guaiaci decocto, vel smilacis asperæ, aluminis, malicorij, & huius census pluitium, quæ sicciora esse constat: quippe uterus ea duplici ratione expostulat, nimirum, ob propriam naturam, quæ membranæ est, & propter vberissimam humiditatem alluuiem, quas exsiccare vehementius oportet: & cōpescere encephalæ quod recipiat hordei, vsti amyli, thuris, singulorum ʒ. j. trita diluantur in lacte asinino, & in uterum immittantur. Quod si adiuncta sit vlcusis vel uteri durties, oleosum aliquid admiscere oportet ex his quæ ca. de scirrho dicta sint. Cuius census est id quod recipit radicis altheæ, liliorum alborum, ana ʒ. j. pulegij vel origani ana m. l. seminis lini, & fenugreci, ana ʒ. l. rosarum p. j. coquantur in pari mensura aquæ, & vini, & adde adipis anserini ʒ. j. Item diluatur uterus lacte bubulo cum prædicto adipe, aut oleo liliorum. Quam sanè medendi rationem in alijs uteri intemperamentis adseruabis, habita contrarietatis cuiusq; ratione. Exulceratus etenim uterus, si calidior frigidiorve fuerit, medelam utiq; exigat, quæ in tantum calfaciat, refrigerareve, quantum ipse à naturali habitu recessit.

C Quod si fluxionem humorum acrimiarum & abradentium, vel putreficientium causam, vel fomentum vlcusis præstare cōpertum sit, alia prorsus ratione, vt ex Hip. constat 1. de mor. mu. agendum est. In qua sanè re distingues primo, an ab vniuerso corpore, quod ex puris tenuitate haud difficulter discas, an à particula aliqua quæ monstrant eius peculiaris symptomata, uel ex solo ipso utero, quod puris crassitudo insinuat: quibus expeditis, si ex parte aliqua profluat, illi prouidendum est, iuxta cuiusq; vitium, & in temperamentum. Verum si ex totius corporis vitio occasionem nascatur ab vniuersalibus purgationibus auspicandum est, vt Hip. consulit, qua autem medicamentis forte, subticuit, quia id humoris idea, & corporis conditio euidenter monstrat. Cui operi non est innitendum subito, & confertim, sed paulatim, & repetitis vicibus. Ac si ob humoris malitiam, aut vberem copiam id prodesse non possit, eis utendum

dū est auxilijs, q̄ habiū in meliōrē mutēt, sudoribus ex guaiaco, & exercitijs, q̄ A corp⁹ deficcēt. Post modū verō vterū exiccabis hisq; inferius referā, & suffumi-
gijs alternis diebus adhibebis, & iterū ad vomitū veniēdū, ad victūq; exiccātē.

Si tamen dolor vlceri adiungatur, protinus hic vel auferendus est, femota eius causa, aut saltem quoad licuerit mitescendus: nam prāter id quod dolor vires summē prosternit, maiores subinde concitat fluxiones. Atq; licet ea, quæ do-
lori profunt, vlceri quodammodo aduersentur, neglecto interim vlcere, dolori tanquam vrgentiori, primò maximēq; innitendum est. Qualiter verò dolorem sedare oporteat, cap. de vteri doloribus abundē dictum est. Proderit etiam prāter dicta, succum plantaginis, portulacę, & coriandri, vel ptisanam, lac, vel amy-
lij aquam tepida omnia in vterum injicere. Quem vsū quoque prāstant infes-
siones ex decocto absinthij, maluarum, rosarum, violarum, capitum papaueris, & aliorum, quæ loco nuper citato retulimus.

Et si dolor superiores etiam partes tetigerit, credibile est, nullā materiā dolo-
ri fomentū p̄stare, ob id p̄missa vacuatione, non solū vterus fouendus ex aqua calida erit, sed & corpus vniuersum modò vires, aut quidpiā aliud nō obstat. Si
autē id acrimonia fluentis succi eueniat sero lacti, aut lacte probē, cocto ieiune-
dato, medeberis, sicut & victu humectāte ac refrigerāte, post habita vlceris in-
dicatione: sic cucurbita, lactuca, ptisana, & alia id genus cocta, & quęcunq; pin-
guia, & pisces qui non sunt saliti administrandi sunt, sicut pullorum, & hedo-
rum carnes elixiæ, ac lactis copia, modò nec delirū, nec capitis dolor adsit, post
modum verò, vlceri est prouidendū anodinis, & his quæ c. citatō adduximus.

*Si ulcus
sordidū
sit.*

Verū si sordidum apparuerit vteri vlcus, abstergentibus rē agere oportebit: huius naturæ est hydromel ex decoctione hordei: item passularū decoctū,
vel hordei cum melle rosaceo. Prāstat etiam decoctum ireos cum hordeo, &
glans confecta ex farina lupinorum cum melle rosaceo: confert, & ptisanæ cre-
mor cum melle vel mulla ex decocto fenugræci, maluarum, fursuris, & lentiū.
Ac si hæc non profuerint, ad validiora confugito, velut est aqua marina vel alu-
minosa cū vnguento ægyptiaco: itē marrubiū, aut eruium, vel erui farina cū mel-
le adiūcta, & pessario aliquo in vterū immissa, puluere sup̄ sparso aluminis vel
iridis: si tñ vlcus, pfundē sitū fuerit, cerati, aut emplastri forma, hæc eadē extrin-
secus adhibita, proderunt. Fit quoq; vtile medicamētū hydromel, in quo iris,
absinthiū, & agrimoniū incoxerint. Itē ad profundiora vlcera ex vsu est, injice-
re medicamētū, qđ cōficit ex lib. s. vini albi, & 3. j. aluminis vsti: cui adice aliud
qđ cōficit ex melle, terebintina, rosaceo, & butyro, vel solū p̄ijce. Maximi p̄fe-
ctō p̄ij est vnguentū illud, quod Auic. laudauerat hoc mō confectum: excipe ly-
thargirij cerusæ, sarcocollæ an. 3. j. adde cere, & olei rosacei q̄tum sit satis, vt fiat
vnguentū, qđ flamma aliqua ex linteo facta exceptū, in vterum immitte, maxi-
mē si in eius collo vlcus extiterit: sicut si in penitioribus recondat id, & reliqua
oīa aqua vel vino liquefacta p̄ vterinum clysterē immittes. Cui etiā vsui vtilissi-
mū est, aristolochiæ, & iridis illiricæ decoctū cum melle, donec vlcus purū fiat.

*Si ulcus
erodens
existat.*

At si vlcus depascens & erodēs esse comperiamus, p̄missa totius corporis p-
uidentia, ad ea auxilia veniendum esse consulit rei rō, qđ frigida, stiptica, & de-
siccantia sint, ut partim repellas qđ influit, partim verò calorem eius, qđ fluit, &
partis affectæ attemperes, ne vltiūs erosio serpat, ac vltimò humorem, & sor-
des

Ades abstergas. Quapropter comode feceris, si ulcus ipsum, & vniuersum uterum aqua aluminosa ablueris: quam equidem huic vlceri magni momenti esse scimus, quod influentes humores valenter repellat, & siccandi facultatem obtineat. Poteris insuper praedictam partem irrigare aqua plantaginis, vel rosarum, vel chalybeata tepida, etiam decocto cyperi, myrobalanorum, cupressi, plantaginis, malicorij, balauisti, baccarum myrti, palmularum, lentium, rosarum, aluminis, & agrimoniae. Ceterum quia raro unguenta, quibus Chirurghi ad praedicta vlcerata utuntur, in hoc affectu, ob partis incommoditatem administrare possumus, alijs praesidijs curandum est, rem ipsam agere. Sic nam in sessiones, & fomenta profunt ex aqua mulsa, in qua lentes excorticata decoquantur, vel eruui, marrubii, & absinthium. Neque minoris est momenti serum saccharo, & aqua plantaginis admixtum, vel pitisanæ succum cum melle per uterinum clysterem infundere. Quod si neque his adhuc malum quieuerit, uterum ablues lacte asinino, vel caprino, addita rhodomellis, uel serapij rosacei sexta parte, additis etiam iridis 3. ij. consimile huic beneficium praestat aqua mulsa ex absinthio, lentisco, & calamo aromatico confecta. Sed in hac affectione pessarijs non est plurimum in nitendum, quod sordidus reddant ipsius osculum, & partem affectam minimè per tingant. Ob id profectò probantur mihi magis, quae exterius utero apponunt, ut quae per latentes vias: & occulta foramina in ipsum vires suas ingerant: tale quidem est, quod recipit rosacei optimi 3. iij. cerae albae 3. j. & siliques facito, ac refrigerato, & in mortarium conijcito, lacteq; muliebri, asinino, aut caprino affuso cum pistillo subigito, donec totum albescat: deinde, diffuso priori lacte, aliud denuò conijcito, idq; ter quaterve facies admixta croci 3. j. mitigat enim, & humorum acrimoniam, ac partis calorem restinguit. Cui simile est aliud, quod recipit tutiae ablutae partes duas, lythargirij, sarcocollae, & cerusae, ana parte j. cum oleo rosaceo, & cera fiat unguentum: quorum aliquid in uterum immitte re modo superius dicto, non erit ab re. Verum quia saepe uteri vlcerata ob loci pudorem, & sorditiem eò mali deuenire solent, ut ne haec quidem sufficere possint, praedictis medicamentis aliquid ex flore aris addere conceditur: ac si vlcerata conspicua fiant, ad arsenicum, uel candens ferrum deuenire oportebit. Cui hoc tamen cauere consulit Aetius ualida, & plurimum erodentia: nam in uterum immissa maioris mali solent esse causa, in nos plurimum coegerit urgentissima necessitas.

B At ulcere iam à fluxu, distemperie, sorditie, aut corrosione uindicato, ea quae puris ulceribus proficua existunt, ueniendum est, qualia sunt, quae leuiter abstergunt, & exsiccant, uelut est decoctum rosarum, aut lentium, uel plantaginis succus, aut poiigoni decoctum cum saccharo, uel syrupo rosaceo. Sunt etiam (neque displicet) qui tetrapharmacum infundunt cum butyro recenti, aut rosaceo: à quibus non multò post ablueri vlcerata opus erit, quo facto, ut utilius paremus praesidium praedictis succis, aut decoctis puluerem aloes, tutiae, hematitis, chartae combustae, aut cucurbitae siccae, & adultae admiscere conueniet. In qua curatione haec sufficere uidentur, quod loci incommoditas non patiatur alia excogitare auxilia, quae ulceribus in conspicuo positis, proficue adhibentur: praeterquam quod ex ijs, quae diximus, uaria confici possunt decocta, expressa, instillata, ac mille modis utilia.

Si ulcus purum sit.

De



AVD secus quàm in ano fissuræ, seu rhagades in vtero quoq; suboriri cōperimus. Sunt quidē illius partis ulcuscula, q̄ rimæ à plerisq; nuncupantur: sunt etenim rimæ, quibus partes musculosæ ueluti procinduntur, sicut labris qnq; & manib⁹ ex uehementi frigore contingere scimus. Quibus ēt vteri osculū ueluti p̄cissum efficitur, hiantibus his ulceribus, haud secus, q̄ labra, & manus ex p̄dicto frigore. Fiunt quidē plerunq; ulcuscula parua in longū, & angustū protracta. aliqñ p̄funda, & labris callosis cōstātia: sepe uerò superficialia, ac sine callo: alia rursus humida existunt: saniosa plurima: nonnulla cancrofa, & feruida. Callum tñ contrahunt, ut Aetio, & Paulo uisum est, cū diuturna sunt, & in eis labra indurantur, ac intumescunt. Est quidē hoc malum importunissimum ulceris genus, in quo neq; caro exeditur, neq; cutis utcunq; sed ad nutum plicaturarū partis, q̄ alicui muneri dicatæ sunt, contrahitur, ita ut pars deinceps officio fungi, citra dolorem, & grauissimā molestiā nō possit: nam si ante integram cicatricis obductionem, utcunq; extendantur, ulterius dirumpuntur, lacerantur ue, & duriores, ac angustiores ob diruptam cicatricem supersunt fissuræ, ita ut extendi deinceps citra dolorem, non possint.

Causa.

Habet quidem in utero hoc ulcerum genus duplicem causam, unam laboriosum partum, qui ex magnitudine capitis infantis proficiscitur: grāde etenim caput uteri os tantum distendit, ut multis partibus dirumpi necessum sit: quas continui solutiones sordidas mox fieri contingit, ob excrementorum cōtinuū defluxum, qui uitari nullo modo potest. Huic quoq; causæ accedit alie huius mali occasio; nempe uolentus coitus, & pudendo grandiori factus. Secundam uerò causam censeo esse humorum acrium, & erodentium affluxum, maximē si lentoris nonnihil obtinuerint: quippe cum tales sint, partibus adherēt, & ob tenuitatem, & acrimoniam faciliē easdem exulcerant, ac erodunt. Quibus causis alia non minoris momenti addi potest, ingens uidelicet uteri siccitas, & condyloma inflammatum, quod cutim dirumpere possit.

Signa.

Docet hunc affectum distinguere, & cognoscere lib. 3. c. 75. Paulus, dicens; Primum sanē rhagades latent, cum recentes adhuc ex partu sunt dolores, postea uerò paulatim percipiuntur, aliās manus tractu, aliās in coitu, quando & p̄pter affricationem cruorem reddunt. Deprehenduntur autem sinu aperto, in cuius ostiolo in circuitu diruptiones, & scissuræ oculis apparent. Præterea ex ijs, quæ præcesserunt, internanine causam, an externam, seu euidentem malum effecerit, faciliē percipies: item elucescit id malum eo tempore magis, quo fœminæ uiro accedunt: nam plurimum à pudendo uiri doleat & exacerbantur. Quod si neque partus præcesserit, nec uirilis pudendi magnitudo, inspiciendum tunc est, an condylomatis tumentis ratione præcedentisve inflammationis, cutis scissa fuerit. Quod faciliē erit intueri sinu fœminæ aperto, ac si ne id quidem affuerit, coniectandum est, humores acres, erodentes, ac mordaces id malum præstare: quorum biliosum ex calore deprehendes, cæteros citra calorem mordicantes esse, existimabis: præterquam quod ea, quæ per uterum profluunt, palā quoq; ostendunt, cuius naturæ sint humores illuc confluentes.

Docet

A Docet primò curandi ratio victum in hoc affectu humidioresse instituedum fugiendumq; à cibis acrioribus, asperis & aluum comprimentibus: ob idque (vt Celsus consulere vr̃) liquida, leuia, glutinosa, pinguias, & huius censûs reliqua vtiliora esse constat: velut sunt gallinarum, pullorû, vituli ac hædi carnes elixæ, & præcipuè earum iura pinguias. Conferunt ex oleribus malua, intubus, buglossa, scariola & borrago: ite p̃isana, lac amygdalarum dulciû & oua forbilia. In hac tñ affectione cauendû est ab omni violeto motu, vociferatione, saltu, & maximè ab ecessu viri, nam eo potissimùm affectio exarcebatur.

Quatenus verò ad reliquam auxiliorû ratione attinet, si rimæ obacres, mordacesque succos in vterum cõfluentes oriantur, prouidendum est, ne fluant, ac si fluxerint, vt temperatiores facti, nil mali efficiant. Quamobrè primò corpus purgare oportet, facta conuenienti præparatione eo pharmaco, q̃ humoribus peccatibus proficuum sit, iuxta adductam à me rationem cap. præcedenti: in quo quidem præsidio & in sanguinis detractioe ea præcepta seruabis, quæ in curandis vteri vlceribus adduximus; Quo facto, eisdem succos distrahere opus erit frictionibus, aqueducis balneis, quibus non parua commodi scissuræ persentunt. Expendes tamen hac in re purgantia medicamenta, acris & vehementia esse admodum aduersa, q̃ succos plurimùm perturbât. Sunt verò huic vsui proficua pulpa casia fistulæ, mâna, syrupus ex infusionibus rosarum & violarum, catholicon, cõfectio Amech sine scâmoneo & colocintide, & rhabarbarû aqua lactis expressum. A purgatione verò reliquos attèperare necessum est serapijs, apozematis, & alijs, quæ temperatam ac mulcebre facultatem sortiantur.

Quod si ex condylomante scissuræ prodeant, eadem omnino medendi ratio ascribenda erit, facto tamè curationis initio à sanguinis detractioe, à cubito, reuulsionis gratia, ac mox à crure, si affectio p̃stiterit: quo facto, corpus pari lege purgabis, & ad chirurgicâ operatione te conferes, vt paulò inferius docebo.

B Verum si ex laborioso partu, vel pudendi virilis magnitudine affecto suboritur, statim à principio mali clysterè vtendum est vterino ex sanguine draconis, bolo armeno, aristolochia, myrrha, thure, plantagine, & capitibus rosarum infusis, de coctis, & expressis aqua rosacea: vel ex prædictis in puluerem redactis, cum albumine oui & lana, pessarium conficito, quod maximi momenti præsidium comperies.

C At si scissuræ cum siccitate, calore & pruritu complicatæ fuerint, vel ab ijs causis proficiscantur, sæpe in die locus fouendus est, & humectandus aqua decoctionis c̃rorum, limacum, ranarum, piscium saxatiliû & maluarum, aut lenticulæ palustris, hordei decorticati, & seminis lini. Quo facto, vteriosculum inunges vnguento de cerusa cum camphora, aut mucilagibus ex semine citoniorum & psyllij, ac seminis maluarum: quam quoque partem recreare oportebit lacte caprino, aut butyro vaccino, aqua rosacea sæpius loto. Quod si & ardor & dolor præualuerint, parti prædictæ adhibere oportet vnguentum, quod recipit camphoræ ʒ.ij. vnguenti populeon ʒ.ij. cerusæ ablutæ aqua rosacea ʒ. j. vnius oui albumem, misce absque igne.

Hæc autè sunt præcularis cuiusque causæ curandi rationes: ceterû topica auxilia, q̃ sub ratione vlceris illius generis p̃ficua esse possunt, varia à plerisq; recensent: ego tñ selectiora hac in parte scribam. Rimæ itaque huius loci ea medica-

dicamenta desiderant, quæ citra morsum, asperitudo inue astringunt, maxime si ex defluxu, vel ex causa extrinsecus rumpente, affectio prodeat: quod Gal. cōsuluisse constat, lib. 9. de compo. phar. sec. lo. Preterea Aetius eandem tuetur sententiam dicens; In harum itaq; curatione chirurgiam, & omnia mordetia phar maca reprobare oportet: talia enim inflammationes, & conuulsiones inducūt: & infelionibus simplicioribus, ac pessis uti, & medicamētis ad sedis rimas descriptis, præcipuè eo, quod è pompholige, stibio, & plumbo vsto paratur. Quā huius viri sententiam subaudire oportet, dum rimæ (vt ipse refert) callosæ non fuerint: nam eo tempore ad maiora auxilia veniendum esse consulit. Itaq; pro simplicis rimæ curatione illud auxilium mihi tutius videtur, quod simul vlceri prodest, & dolori prouidet: cuius naturæ est oleum de semine lini, ad mutationem coloris in mortario plumbeo agitatum: item aliud, quod ex butyro, vitello oui, & prædicto oleo in eodem mortario conficitur: prodest & id, quod ex oui vitello, & rosaceo in dicto mortario agitur: succus etiam plantaginis aut portulacæ, aut vterque in dicto mortario ad mutationem coloris cum axungia anatis admixtus, mirè prodest. Eandem quoque gratiam præstat quod ex mucilagibus, & plumbo vsto efformatur: item ex oleo omphancino, aut rosaceo, vel de salicibus & plumbo vsto ac vitellis ouorum: lac etiam muliebre cum saccharo vtile esse comperimus, sicut cerotum ex lythargirio. Sed præter hæc passim apud Gal. varia & vtilissima reperies non pauca, quale est illud Apollonij, quod recipit olei rosacei 3. ix. quas in pilam plumbeam infundes, & plumbeo pistillo tandiu agitabis, donec crassum & subnigrum oleum reddatur, deinde scorsum spumæ argenti lib. j. & cerusæ tantundem tertio, oleoque admisceto, & vtere: prius tamen lacte probè eloto, & siccato, decocto hordei, plantaginis, & rosarum, aut aqua chalybeata cum modico vino. Confert item oui assil vitellus vino dissolutus, & cerato rosaceo exceptus. Vtile quoque est aliud vnguentum, quod recipit pompholigis lotæ, & plumbi vsti ac loti, ana. d. ij. cerusæ, & spumæ argenti ana. 3. j. gūmi tragacanthi. 3. iij. thuris & radicis symphiti, ana. 3. ij. omnia probè tertio, & rosaceo cerato admisce, ac locum affectum illinito: qd si caliditatem in affecta parte vigere compertum fuerit, addere oportebit succi plantaginis, portulacæ, & centaureæ minoris. ana. 3. j. Huic quidem consimile aliud reperies, quod recipit argenti spumæ, & cerusæ ana. 3. j. pōpholigis lotæ. 3. j. & s. seminis rosarum 3. ij. succi plantaginis 3. ij. oui assil vitellum, vnum, adipis anseris 3. ij. excipiantur omnia rosaceo, & vtere. Quod si his affectum cedere comperiamus, abstergentibus abluere partem ipsam oportebit ea lege, quā adduximus c. præcedenti. Verum, quia ex his vlceribus quædam esse callosa dictum est, illis proprium & proficuum vnguentum conficies ex esypo humida, radice lilij, iride Illyrica terebinthina exceptis: item aliud conficies ex medulla ceruina, oleo liliorum & cera. Si tamen saniosa sint vlcera, ea sero lactis abluēs, aut mulla. Item si ferueat vlcus, & canceri suspiciō adsit, confert succus cancrosum, plantaginis, portulacæ, lactucæ, psyllij vnguentum de cerusa, de plumbo, de lythargirio: certatū itē rosaceum Gal. cū succo solatri, & alia huius naturæ. Quod si in his omnibus factis ea conditione redditum sit vlcus, qd cōsolidare, vni-req; tantum id studeas: vino calido abluēs, vel rubro decoctionis myrrhæ, thuris, myrti, nucū cupressi, aloes, tutiæ, ac mumia. Verum cum carnē superemine-

re com-

Are compereris, adhibe quæ carnem exedant, ut alumen vstum, & reliqua huic vsui proficua. At dum rimæ diuturniores fiunt, induruerintque, ad chirurgiam deueniendum est, quæ condylomata terat, & callum extirpet, si prius vsi fuerimus medicamento illo toties Gal. commendato, ex charta nimirum combusta, & alijs consimilibus, quibus periti Chirurghi tutò vtuntur.

De vteri condylomate. Cap. 22.



CVM nō sit vna omnium autorem de condylomate sententia, necesse subinde erit, quid propriè dei condyloma mereatur, prius docere. Condyloma igitur (inquit Celsus lib. 9. c. 14.) nil aliud est, quàm tuberculum quoddam, quod ex quadam inflammatione oritur. Verùm si quis Paulum legat, reperiet profectò, tantum condyloma appellari ipsum tuberculum obcallefcens, siue ex inflammatione, siue ex fissuris supersit. Quamòbrem recens, tuberculum, non condyloma, quia nondum obcalluit, sed simpliciter tuberculum, non condyloma, quia nondum obcalluit, sed simpliciter tuberculum appellari consuevit: specialiori tamen nomine condiloma appellauit, quod ex rimis in callosam eminentiam degenerantibus proficiscitur. Aetius verò, sicut & Celsus, quemuis tuberculum ex inflammatione ortum siue callum contraxerit, siue recens fuerit, condyloma appellat, dum rugosa sitani, aut vteri eminentia. Cùm hoc tamen, iudicio nostro, has eminentias indurari quoque, & crassescere teueri, ut condylomata sint, & fatetur. Itaque cùm vterus, sicut & anus, rugas non paucas habeat, vbi earum aliqua præter naturam intumuerit, tunc sanè sit condyloma, aliquando citra inflammationem existens, sed factis rugis maioribus, & prominentioribus obrimas callosas: Interim verò cum inflammatione durum ac dolorosum, ad similitudinem nodorum qui in digitis pugno clausi sunt, effectum. Quapropter a thymijs, qui in eadem parte oriri consueuerunt, condylomata differunt: nam thymia, tuberculosa quædam eminentia sunt, doloris expertes, præter naturam aucta, asperæ, oblongæ, subrubræ, interim albicantis coloris, maxime vbi mansueta fuerint, a cacuminibus eiusdem nominis herbæ in montibus nascentis sic appellata: quæ eminentia ubi parua fuerint, thymij, vbi verò magnitudine excedunt, ficus appellantur, si Aetio credendum est loco nuper citato. Generantur quidem hæ actiones frequentissimè in alis pudendi, aut in pudendo ipso, vel intus in osculo, aut collo. Fiunt tamen omnes ex causis nuper dictis, ac præcipuè ex crassis, exustis tamen & faculentis humoribus, & ex lue venerea: quarum affectionum signa subticere placuit, quod visui manifestissima sint.

Præmissa quatenus pertinet ad victus, & viuendi rationem prouidentia, ut præcedenti cap. dictum est: ita quoque humorum purgationem, & præparationem iuxta peccantis succij ideam institues. Mox verò ad peculiarem condylomatū curationem, deueniendum est: in qua quidem duo cōsiderabis, primū an inflāmatum condyloma existat: quo tempore mitigationi tantum innitendum est, oleis anodynis & lacte, ac reliquis, quæ mulcebrē habeant naturam: similemquē omni-

Cura de
ratio.

omnino institues curationem ei, quam Hipp. consuluerat in columella inflam-
mata: inquit enim lib. de natu. mul. Si in pudendis graue colentia fuerint, & co-
lumella nascatur, & dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunè
in vino datum. Secundum considerabis, an condyloma callum contraxerit, in-
ueteratumve ac durum fuerit, an nouiter genitum. Quod si nuper generatione
sortitum sit, ijs auxilijs vtèdum est, quæ reprimendi & exsiccandi vires habeant.
Cui vsui Celsus commendat infessiones ex decocto verbenæ, lentium, & melle
& fertula cāpana ex vino cocta cum rubi folijs tritis, & rosaceo cerato: vel ma-
licorium ex vino coctum cum hyssopo. Quibus & alijs, quæ huic vsui parantur,
addere oportebit aliquid discussorium, vt thymum & chamæmalum, aut si ma-
gis placuerit, lixiua partem perfundes. Facit & pessus ex malicorio, & butyro
paratus, & qui ex æsypo conficitur. Verùm si condyloma iā induruerit, callūve
contraxerit, ad chirurgicam operationem deueniendum esse consilii ipsa affe-
ctus natura, quæ vllis auxilijs cedere nunquam visa est. At quia timida femina
non nisi maxima urgente necessitate, sectionem aut vstionem admittere audet,
tentandum prius est prædicto condylomata emollire, & mox conterere ac di-
scutere. Primum itaque emollientibus herbis aqua incoctis infessiones, & fo-
menta parabis, quibus bis terve in die vtitor, & postmodum ea cataplasmata
imponito, quæ quod emollitum fuerit, conterant, & condylomata contrahant:
huius naturæ est illud, quod hac via conficitur. Myrsi assatum terebinthina exci-
pe, vt emplastri compagem habeat, & adhibeto: quo sanè remoto, super partem
hunc puluerem spargito: testas onorum vstas ac tritas lauato, & siccitas asper-
gito. Præstat, & aliud vnguentum, quod recipit thuris 3. j. aluminis scissilis 3. ij.
cerusæ 3. iij. spumæ argenti 3. v. quibus dum teruntur, aquam rosaceam, & vinū
admisce. & postea eadem rosaceo excipe, ac ceratum confice. Ex vsu quoque est
medicamento ex charta combusta confectum Gal. & Pauli testimonio: quod si
eius vim experiri non libuerit, itidem Illyricam terebinthina exceptam appo-
nito. Caterum sine hac quidem prodesse uideantur, vt Celsus consuluit, ad se-
ctionem veniendum est: ac si plura fuerint condylomata, ad partis vstionem. Se-
ctionis autem modum docuerat Aetius lib. 4. serm. 2. c. 13. & Paulus lib. 3. c. 75.
Sed clarius idem Aet. lib. 4. serm. 1. cap. 3. Referunt quidem, per bolsellam esse
excidenda condylomata: inquit enim Paulus; In his igitur cum morbus remit-
tit, bolsella modò fieri queat, prehenfas amputare oportet. Censeo quidem bol-
sellam esse ferramentum, quo aliquidprehendimus: quod etiam Celsus bol-
sellam nominauit, dicens; Neque quicquam commodius est, quàm bolsella pre-
hendere, sub ea quæ quod volumus: excidere: sic enim vnas immodicè laxatas,
bolsella prehenfas excidimus. id quoque consuluit Hipp. lib. de natu. mul. qua
parte columellam refecare docet. Sed iubet etiam Celsus causticis vt pharma-
cis: quæ sanè prudenter adhibenda sunt, ne ob partis laxitatem plus, quàm par-
sit, exedant. Chirurgia tamen facta, vniuersam curationem circumscribere o-
portet suppuratorijs, repurgantibus, demum cicatricem inducentibus: inter
quæ cerorum ex lythargirio, scopum omnem complere experimento dicimus.

De

A De vteri, ac pudendi, verrucis, thymijs, & ficu. Cap. 23.



Est quidem tam importunum morbi genus verruca vteri osculo, & pudendo adnascens, ut saepe in curatione maius facessat negotium, quam grauior alia morbi species: ob id profecto, proprium illi caput dicere studui. Verrucarum naturam tam variam esse constat, ut curationis vnam praescribere legem, sit perdifficile, nisi prius earum differentias, ac naturam exacte perpede-

ris. Sunt igitur verrucae, tumores ex scirrhusa tumorum sorte, qui instar moticulorum quorundam in cute insunt, unde & uomen sortuntur. Ad hoc quoque tumorum genus reduces myrmecias, ac si formiculas diceret, & acrocordones quae vulgariter verrucae pensiles dicuntur. Itaque, ex varia verrucae figura vario quoque nomine insigniri potest: sic enim thymios, vel thymeos, verruca appellatur, dum thymi herbae caput repraesentat: quae nihil aliud est, quam tuberculosa quaedam eminentia praeter naturam aucta, doloris expers, aspera, oblonga, sub rubra interim albescentis coloris, praesertim ubi mansuetior fuerit: quam sane eminentiam, dum parua fuerit, thymian appellant, ubi vero magnitudine excesserit, ficum nuncupat Aetius. Cuius sane tumoris duplex natura constat: prior quidem maligna, quae thymos duriores, asperiores, maiores, foeculentos, & colore liuidos continet, necnon & dolorem inducentes, qui sane exacerbantur maxime ad manuum contactum, & medicamentorum adhibitionem, sed praecipue in partu, aut menstruali purgatione. Altera vero mansuetior existit, & ijs constat, qui mitioribus insigniuntur accidentibus. Caeterum in vtrisque potest concubitum, exercitium, & quemuis laborem accidentia maligna excrescunt, & sane moro maturo assimilantur, quod fit, ut a multis eodem modo appellentur. Cornua item (affectio quidem ex verrucarum genere) ex cornu figura mutata, sic nuncupantur item myrmecia dicuntur verrucae, quae latiore sunt vase: inter quas eminens thymus vocata verruca, foeminarum pudendis adnata pessima est, maxime ubi sanguinem fundis: quod verrucae genus tarsicum vocauit Auic.

C Causam habent omnes verrucarum differentiae vnam, vniuscunque naturae, differentem quidem in diuersis speciebus, iuxta maiorem, aut minorem crassitiam humoris: ac prout altius, vel superficialius radices habet insertas. Sapit autem humor eadem efficiens naturam humoris melancholici, vel crassioris, & terrestri, pituitae: praeter quam quod mala plerumque qualitas ex gallico morbo contracta ijs, quae pudendis partibus adnascuntur, adhaeret, quae eandem difficultioris efficit curationis.

Hac profecto ratione ijs verrucis, quae foeminis deuirginatis prope os vteri, aut pudendum adnascuntur, praecipua & communis curandi ratio erit, vniuersalis totius corporis prouidentia, quod nunquam sanitati restitutas conspiciamus, nisi per sudores, & ea pharmaca, quae vniuersum corpus purius reddunt. Quapropter praemissa vniuersali prouidentia in victu, & reliquis, ad peculiarem curandi rationem deueniendum est: verum id fieri oportebit iuxta cuiusque verrucarum speciei sortem & naturam: prius tamen adhibita diligentia in expurgandis corporis excrementis.

V Myr-

Myrmecia igitur si in utero adnascantur, quia altissimas habent radices, exci-
 di sine magno ulcere non possunt: ideo cautè tractare oportet, & in hoc genere
 & in reliquis verrucarum generibus frequenter, & aliquò copiosè purgabis, &
 corpus sudori ex ligno guaiaco committes, & nonnunquam vñctionibus si ex
 morbo gallico, principium traxerint, maximè vnguento nostro scripto lib. de
 morbo gallico, & sic sectionem facito. Thymia, clauusq; et si exciditur, iterum ra-
 diculas spargunt, & ad antiquum statum facile redeunt. A crocordero verò si se-
 mel excidatur, nullam radicem relinquunt, & facile sanescit, neq; amplius rena-
 scitur. Hæc quidem expendisse conuenit, ut constet quales verrucæ vehemens
 medicamentum, quales ve lene exposculent. Paulus verò li. 4. c. 13. plura annu-
 merat, quæ verrucas præferim fessiles, & pensiles tollunt conterunq; velut est
 succus cucumeris agrestis cum sale, thuris cortex cum aceto: ficus primæ, quæ
 velut proceres non matnrescunt cum aceto, farina, & nitro. Eandem efficaciam
 habet lac, seu succus fici arboris illius: ærugo cum sulphure uiuæ: ocymi folia
 cum atramento futuriæ aqua quæ instillat ex uitibus cum amputantur, addito
 sale: simus ouillus cum aceto, hircinum fel illitum, nitrum cum urina pueri,
 & stercois houis cum aceto. Neq; est parui momenti capita salitorum piscium in-
 coquere aqua, quæ ex farmentis instillat, & verrucas abluere. Confert & aqua,
 qua argentarij ad deaurandum utuntur, medicamento aliquo mitiori admixta
 & verrucis adhibita, quas proculdubio extirpat. Itaq; in uniuersum cõis oñum
 curandi ratio est, ea adhibere medicamenta, quæ adutendi, & erodendi vires
 habeant: quibus in utero quoq; utendum est, dummodo eas, quæ circa affectum lo-
 cum sunt partes, folijs, uel quouis alio cooperimento cõtegantur, ne ipsæ quo-
 que nim medicamenti experiantur: quod proculdubio, in pudendis partibus
 frequentius, ac facilius contingere cernimus, quàm quibusvis alijs. Quò fit, ut pe-
 ritiores Medici ob eandem causam, circumiacentes partes illiniant vnguento
 ex bolo armeno, terra sigillata, aqua rosacea, & aceto: non quidem solū præca-
 uendæ partis gratia, uerum ne humorum aliquid ui medicamentorum ad affectam
 partem euocetur. Acrocordones uerò, myrmecia, & thymia non modò aduren-
 tibus medicamentis conteremus, sed & candenti ferro frequentissimè opus est
 inurere, quæ sanè omnia nonnunq; excidimus ligatura aptè illis coaptata, uel
 ferreis dentibus, aut forcipibus euellimus, ac radicibus extirpamus. Ceterum si
 aut excideris, aut ferro inusseris, prius partes circumstantes, uel ferrea lamina,
 uel utcunq; aliter contegere oportet, ne ignis aut ferri vim perferant: Post-
 modum uerò crusta butyro soluenda est, & ulcus curandum. Verum si verru-
 carum aliqua species in exulcerationem migrauerit, metallicis medicamentis
 ante scissionem, aut uisionem, curationem tentare conueniet. Quod si thymia
 in utero adnascantur, considerare primò oportet manusuetorum curationem, quæ
 facilis est, ac (ut refert Aetius) per abscissionem ex bol sella fit, mox adhibitis phar-
 macis sanguinem sistentibus, ac inducentibus crustam: sic medicamento flori-
 do ex romomate, rosarum flore, & citrini sicis parato utemur: nam hæc cõtra
 hunt, & quadamtenus repurgant, ulceraq; ad cicatricem ducunt. Verum ante
 scissionem tentare oportet eorum discussionem, quæ primò præstat salua sicca, tusa
 cum pinguibus carycis: item soleas ueteramentarias humidas urito, ac terito,
 & uino preimbutas imposito. Præstat & serpentis exuuias tritas carne carya-
 rum

A rāni reiectis granis, emplasti formā imponere: item gallam, aut alumen tritum in spergito: aut origani & rūtæ radicis æquales partes: quas ure, tere, & in sperge: Quæ si nō profuerint, preueniendum est chirurgia, ante q̄ maligna fiat, quo tempore, frustra existimant antiqui præsi dijs uti ante sectionē, quin potius ustione tantum esse curanda, ob periculum sanguinis eruptionis, uā o cō sensu fatentur. Cui consimilem curationem ficos exposcere mihi uisum est. Ad uerrucas autem huius partis, quas fornicarias nuncupant, summē confert hoc præsidium. Capræ recentē iugulare oculos compungito, & humore inde profluente assidue illinito. Bubulum item sterco calidum illitum confert. Velut aliud quod utilissimum est, & hoc modo paratur: origani festucam ad lucernam accendito, & fornicarijs uerrucis adinoueto, non quidem ut urat, sed quoddam fumum parti præstet.

B Id proculdubio, in omni curatione obseruare oportebit, nimirum, humectia, pingua, & laxantia pharmaca ex usu non esse. Item in prædictarum curatione circa uteri partes exedentia medicamenta diu immorari, non est permittendum, ne subiecta caro, quæ tenerrima est, ocysimē exedatur: ob id quidē bis terve in die partem abluere oportebit, maximē astringenti aliquo lauacro, si fluxionis suspicio adsit, sin aliter, abstergenti.

De scabris uteri, & pudendi pustulis. Cap. 24.



A V D raro equidem in foeminarum pudendo, & uteri osculo scabre, pruriginosæ, & furfurum plene pustulæ adnasci solēt, ijs potissimum feminis, quæ morbo gallico affectæ, uitorum quoque eodem malo infectorum, consortio utuntur. Ex quo proculdubio malo in sordida, corrodentiaq; ac maligna ulcera decidere feminas frequentissimē conspiciamus. Sunt igitur pustulæ exigui quidam tumores, quos & botores appellant Medici: in quibus substantia, ex qua prodeunt, qualitate magis, quē copia molesta esse solet: imo & plerunque in eis uenenositas inest, maximē cum scabre, & pruriginosæ pustulæ fiunt, & furfuraceas squamas ex se proijciunt. Quo tempore coniectandum est, humorem esse mali moris, & ex gallicæ infectionis sorte, quod nō solum in pustulam degeneret, uerum & agrē sanabilem reddat affectum, pruriginosum quidem, ac scabrum, quod maioris mali præludium existit, si dūque, potissimum in partibus, ubi fœculenti, & sordidi humores affluunt, & immorantur.

C Causas quidem habet huiusmodi affectus plurimas, nempe humorū non naturalium exuberantiā, quos esse biliosos, & adustos cum crassitie arbitrantur. Qui sanē dum in corpore redundant, & pars aliqua imbecillior facta, in apto loco existit, illuc sese in partem carnosam per porositates insinuant, & huiusmodi affectus progignunt, eoq; maximē in foeminarum pudendis, ob partis naturam, & situm. Huc etiam causarum generi accedit alia ex morbi gallici natura contracta, quæ easdem pustulas reddit curatu rebelles, contumaces, diuturnas, dolorosas, contagiosas, ac denique maioris mali præfagas.

V 2 Requi-

Curandi
ratio.

Requirat profectò huiusmodi affectio, non solum optimam vitæ rationē, & A
studium, verum maximam, & diuinam in artifice diligentiam. Quapropter in-
stituta ea victus ratione, quæ alimentis optimi nutrimenti constet: præcaebi-
mus cibaria acris, sanguinem item ex brachio mittemus non semel, sed bis, &
aliqn ex talo. Præterea lentē, & paulatim humorum malitiā frenabis syrupus
ex borragine, violis, rosis, cichorio, fumaria, & similibus, cum decocto lupulo-
rum, radicis schorcioneræ, similacis asperæ, aut ligni guaiaci. Et eadē lege non
solum bis, sed pluries prædictos humores purgabis pillulis fœtidis, cōfectio-
ne amech, agarico, diacatholico, ac diaphœnico, & alijs, quæ aduersus gallici
morbi naturam parantur: in minori tamen dosi, quàm viris offeres, vel tempe-
ratis, aut commixtis alijs mitioribus, vt casia syrupo ex infusionibus, cōfectio-
ne amech simplici, decocto senæ, prunorum, & polipodij: à quibus non erit ab-
re aliquando vomere, vt Hip. est consilium: vel si maioris, decocto guaiaci sudo-
rem mouere, aut vnguento nostro li. de morbo gallico scripto inungere: quod
huic malo summopere esse proficuum arbitròr. Quibus,educta maiori humo-
rum copia, reliquam curandi rationem tribus scopis circumscribes.

Primitus quidem id, quod iecori huius mali origini, & toti corpori, quasi B
habitualiter inhaeret, radicitus extirpabis. balneis nimirū sulphureis, vel si prū-
ritus fuerit maximus, aquæ dulcis, aut sudoribus ex decocto ligni guaiaci, vel
similacis asperæ, aut vtriusq; vel prædicta inunctione. Quo facto sufficiēti die-
rum numero, quia plerunq; aliquid in iecore, & membris solidis, adhuc post
sudores reconditum, ac fixum superesse comperimus (cuius ratione iterū affe-
ctus pullulat) mihi & plurimis doctissimorum virorum compertū est, prodesse
non parum, diutius vti syrupo cōfecto ex decocto ligni guaiaci, & similacis
asperæ, aut paulatim, ac sensim si quid superest, conterat, ac dissipet.

Secunda verò indicatio, his factis, & interim dum fiunt, consulit, corpus p-
stantioribus succis grandi diligentia renutrire, tum vt partes in antiquum, &
natinum statum optimo alimento restituantur: tum verò, vt alimenta ipsa attē-
peramento sint vitiosis humoribus.

Tertia, & vltima indicatio prouidet parti affectæ, vt si quid pustulosum ibi-
dem præest, facile auferatur, & procidat. Quod profectò facies, si aqua calida C
freq̃ uenter pustularum scabritiem temperaueris, & balneis, ac infussionibus.
Postea verò partem affectam vino calido cum nitro eluito, & mox à lotionē,
iterum aqua calida perfunde. Confert etiam butyro cum sulphure pustulas
inungere, aut ceratum ex oleo myrtino, rosarum, & spuma argenti, ac cera con-
ficere, & parti apponere. Præstat amurea cum sulphure, aut eadem argenti spu-
ma: alumen item cum melle, & myrrha. Ex vsu quoq; est, oui vitellus cū amur-
ca in plumbeo mortario ad coloris mutationem agitatus: itē malicorium cum
myrrha & melle: aqua et Lanfranci vulgò appellata. Sed inter oīa auxilia id mā-
ximè, & semper conferre, peritis in arte est cōpertum, quod recipit aquarū plā-
taginis, & rosarum, ana 3. iij. salis gemmæ, nitri, & aluminis, ana 3. iij. sublimati
3. j. & .s. bulliant ad tertias, & fiat colatura, cui adde viridis æris 3. j. à cuius medi-
camenti vsu, vno aut altero die exhibitō, ad mitiora medicamēta progrediendū
est, & iterū ad id redeundū, donec pustulosam carnē separatā cōperies, & noui-
ter facta elucescat. Huius celsus auxilia nō pauca apud peritos chirurgos repies:
sed

A sed mihi nunc hæc sufficere videntur, ni affectio eius fortis videatur, quæ nos cogat vel ad ferrum, vel ad aquam argentariorum, quam cenſeo in malignis esse proficuum deuenire.

De vteri fistulis. Cap. 25.

Num hoc certum esse ſcio, ex inueteratis, diffiſſimis, depaſcentibus, & perperam ac negligenter curatis vteri ulceribus (ſed præcipue ex tumore, qui diffiſſe rumpitur, ac viroſum pus effundit) facile fiſtu loſa vlcera & cauernoſa maxime fieri. Fiſtula igitur eſt arctus, oblongusque & calloſus ſinus aliquatenus indolens: &, vt alij cenſent, cauum eſt, profundum, ſinuoſumque; vlcus, callo obductum, & anguſto foramine patens, quo à ſinuoſis vlceribus diſſidere conſtat. Huius ſanè affectionis differentias nō pauca reperies, ſiquidem aliæ ſub cute extenſæ ſunt: aliæ altius penetrant, aliæ rectæ, aliæ tortuoſæ ſunt, plures intra carnem deſinunt: aliæ ad oſſa aut cartilaginem permeant, uel venam, arteriam aut neruum attingunt: & tandem omnes ab uno ore exorſæ, aut ſimplices ſunt, aut duplices, triplicesve. Quas porro differentias expendiſſe ad curationem conuenit.

Inter eas corporis particulas, quæ fiſtu loſis vlceribus maxime obnoxie ſunt, non inſimum habent locum oſ vteri & pudendum ipſum: nam præter plurimas, acres, & erodentes humiditates (quibus hæ partes abundant, quas ſcimus eſſe huius affectionis potiſſimas cauſas) carnis ſubſtantia & molliſſima compago facile monſtrant à quauis cauſa poſſe exedi, ac poſtea diffiſſe coaleſcere, quod calli eſt potiſſima occaſio. Fiunt itaque in vtero fiſtulæ cum pus in abſceſſu aliquo, qui promptè non rumpatur: ſic excoriat prædictas partes, vt continetia à ſubiectis ſeparet ac diducat, deinde, eo vteunque vacuato, diſtantia inter ſe priſtinum ſtatum recuperare nequeunt, vt ex Gal. conſtat lib. de tumo. præ. na. Quem proculdubio ſinum ſi protinus diligenter non curaueris, callo obduces ita duro ac denſo, vt nec glutinari quidem deinceps poſſibile ſit. Huius affectionis rationem adducit Gal. lib. de humo. Sed expreſſius & fuſius Hipp. lib. de fiſtulis: qui proſectò ex conuulſionibus, æquitatione, aut re quauis contundente extrinſecus accedente, fieri teſtatur: ſicut ex tuberculo diu matureſcente prodire etiam fatetur. Ita quoque ex omni cauſa, quæ carnem, vel ſubiectam ſubſtantiam exedat, facile fiet, niſi antea præueniatur, ne obcaleſcat prius quidem, quæ partes coaleſcant, modò tuberculum, modò humor exedens depaſcensque; ſub cute carnem, modò contundens aliquid ſit: dummodò partes inanes carne ſuperſint, & antequam coaleſcant, obcaleſcant.

Dignosces quidè affectū & eius differentias: primò ex figura fiſtulæ: ſæctitię perſimili: item ex callo forma fiſtulari obducto, quæ fiſtulæ eſſentialis differentia exiſtit. A virulentia quoque horribili aliquando excreta, ex deſento inſinu ſitatibus illis recremento malè perflato, ibidemque corrupto. Eodem etiam mō extenui ſanie, ac fluxibilibus & tenuibus humiditatibus dignosces: quas neque coquere partis imbecillitas valuit, neque craſſiores per calloſam ſubſtantiam, denſam alioqui ac ſolidam permeare poſſe, eſt credendum. Item id oſtendit nullus aut leuiſſimus dolor, niſi fiſtula neruum attigerit. Simplicem verò aut

duplicem esse fistulam, ex puris maxima copia, quam foramen vnum capere maximè potest, facile intelliges: item si in diuerso corporis situ, vteunque sit, pus exierit certum, proculdubio est indicium, non vnicum, sed multiplicem esse sinum.

Præterea carnem esse fistula perforatam, pus rubescens ostendit: & sic de reliquis subiectis substantijs iuxta cuiusque naturam: licet de signis nervi de sumptis ex pure variè sentiant. Celsus & Aetius: verum ex dolore id facilius colliges etiam si quàm minimum fistulæ fortiantur. Quod si venæ intimum abradatur, crassus & plurimus profluat sanguis: si arteria, paucus & tenuis. Et hæc de signis sufficiant.

*Curatio
ratio.*

Verum quia ærumnosam, calamitosamque vitam & multis perculis obnoxiam huius affectiones accersunt: siquidem ad intestina & ad vesicam adeo profundè aliquando perineant, ut vrina & alui excrementa per fistulam faciliè instillent: ob id quidem, antequam natura habitum contrahat, assuescatque per partem illam à recrementis prædictarum partium aut totius corporis expurgari, curandum est: fistulosa ulcera ad coalitum ducere, quippe si diu curatione protraxeris, corpus mille miserijs obnoxium proculdubio facies. Primum itaque victu & uita optime institutis, quæ non eris redundare humorem præparabis; quo extracto conuenienti pharmaco, prout superius dictum est, ad totius corporis prouidentiam deueniendum erit, frictionibus & moderatis vinculis partium superiorum, maximè si affectio ex fluxione dependeat. In qua sanè re conducit, non parum vsus balnei sulphurei: sed vtilius longè est corpus sudare decocto ligni guaiaci, aut smilacis asperæ. Quo facto, iterum syrupis & apozematis vtendum est, quæ interiora viscera exsiccent ac roborent, ut prohibita fluxione facilius fistulosa ulcera curari possint. Præstat potissimum hæc gratiam syrupus ex ligno guaiaco confectus, cui in decoctione addere oportebit agrimoniam, centauream, & senam aliquid. Benefacit quoque potus, qui recipit filicis maris à Dioscoride appellatæ 3. j. & gentianæ 3. j. centauri 3. vj. portulacæ 3. l. hordei mundi p. j. decoquantur in aqua secundum artem, & facta colatura, adde serapij rosacei, quod sufficiat ad conciliandam dulcedinem. Confert etiam potus, qui recipit agrimoniam p. plantaginis p. l. foliorum oliuæ 3. l. polipodij 3. vj. coquantur contussa ad tertiæ partis consumptionem, & colatura adde syrupi de rosis siccis, aut miorum citoniorum quantum sit satis, ut citra molestiam bibi possit.

Quibus porro corpore præuenito, ad localia præsidia tutius & audaciùs peruenire poteris: in quibus administrandis prima indicatio, quatenus ad effectum pertinet, docet callum prius conterere; nam cum ea, quæ disuncta sunt, vniri minimè possint, callo in medio existente, curandum primò est, eum extirpare. Verum quia peculiaris fistulæ cõditio est, osculum summe arctum & angustum obtinere, ipsum primo dilatabis, caute in, ne vesica aut rectum intestinum, quod propè sunt, damnum perferant, & subinde conuulso, aut aliud grauius noua fluxione concitata subsequatur. Primò itaque id tentabis immisso aliquo collirio, quod cõstet ex radice gentianæ, uel aristolochiæ, aut brionæ: sed pro magis spongiæ ellychinum immittere, & ibidem immorari sinere octo aut decem horarum spatio: quo auxilio, tuus foramen dilatari conspicias, quantum sat sit, ut facilius medicamenta immitti possint, vel pars inuri. Orificio satis patulo, callum uno è tribus modis extirpare pote-

A poteris medicamentis nimirū acrioribus, & callum conterentibus, scissione, ac auulsione calli: & ultimò partis inuisione. Quas etenim actiones non indistin-
ctè, & utcumq; cuius fistuloso ulceri præstabis: sed si recens fuerit fistula, in qua
callus non induruerit, aut flexuosa non extiterit, vel plurimum maligna nō fue-
rit sordida, ac virulenta, solum quidem medicamentis acrioribus curari deside-
rat: sicut dum callosa est, sinuosaue, scissione, ac dum sordida vel maligna, vstio-
ne. Ergo si recens fuerit fistula eius callum conteret radix gentianæ, radix elle-
bori nigri, spondilij radix circumrassa, & in collutione cum modico puluere
Ioannis de Vigo immissa: succus etiam radicis laserpiij. Prodest, & unguentū
ægyptiacum item aliud, quod recipit æruginis 3. xij. ammoniaci 3. ij. vino exci-
pe, & penicillo aliquo immitte. Præstat, & collirium ex trochiscis asphodelo-
rum, vel ex calce, & sapone. At si laborans, non admodum imbecilla fuerit, nul-
lum aliud medicamentum facilius callum conteret, quàm penicillus aqua ro-
sarū madidus, & modico arsenico intinctus. Si tñ fistula sinuosa fuerit, oīa hæc
decocto aliquo liquefacito, & pmetrāchitā inijcito. Pleraq; alia apud oēs auto-
res ad fistulas pharmaca reperies, qb⁹ vñ ē poteris, si quas adduximus, seruaue-
ris leges. Verū si fistula antiquior, durior, & callosior facta fuerit, laborans tñ
sectionem vel vstionē formidauerit, ad efficaciora medicamēta veniendū esse,
cōsuluit rei ipsius necessitas, cuius naturæ est illud, qd recipit unguēti ægyptia-
ci 3. f. sublimati 3. f. arsenici 3. j. lixiuiæ, & aquæ plantaginis ana 3. iij. aque rosa-
rum, 3. iij. bulliant ad cōsumptionē tertiæ partis: cuius medicamenti pusillum
aliquid inijcito, ac foramē obturato, ne ressuat. In eadē quoq; & insinuosas fi-
stulas, ex aridis medicamētis per fistulā aliquid insufflabis. Sunt et qui audeant
aquā argētorum in fistulas, immittere, qd cautē in uteri, ac pudēdi malis effi-
cere oportebit, ac non nisi dum corruptionē vereamur. Cum hoc tñ, si in pudē-
do malū extiterit, facilius & tutius valida quoq; offerre poteris: verū si in ute-
ri osculo, debiliora proficua sunt, reliqua verò citra damnum pars non admittit.

C Quod sine hæc quidem omnia sufficere uideantur, ad secundam curandi rē-
nem deueniendum est, uel pronuntiato periculo discedendū. Fit autē hæc in scis-
sione vsq; ad fistulæ finē facta, & callo unguibus aut scalpro radicitus auulso,
seu excoiato. Quo facto, ulcus detergentibus curato, quale est, qd recepit tere-
binthinæ in aqua uitæ lotæ 3. iij. succi apij. succi cynoglossæ ana. 3. vj. mellis ro-
sati. 3. j. & saristolochiæ rotundæ 3. ij. farinæ lupinorum. 3. f. coquantur succi cū
melle rosaceo ad medietatis cōsumptionē, deinde reliqua misceant. Præstat quo-
que aliud qd recipit aquæ hordei 3. viij. mellis rosacei 3. ij. myrrhæ, sarcocollæ,
radicis peucedani, & iridis ana. 3. f. Itē aliud qd recipit radicū lilij prū crematorū
3. j. mellis rosacei 3. iij. misce, & vtere: ex usu itē est idē puluis sol⁹ immixtus. Vti-
lissimū qd ē experietis aliud, qd recipit chameleontis nigri radicē, pini corticē,
thus masculū, aristolochiā pari pōdere, tertio, ac p fistulā, aridū ifunde, aut mel-
le rosaceo admixtum. Est item aliud, quod mirum in modum prodesse fert: re-
cipiens aquæ vitæ 3. ij. vini maluatici 3. j. mellis rosacei 3. x. myrrhæ, radicis pe-
ucedani tritæ, utriusque 3. ij. sarcocollæ, aloes, utriusque. 3. j. & f. misceantur, &
bulliant unica ebullitione lento igne, & in ulcus infundantur. Sed apud ple-
rosque probatur magis aliud, quod recipit aloes, thuris, sarcocollæ, sanguinis
draconis, balaustiarum, antimonij, aluminis, sacchari, cuiusque 3. scilicet cum

succo fumarie fiant trochisci, quibus liquore aliquo dissolutis, utere.

At dum eo miseria fistula deuenerit, ut non solum callosa existat, sed uirulenta quoque & maligna sit, ad uisionem venire nos cogit rei difficultas & imminuentis mali timor. Fieri etenim id solet, vel candenti ferro, vel caustico medicamento, quorum neutro in fistulis oris uteri utendum esse censeo, sed in ijs tantum, quae pudendo insunt. Verum ubi opus est, ac lege fieri debet: scindes quidem primo uniuersam fistulae cavitatem, sectionem arteriarum cauens. Quo facto, specillo prius per fistulam immisso, cuius ductu fistula discindatur, ellychnis partem formabis, donec undique discissa labra disiungantur: altera tamen vel tertia die medicamentum causticum immittes, vel ferro candenti, si ugens fuerit necessitas, partem inures, circum ipsam positis, quae repellant ac refrigerent, medicamentis. Facto ulcere, pharmaco uteris mitigatorio, ut oleo cum ouitello: tandem ad ea, quae crustas deiciunt, denenies, uelut est butyrum, aut pingue aliquod vel unctuosum: tunc enim crustis decissis, pus incipit coctum apparere, a quo donec ulcus sanescat, ea, quae superius diximus abstergere & ad cicatricem perducere, adhibenda sunt. Hoc unum tamen in hac curatione praeculis habeto, quod si affectio ex morbo gallico originem traxerit, verendum minimè est, efficacissima quaeque adhibere praesidia, quale illud est, quod arsenicum & argentum uiuum recipere diximus: verum si ex alia causa prodierit, mitioribus semper utendum est pharmacis.

De uteri haemorrhoidibus.

Cap. 26.



QUEMADMODUM (ut ex Hipp. lib. de haemorrh. constat) cum humoris alicuius copia ad uenas recti intestini decumbit, sanguinem, qui in uenis est, calfacit: calescentes autem uenae ex vicinis uenulis sanguinem attrahunt, & ubi replentur, interna sedis pars intumescit, & capita uenarum supereminent. Sic profecto, pari prorsus ratione in uteri osculo ac ceruice, uenae quae in has partes desinunt, dum crassiore sanguine, vel alio quouis humore, adeo (citra debitum & statutum menstruationis tempus) replentur, ut intumescant, eminentias non paruas aut haemorrhoidibus per similes efficiunt, quas uteri quoque haemorrhoides plerisque autorum appellare placuit. Has quidem his uteri partibus accidere scimus in quas uasa desinere contingit, in quorum osculis nimio humore, eoque saeculento crasso & effervescente turgentibus, praedictas haemorrhoides fieri certum est: maxime quae in uteri collo aut osculo id uitium accidere, ut ex Cleopatra, Moschione & Paulo euidenter constat: licet Aetius raro utero accidere referat, ac rarissime pudendo. Haec itaque est huius affectus natura, cuius effigies aut ceterarum est haemorrhoidum, uel ficus aut mori, prout sanguinis est conditio, & uenarum, quae tument, magnitudo. Harum sane haemorrhoidum quasdam constat esse dolentes, exacerbatas, ac mali moris: quasdam uero mites & citra dolorem: item alias caecas per aliquod tempus, aliasque fluentes semper.

Proficiscitur quidem haec affectio ex uarijs causis: primum quidem ex rhagadijs, condylomate, aut alia uteri excrescentia, ubi ad eam temporis tractu crassus foeculentusue humor confluerit. Item ex inordinato sanguinis menstrui ad uteri inferioris uenas fluxu: nam si ante debitum tempus huius uenae repleantur, fit facile, cum

A cum sanguinem susceptum non profundant (quia nondum tempus excretioni aptum est) ut ibidem incalascant, fiatque crassior, ita ut permeare venarum oscula non possit, ac ex consequenti eadem in tumorem prædictum eleuet. Quia propter diu vitio sanguinis venarum superiorum partium uteri sanguis in eodem plus iusto immoratur, innumera alia vitia, quæ hucusque retulimus, succrescunt, dum verò ad venarum oscula ante debitum tempus cõfluxerit, & ibidem præpediatur, videturque hæmorrhoides & mēstruorum suppressionem, aut inordinatos fluxus proficisci certum est.

Cum hmoi hæmorrhoides in duplici sint differentia, dolorosæ nimirum, & indolentes: oïum signa recensere oportebit, si prius cõe plerisque esse dixerim, sanguinem plurimum fundere, eumque per inordinata & breuissima intervalla: aliquando verò per longiora, nonnunquam verò licet rarissime per statuta tēpora. Habent quoque feminae sic affectæ colorem fœculento sanguini, aut humori peccanti per similem: aliquando pallor vniuersas apprehendit ex frequentibus sanguinis vacationibus: quas quoque esse lassitudine, tensione, ac imbecillitate non leui affectas comperimus. Item dolorosas & excrecentes comprehendentes ex dolorifica, cruenta, ac subrubra excretionē: in remissione verò fluunt citra dolorem huida & fœculenta. Earum quoque causam dignoscēs, quia si sanguis fœculentus & crassus fuerit, mori ac fici formam hæmorrhoides obtinere certum est, in quibus sanguis difficulter aut rarò funditur: at si pituitosus extiterit, vix quidem aut vesicæ formam suscipiunt: si verò adusta flauabilis & crassa, virulentiam ex se cum fœtore & dolore maximo profundent. Carterum intueri potest affecta pars & conspicua effici instrumento apud chirurgos huic usui parato, quod matricis speculum appellant.

Est quidē tā difficilis & varia apud priscos autores huius affectionis curandi rō, ut si rē diligentius consideres, non possis eos audacie nomine non accusare. Quippe oēs, primò ferè statim curationis accessu, hæmorrhoides in totū abscedentes, aut subtus in earū radicibus scarificantes, donec ipsæ emortuæ spōte decidant, in nō leue discrimen laborantes deferūt. Quā sanè audaciā, ne dicā temeritatem, à Moschione & Cleopatra summe dam natam reperio, licet ipsi quoque scissioni manus adhibeant. Attē uera medēdi rō, & qualis futura sit circa hmoi affectum diligentia, ipsius affectus natura & conditio euidenter monstrāt: scio tñ non deesse, qui sicut hæmorrhoides ani, curare doceant. Considerare tñ imprimis oportet, dolorosæ ne sint, an dolore carentes: nam si primū, dolorē mitigabis sanguine sufficienter missō, si plenitudo subsit ex brachio, postmodum tñ ex talo, maximè si menses defecerint, & hæmorrhoides nullum sanguinem profuderint. Deinceps verò in sefsionib. vteris ex malua, hordeo, fœnugræco & oleo amygdalarum dulcium factis: cui usui conficies unguentum ex butyro recenti, uel vnguento rosaceo diu in mortario plumbo agitato: item ex mucilagibus seminis citoniorum, aqua plantaginis & rosarum extractis, & in eodem mortario validè cōmotis. Si tñ dolor plurimū urgeat, hoc unguēto utitor, qđ recipit butyri recentis ʒ. j. vnguenti populeonis ʒ. f. olei rosacei ʒ. f. vitellum oui recentis, misce. Conficies item aliud ex nuper dictis, cui adde croci ʒ. f. opi ʒ. x. misce: & vtere: tandem adhibebis aliquod ex ijs, quæ superius ad uteri ardorē, pruritum, aut inflammationem diximus.

Verūm

Signa.

249

Curandi
ratio.

Verum si hæmorrhoides dolore sint carentes, aut iam mitigatio, diligenter exquirere opus erit, an sanguinem aliquem fundant, vel sicca, & tumentes existant. Si primum iterum medicus consideret, an sanguis ille, qui fluit, modicus fuerit, quo nullum est præstantius beneficium, vel immodicus, ita ut periculum aliquod vel plenioris hæmorrhagiæ, vel malis corporis habitus immincat. Quo tempore diligenter sanguinis profusioni prouidendum est, primo sanguine misso ex brachio partitè, & per intervalla, ne facto subito retrocessu, in principalibus membris irruat, vel facta copiosiore vacuatione vires ocys labant. Mox tamen ad ea, quæ sanguinem sistunt, veniendum est, cuius naturæ existunt alumina, cortices thuris, pulueres rosarum, myrtillorum, sanguis draconis, quæ omnia albumine oui excepta, uel cum atramento sutorio admixta, summopere prodesse constat. Nec placet quidem hac in parte eorum sententia, qui inurere iubent partem illam: quippe os vteri agere id perferre poterit, nisi periculo admodum urgente: quo tempore dorso, & eidem parti frigidiori, & astringentia prius adhibenda esse consulo, vel ut est bolus armennus, balauistium, folium malicidonij, vel puluis eius, sanguis draconis, acacia, hypocistis; ex quibus fieri possunt unguenta, pulueres, aut sacculi, parti affluenti adhibiti. Neque minoris momenti est, ipsas hæmorrhoides illinire puluere, qui recipit gummi prunorum coria meli granati, gallas, acaciam, hypocistidem, quæ omnia uino dissoluantur. Potiones et porrigere oportet, quas sanguinis profusioni conferre dictum est. Itæ prodest eoque partes superiores fricare, ligare, ac cucurbitulis ad eas sanguinis impetum euocare.

Quod si tumentes, & sicca extiterint hæmorrhoides, vel per longissima intervalla sanguinem fuudentes, consideret tunc prudens, & diligens medicus, an sanguinem habeant ibidem concretum, an verò carnosam quædam substantiam, fungosamque; ex vitioso sanguine genitam: nam si primum sit: eas rescindere, ut ueteres iubent, temeritate plenum esse existimo. Inquit enim Moscio; Antiqui ergo, quibus tollere eas placebat, aut chalcastico eas illiniebat, aut ligno constringebat, aut bases earum scarificantes, sic puluerem apponebant, ut paulatim emortuæ ibi caderent: quæ omnia præsidia, & pleraque alia eius naturæ nos reprobauimus, quod feruor inde nimius emergat, & ex consensu vicinitatis periculum nasci possit. Cui sanè voto ego quoque assentior, ac existimo, non solum id periculum præstito esse, uerum, & incognoscibilem fluxum. Nam cum hæmorrhoides uniuersi corporis extremi sint, & oscula vasorum: necessum subinde est, his rescissis maximam, & incognoscibilem fieri hæmorrhagiā. Quamobrem in ijs, quæ adhuc sanguinem continent, præsidia, citra chirurgicam manum solum adhibenda esse censemus, ea nempe, quæ hæmorrhoides exsiccare nata sunt, uelut est acacia uino austero trita, aut terra lemnia cum aceto illita, puluis sparte parellæ, aut ligni guaiaci subtilissimus cum melle, puluis rhabbari cum uino nigro. In qua re consulit Aetius ad merè frigida peruenire, uelut est succus mandragoræ, aut cicutæ, quibus ego uti non auderem, nisi aut alijs admixtis, aut in paruissima quantitate. Quem uolum tutius præstabit unguentum, quod recipit disfriges 3. iij. cerusa, spuma argenti, plumbi usti, & loti, singulorum 3. iij. excipe melle, & abluta prius uino parte, illine. Quod si frigidis uti necessitas non compulerit, exsiccare eas placebit, magis quam nimis frigidis constringere, præstito fortasse maiori danno. Resiccat quidem huiusmodi hæmorrhoides oleum de semine lini cum oleo de nucleis persicarum, vel pini combustis in plumbico mortario agitarum.

A tum. Confert etiam incredibili quadam efficacia olei de fructibus momordice quam balsaminam appellant. Præstat eundem usum, ut refert Gal. lib. de theriaca ad Piso. theriaca vino liquata, vel frequens uini ablutio, aut sacculus ex chamæ malo & semine lini, uino austero aut nigro, calens ibidem sæpe appositus: item pulvis, qui recipit corticis nucis aut quercus, spongiæ, aristolochiæ maioris æquas partes: quæ omnia ex siccata & in puluerem redacta, loco melle illito insperge. Verum si efficaciori adhuc opus fuerit auxilio, id confice, quod recipit foliorum uitis & ficus, ana m. j. viridis æris ʒ. j. quæ in uase aliquo pone & in furno desiccari finito, donec pulvis fieri possit: quo locus oleo de semine lini madidus aspergatur. Neque parum profectò conferre uidentur infelliones ex ijs, quæ resoluendi uires habeant, sicut balneum ex aqua sulphurea & aluminosa. Profunt et alia non pauca, quæ ani hæmorrhoidibus prodesse scimus.

B Verum quando eò miseræ deuentum sit, ut in fungosam ac fictitiam carnem, totam illam excrecentiam degenerasse comperiamus: maioribus auxilijs, ijs quæ mox diximus, prius tentatis: ad sectionem ueniendum esse cōsultat affectus naturæ quippe in hac sola hæmorrhoidum dispositione ac statu, sectionem esse proficiam ac tutam existimo. Antè tamen non erit ab re, medicamentis excrecentem carnem conterere: cuiusmodi est, quod recipit calcem uiuam, ac mellis quantum sit satis, ut formetur massa, quam in furno exsiccari permittito, donec facile in puluerem redigi possit, postea melle admixtum super partem insperge: primò tamen accessu aliquid ex mitioribus pharmacis adde, donec comperias quid ferre possint affectio & mulieris conditio. Succus etiam tassi barbasi cum oleo de semine lini parti appositus, fertur plurimum prodesse. Si tamen hæc sufficere non uideantur, sicut condylomata excidenda esse diximus, has quoque hæmorrhoides abscindere necessum est. Mox quidem, ut prædicto cap. diximus, ulcus curare oportebit, præcauentes semper, ne sanguis impetu ruat exhibitio ex astringentibus & resicantibus aliquò medicamento.

De uteri calculo. Cap. 27.

C **I** N utero calculos generari inter alios recēset Aetius: sed primò oīum Hipp. lib. de sterilibus, refert ex pure in utero concreto callū fieri: inquit. n. Festinare itaq; oportet ad expurgandum prius, q̄ pus in uteris in callum concreseat. Sed clariùs adhuc idem autor lib. 5. populi. inquit; Famula Dysiridis in Larissa cū inuēcula esset, ubi Venere vteret, fortiter circū circa dolebat, aliàs autē sine dolore erat: concepit autē nunquā, & cū sexaginta esset annorū, dolebat à meridie, uelut ex partu uehementer laboraret. Hæc cū ante meridiem porrum edisser, multum, postquam dolor ipsam corripuit uehementissimus, & priores oēs excedens, exurgens asperum quodam in uteri ore deprehēdit, postea cum ipsa animi deliquiū incideret, alia mulier immissa manu exprefit lapidē asperū magnitudine verticili fusi, & sanata tunc statim. Ex quibus sanè locis euidenter cōstat, uteri calculos nō esse solutos ac liberos, quales vesica generat: nā cū uteri cavitās & osculum tam grande existat, & singulis mensibus tanta sanguinis copia fluat, perdifficile est credere calculos solutos ibidem immo-

immorari posse. Quod etiam constare arbitror, quia certum est, eos quoque in vteri ceruice adnasci, ut ex Aetio scriptum inueniemus. Ob id quidem velut tofacea & callosa substantia vteri tunicis aut collo proculdubio adnascuntur duri, diuersae magnitudinis, & qui non hinc inde mouentur, sed simplici quadam vnione ab extremeto eorum alitioni apto, incrementum susceperant, & tunicis aut collo adherent. Quam sanè adhaerentiam euidenter ostendit sententia illa Hip. lib. de steril. siquidem refert ex materia callum in utero concreescere, ac confirmat diuturna lapidis mora in vtero famulae Dysiridis, quod erat per difficile, si solutus uagaretur peruterum lapis. Vtunque tamen sit, morbus est in numero adaucto, uel in contentis praeter naturam.


Causa. Causam verò existimo esse, crudum, crassum & foeculentum humorem in aliqua vteri parte ex eius imbecillitate genitum, aut paulatina congestione aliunde transmissum. Cuius equidem, potissima causa est lentor praedictorum humorum, quos neque coquere, neque discutere ualet uteri calor: non quod debilis ac remissus existat, sed quod ex intensione ac uitio tenue digerat citra coctionem & crassum in tofaceam naturam commutet. Generat tamen humorum extuberantiam, quia cum inutiles sint humorum humores, eos quidem trudere ac expellere nititur, qui cum uiscidi sint & glutinosi, tenaciter adherent, cum difficulter sit crassa permeare ac delabi: quo fit, ut in porositatibus alicuius partis uteri permanentes, praedicto modo accrescant, & aliquando in magnam profecto quantitatem, natura indies magis ac magis ad partem mittente. Ex quibus constare arbitror, non lapidem, qualis uesica est, sed tofaceam substantiam reuera esse: quam natura ualida nonnunquam separat & foras trudit: aliquando verò ibidem morari permittit, & multorum maiorum causa existit, Medicis fortasse ob rei nouitatem causam ignorantibus.

Signa. Cum verò hi lapides in utero praesunt, grauatiuus in ipso, ceterum leuis persequitur dolor, & exacerbatur maximè ipso compresso: menses inordinate praedunt, femina nequit concipere ad tactum aliquando cognoscitur. Qui verò vteri collo insunt, maiores inferunt dolores ob compressionem vicinarum partium: qui tamen aliquando adeo crescere solent, ut grauissimam in utero & partibus vicinis inferant molestiam: maximè cum certo quodam modo ac situ foemina decumbunt aut sedent, ita ut vteri collum torqueri ac comprimi contingat. Aliquando verò instrumento, speculo appellato, hos lapides facillè est intueri.

Curatio. Ex affectionis natura & conditione proficiscitur, & ex Aetio constare vix nullam aliam prodesse curandi rationem, quam eam, quae docet tofaceam illam substantiam radicitus euellere: ob id consultissimum est, facta leui purgatione, & injecto clystere, quod alius eluat, lapidem extirpare. Ponit autem idem author extractionis modum, quem ego proculdubito ceteris esse securiorem arbitror: iubet enim digitis largioribus sinistrae manus in foeminae anum immisisse, dextra ventrem comprimere, donec calculus extrorsum pelli cogatur. Cum hoc tamè calculus, qui in abdita vteri sede reconditur, curatu existit difficillimus: nam cum rationi consonum sit, eos vteri tunicis esse adhaerentes, ut superius diximus, difficillimum sanè erit sola manus compressione euelli. Ob id quidem necessarium erit, compresso sinistra manu lapide, dextra tantam vim in ipsum imprimere, quae sufficiat, ut paulatina facta euulsione, lapis ipse procidat: quo facto, facillimum erit, ipsum deinceps ab utero pelleri.

Ante

- A** Antè tamen q̄ id opus moliaris, operæ pretium est, si rem ex voto fieri cupis, ex terius fomēta, & blandas inunctiones vtero admouere, quales ex butyro, oleo amygdalarum dulcium, mucilaginis, ac iure pingui carniū parari solent. Intus verò idem opus mulieris per iniectiones decoctionis herbarum emollientium, ex butyro, & oleo amygdalarum dulcium, quibus vnio rosaceæ illius substantiæ tenuior, ac mollior facta, facilius & indolorosius euulsioni, ac tractioni cedat. Verum si lapis in vteri collo extiterit, facilius rem facies, nam aperto vteri osculo instrumento aliquo ferreo, haud difficulter cōprehenditur, & paulatim, sicut vesicæ lapis euellitur, aut scalpello refecatur. Quibus factis in vterum proijcies ea, quæ recentibus vlceribus proficua sunt, ne sanguinis fluxio iusto copiosior concitetur: quibus admiscebis, quæ magis astringant, ac postmodū q̄ siccent, donec partem cicatrice obductam esse, comperias. Deinceps tñ prouidendum est, ne femina incautè viuatur, sed instituto optimo viuendi modo in victu, ac reliquis vitæ vsibus, curandum est, ne iterum affectio reuertatur: quod facile solet fieri, maxime si cibi vtatur crassis, vel potibus largioribus frigidioribusque, ita vt cibi iterum recrudescant. Quamobrem donec habitus morbosus ad pristinum statum redeat, hoc viuendi instituto vtendum est, bis terve corpus in anno purgandum, ne clam crassus ille habitus iterum sucrescat.

*De vteri vermibus.**Cap.**28.*

- N**ON satis inter grauissimos autores cōstat, an lūbrici alio in loco, q̄ in intestinis generari possint, ob loci, ac materiæ apparatus, & cōmoditatē. Verum quia ex Cleopatra, & Prisciano constare scimus, in vtero aliquñ reperiri: disputatione videtur dignū (quantum rei institutū partitur) an ibidē fiant, an aliunde in vterum permeent. Primum itaq; experimento credendum censeo, quod docet in vesica vrinae generari paruos, rotundos, & albos lumbricos. Quod ē unica ratione uidetur posse probari: nam si materia eadem & efficiens causa ipsissima in loco intestinis simillimo reperiatur, non capit intellectus, cur nō possint in eadē parte lumbrici fieri, tēpore non deficiente. Quippe si causa est putridus humor, ut ex Gal. testimonio cōstat (q̄ sanè putredinem, nō quamuis, sed subiectam crassæ, crudæ, & pituitosæ materiæ censemus, vel profectò eandē materiam putredini obnoxiam) ubi hæc præfuerit, fieri quoq; lumbricos necessum erit. Atqui cū hæc ē in utero, & vesica reperiuntur, mirum nideri non debet, si ibidem pari ratione insint. Sed dices, qui sit, ut tam rarò extra intestina appareant? id profectò accidit ob uteri grandes, & apertos meatus qui non permittunt tandiū ibidē huiusmodi humorē immorari, q̄ diu par est, ut lumbrici ex eo gigni possint: & quia in vesica acris, & biliosa urinæ substantia, eaq; copiosa immoratur, q̄ aut putredini obfistit, aut vesicam à prædictis recrementis repurgat. Constat igitur quatenus ad materialē atinet causam in utero posse lumbricos fieri. Efficiens uerò causa, cū calor sit, constat, si cōsimilis in utero reperiatur, eodē quoq; ibidem fieri posse. Ex ijs enim, quæ ab autoribus & rei natura desumpsimus, euidenter colligitur, duplicem prærequiri calorē in prædicto opere: alterum putredinosum, & spurium, quē necessario humo-

ri

ripuitoso, & crasso inesse oportet: alterum verò naturalem & copiosissimum, qui autor sit generationis. Ex quo elicimus, pueros hoc malo frequentissime affici, quod ex ciborū ingluvie frigidis, crassis, & pituitosis succis scateant: quos equidē, dū plurimū crescunt, calorē p̄ter naturā concipere. est opus: q̄ dispositionē nacti (nam antea, et si eadē habeant excrementa, lumbricis minimē infestantur) eō q̄ pueri plurimū habeant calidi innati, promptissimē lumbricos gignunt. Ad rē igitur: si vterus natura iusto calidior plurima ex his recrementis susceperit, comprehensaq; diu obtinuerit, donec putridum calorem concipiant, rationi consonum videtur prādictos quoq; lumbricos ibidē generari posse. Si quis tñ dixerit, non posse quantū sat est, eo loco immorari excrementa, expēdat primò plus prāstare ad retentionē crassitiem, ac visciditatē humorum, q̄ inueniet ad expulsionē vteri cōmoditas: prāterquam, q̄ quantitas non est tam copiosa, quantum ea, quæ intestinis immoratur: neq; rursus id malum accidit, nisi ijs feciminis, q̄ vias vteri habent naturaliter angustas, & ipsum vterum prāter naturā calidum. Ex quibus causis prodit, vteri lumbricos, aut paruissimos esse, aut eis, quos ascarides appellamus, persimiles: quos prope pudendū adnasci rationabilius est. Cuius sanē rei testis et est Hip. li. 2. de mor. mul. per hæc verba: Si in pudendo mulieris, aut intestino recto ascarides nascantur, viticis folia, ac semē cū fellis bubuli obolo permisceantur. Ex quo decreto euidenter constat, lumbricos quoq; in vtero fieri posse, maximē tñ in eius extima parte, & collo, recto intestino simillimo: idq; ob copiosam pituitam rugis, & vteri osculo inuiscatā, accedente nimio vteri calore. Sed Priscianus, & Cleopatra euidenter docent ex intestinis in vterum lumbricos migrare: quod etsi aliquando fieri possit, non ob id negandum est, prādictis partibus posse quoque adnasci.

Signa.

Nec difficile admodum est, hos vteri lumbricos nosse: quippe dum adsunt, prurit natura, & venter, ac totum corpus inquietudine molestatur, inundat vteri osculum, & pudendum nimia pituita, non quod ibidem sua sponte sit, sed q̄ ex lumbricorum pruritu, ac dolore, aliunde in vterum confluat. Sudant plerūque huiusmodi fœminæ, forsitan ex molestia: gracilescunt etiam & impotētes ac imbecilles fiunt. A somno quoque frequenter excitantur, & tumultuosē dormiunt, ac non rarò contremiscunt. Item aliquando inter menstruas purgationes ipsos lumbricos excerni conspiciamus, & aliquando pudendo adaperto videntur conspici. Prāterea, sic affecta febribus inordinatis maxima ex parte corripuntur, & multa alia signa accidunt, quæ lumbrici intestinorum accersere solent: quæ sanē ob id consultò subiceo.

Curandi ratio.

Vniuersalem medendi rationem in proba victus institutione, & optimo viuendi studio, sitam esse dubitabit nullus: ob id cibaria adhibenda sunt, quæ facilis & optimi nutrimenti sint, ac facillimæ coctionis, & exsiccantis naturæ: ita vt in totum cruditas præpediatur, ac distributio ad singulas partes facili fiat, & insit quoque in alimento vis, & efficacia exsiccandi crudos, & frigidos humores. Potum verò sic affectis institues ex decocto radicis chinæ, vel similacis asperæ, anisi, vel cinnamomi: tandem eius, cui vires insint exsiccandi, roborandiq; ventriculum, & viscera omnia.

Verum quia non sat est, victum commodè instituere, ni deinceps ad morbosum apparatus, & genitos iam lumbricos curandi quoq; rationem conuertamus,

A mus, ob id vniuersum corporis habitum exsiccabis mollibus frictionibus, & conuenienti exercitio: tandem ipsum paulatim purgare oportebit ijs, q̄ pituitā & crudos succos purgare nata sunt, qualis naturæ est agarici infusum, syrupus ex infusionibus rosarum persicarum, pillulæ mastichinæ, de hiera simplici Gal. de agarico, de aloe, electarium Indum, & alia nō pauca, quæ superius diximus, & quæ etiam amarorem præter purgandi vim obineant, vt commodius pituitā abradere, & abstergere possint. Quo facto, quia huiusmodi lumbricos interficere medicamento per os sumpto, vt in ijs, qui intestinorum sunt, perdifficile est & inutile, necessum quidem erit per vterinos clysteres ea in vterum infundere, quæ pituitam abstergant pariter, & lumbricos ibidem adherescentes. Fiunt autē tales ex aqua, & alumine cum absinthij succo, aut abrotani, vel eorū decocto, & menthe, calaminthe, dictami, & pulegij cum melle: item ex aqua lupinorum cum hyssopo & melle, vel ex decocto mercurialis cum melle, absinthio, & aliquo ex supra dictis: quibus si addideris aloes aliquid, vel aliud amarum, & abstergens, proderit maximè.

B Exteriorius autem vteri regioni adhibebis cataplasma confectum ex lupinorū farina in hydromelite decocto: item aliud facito ex melantho, & lacte muliebri. Huic quoq; affectioni suum præsidium scripsit Hip. li. 2. de mor. mul. dicēs; Si in pudendo mulieris, aut intestino recto ascarides nascantur, viticis folia, ac semen cum fellis bubuli obolo permisceantur. Quo loco alia etiam recenset auxilia huic vsui non minus proficua. Sed vtile quoque est illud auxilium, quod paratur ex vtraque mētha, & absinthio, ac persicæ folijs contusis, adiecto aloes puluere, lupinorum farina, & mica etiam panis torrefacti cum decocto lupinorum & melle. Pari etiam vtilitate fit aliud ex absinthij, ac persicæ folijs, felle taurino, aloe, ac farina lupinorum, adiectis oleo absinthij, & oleo amygdalarum amararum, & efformato cataplasmate cum oximelite. Denique proderunt reliqua auxilia alijs partibus hoc malo vexatis vtilia: habet tamen hoc vnum

lumbricorum vteri curatio, quod ore sumpta medicamenta, quæ lumbricos interimere habeant, nequaquam admittunt, quod iecur prætergradientia malum aliquod grauius haud difficulter moliri possint.

C Quod profectò in curatione lumbricorum, qui intestinis adhaesunt, accidere ita facilè, est impossibile.
Et huius libri hic esto finis.

L A V S D E O.



DE STERILIVM ET PRAEKNANTIVM AFFECTIONIBVS.

LIBER TERTIVS.

B Quum mihi in animo fuerit, hoc vno volumine omnes feminarum affectiones recensere, & curare nulla alia scribendi ratio commodior visa fuit, quam ea, quae clario, & distincto ordine, affectiones cuique feminarum statui, & conditioni proprias & peculiare complecteretur, ac differeret. Ob id profecto tertium hunc librum Sterilibus, ac praegnantibus tantum dicare studi. In cuius prima parte sterilitatem, eius rationem, & causas ad vnguem exequi, institui: necnon quales sint morbi, qui ipsum veluti manufactant: ac rursus quales sint ij, qui eandem perpetuo sequantur. Pari prorsus ratione in secunda eius parte curabo, vteri gestationis causas, & modum expendere: atque etiam quales affectus ipsis agnantibus comites sint: & insuper si quis alius ex grauioribus superuenerit, quali methodo, & prouidentia vtero gerentes tractare praecauereq; oporteat. Quae omnia si exacte, ac diligenter expendis, mihi non est dubium, quin maximam tibi, & laborantibus vtilitatem sis allaturus.

C

De sterilitate in genere.

Cap. I.



QUANTVM naturae interfit, feminas maresq; fecundos esse, ac prolem procreare posse, nemo profecto ambiget: nititur namque ipsa maxime suum opificium immortale construere, id vero cum non possit ob materiae caducitatem, & corruptibilitatem, noua quadam mirabilique ratione inuenta, loco vnus animalis, ne species perirent, nouum aliud effingere institui, noua prole reficiens, quod quotidie caduca naturae conditio perdit. Prouida etenim natura, & suae conditionis gnara, quae corruptibilis erat, & caduca, omnibus rebus, nitens sui generis perpetuitatem tueri, insitam quandam generandi potentiam tribuit, qua perpetuum fieret in specie, quod in indiuiduo fieri nequibat. Cui sane operi perficiendo distinxit omnia, quae per propagationem fiunt, in marem & feminam, deditq; vtrique semen prolificum, & instrumenta generationi idonea. Sic profecto

X

emo-

emolumentum maximum dulcissimumq; mortalibus praestat, quod est, amabilis sobolis continuatio, cuique iuxta naturam suam sumillima. Propter quam etiam ferae, & belluae, pisces atque aures pugnant, & in laboribus gaudent, & delectantur. Fuit enim sterilitas antiquitus tam detestabile malum, ut Platonē scripsisse constet 4. de legum latione, feminam sterilem ablegandam esse à matrimonio, quod esset cum ea inane, & irritum matrimonium. Sic quoque olim obstetricum officium antiquitatem extulisse, ex Platone in Theaet. constat: ille enim tanquam pronuba in conficiendis nuptijs, in considerandis coniugijs, q; cuique ad amabilem filiorum procreationem iugare oporteret, optimè callebant: haud secus quam peritus agrorum colonus, qui, qualem agrum quod semen exposcat, probè intelligat. Quamobrem 5. Aphor. 57. Hipp. dixisse censeo. Si mulier non concipit, scire autem velis, an conceptura sit, & cat. quasi probas ad coniugium qualis femina sit apta. Atq; cum crebro in aliquo stemmate, ad quod regni, potestatis aut imperij, vel reliquorum bonorum dignitas spectat, haeres desideretur, ob virorum, sed frequentius vxorū sterilitatem, ne tanta dignitate stemma quodvis priuatur, peculiari diligentia curandum est, id naturę exitum, quantum ipsa permiserit, auferre. Verum ne quis (ut frequenter fit) in feminas oēm culpam reierat, inutiliterq; illis, non citra maximum damnum praesidia adhibeat: scire oportet: non minus steriles esse plerosq; viros, q; feminas ipsas. Quamobrem vtriusq; sterilitatis seorsum meminisse erit operæ p̄tū. Ante tamē scito, quod præter sterilitatem, quæ sic affectæ sunt feminae, grauius à quouis morbo premuntur, quàm quæ pepererunt. Inquit. n. Hippo. lib. 1. de mor. mul. Si uerò etiam affectio aliqua mulieri, quæ iam peperit accadat, ut menses venientes probè purgari non possint, facilius dolorem fert, quàm non si peperisset. Assueti. n. sunt vteri, & corpus idoneum ut impleatur, utpote in ventre habenti, & simul multa amplitudo in corpore est. Ex qua sententia euidenter constat quanti momenti sit, sterilitatem remouere: tum sanitatis tuendę gratia, tum uerò ob rationes à me nuper adductas.

De feminarū sterilitate.

Est igitur sterilitas vitium vteri, quatenus instrumentum est, concipiendi officio dicatū. Succrescunt equidem vtero, quatenus generationis est instrumentū, tria vitiorum genera, iuxta celebrem illam symptomatū diuisionem, q; Gal. adducit lib. de diff. sympt. Quippe vitiatum cui vsuis instrumenti actio, aut ablata ex toto operandi potentia, aut diminutę agente, vel corruptum, & monstruosum progignente effectum. Sic profectò ex feminis quædam omnino non concipiunt, quas peculiari nomine steriles appellat Hipp. De quarum et sterilitate sic locutus est Arist. lib. 2. de Gen. anim. c. 5. Nam, & à primo ortu naturæ, locis ad coitum incommodis laxis, steriles, & mulieres, & viri redduntur, ut alteræ non pubescant, alij non barbescant. Aliæ rursus ex feminis concipiunt quidē, sed fœtū perficere nequeunt, quibus necessario contingit abortire: est sanè hic diminuta uteri actio. Pleraq; insuper concipiunt quidē, & continent, cæterū monstruosū quid in utero gignit, qualis naturæ existit mola à Medicis appellata.

Primum sanè sterilitatis membrū, quod in genere abolitarum uteri actionū (potissimum earum, quæ illi, ut concipiendi instrumentū est, referunt) cōsistit, quadruplicē sterilitatis, speciē cōplectitur: nam mulieres steriles fieri cōstat primò, ex ingenito sibi uiuio, & naturali quodā defectu à primæua cōstitutione cōtracto,

A tracto, quod emendari arte aut ingenio minimè potest: quarum meminisse Aristoteli loco nuper citato constat. Quam equidem sterilitatis speciem nouisse plurimum confert, ne si eam inscienter curare studueris, ipsa non curata, in incurabiles affectus feminam deferat. Quod proculdubio frequentissimè cōtigisse cōspicimus, ut Hipp. ipsi accidisse constat, qui, ut ipse §. lib. populi refert, ex catapotto ad sterilitatem auferendam exhibito, mortē feminæ inopinato cōparauit: ob id profectò huius sterilitatis cognitionem, & prouidentem obtinere oportet antequam curationē aggrediaris. Alia rursus sterilitatis species est, q̄ non absoluta (ut præcedentem esse diximus) sed per collationē feminæ ad proprium virum existit. Cuius profectò sortis haud paucas reperies sterilitates, quas ob id mihi commodi ex præfidijs capere conspiciamus, sed cōnates sterilitatem in femina curare, aut nihil profumus, aut maius aliquod malum efficitur. Cuius sanè curationē nō à nuda sterilitate, sed ex collatione facta inter virum, & feminam (quantū nimirum quisq; ab altero dissideat cognoscētes) aggredi oportebit. Tertia verò sterilitatis species ex morbo aliquo affectu proficiscit, quæ aut ætate mutata, aut Medicorum diligentia, vel utroque mō auferri pōt. Pleræque. n. ex ijs, q̄ in iuuenta nō pepererūt, in consistente ætate fecundæ factæ sūt. Quarta denique, & vltima est earum feminarum, quæ pepererunt quidem, verum à primo aut secundò partu steriles effectæ sunt. Quarum omnium meminisse seorsum, erit operæpretium, initio sumpto à communis sterilitatis cognitione. nam postea iuxta cuiusque causam peculiaris monstrabo signa.

Multa sanè sunt, quæ feminarum sterilitatem monstrare possunt, & in primis natiua, & naturalis cuiusq; feminæ temperies, aut totius corporis intemperamentum, uel vteri habitudo. Cuius gratia Hippo. dixisse censeo §. aphorif. 46. Quæcunque præter naturam crassæ non concipiunt vtero, ijs omentum os vteri comprimit, & prius quàm extenuentur, non concipiunt. Quod etiam de nimium extenuatis, & gracilibus ex eodem autore probari potest. Ob id quoque Hippoc. dixisse constat. Quæcunq; frigidos, & spissos vteros habent, nō concipiunt. Et idem refert de humidis, & liccis eadem sententia. Sed clariùs libr. de natu. mulie. eadem verba refert dicens, Si os vterorum concludatur, fortè fit uel

C ut grossus ficus, & si digito cōtingeris, comperies durum, & contractum, & digitum non intromittit, & menses occultant nige, & urturā non suscipit. Quæ signa communia existunt his, & illis, quas crassum, & spissum habere vterū dixerat. Sed frigidorum vterorum recordatus est libr. 2. de morb. mulie. dicens; Quum verò perfrigeratur vterus, & onus insitum esse videtur, & color non est clarus, & compactus est vterus. Quia sententia de morbosa frigiditate, & extrinsecus accepta, videtur loqui. Sed sterilitatem non minus venaberis ex mulieris ipsius voce, quæ aut aspera, crassa, vel rauca futura est. Idē quq; ostendit femina, quæ pilos habet circa pudēdas partes crassos, nigros, & hirsutos, quales viragines obtinere solēt: maximè si in mēto nōnullos habuerit, moresq; ac robur nanciscatur virile. Sic q̄ calidiores, & hirsutiores existūt, nō cōcipiūt. Pari prorsus rōne steriles existimare oportet eas, quæ in membro aliquo principe insigne malū aut vehemens intemperamentū perpetiuntur. Sterilitatem monstrat inordinata mēstruorum fluxio, diminuta, vel supramodum copiosa.

Feminam præterea esse maximis laboribus debitā, infecundam sterilemq; fore euidenter constat. Item ea, quæ strictum habet uentrem, & coxarum ossa

Sterilitas ingenere signa, & probata.

plurimum coniuncta, sterilis censenda est, sicut quæ salacissima, nigrioris coloris, & pilosi corporis extiterit; vel membrum aliquod princeps admodum calidum obtinuerit. Quibus exactè in fœmina pensatis, quia frequenter accidit, non semper sufficere ad integram sterilitatis cognitionem, vsque ad experimentum & probationem deueniendum esse, consulunt autores omnes.

Primus cū Hip. mulierē pannis vnde quaq; circum septā thuris, styracis, sylphij, aut cyphei suffumigio subter suffire iussit, & in apho. ac si odor tunc videatur p corporis meatus internos ad nares, & os permeare, tunc mulierē non sterilem ex seipsa iudicabis. Et lib. de steril. netopū vnguentum lana exceptum & pessi figura efformatum, ac in vterum p obstetricem immisum, id experimentum ē ostendere refert, si subdita; p os manē olfecerit, fœcundā fore, & concipere posse affirmat. Ac subdit: Caput ali; derafum, & purgatū integrum ad vterum exponat, & si p os postridie olfecerit, concipere poterit. Sic profectō cum oculi spermaticis, vt ferunt, à cerebro poris, affines, q; adeo coitu alteratur, afficiunturq; vt geniturā emissuri, pleriq; conuiuere, vel nictari euidenter cogant; eō fit, vt illitis eorum angulis cum croco, fœcunditatem, & an seminales pori obstructi sint, experiri possimus. Id quod Plin. fieri posse testatur, dicens: Fœcunditatis in fœminis progatiuā accepimus, inunctis medicamine oculis saliuā infici. Quod ē Ari. 2. de gen. ani. c. 5. docuisse constat: à quo cenfeo Gentilem mutuatum fuisse fen. 3. 3. Auic. trac. 1. c. 1. Inquit. n. Aristo. Mulierum fœcunditatis pbatio suffitu fit, vt odores subeuntes vterum, efferantur ad locum spirandi, & afficiāt halitum, atq; ē illitu, aut colores oculis impositi, saliuā oris inficiāt: nā nisi hæc ita fiant, meatus corporis, p quos excrementum decedit, obstructos, & obsecatos esse, significatur: sedes. n. oculorum maximè oīum capitis locorum feminalis est, quod patet, quia sola ipsa p coitum venereum manifestè minuit, & languet, causa est, q; natura genituræ similis cerebro est, & aquosa vtraq;. Verum inter probationes potissima est, q; de galbano scribitur, quem si igni emollitū, sericoq; inclusum muliebris vteri stomacho nocte indideris, & caput mulieris purè lotū, linteolo, & reticulo inodoratis tñ obligaueris, manē si uertex mulieris galbanum redolet, mulierē probè purgatā, & esse fœcundā, ne dubites. Idem experieris, si parum balsami aqua admixtum bōbace exceptum, in vterum immiseris, femoriq; alligaueris, quod si tunc vterus traxerit, fœcunditatis est probatissimum signum. Præterea fœminā probat pessus ex aristolochia cum melle impositus in ceruice vteri, ac si saliuā dulcescat, fœcunda proculdubio cēsetur. Cuius sanè fortis alias non paucas reperies probationes apud Hip. li. 1. de mor. mul. quas breuitatis studio ptermitto, consulens harum oīum sterilitatū, ei minime esse curatrices manus adhibendas, q; ex natua sorte, & abstricta viarum structura proficiscitur: neq; rursus ei, quæ ex habitu impensè calido, ita vt semen conterat, aut ex nimis frigido, qui genituram extinguat, principiū fortitur, ne nimium curationi frustra innitentes, mala, quæ superius retulimus inopinato eueniant. Ob id ea vitans pericula supersedeo obsteriliū, quæ tales natura existunt, curatione, diuidens reliquarum medelam in quatuor potissima capita: quorum primum fœminæ sterilitatem tractabit, facta collatione ad virum: secundum quod maius faceffit negotium, sterilitatem morbosam: tertium verò sterilitatem ad tempus, hoc est, de fœminis, quæ pepererunt, sed par-

A re ante tempus defierunt: quartam porro, & vltimo de virorum sterilitate, ne fecunditati quicquam deesse videatur.

De fœminæ sterilitate per collationem ad virum. Cap. 2.



CENSEO quidem plerasque fœminas facta collatione ad viros, quibus coniunguntur, steriles esse potius, quàm absolutè, & morbosè. Quas cum Medici nulla distinctione facta, curare aggrediuntur, in veram sterilitatem, aut grauius aliquod malum delabi antè cogunt, quàm quid vtile, ex inconsideratis auxilijs præstare possint. Ob id primò, hoc distinxisse oportebit: nam quemadmodum in omnibus, quæ è terra nascuntur, non quoduis ex quauis terra nasci, aut augeri potest, sed determinatum statutumque est, vnumquodque semen peculiarem terræ conditionem sibi exposcere, esseque terrarum plerasque, quæ quibusdam seminibus proficiat, & necessaria existunt, alijs verò inutiles, & omnino contrariæ: ita prorsus in hominis generatione contingere censendū est. Nam licet fœmina suapte natura fœcunda existat, prærequirit tñ semē sibi congeneum, & affine, citra quod genituram procreare nequit: id quod de viris etiā subaudiendum est pari pensu. Quid enim præstat fœcundum præbere semen, si fœminæ uterus longissimis interuallis, à suscepti seminis natura distat. Quāobrem dictum est ab Hippocr. eisdem rationibus vteri fœcunditatem, quibus agricola sui agri fertilitatem, metiri. Nam vt seminis fœcunditatem frigiditas & agri spissitudo, vt emergere non possit coercet: sic per angusta frigore inspissanti vteri vasa, ad incrementum embrionis, non nisi sanguis, isque serosus perlabi potest, quibus nec secundæ aut cotylidones cum vmbilico formentur, ad nasci possunt, ac perinde in vteris humidis genituræ, vt in palustri solo cerealia extinguuntur, & suffocantur, & vt in agro sicco, & calido defectu alimenti, femina marcescunt, sic arida vteri caliditate proficisci seminis humorem insumi, & aduri pars est. Necessaria igitur est commensurata materni vteri, & uirilis seminis temperatura: nec tamen inficiabimur (vt paulò inferiùs latiùs probabo) dispares in qualitatibus vtriusq; coniugis intemperaturas mutua actione corrigi, & fœcunditati non semper, & vtcunque obsistere. Conspicimus. n. nò rarò viduas in primò coniugio steriles, alteri verò marito nuptas, fœcundissimas fieri. Cuius euentus causas, & probationem ad unguem exequi oportebit, ut cuiq; pro exuperantia vel defectu, in quo dissidium consistit, proficuum præsidium adhibere possimus.

Primum quidem omni arte exquirendum est, cuius nam sterilitas sit, viri ne, an mulieris. Quod licet multi ex vulgato quodam experimento indagare conentur, non tamen ex toto, vitio caret probatio illa. Nam vir etiam si uxorem cum priore marito, fœcundam implere non possit, aut fœmina, si ex marito cum prægressa vxore fœcundo non concipiat, non ob id eos, existimare oportet steriles esse. Fieri enim potest, ut prius iuncti temperati fuerint, aut contrario prædicti temperamento, & ob id fœcundi: nunc uerò uidua fœmina aut uir iungantur intemperato dissimili gradu aut modo, ita, ut omnino gene-

Probatio
an fœmi
na vel
mas ste
riles sit.

rationi obstant, & sic infecundi supersint: quod foemina quae foecunda erat ante, nequeat commutare noui mariti semen ob disparitatem, alioqui sua sponte prolificum. Quamobrem certius signum iudico, quod Auic. fen 21. tracta. 1. c. 9. adducit desumptum ex Rasio 22. continetur, ut proijciantur vtriusque semina super aquam, ac quod supernatauerit, sterile iudicetur, licet semen mulieris colligere sit difficile, & suspectum. Sed aliud eiusdem autoris facilius videtur, scilicet non ira certum, nempe, cuius vrina super radices lactucae sparsa, aut platam tenerrimam, ipsas exsiccauerit, eiusdem sterilitas censetur. Tertium quidem ex Gal. acceptum non minoris est momenti. Sumantur (inquit) fabae & grana tritici, ac totidem hordei, & ponantur in vase, & totidem grana in altero, & super illa mingat alter coniugum, & si post septem dies nascantur, is, cuius erat illa vrina, foecundus existimabitur: infecundus vero, cuius grana non nascuntur. Quam etiam probationem monstrat malua, quae non arefcit post mictum viri aut foeminae, quod si vrina iniecta arefcit, sterilitatem cuius erat, vrina, monstrat. Idem iudicium elicies, si vir dies circiter noctem aut plures vrinam emittat super furfures vase aliquo coctos, & mulier pari ratione in aliud vas, & in cuius vase vermes citius nascuntur, eiusdem profecto sterilitas est. Sed maxime id cognosces ex totius corporis temperamento, nam steriles sunt mulieres viragines, & viri effoeminati: item plerisque menstrua defuncta: alijs semen profuit exile, frigidum, ac fluxui paratissimum. Quippe infecundum semen est tenue: foecundum vero, quod grandinis speciem refert. Docet quidem Auic. foecundum viri semen debere esse album, tenax, splendidum, ad quod accedunt muscae, & comedunt ex eo, & odor eius est, ut odor florum palmarum, & iasmini, scilicet valde suavis. Est etiam infecundum puerorum, & valde senium: item virorum a primo exortu impuberum. Sic enim foeminae steriles sunt, quae pubem, & pudendi sinum habent glabrum, vel nimis hirsutum. Quod etiam comperies ex veneris appetentia cita, tarda, remissa, intensa: item ex seminis emissionem lenta, vel celerrima: a seminis quoque consistentia, quantitate, qualitate, & a plerisque alijs, quae in causarum expositione, latius docebo. Interim tamen scito, viros foeminis satisfacere non posse, nec foecundos esse, qui natura timidi, actus exercent muliebres, voceque foeminas referunt: pudenda pilis nudata habent, aut barba exiles, & paucissimos nanciscatur pilos: nam cum huiusmodi gelidam testium fortiantur temperaturam, minime poterunt generationi inservire.

Is item sterilis censendus est, qui plurimis foeminis deditus ex nullo concubitu foetum produxit. Mulierem etiam sterilem dicendam censeo, cuius crassa vox est, pilique multi, & duri, & rigidi pubem obsepunt, mistacem mentumque; barba circumdat, quae etiam plurium uirorum amplexus experta, nunquam vtero gessit. Refert quoque Hipp. haec uerba lib. 2. praedict. Ex mulieribus, quae magis ac minus in utero concipere solent, ita considerationem facere conuenit. Primum quidem specierum: paruae enim ad conceptionem praestantiores sunt maioribus, tennes crassas, albae rubicundis, nigrae liuidis. Quae item venas conspicuas habent, meliores sunt, quam quibus non apparent: carnem autem vberiore habere aniculae malum est, mammas autem tumidas, ac magnas, bonum, atque haec quidem ad usum exposita sunt.

Verum interrogare oportet etiam de mensuris purgationibus, an omnibus mensibus

Alibus compareant, & an copia satis magna, & æquales in singulis tēporibus, & in eisdem mensium diebus: sic. n. has fieri optimum est. Locum verò, in quo conceptio fit sanū oportet & siccum ac mollem esse. Sit item nec retractus, nec pronus, neq; os ipsius sit auersum, neque conclusum, neque euersum. Fieri. n. non potest, vt conceptio fiat, quodcunque tandem talium impedimentorum affuerit. Quorum omnium rationem habere oportet, vt prudens Medicus cuiq; iuxta indigentiam, id præsidium adhibeat, quod profuturum intelligit.

Ex oīum autorum decreto constat, potissimam sterilitatis per collationē cām esse, vtriusque coniugis dissidium in naturali & proprio temperamento. Nam cum diuersa, quæ vnum constituunt, certam quandam proportionem sibi adferuare teneantur, ut ex eis tertium aliquid fieri possit, vbi hæc proportio nō reperitur, neq; vtriusq; seminis vnio fit, perdifficile quidem est, ex eis vnum constitui. Ferunt quidem multi temperatum virum in temperata muliere optimè & fecundissimè generare. Alij rursus existimantes similia inter se nō posse agere, censent, neq; eos, qui eiusdē sunt temperiei, neq; qui temperata fruuntur cōmoderatione, posse vsquam generare: ex quo proferunt fecundiores esse, qui contraria cōstant tēperie. Fulciunt quidē oēs suam sñam verbis quibusdam Gal. li. 5. Apho. 63. quæ in hunc modum se habent. Tam mulieres q̄ uiri, si temperie quatuor qualitatum potiantur, generant: quamuis temperie illa priuatis commisceantur: intemperati verò nunquam generant, nisi contraria intemperie peditis, iungantur, utpote calidi frigidis, humidi siccis, & sic de singulis. Quam equidem sñam sic expositam constat difficilem esse, & sibi aliquo mō contrariam. Nam si uerū esset, intemperatos solis intemperie eorum naturis contrarijs copulatos gignere, qui poterunt temperatis iuncti generare, ut prima pars sententiæ Gal. profert. Neq; sat erit dicere, temperatas naturas intēperatis quibusuis contrarias existere: qm̄ idem autor paulò inferiùs satis manifestum facit: sed de ea loquitur contrarietate, quæ inter vtraque extrema, non inter alterū extremum & medium posita est. Quamobrem placet magis intemperatio Mercurialis li. variarum lectionum. nimirum, q̄ temperati, si temperatis misceantur, semper gignunt, intemperati verò, tunc solū, quādo contrarijs suæ temperiei copulantur. Quod etiam Lucretius his carminibus probat.

*Vsq̄ue adeò id magni refert, vt semina possint
Seminibus commisceri generaliter; apta,
Crassaque conueniant liquidis, & liquida, crassis.*

Ex quibus ego hæc infero rōnē, nempe, tēperatā vtriusq; coniugis naturam, fecundissimam esse, fecundā quōq; intemperatam vtriusq; dummodò non sit distemperantia in extremo, & vehemens; quippe tales infœcundi existunt omnino. Itē infœcundi rōne intēperamenti sūt, qui simile obtinent tēperie, si ambo calidi sint, siue frigidi, humidi ac siccis: nā eorū semē nullā, cū simile sit, pstat actiuitatē: quā ad generationē p̄requiri probat Gal. lib. de natura humana. Qd si quis dixerit, temperata corpora esse similia, & ob id debere esse infœcunda, expendat numeris non paucis distare temperatum fœminæ corpus à viri corpore temperato: nam iustitiale cuiusque sexus temperamentum, multis numeris ab alterius temperatione dissidet, & sic diuersa quodammodo sunt temperata vi-

ri & mulieris corpora, quantū sat est ad fœcunditatē. Quapropter tēperatum in
 réperata ob hac diuersitatē generare optimē poterit, quod similes, neq; summē
 cōtrarias habentibus intemperantias, accidere minimē poterit. Hāc sanē snīam
 Gal. loco citato his verbis ex Hip. probat. Primum itaq; necessarium est genera
 tionem huius non pcessisse ab vno: quo nā. n. pacto, quod vnum est, generare
 aliud pōt, nisi cum aliquo cōmiscetur: deinde neq; miscentur, neq; generant,
 nisi sint eiusdē generis, eandēq; habeant facultatē, neq; similis nobis efficient:
 rursus nisi calidū frigidū, & siccū humido, modo & æquabilitate respōdeat,
 sed alterum alteri longē p̄stabit, & ualentius infirmiori, nihil generabit. In qua
 sanē Hip. snīa Gal. inquit citra vllā aducntitiā opem non differret fœtum, ne in
 paucos quidem dies, quin ē vestigio expullularet: non. n. ex seipsis tantū obti
 nent fœmina, vt producant, sed externum desiderant auxiliū. Quas sanē actio
 nes, neq; à similibus, neq; à summe contrarijs fieri posse certū est. Ob id cēseo
 Hip. dixisse 5. apho. 62. Quæcunq; frigidos, & spissos vteros habēt, nō cōcipiūt,
 & quæcunq; p̄humidos habent vteros non concipiunt: nā extinguitur genitu
 ra. Et quæcunq; sicciores, feruidioresq;, nā alimenti difficultate tabescit genitu
 ra (quasi excedentes intemperantias damnans) & quæcunq; ex vtriusq; medio
 crem habent temperatiōē, hæ fœcundæ sunt. Subdit huius rei rōnem Gal. li. 1.
 de nat. hum. ac transferens eandem doctrinā, q̄ de temperamento totius corpo
 ris retulerat, ad temperationem vteri partium genitalium, & vtriusq; seminis,
 inquit: Nā de vteri temperamentis, quæ dixi, hæc quidem de genitura tempe
 ramento intelligi debent, vt quæ nunc iusto est humidior, aut algidior, nunc
 siccior, vel feruidior. Est aut vtero sicciori familiaris humidior genitura. humi
 diori siccior, æquē vt calidiori frigidior, frigidiori calidior. Itaq; minimē pōt
 ex duobus coeuntibus aliquid gigni, ni mutua inter ipsa familiaritas, ac medio
 critas, ex attemperatiōe vnus cum altero ex coeuntibus prodeat.

Sed ne huius pstantissimæ causæ (q̄ coniugium frequentissimē sterile effice
 re habet) varietate, rerum integrē cognitionem obscuremus, p̄ter cōe totius fœ
 minæ, & vteri temperamentum, à quo id pficisci diximus, pudēdarum quoq;
 partium varietatē, ac mutuā inremperiem docere oportet, vt constet cuius con
 iugum vitio sterilitas prodeat. Qua in re expendere prius oportet testium viri,
 & fœminæ naturā, deinceps pudēdi virilis vitium, collatiōe facta ad vteri si
 nū, & vltimō seminis vtriusq; differentias; nā de morbofis distēperantijs, & af
 fectionib. seq. c. disputabo. Penis igitur virilis, vel longitudo, conuenienti ma
 ior, q̄ vterum plurimum feriat, sterilem efficit concubitus: item eiusdē breui
 tas, q̄ nondum os vteri attingere possit, inanē efficit seminis emissionē: non. n. re
 cipitur in vtero, sed à pudendis ocysimē prolabitur. Eadem ratione virile mē
 brum latius, aut crassius, q̄ par sit, vel sustinere fœmina nequit, vel adeo os vteri
 aperit, q̄ hiare ipsum faciat, donec semen procidat, vteri osculo nequeunte se
 cōprimere præ dolore, & extensione nimia. Item viri semispadones generare
 nequeunt, vel qui nimis obesi sunt, quia in vterum eiacularē semē nō possunt,
 q̄ ventrosi nimium existant. Præterea viri testes conferre ad vteri, & testiū fœ
 minæ tēperie: nā si calidiores existant, semē exustū, & infecundū emittunt: itē
 frigidi sterile p̄gignunt, frigidū, ac maximē labile. Quæ pculdubio oīa ad fœ
 minā transferenda sunt, q̄p̄p̄ steriles existunt, q̄bus os vteri hiat, aut clauditur
 plus

A plus q̄ par est, illud q̄ de semen reijcit: hoc verò non admittit. Itē si meatus seminarij naturaliter in obliquū tendunt: vel pudendi os nimis strictū sit, vel plurimū parens, & grāde. Vterus pari rōne supra modū calidus semen exurit, sicut frigidus ipsum extinguit: qđ pari lege de testibus subaudiendū est. Quibus causis alia nō minoris momēti accedit, cū videlicet, vteri os in coitu dolitat, & sanguis p̄silit: cuius affectionis Hip. meminisse cōstat lib. de steril. p̄ hęc uerba: Si verò à coitu imū ventrē dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semē tritū, & muscū mollē, & adipē anserinū mixta molli lana excepta imposito. Est. n. vteri officiū nō solū sanguinē purgare, & copiosum habere, sed semen suscipere, attrahere, vndiq; cōplecti, & ex eo aliquid parentibus simile efformare, & formatū retinere, & opportuno tpe pellere, in q̄bus si defecerit sterilis cēsendus est.

Sed in semine cōiectare quidē oportet qualitātē, quantitātē, & substantiā, ac excernendi tēpus. Semen igitur tale esse oportet: quale depingit Arist. li. 3. & 7. de parti anim. & 7. de gen. ani. dicens: Semen generationi aptū sit albū, splendidū, globosum, florū sambuci modo odorū, qđ in aquā iniectū, fundum petat. **B** A viro tñ infœcundum excernitur semen, cum feruidum fuerit, & veluti torre factum, vel frigidum tenue, & aquosum, quale decrepitorum est, & eorum, q̄ aquæ nimis sunt potatores, vel quasi puerorū, aut ebriorum, & helluonū, ac pituitosorū, aut acrius, & siccius, qđ infœcundum existit: nisi moderatissima, aut appositā seminis fœminei natura fœcundū ex attemperamento reddiderit. Sit p̄terea moderatum, nā parcius generationi nō sufficit, copiosius agrē cōcipit, & malē à mulieris semine nutritur, aut refouetur. Quos ēt conditiones in fœmineo semine spectare opus est. Sic ēt in fœminis viæ seminales angustæ, q̄ impediunt, quominus debito, & æquali tpe ipsum in vterum decidat, non parua sterilitas causa est: sicut semen in vtero diu retentum, priusq̄ ab ipso, vndiq; concipiatur: resoluuntur. n. spiritus, & calor inutile fit. Sterilem quoq; hac lege efficit concubitus excretio seminis cuiusq; coniugum ante tēpus, & paritatem facta: nā quod receptum primo est, vel ante plabatur, vel quod vltimō emittitur, non ita auidē amplectatur vterus, vt constet quantū errent, qui censeant semine à viro in balneū piccto, fœminā, suscepto illo in balnei ingressu, concepisse. Præterea sterilefcit concubitus, si coitus coitui accedat, & maximē si cōcubitus coactus fuerit, qđ potissimē contingit in ijs, qui inuiti & sine amore iungunt: voluntarius verò, & iocundus fœcundissimus existit, nisi nimium sit ardens.

C Coniugum præter hęc omnia ætas incommoda, immaturaq; sterile efficere enidenti obseruatione comperimus: nam ætas maris annis duodecim (qđ multi tenent, ego tamen non probo) fœminæ quatuordecim minor: & illius annis sexaginta huius verò quinquaginta maior, raro fœcunda existit, aut malē fœcunda, vt ex Arist. 4. de par. anim. euidenter constat, licet aliqñ contrarium accidisse scriptum sit. Et Hip. fateatur, lib. 2. popu. par. 2. tex. 18. de coriari vxore, q̄ cum iam esset menstruus orbata, & multos annos habuisset, filium conceperat, non sine magna multorum admiratione.

Ætas. n. conceptui aptior, multis decem & octo annorū probatur: ego qđ decimum quartum, q̄ legitimū esse terminum legitimæ cōceptionis cenſeo: licet, vt dictum est, fœmina antē possit concipere: Debiles tñ fœtus, & cum periculo abortus. Cæterum plures ex ijs, q̄ ante hoc tempus nubunt, aut sterilefcunt prorsus,

prorsus, si uterus sit valde imbecillis, disruptis vasis, & utero nimiū excafacto: **A** idq; maximè si virile mēbrū magnum sit, & puella parnā vel semen viri vitiosum. Quod et sentire videtur Plāto loquens de nuptiarum tempore lib. 6. de legibus, dum in masculis à trigésimo ad trigésimum quintū, in puellis à decimo sexto ad vigésimum coniugium præcipit. Quo profectò fit, ut quæ aliter faciūt, à primo partu steriles euadant, ac malè in genitalibus afficiantur, & plerunque sic geniti parum mente valeant. Vnde non mirum est, si monstrosi aliquando Principes, & magnatū primogeniti, aut nō plurimū vitales, & firmi nascent: nā ob imperium, & maioratū, vel pueri puellis adiunguntur, aut senibus puellæ. Sed in hac re paulò diligentius sententiā proferre oportebit, qđ multis vñibus proficuū fore arbitror, tum iuris peritis, tum et parentibus qui filias studēt viro committere. Primò itaq; ætatem viro maturam, aut in viro aptam ad fēminam, annorum numero nō esse metiendā certissimum est, apud viros strenuos & in bona philosophia peritos: nam robur ad actiones potius ex temperamento comparatur, q̃ ex tpe, quod qui ignorarunt, in mille errores delapsi sunt: sic enim Plāto, & alij virum, & fēminam non esse coniugio committendos ante trigésimum annum, & in fēmina ante decimum octauum. Quos equidem autores arbitror magis robori comparando studuisse, q̃ metisse ætatē cōiugio aptā, alij verò ætatē fecunditati aptiorem exquirentes, in viris scripserunt 18. annū prærequiri, & in fēminis. 14. Sed sanctè, & piè sacri canones statuerunt ad matrimonij præquiri in viro pubertatem, hoc est 14. annum, & in fēmina 12. nā sedandæ concupiscentiæ muneri, q̃ matrimonij alter est vñus, sat erat eā ætatem seligere, q̃ ad virum citra noxam salutis, aut fecunditatis in fēmina sufficiens esset: nā eo tpe, iā ut inquit Arist. fratrare fēminæ incipiunt, & semen ob acutiem & maturitatem ad coitum excitare, & maiori ex parte 12. annorum fēminæ viros perferre innocuè poterunt, licet aliquæ ob peculiarem compositionem id non valeant. In qua item re arbitror alias quoq; esse, & in undecimo, & circa ipsum, quæ optime visum perferre poterunt, maximè si temperamēto sint calido colore nigricante, aut ex albo, & rubro mixto, corpore robusto, & conditione lasciuia, & ad ventrem prona, in quibus nulli dubium est, complexionis conditionē ætatē supplere, si quidem ætas potius hac lege quam annorum numero circumscribenda est. Quæ omnia in fēminis, & uiris obseruare oportet. **C**

Obesitas eodem modo alterius, & magis utriusq; inanes efficit concubitus, quia generatiuæ partes statutū, & naturalē locū attingere nequeūt, & sanguis in his qui natura crassi sunt, paucus, & in adipē consumptus, & sic semine & sanguine mēstruo carēt, & parū subinde appetūt, & rarò coeunt. Verū licet fēmina pinguis crassaq; existat, nō ob id protinus sterilis cēsēda est, et si Hip. 5. Aph. afferat crassas fēminas nō cōcipere: nā eo loci Hip. intelligit de ijs, q̃ pter naturā pinguescūt. In reliquis. n. q̃ natia tēperie crassecūt, solet natura, si nō fuerit laesa, sic cuncta cōstruere, ut nō laedant necessariæ operationes. Cōsimilē huic snie adduxit Hip. lib. de locis, aqua, & aere, dicens; Mulieres aut pinguedo carnis, & humiditas steriles facit, p̃ quibus vteri earū genitale semē arripere nequeūt. Cuius dicti rōnē q̃rens Vesalius lib. de fabr. corp. hum. c. 4. arbitrat, id esse intelligēdū de pinguedine, & obesitate pter naturā, cuius sniam probō: vidimus enim plerasq; pingues, fecundas esse, quas nō ex morbo, & præter naturā, sed à natua forte

Aua forte sic factas arbitramur: dummodo mēstrua copiosē profundant alioqui in fecundas arbitror q̄ multum sanguinis in pinguedinem conterant adeo ut fetui alendo defit conueniens sanguinibus vbertas, at alibi fufius dictū est. Ex maci entis tñ pinguioribus factis, vix vllam concepisse reperies, nisi corpulentia moderata sit, vt intelligenda est Hip. sentētia. 5. Apho. Probat nostrā & illius viri sententiā Hipp. lib. de superfetatione dicens; Mulier, q̄ p̄ter naturam crassa est ac pinguis, & pituita repleta, non concipit hoc tpe: q̄ verò ex natura talis est horū gratia concipit, si non aliud quoddā ipsam impediāt. Qua sententiā euidēter nostra constare vñ neq; obstat me antea dixisse, magis carere sanguine obesa corpora, quæ talia sunt naturaliter, & ob id semine priuari, & sanguine menstruo: illud qdē dēctū est facta collatione ad corpora p̄ter naturā obesa, sed vtraque cōceptioni inepta, minùs tñ, q̄ natura sunt crassa, & magis, q̄ p̄ter naturam, non quidem qd sanguis deficiat, sed ob incrementū omenti, quo vterus comprimitur, vt semē neq; suscipere neq; aptē cōplecti possint. In quibus verò crassitudo naturalis est mēbra interna non hñt hanc deformitatē, & ob id non sunt cōceptioni hac rōne inepta: neq; qd sanguis deficiat, quia tñ habent, q̄tum sibi proficuum fore existimauit natura rectē operans. Ex quibus constat habitum p̄ter naturā tenuem, & crassum steriles esse. Vter verò magis, ab Hipp. monstrat 2. p̄dict. dicente, reuues crassis esse fecundiores. Est quoq; huius disparitatis inter coniuges causa animi affectio vehemens, quæ proculdubio uitalē firmitudinem, & calorem imminuit, ac spiritus dissipat: quo fit, ut utriusq; coniugis immoderatus labor sterilitatem efficiat. Item eundē effectū p̄stat aer calidior pestilēs, uictus tenuior, balneū ieiuniū ieiunis immodicū, gonorrhea, venus immodica, vel vita admodū sedentaria, & otiosa, ac epulis plena, & tandē omnia, quæ uel sanguinem aut semen imminuāt, vel optimā eius, ac moderatā tēperie euerant. Sic aeris vel calis status aut regionis, calor uel frigus inclemētes sterilitatē quibusvis uiris ac feminis accersunt: ijs maximē, quibus ex toto cōtrarij existūt uel aded similes, vt in tēperamētū adaugeant. Atq; hæc de causis dixisse sit satis.

B Primo q̄tum distet temperamento, uel conueniat alter coniugum ab altero, diligenter nosse curabis. Sic calidū uiri uel mulieris temperamentū cognosces, quia calor in cute, & carnosō genere tactu facillē percipitur: & ob id huiusmodi corpora prōptē calsiunt, & refrigerant tardē. Rubor itē in cute adest, adipis inopia, pilorum copia, & capillorū nigrities. Verū si corpus calidius fuerit, hirsutius erit, siccius, durius, gracilius ac nigrius, & ad actiones nō leuē obtinebit prōptitudinē: adherit huic et uigilia, agilitas, iracundia, & reliqua, quæ methodo nostra scripsimus calorem attestari. Frigidū quidem corpus monstrant frigiditas tactu percepta, refrigeratio prompta, calfactio tardissima, cutis albicās, liuida, plumbea, pilorū nuditas, & glabrities, capillus et aureus remissus. Veruntamen si corpus frigidius fuerit, albū erit, molle, obesum & debile: qd si p̄dictis adiūgat actionū omniū tarditas, certius erit signū. Siccū corpus tale esse constabit, si durū sit, gracile, ægrē mobile, & facillē a siccantibus offensū. Sic profectō humidū erit carnosius, mollius, cui et erit læsio prōpta ab humectantibus, subditū fluxionibus, ac multū spuens. Præterea potissimā sterilitatis rōnē, cū antea ad pudenda uiri, & femine reducendā esse dixerim: ob id quidē q̄tum distent a mediā temperie utriusq; aut alterius partes perdiscere oportebit.

Viri

Signa
causarū

Viri itaque testes calidiores, ostendunt in venerem ab adolescentia propensio **A**
 cum subito penis rigore, ac subita etiā seminis excretionē: quod proculdubio
 semen foemina in vtero sentit calidius acrius, & mordax. Ipsi quoque testes cali-
 di ad tactum existunt, & persentiunt a calidis promptē offensam, & modico fri-
 gore gaudent. Item partes genitales proximae ad umbilicum, & femora celeri-
 mē pilis vestiuntur. Quod si calidiores simul, & sicciores sint, praeter dicta signa
 quoque crassius excernunt: si verò calidiores, & humidiores, venerem minū-
 s praedictis appetunt, & vsu eius minū lēduntur. Si verò multo calidiores sint,
 & humidiores, semen habent largius, sed partes genitales minū hirsuta: hanc
 quidem testium temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas se-
 quitur. His proculdubio omnino contraria signa existunt, dum testes frigidi
 sunt: quod si cum frigidityte humiditas quoque praesit, penis tarde aut rarō eri-
 gitur, venerem tardius exercere incipiunt, ac parum ea delectantur, semen itē
 tenue est, aquosum, & tardē in coitu excretum, ac frigidum a foemina sentitur,
 & infecundum existit, aut foeminas maximē generat. Partes etiā pudendae, &
 his vicinae aut glabrae sunt, vel pilos, eosque tenues, tardē emitunt. Id quoque atte-
 stantur arteriarum pulsus tardi, & vrina colore remissa: cuius sanē tei plura le- **B**
 ges cap. de virorum sterilitate.

Foeminae quidem vterū viro, ac eius testibus esse similē aut diuersum, vel ap-
 tum ad seminis virilis moderationem, cognoscere quoque oportet. Sic vterū cali-
 diorem praeter totius corporis adducta signa, pudendarum partium calor maxi-
 mē ostendit. Itē foeminae audacia, iracūdia, sitis inexplēta, ad omnia prōptitudo,
 pulsus celeritas, & vrina flaua, menses paucissimi, crassi, calidi, flauī, & ex adu-
 sione nigricantes, cum dolore, & morfu frequenter exulcerante prodeuntes,
 quibus ēt adest salacitas inexplēta, celeris excretio seminis, qd ēt calidius & ti-
 tilans ipsa percipit in exortu: pili in pectine, & cruribus citō nati, multi, crassi,
 flauī, nigri. Vterum insuper esse frigidiorē ostendit corpus reliquum, praeser-
 tim imae, & pudendae partes, angustia imi ventris, & stupor, menses ob crassi-
 tiem a frigore concretam suppressi, rari, tardi, crudi, albi, aut albicantes: interdū
 fluxiles, & aquosi a liquidiorē pituita, veneris odium, seminis pauci aut frigidi
 excretio tarda, & voluptatis expers: os vteri contractū, & spissum: pili in pube, **C**
 & cruribus tardi, rari, exiles, pallidi, aut albicantes. Qd si his humiditas accedat,
 corpus reliquum erit molle, & tactu frigidum: fluxus muliebris, aut saltē ppe-
 tua vteri humiditas, & in coitu maior, ita aut fiat molesta, & ingrata: vteri ēt fa-
 cultas retentrix ob humiditatem imbecilla, ita vt si concipiant, facilē abortiāt.

Verū si siccitas frigidityti adiungatur, menses aderūt pauci, tardi, & crassi,
 semen paucum, coitus appetentia, quam proximae maiori: collum uteri, & etiā
 os in coitu siccum, & ob siccitatem a frigidityte auctam rhagadijs obnoxium.
 At contrario prorsus modo omnia accidunt siccitate praualente, paucus etenim
 erit mensium fluxus, os siccum, labra scissa, coitum appetunt, velut terra sicea
 rorem, facilē irascitur foemina sic affecta, corpore tenuis est, & in actu venereo
 ferē nihil seminis excernit. Et his proculdubio signis deprehendes, qualis in-
 ter sit differentia inter virum, & foeminam, vt discas quemuis ad alterius naturā
 conferre. Reliqua verò, quae in vtroque disparitatem efficere habent, ut aetas,
 tempus & regio ac reliqua facilē citra alia signa tu ipse cognosces.

Cūm

A Cū coniugum alter alteri non conuenit, temperamenti ne totius, aut genitalium uicio sit, primò expendendum est. Ac si totius corporis intemperieri rōne dissidium sit, animo diligenter euolues, utra temperaturarū suapte natura à fecunditatis rōne distantior existat, q̄ protinus ad aliam comparabis, reduces, & moderabis alterius temperie adseruata, si quidem inculpator existit. Sic profectò cum fœmina vel uir, calidior biliosiorve altero extiterit, ita ut fecunditati officiat, tantum huiusmodi corpus temperandum est, q̄ tum ad mediocritatem vel paulò suprà reducendum sat sit. Id profectò facies tribus potissimum præsidij: victu nimirum frigido, & potu aquæ vel diluissimū vini, quibus sensim & paulatim, ac citra corporis alterationem ipsū immutari comperiemus: qđ pari lege subaudiendum est de alijs rebus non naturalibus. Secundò ijs medicamentis, quæ humorū calidorū excessum frenent, & attemperent. Huius census est sanguinis detractio bis ter uel in anno facta: ac ter aut quater expurgata fluabile infuso aliquo rhabarbari ex aqua lactis caprini vel aqua cichorii, manna vel casia fistulari exhibita, vel syrupo ex infusionibus violarū superbibito de cocto hordei: quibus superabundans succus euacuetur, tepescantq; quodammodo calida viscera. Vltimò in, corpus siue uiri siue fœminæ temperabis, intus quidā, decocto hordei cum saccharo, ptisana, fare, sero lactis, aqua cichorii, borraginis, & acetosæ cū saccharo, vel lacte caprino, aut asinino, atq; alijs cibarijs, omnino frigidis, dūmodo refrigeratio morbosum quid non pariat. Exteriùs uero idē facies inunctis renibus, & dorso unguento rosaceo, vel refrigeranti Gal, cum modico resumptiuo, vel unguento de cucurbita, aut de lenticula palustri cū butyro recenti vaccino. Præterea frequentibus aquæ dulcis balneis: q̄ tanq̄ peculiare, & proficiuū auxiliū summopere p̄bo. Tandē corpus omni arte refrigerabis, lentē in paulatim, & cautē, ne ultra id, q̄ par sit conueniat, refrigeres.

*Curatio
ratio.*

B Pari quoq; rōne si alter coniugum iusto frigidior extiterit ita, ut unus calor frigiditatem seminis alterius remittere, & cōtemperare nō possit: p̄dictis tribus auxilijs immoderantiā corrigere oportebit, donec ad eam temperiē corpus deuenisse constet, quæ fecunditati sufficiat. Sic primum victu calido, & sicco corpus sic affectum reficito, additis aromatis, & calidis speciebus, q̄ tum sat sit, ut frigiditatis excessus retūdatur. Vinum sic affectis largiri poteris, & maximē ex ijs vinorum generibus, quæ aut cocta, aut calidis rebus condita, corpus calfacere nata sint: cuius census est hippocras appellatum, vinum quidem aromatis conditum. Quod si uinum renuerint, uel id corpus non tulerit, aquā garyophyllis, cinnamomo, aniso, feniculo, & corticibus citri incoctā p̄beto. Cui usui maximū momenti esse probaui eā, q̄ radice chinæ, similace aspera, aut ligno guaiaco incoquitur, p̄serim si humiditatis p̄sit suspicio. Huiusmodi et corpora plurimum exsicari cōuenit, ne præter frigidam temperiem frigida quoq; excrementa superabundent. Cui usui perfricabis totum corpus summo manē linteis mollibus, donec cutis rubescat. Itē p̄parata pituita, ipsam pharmaco purgabis ter quater uel in anno: quo facto, dianisō, diacimino; aromatico rosaceo, uel diarrhodone cū uino albo uteris. Quem usum præstat inter reliqua pharmaca, theriaca cum uino supra summo manē, aut aqua theriacalis arte chimica extracta: Sed qđ maioris esse momenti in hac re scimus, est usus balnearū sulphureorū: dūmodo plurimum sudoris non alliciant, sed ea tū mora in eis facta, q̄ satis sit corpori calfaciendo,

do. Verum si cum frigiditate simul humiditatem quoque abundare comperiamus, copiosius eisdem balneis sudare oportebit, aut si maius, ex decocto ligni guaiaci, vel similacis asperæ: a quibus iterum oportet uti eis, quæ posse intus corpus calfacere, superius diximus; donec sensum, & paulatim, ac citra maximam alterationem corpus ad meliorem statum commutemus.

Partes verò genitales eadem lege, & reducendi ratione contemperabis: in viro quidem, ut c. de virorū sterilitate copiosè reperies: at in femina; si caliditate polleant prædictæ partes, balneis aquæ dulcis vteris, inunctionibus frigidis, & purgationibus bis in anno factis, maximè biliosorum humorum, & proba victus ratione, ac refrigerante exhibita. Præter quæ omnia, ea administrabis, quæ c. de vteri distemperie proficua esse diximus, & sequenti c. dicturi sumus: hac vna sola præmissa differentia in reductione vteri intemperati ad meliorem statum, quod dum natiuam ipsius temperiem ad mansuetiorem mutare nitimur, sensum paulatimque; & longo temporis tractu quamvis temperaturam moderatam oportebit: at verò cum intemperatus fuerit vterus, audacius ipsum corrigere, mutare aut temperare oportebit. Cuius operis superius auxilia adduximus, & ob id hac in parte subitico, solum recensens id præsidium, quod Hipp. lib. de steril. scripsit proficuum esse ijs, quibus semen prius decidit ob vteri laxitatem, & humiditatem: inquit. n. Si vteri genituram non contineant, plūbeū lapidem, quæ ferrū ad se rapit, leuiter terito, & in linteis alligato, quo in muliebri lacte tincto subductio utat.

Quod si exactè totius corporis vel genitalium partium temperiem ad necessariam reduceris, facile est seminis alterius vel viriusque vitium corrigere: nam semine abundare vel deficere rarè accidit, nisi totius corporis vel testium vitio. Quamobrem non oportet eadē hic repetere, præter quam quod sequenti ca. seminis vitia specialius corrigere studebo. Sed recensebo hac in parte præsidium ad semine augendum, & fecundum efficiendum, si non sunt mendaces priscorum libri: nam scriptum reperio in omnibus feminarū vitijs, & in hoc maximè prodesse hortensem saluam, si mulier plantam huius hemina cum modico sale quarto à secutu die potauerit, deinde viro post horæ quadrante sese commiscuerit. Hinc aut ferunt in Copro Aegypti post sevas pestilentias ab ijs, quæ superfuerunt ad eius succum bibendum coactas fuisse, plurimosque inde fetus produxisse.

Si tamen immatura ætas sterilitatem adduxerit, curatrices manus minime adhibebis, negotium omne ætatis mutationi committens. Interim tamen abstinentiam à venere imperabis, ne is, qui natus minor fuerit, coitu nimio impotens ita fiat, ut fecundum semen deinceps efficere minime possit. Feminas verò leniores nullo auxilio fecundas efficies, præsertim si menstrua præ senio defecerint: viri quidem senes generare possunt, cæterum non ita facile, quorum curationem c. de virorum sterilitate docebo. Interea verò expendat Medicus calidis, & aromaticis, ac vino præcipue cocto, aut aromate aliquo condito eorum semen calfaciendum, coquendumque; esse: quod item facies, si coitum præceperis ex longis intervallis, idque maxime femina eum avidissime amplexante, ac desiderante.

Quod si ex inordinato coitu sterilitatem proficisci cognoveris, ab huiusmodi immoderantia coniuges abstinere imperabis.

Obesos aut coniuges omni arte macrefacies, victu nimirum tenui, exsiccate, aut rebus siccis condito frequenti exercitio, ac labore, potu partiori ex aqua similacis asperæ,

A asperę, anisi, cinnamomi vel alterius rei calidę, & sic: frictionibus item fortioribus summo manę, & per vniuersum corpus factis. Sudore proculdubio corpus conterit bblumiturq; pinguedo, potissimum ex decocto ligni guaiaci, vel radicis chinę, aut similacis asperę: item confert frequentissimus vsus syrupi ex decocto radicis chinę cum multo aniso. Sed efficacius est auxilium balneum ex aqua sulphurea, quo certum est corporis pinguedinem conterı, & euanescere. Utantur et aniso leuiter torrefacto ante prandiũ, & cenã, vel tabellis ex aniso, cimino, & cinnamomo, amygdalis testis, aromatico rosato cum vino, & alijs, quibus insit efficacia exsiccandi, & humiditates ebibedi. In hac tamen curatione hanc methodũ scripsit Hip. li. de natu. mul. Hanc attenuare oportet, & pharmacum infra purgans bibendũ dare, & ad vteros apponere q̃ purgent ipsos, & flatus inducat. Quam sanę curationem, licet primò accessũ videatur difficilis, sũmo esse habendam preiõ existimo: nam extenuare corpus antea non poteris, q̃ dum crebrius corpus, & vterum purges: qua purgatione, omnem humoris diffusionem, & exsiccationem intelligendam esse arbitror. Neque contēnendũ est verbum illud (& flatus inducat) nam proficua esse uterõ remedia ea credendum est, quę quodammodo uterum dilatent, distendant, & compressos pre pinguedine, & omento meatũs patentiores reddant: quod proculdubio existimo fieri p ea, q̃ flatus inducunt, quippe qui partē, ubi præsunt, distendere sunt nati. Quod si ex alijs causis, quas antea diximus, aliquam præsente cognoueris velut est Aeris aut regionis inclementia, abstinentia, & inedia, potus aquę, animi affectio, & aliud his simile: malo ocysimē subuenies facta in contrarium mutatione: ita vt omnino corpus ad contrarium statum ei, qui sterilitatem inducebat, mutationem sensim, & paulatim factam subeat.

De sterilitate morbosa. Cap. 3.

INTER fęminas, plurimas proculdubio reperies steriles quidem, non tamen ex propria conditione: & natua sorte, neq; p collationē ad virum, cui coniunguntur: sed ex morbosa aliqua cā, q̃ ita fęminam ipsam, & generationi dicatas partes disponit, & afficit, vt etiã si cuius viro quantumcunque fecundissimo adhæreat, concipere minimē possit; donec affectum abstuleris. Quod profectò Arist. lib. 2. de gener. anim. ca. 5. scripsisse his verbis constat. Nam, & a primo ortu naturę locis ad coitum cõmodis oblaſis steriles, & mulieres, & viri redduntur. Qua snĩa de natua sterilitate videtur loquutus fuisse. Verum subdit eodē loco. Alijs in processu ætatis idem accidit affectus, aut pp corporis nutritionem, aut ex morbo viris humidum frigidumq; emittitur semen: mulieribus purgationes vitiantur. Quę uitia, & eorum cās expendisse oportebit, vt cuiq; peculiare auxilium adhibere possimus.

Causas igitur omnes quatuor numero, ac genere esse diligenti obseruatione & multorũ autorũ lectione cõperimus. Prima quidem se complectitur oēs cās externas, quę prauē afficientes instrumenta conceptioni seruiencia, omnino fecunditatem auferunt. Secda corporis uniuersi, & uteri uitia continet, q̃ uaria admodũ sunt, & huic malo efficiendo efficacissima. Tertia seminis fęminei defectũ cõplectit, quo frequēssimē fecũditas ipedit. Quarta verò, et ultima ad sãguinis

men-

mēstrui depravatam fluendi naturam, & rationem refertur. Quæ sanè vitia nisi primò ratione, & methodo corregeris, non solum nihil incuratione proderis, verum obesse sēpissimè comperies: ob id cuiusq; causarū generis seorsum meminisse oportebit, & cuiq; propria signa, & curandi viam, ac materiam scribere, initio sumpto ab externis causis.

Causa externa.

Inter causas, quæ fœminæ alicui occurrere possunt, inferreque concipiendi impotentiam, eæ potissimæ sunt, quæ vel ad qualitates reducuntur manifestas, vel ad occultas. Qualitates quidem manifestas, ad tempus, ad regionem, vel ad medicamentum optimè reduces. Quippe frigidissimum tempus, frigidissimam regionem aut callidissimam nulli est dubium excadentem posse in vtero distemperiem efficere, quæ deinceps sterilitatem inferre nata sit. Sic profectò medicamenta non pauca ob excedentem qualitatem, vtero imposita sterilitatem inducunt, velut ruta, vinum dulce, & pleraque medicamenta calida citra indigentiam adhibita: pari etiam pensu ob frigiditatem camphora vel nenufaris flos idem malum præstant. Item quæ plurimum vteri os emolliunt, vt altheæ radix, aut quæ plurimum indurant, vt omne terræ genus, vel quæ nimis os vteri aperit, vt abrotanum, aut inspissant, & refrigerant, vt sempuiuū, & cicuta uel adurunt, ut calx, vel putrefaciunt, vt auri pigmentum, vel attrahunt, vt pulegium, aut mordent, & irritant, vt acetum, sinapis, & urtica: hæc enim sterilitatem quoque inferunt. Quorum omnium notitiam ex relatione facillè consequeris. Sic curationem his omnibus præscribes, vel mutata regione in statum celi omnino fœminæ contrarium, vel plurimum similem, qui eius temperamentum versus aliquod extremorum adaugeat: vel adhibitis medicamentis ijs, quæ sterilitatē posse inducere diximus omnino contrarijs. Quæ sanè ob id silentio prætereo, quia facillima sunt, & plerunque sua sponte curantur.

Causa occulta.

Sunt equidem haud pauca (præter diuinam uoluntatem) quæ occulta quadam, & peculiari proprietate citra euidentem qualitatem, sterilitatem inducunt: vel ut est sterilis aliquis astrorum aspectus, qui fœminam in exortu aspexit, in fecundamq; ob occultum aliquem influxum efficit. Maleficia item, & incantationes, quibus sacrilegi quidam histriones, homines fœminasve (ut ferunt) magicis incantationibus ligant. Præterea ueneni assumptio, quo menibru aliquod princeps perdi contingat. Item turpis aliquis aspectus, uel odium inter virum, & fœminam, aut desiderium nimis ardens. Præterea reperies nō pauca medicamenta, quæ suapte natura aut superstitione aliqua adiuncta, sterilitatem quoque afferunt: quorum profectò hac in parte melioris gratia meminisse non placet, ne quis imprudenter audacterve; & citra Dei optimi maximiq; timorem, eis unquam utatur.

Prædictarum causarū signa, & curatio.

Nosces ex peculiari celi influxu sterilitatem proficisci ex priuatione aliarū cārū, q̄ euidenter ipsam inducunt, maximè si natalitia eiusdem fœminæ expēderis, ac repereris, natam fuisse sub signo aliquo sicco frigido, & sterili. Cui profectò medeberis, si concubitu iusseris prædominante astro fecundo, & prædicto contrario nā id tps, in quo Luna uiget in signo fœminino, ac prolifico fœminis sic affectis, fecundum existit. Præter q̄ quoddam alimentis, & contrario uitæ instituto natuam illam siccitatem, & sterilitatem compescere quoq; tentandum est. Dignosces præterea regionē, & celi statum, peculiarem fecunditatē influere, eò q̄ steri-

A sterilitas eo tpe, eà regione plerisq; sceminis cōis existit, vel ipsa scēmina in alia regione scēcunda erat. Cuius medela erit regionis mutatio, uel vsus eorum medicamentorum, quæ ex toto sint contraria regionis temperamento, qualia ex ante dictis & ijs, quæ inferiùs referam, facillè colliges. Venenum quidē scēminam sumpsisse, licet facilliter perpendi nō possit, cum hoc tñ consequeris ex ijs accidentibus, quæ præcessisse tibi relatum fuerit, & ex præsentī alicuius principis mēbri vitio: quippe in hmōi semp aliqd accidens superest graue & alienum a communibus, ita vt facta cōiectura, venari possis ex venenosa aliqua substantia, uel qualitate reliquum fuisse. Cui, si veneni naturam assequaris, auxiliū prestabis per ea alexipharmaca, q̄ è directo ipsi respondere possint, sin aliter, per cōmunia; tandem ea peculiariter adhibebis medicamēta, q̄ aduersa sint ei qualitati, quā in corpore reliquisse venenum cognoueris. Dilectionem verò maximā aut odium, nimiamve in venereis delectationem aut appetitiā, uel deiectā sensibilitatem ex relatione facile perdisces. Quibus medeeris, dum odio se habent, per ea, quæ venerem excitent, sicut ijs, quæ deiectam habent veneris appetitiā, quorum auxiliorum siluam pauld̄ inferiùs hoc cap. reperies. Ijs verò, quæ nimia delectatione amplexantur, per ea, quæ calorem genitalium partium refrigerare, saltem moderari habeant, qualia etiam hac in parte scribam.

Ceterum steriles ex maleficio cognosces ex priuatione signorum aliarū causarū, ex præcedente aliqua occasione suspicandi maleficiū aliquod p̄cessisse: & eò q̄ coniuges se adinuicem diligentes, coire tñ nequeunt: aut cum antea amore mutuo afficerentur, nunc verò citra euidentē cām odio se habent in credibili. Quod sanè multis modis contingere posse scriptum reperio libr. appellato malleus maleficarū. Primo quidem, si uir priuetur generatiua potentia cū propria vxore, cum alijs tñ vim obtineat & efficaciam. Item secundò, cum vxorem hēt exosam, nec pōt ipsam cognoscere. Præterea tertid̄, si non habeat exosam, veluti tñ agnoscere, ceterum membri vigore careat. Quartò, etiam si vigorem habeat membri, cum hoc tñ non hēt excissionem seminis. Quorum oīum curandi rō sanctæ ecclesiæ & sacerdotibus omnino committenda est: nam cum ut plurimum ad maleficiū quoduis diabolica vis concurrat, ob id quidem sanctitum est in sacrosancta Romana Ecclesia exorcismis huic rei peculiariter dicatis vtē dum esse. Quibus æquū est profectò per peccatorū confessionem & penitentiā subuenire: sic quidem ieiuniū, elemosyna, continuæ orationes & sacrificia accedāt protinus oportet: q̄ proculdubio, existimo potiora esse p̄sidia. Quamobrē ab alijs, quæ suspicionē & superstitione non carent, super sedendum esse firmiter arbitror. Verum si qualitas aliqua manifesta in maleficijs apparuerit, pharmacis aduersus eam operatibus tutò & utiliter uti poteris: qualia verò sint, mox plura referā, si prius dixerō dictum esse uiris doctis abrotanum oleo illitum, & uino sumptum, frigidis ex maleficio non parū prodesse: reliquis uerò opitulat̄ radix asparagi cum uino dulci decocta cōmanducataq; ; sicut & hortense aliū, uel satireia, aut ocymum hortense, & cardus quoq; hortensis uino generoso præmaceratus. Atqui si ex ui & efficacia alicuius medicamenti uel alterius rei ex oculta proprietate operantis sterilitatē proficisci cognoueris, facta diligētī interrogatione qbus nā fuerit usa medicamētis, uel alijs rebus mulier, ex relatione, disces, cui sit reiicienda sterilitatis culpa. Sunt. n. plurima, quæ sterilitatem in-

Y ferunt,

ferunt, q̄ subtere hac in parte studui, ne quis prece vel pretio seductus, eis pra
 uē vtatur: sat. n. est nosse plurima alia esse, q̄ inductam ab his sterilitatem aufe-
 runt: qualia mox referā, si prius dixerō hanc esse vtendi legem & rōnē, nepe, si
 ex medicamēto uel alimēto supererit in corpore qualitas aliqua euidēs ex eis,
 quas hic referā, id liges, qd̄ aduersus illā qualitātē pugnare natū sit. Verū si ci-
 tra introductionem manifesta qualitatis, sterilitatem p̄stiterit, id tñ possit. Habeant equi-
 debis auxilium, qd̄ nulla qualitate euidente polleat, id tñ possit. Habeant equi-
 de experimenta hæc, præterquam q̄ primò & per se his occultis causis aduer-
 sentur, ut euidentibus qualitatibus non noceant, potissimū seruata qualitatum
 cōtrarietate. Quapp cordatus Medicus hæc expendat suspiciatque, vt sibi cōpa-
 ret materiā cuique causa proficua, & propriam, ac multis quoque cōmunē.
 Primū sanē experimētū est si fœmina inūgat pudēdū succo satyrionis sparso
 puluere leporis cōbusti: idē p̄stat suffumigiū ex trochiscis myrrha, styracis liq-
 da, galbani & baccarū lauri. Ex vsu ēt est, fœminā testes gallorum comedere, &
 vterum balsamo inungere: pastinaca quoq; siluestris idem præstat comesta, vel
 semen eius in potu duorū mensium spatio. Confert theriacā vsus ijs, q̄ ex frigi-
 ditate non concipiunt: quibus ēt prodest uinum Hippocras appellatum: semen
 feseleos confectum, aut ficus arida cū folijs abieris: genitale arietis, uel tauri co-
 ctum & comestum: testes cerui in puluere redacti: semen vrticæ. Præterea potus
 lactis vacinni: oua perdicis: simus accipitris cū mulsā: limatura eboris tribus die-
 bus exhibita cum eadē mulsā: sanguis leporis cum eius coagulo, & puluis artemi-
 siæ. Prodest & potus ex g. x. diamusci cū uino calido, in quo bullierit rasura
 eboris, & cornu capræ, sic & vinū ex floribus roris marini factū. Abluere item
 partes pudēdas cū aqua melissæ, ex vsu esse fert: sicut suffumigiū ex lilio in for-
 ma polētē cū thure mixto, uel factum ex limatura cornu capræ cū oleo de spi-
 ca: cui vsui aliquādo prodesse scimus puluerem baccarū lauri, vel ex asphalto,
 fimo leporis, ruta sicca, & melle, aut factū suffumigio ex ligno aloes, uel addita
 eboris rasura, aut puluere uteri suis. Pessariū itē eundē usum multi p̄stare dicūt
 ex mētha sicca, myrrha & cera, uel limacibus cū croco, aut ex coagulo & stercō
 re leporis cū melle: ex felle itē taurino & adipe aut butyro, uel ex felle caprino
 cū oleo rosaceo & cumino. A coitu ēt cōferre fertur pudēdū obturare pessario
 ex lana confecto & succo myrti madido: & eundē rōne nascalc factum ex croci,
 spicæ, pinguedinis gallinæ, gummi, olei de spica, singulorum partibus æquali-
 bus cū cera. Itē quatuor horis ante coitū teneat aliud pessariū ex croco, myrrha,
 spica, sepo, galia, terebinthina, mastiche, & oleo de spica cum pinguedine galli-
 næ, & lana confectum. Præstat idem beneficium pessarium ex satyrione cū mel-
 le, uel stercore uulpis cū oleo rosaceo & lana, aut succus mercurialis cū lana:
 itē aliud factū ex oleo de ben, de bdellio, & balsamo, uel aliud ex nucē cupres-
 si, baccis lauri, gallia, amomo, & cera, aut ex oleo de bdellio, & melle: aliud itē
 ex medulle cerui, hyssopi uiridis, butyri, sepe capræ, styracis liqda, meliloti an.
 3. vj. olei de spica. 3. j. galliæ, mastichis, spicæ an. 3. j. cū oleo rosaceo fiat pessariū.
 Confert, & aliud confectū ex scœnugrēco cū adipe anatis, uel ex musco dissolu-
 to oleo rosaceo, aut ex trifera magna cū succo artemisiæ, uel ex eiusdē artemi-
 siæ succo cum myrrha. Sumere quoque per os theriacam cum limatura eboris,
 conferre maximē plures ex autoribus profitentur: sicut electarium, ex flore
 roris

Aroris marini, & potissimum ex flore stœchados cum melle, aut electariũ de pudẽdo tauri cum mentha & melle factũ. Puluis et̃ prodesse fertur testiculorum, cerui visco quercino addito factus, sicut puluis ex artemisia cũ saccharo summo manẽ sumptus, postea factũ suffumigio ex calamintha. Præterea coagulũ leporis comestũ, vel uterum eiusdẽ assatũ, & comestum plurimum, pdesse scriptum reperimus: itẽ a purgatione sumat fœmina duo ova sorbilia nepeta plena, cum modico vino, ac postmodum cum viro coeat. Utatur et̃ balneis ex decocto spiræ, florũ chamæmeli, meliloti, polij, seseleos: postea suffumigium susceper ex opopanaco cum balsamo. Profunt intra vterum immisæ pillulæ filo appensæ, confectæ ex gentiana, croco, & folijs myrti tritis cum pilis arietis, & oleo sesamino formatis. Itẽ subijcere oportet pessarium ex lana, & testiculis uulpis, ac felle galli, quo factũ fœmina bibat limaturæ eboris cũ uino. 3. f. Præter quæ oia & alia, quæ consulto prætereo, refert Plin. (si uerum est) sterilitatem mulierum emendare hyænẽ oculum glycyrrhiza, & anetho sumptum in cibo. Sunt q̃ florem crategoni bibentes mulieres, intra quadragelimũ diem concipere, tradant. Quibus itaq; omnibus uti poteris facta prius hac consideratione, q̃ ea, eis q̃ nullam habuerint euidentem qualitatem, quæ sit causa sterilitatis adhibeas, quæ uerò aliqua pollent, ijs tantum, quæ illi è contrario respondeant.

Causas quidẽ ad quas potissimum referri sterilitatem apud uiros doctos, & cordatos conspiciamus, uel corpus est uniuersum, aliquo morboſo affectu deiectum, cuius in hac parte meminisse non est in animo, sed ipsum ad proprium cuiusq; mali caput relegare, uel uterus ipse aliq̃ officina, & receptaculũ genituræ, uel seminis quidẽ alterius, uel utriusq; uitium aliquod, aut sanguis mēstruus certa quadam ratione uitiatuſ: in quorum expositione, & medella ab uteri uitijs initium sumam. Si prius de nimia obesitate, & gracilitate aliquid dixerõ.

Obesitas quidẽ multis modis, & uiris, & fœminis infœcunda existit. Primò, quia & feminis, & adipis eadẽ est materia: nõ quidẽ ut multi arbitrantur, q̃ frigida sint obesorũ corpora: hinc. n. fit, ut salatiores ueneriq; nimium indulgentis exsuccati, & graciles uideantur. Idẽ probat quoq; castratio, q̃ in animalib⁹, ut pinguescant, molimur: dum. n. testes & uenis aurire desinunt pingue tenue & aeream substantiã, tota in adipẽ conuertitur: q̃ sanẽ ex nimio coitu facile euanescit. Præterea in uiris obesitas breuiorem efficit penẽ, & ob id eos steriles reddit: in mulieribus uerò omentũ crassius conceptionis spem adimit, ut mox scribã, & ex Scitharum fœminis Hip. lib. de locis aq. & aere, refert: Nimia item pinguedo mulierũ fœcunditatẽ obest, q̃a multus in ea gignenda sanguis absu- mit, ita ut qd̃ superest, alendo fœtui non sufficiat. Præterea q̃ obese sunt lunares purgationes minutissimas habent: quod Scithis uitio uerterat Hip. & q̃a ociosam uitã degebant, nimium esse steriles dixerat: ancillasq; earum, q̃ uirã agebant laboriosam, fœcundas. Quibus rationibus addi põt, huiusmodi fœminas carnosum, & pingue adeo uterum obtinere, ut iustum spatium in locellis fœtui continendo, non relinquatur: p̃terea uenter prominentior sterilem utrunq; facit. Inquit. n. Actius tetra. 4. ser. 4. c. 26. Hoc uelut maximum negligendum non est, nec uſtri, nec mulier pinguem habitũ acquirant: tales enim inepti sunt ad pueros gignendos. nam nec pudenda inter se adaptare possunt, & uiri parum seminis emittunt, & mulieribus pauci menses feruntur, cum maxima alimenti pars

Causa interna.

in pinguedinem transeat. Quæ vitia sanè vitaberis, si vtrunq; macrefeceris: **A**

Vterus quidè sterilis efficitur, vel subuersa natua temperie qua mille cōgregat excrementa, ac flatus, quibus semen nō raro propellitur: vel subuerso appetitu, ira, vel nihil appetat, aut nimio appetitu excādescat: tertio mutata propria figura, vel laxiori constrictiorive facta: vltimò sterilis fit mutatio peculiari, & natuo situ. Dimitto quoq; hac in parte vlcera, & cætera, q̄ ad chirurgi officinā ptinent, quorū lib. p̄ce. meminimus, & alia q̄ viri accessum dolorosum efficiūt: nā & id quoq; sterile est, vt refert Hip. li. 5. pop. in histor. famule disiridis. Quod verò fœminis frequentissimè accidere cōspicimus, p̄culdubio est vteri intēperamentum, quemadmodū ab Hip. & Gal. scriptum reperimus 5. aphor. 62. Quippe referunt benè tēperatos vteros ad cōceptionem esse idoneos: malè autē tēperatos, si parum à bonitate recedunt, difficulter concipere: si verò nimium, mulieres steriles fieri, & ob id eas esse fœcundas sine ambabus bonis temperaturis est impossibile. Inquit. n. Gal. in com. Appello autē bonas temperaturas, mediocres, s. tum ex calidi, & frigidi, tum ex humidi, & sicci cōmixtione: cū fieri possit, vt secundum vnā oppositionem benè temperatus sit vterus, secundum alterā verò malè. Quapropter censeo Hip. dixisse: Quæcunq; vtero ex vtriusq; mediocrē hñt temperaturam, eæ fœcundæ sunt. Quā quoq; sniam adduxerat idem Hip. lib. de nat. hum. per hæc verba: Si non calidum, ac frigidum, siccum, & humidum moderatè, ac æqualiter inter se haberent, sed alterum multum præcelleret, & validus debiliori præstaret, non posset fieri generatio. Verum inter prædictas intēperantias, quæ ad calidum, & humidum inclinant, successu temporis haud difficulter corrigi possunt: quæ verò ad siccum, & frigidum nequaquam, sed post iuuentam fiunt deteriores ni maxima diligentia corregeris. **B**

*Calidi
vteri si-
gna &
curatio.*

Excandescit frequenter vterus præ nimio calore, quo geniturā cōterit, & cōsumit, vt Hippo. scripsit 5. apho. 59. In quo sanè affectu aliqñ solus elucet calor plerunq; verò adiunctis flaua bile, & alijs ichoribus, ac succis calidis, quibus nō solū calore, & sterilitate efficit, verū & alijs subinde malis, quorū abundè superius meminimus. Dignosces vtranq; intemperie simplicē quidè, & cū humore adiunctā ex corporis squalore, ac ex mensium paucitate cum dolore p̄deuntū ita vt pudēda mulieris exulcerent: sed q̄ proderint nigra sunt, & ob nimiam mordacitatem nullum ordinē seruāt. Sequitur et hanc intemperiem insignis salacitas, & totius corporis siccitas; quò fit, vt semini suscepto accidat id quod semini bus terræ cōmissis sub cane, & feruido Sole: quippe hæc nō solū alimenti defectu, sed & æstiuo calore, & nimia siccitate contabescunt. Cui intēperamēto subueniendum est, non tm̄ ut sterilitatem arceamus, sed vt maiora mala, q̄ accidere solent, p̄pediantur. Sic instituta ea victus rōne, q̄ vim refrigerandi sanguinē, & vniuersum corpus, nata sit, & pari pensu in reliquarū rerū non naturalium administratione diligenter rimari oportet, an subsit biliosi mordacisve succi aliquid: qđ p̄culdubio Hip. docuisse cognoscere li. de nat. mu. apertè cōstat, dicentē: Si mulierē parere nō potentē purgare velis, & fuerit biliosa, aut pituitosa, cognosces aut vtrum horū sit, si arena subtrahā cū menses fuerint in Sole sanguinē supra fundas, ac siccari sinas: si. n. biliosa fuerit, supra arenā sanguis pallidus erit, si verò pituitosa velut mucus erit. Cui fœmina, si id iā cōpereris, ante oē auxiliū, p̄uidendæ est sanguinē mittere ex basilica lateris dextri, vel ex eiusdē lateris **C**

- A**teris manus saluatella, vel (q. maioris censo esse momenti) ex talo semel aut bis. Qd si feceris omni arte postmodum humoris calore, & acrimoniā reuiderē oportebit apozematis, & syrupis frigidis ac humidis, velut est syrupus granatorū, butyrosi, cichorii, & borraginis, addito, si uterus nō renuerit, oxilaccari modico cum aquis butyrosi, acetosi, borraginis aut portulacae. Quibus & alijs, quos ex succis granatorū, aqua hordei, & saccharo, vel ex succis predictarū herbarū clarificatis cum aqua portulacae, & saccharo conficere poteris, aliquid gusti gratū & aromaticū addens, velut est santhalarū, rosarū, aut diamusci momentum. Probatē plerisque, & merito, syrupus, q. excipit foliorū butyrosi, borraginis, & rosarū rubearū ana m. j. violarū, lactucae, foliorū papaueris albi, intibi, scariolae ana m. f. seminis intibi & scariolae ana ʒ. f. quatuor seminum frigidiorū maiorū ana ʒ. vj. fiat decoctio fm artē, q. collo traiecta suscipiat sacchari li. 2. aceti albi ʒ. j. vini granatorū lib. f. lēto igne fiat syrupus, q. gustui gratus efficiat addito santhalarū modico. Quibus dū pparatū cognoueris flauū bilē, primò corpus purgabis ex māna, cassia fistula, aut syrupo solutiuo rosarū, vel violarū cum decocto adithi, florū butyrosi, violarū, prunorū, & tamarindorū, vel cum aqua cucurbitae. A quibus vel facta vna purgatione, porriges cōfectionē amech sine scāmonio, & colocintide, sero lactis vel aqua stillatitia ex hordeo, & portulaca dissolutā, pōdere ʒ. j. aut ex ipsa cōfectione cum modico rhabbaro cōficies bolos cum saccharo, vel porriges rhabbari infusum in aqua lactis, butyrosi, borraginis, aut cichorii ʒ. j. & f. cum ʒ. iij. syrupi violarū ex infusionibus. Itē paulatinis vteris purgationibus ex aqua cucurbitae aut hordei stillatitia, & rhabbaro. Maiora n. in his adhibere medicamēta verēdū est: rob id tutius existimaui prae dicta repetere, quā grauiora adhibere. Purgata flaua bile, puidēdū est deinceps calido intemperamento: primò balneis aquae dulcis frequentioribus vel infusionibus ac fomentis vterro adhibitis, q. recipiāt maluae vtriusq. cum radicibus manip. iij. florū violarū, salicis, rosarū, ac nymphaeae ana m. ij. foliorū vitis, & malorū cotoneorū, & vlmī ana p. j. foenugraeci li. f. facto decocto, infideat mulier ieiuna pcanens ne sudet. Itē ex eodē decocto pudendū abluēs, uel ex predictis herbis sacculū cōficies: quo facto cubitum ad eat, & antea sumat sequentis medicamēti aliquid. Excipe fragmentum santhalarum ʒ. ij. ramenti eboris, visci quercini, pudendi tauri, vuluae leporis ana ʒ. j. & f. sacchari candidissimi lib. f. saccharū aqua rosacea, aut hordei liquet, & forment quadre pondere ij. ʒ. Diebus ē alternatim interpositis, loco praedicti auxiliij sumat mulier aliud pretiosius, quod recipit conseruae rosarum ʒ. j. conseruae florū nymphaeae, & florū vtriusq. butyrosi ana ʒ. iij. pulueris triū santhalarum, electarij, de geminis & diamargaritonis frigidi ana ʒ. j. seminis mercurialis ʒ. iij. ramenti eboris, visci quercini, pudēdi tauri, & matricis leporis ana ʒ. ij. misce, & facta cōfectione cum syrupo adithi pbetō coeleare vnum ante pradium a balneo, & tantundē ante cenam. Poteris quoq. feminam suffire pastillis, qui conficiuntur hac lege: Recipe oīum santhalarum ana ʒ. f. rosarū rubearum, florū nymphaeae, & violarū ana ʒ. ij. styracis ʒ. j. ambræ g. x. terantur, & rosacea excepta redigantur in pastillos. Vtilissimum pari pensu erit, feminae dorsum inungere olēo rosarum, nenufaris, & violarum, aut vnguento rosaceo, de cucurbitis, refrigeranti, vel resumptiuo: quibus bolus armeni aliquid addere poteris, uel calidi alicuius medicamēti, ut id, quod dorso aut venter adhibueris,

hibueris, impensè frigidū non sit: sat. n. est uel tēperatum esse, uel parum à me-
 diocritate recedens, ut optimè consuluisset Aetium cōstat. Ad pubē verò, & imū
 ventrem ac lumbos refrigerantia eadē adhibeto: quibus addēs solani, aut um-
 bilici ueneris succi modicum, aut lactucæ oleo rosaceo admixto, ubi ingēs fue-
 rit caliditas. Cui vsui hoc mō appositisimum parabis medicamentum: excipe
 foliorum atriplicis, portulacæ, & lactucæ p. ij. coque, & pista, ac adde olei rosa-
 rum, violarum, & citoniorū ana. ʒ. j. farina ordēi p. j. cū modica hordei aqua fiat
 emplastrū. Vteri osculo pessarlū et appones, qđ recipit medullæ cruris uituli,
 cerui cerebri, butyri vaccini, adipis caprarum, seminis mercurialis ana. ʒ. f. aca-
 ciæ, hypocistidos, santhalorum rubeorum, cornu cerui vsti ana. ʒ. ij. oleo rosa-
 ceo, & lana in pesslos excipe. Præterea in pudendum dū ingues fuerit caliditas
 optimè infunditur aqua hordei, aqua portulacæ, & cucurbitulæ, & umbilici,
 veneris cum modico rosaceo; quē quoq; usum præstat lac caprilum. Refertitē
 Aetius, mercurialem, vtero pectini, & dorso impositam prodesse, & argenti spu-
 mam ac cerusam cum aqua tritam. Quorum tamen omnium frigiditatem me-
 titi, & attemperare oportebit, quantum natura, & uterus fœminæ permiserint.

*Frigidi
uteri si-
gna, &
curatio.*

Inter oēs morbosæ sterilitatis causas, frigiditatem vulgatissimā, & communis-
 simam esse censemus: cui pfectō ob id paulō diligentius prouidendum est. In-
 quit. n. Hip. 5. Aph. 59. Quacūq; frigidos, & spissos uteros habent, nō conci-
 piunt, quæquidē parte arbitror Hipi. nō quacūq; vteri frigiditatem sterilem
 esse intellexisse, sed eā solum, q̄ tanta sit, vt spissum reddat vterū; quā sanē intel-
 ligentiam rōni, & Gal. consonam esse constat, maxime cum apertum sit quinq;
 assignasse modos, quibus frigiditas sterilem reddit uterum. Primus qđ est, cū
 frigiditas per se extinguit seminis innatū calorem: secundus, cū tm̄ uterus à fri-
 giditate cogitur comprimatur, ut semen recipere nō possit: tertius, cū venarū
 ora occludit, ita vt sanguis nō possit in vterum instillari, ad fœtus alimōniam;
 quartus verò, cū sanguinem efficit aqueū, & nutritioni, aut solidorū vel car-
 nis cōpactioni ineptum: quintus, cū tantam vterus ob frigidū tēperamētū ge-
 nerat pituitam, q̄ humidior, mollior, & generationi ac seminis compressioni in-
 eptior fiat. Quapp censendum est minus has fœminas menstruo sanguine pur-
 gari. Sed constare iā ex his arbitror, eā frigiditatem sterilem esse, q̄ (vt dictum est)

C

spissum reddat vterum, siue in propria substantia, siue ob humorū crassorum, &
 frigidorum copiam. Cognouisse tm̄ ac distinxisse adamussim hos frigiditas operā-
 di modos oportet, ut p cuiusq; effectu, & natura calfacientia quoque adhiberi
 possint: ne si frigiditas unū predictorū uitiorū inferat, alteri remedia adhibea-
 mus, decepti sola frigiditas specie. Nā vterū cuiusq; affectus p̄sidiū nō solū cām
 respicere tenent, sed & modum operādi ipsius causæ, ut par in mō operādi, &
 qualitate id adhibeamus. Docet itaq; Hip. frigidū intēperamētū nosse lib. 2. de
 mor. mul. per hæc uerba; Quū verò perfrigerat uterus, & onus insitū esse ui-
 det, & color nō est clarus, & compactus est vterus. Verū specialius cogno-
 sces ex mensibus suppressis, qui in cōmodē ferunt ob nimiam crassitiem: acce-
 dit et stupidus sensus circa pectinē, lumbos, & cruras: quibusdā itē crurū impo-
 tentia accidit, ac si prorsus perfrigeratē fuerint, quas venerem minimè appetē-
 re; & vteri osculū contractū habere, certum est. Affectum tamen frigidum esse
 cognosces, qā semen extingui percipies, quōd uir in coitu pudendū sentiat fri-
 gidum,

Agidium, & femina non percipiat semen suscepisse. Venarum oscula claudi constat ex mensium suppressione uel paucitate, quorum sanguis aquosus existit, & decolor, ac debitum tempus antevertens: mucosum esse dignoscas, quod sanguis crassius sit subalbidus, & mucosus.

Quibus cognitis, talem opus est instituere medendi rationem, quæ non solum calfaciendi vires habeat, sed quæ cuiq; etiã agendi modo respondeat, contrarieturq;. Nam dum semen extinguere cognoscimus, quæ caliditate polleant, ipsamq; frigiditatem compescant, citra aliã operationem adhibenda sunt, donec innata uteri caliditas sopita, & veluti extincta ad nativum redeat temperamentum. Dum verò frigiditas præ uteri conclusionem semen non admittit, non solum quæ calfaciunt adhibenda sunt, sed quæ dilatare, & aperire partes possunt, quæ aliæ esse credimus vaporosa omnia. Sic dum venarum ora concludi sentimus, eadem sed lentius, & diutius adhibere oportet. Caterum si frigiditas sanguinem aquosum pariat, calida reficcantia, & euacuantia proficua sunt: dum uerò pituitosum, & crassum calida, quæ attenuent, abstergant, & repurgent. Quæ omnia

B si exactè animadvertas, nil mirum si sæpius quam alijs prosperè successisse rem comperias. At quia plerumque huiusmodi frigiditatem sibi comitem habere parvam frigidi humoris copiam scimus: ob id ante omne opus frigidos, crudos, pituitosos, & aquosos succos, non tantum uictu exsiccante, & calido, verum, & medicamentis munere necessum erit. Primum itaq; cibarijs omnibus admiscebis quæ alim citare possunt calida & acria, ut fœniculum, anisum, gnidium, apium, smyrnium, cistichium, & alia consimiles vires habentia. Potus et probatissimus est aqua decoctionis simlacis asperæ, radices chinæ, gariophyllorum, cinnamomi aut anisi. Deinceps verò lentè, & paulatim prædictos humores præparate curabis melle rosaceo syrupo de mentha, de absinthio, de radicibus, & borragine cum modico oximelite, addito decocto rubæ maioris, radicis brusci, asparagi, graminis, nepetæ, gallitrici, samplici, origani, calaminthæ, pulegi, cum seminibus calidis, & modico sabinæ, & ex eisdem facto interim syrupo. Tandem omni arte curabis pituitosum humorem euacuare ijs, quæ in millies iam diximus. Scias tamen interim id fieri posse agarico, syrupo ex infusionibus rosarum, cartamo, electario indo, catholico, pilulis mastichinis, alephanginis, & ijs similibus. Quod si aquosus sit humor prædictis addes vel rhabarbari, vel hieræ simplicis Gal. aliquid: cui vsu pilulas ex rhabarbaro, agarico, cartamo, & mastiche efformare poteris. Laudo tamen purgationes fieri viginti diebus à menstruatione, ut menses puriores, & copiosiores prodeant. At si per epicalim purgare libuerit, utile quoq; erit, huic vsui pilulas porrigere, quæ recipiunt xylobal sami, cinnamomi, fileris montani, asari, mastichis, seminis anisi, fœniculi, macis, croci ana. ʒ. j. calami aromatici, squinanti, spicæ, ana. g. x. myrobalanorum, turbit, ana. ʒ. ij. aloes ad pondus omnium, cum succo fœniculi fiat massa. Attamen si ex indebito uitæ instituto uel uentriculi ultio, aut totius corporis frigido habitu, uterum prædictos, succos suscipere aliquando comperias, probatissima mihi uidetur ea purgandi ratio, quæ per uomitum fit, exhibito origani aut thymi decocto.

C Purgato quidem altero aut utroq; modo sufficienter corpore, ea potui aut esui porriges medicamenta, quæ præter id quod humorum reliquias coterere habeant, totum subinde corpus, & sanguinem ipsum calfaciant, & siccant: eoq; magis, quod aquosior extiterit menstrualis sanguis. In primis itaq; administrabis,

Causa.

3.℥. vel 3.℥. triferæ magnæ sine opio ex vino, pliris cū moscho, diābre, diafary-
 rij, rameti eboris, seminis mercurialis ana 3.℥. coaguli leporis, & matricis eius-
 dē ana. 3.℥. sacchari albi. li. ℥. liquore stillatio apialtri, & aquæ buglossæ saccha-
 rū dissolue, & adde conferuæ corticum malicuri 3.℥. conferuæ florū stachados
 3.℥. atq; in quadras redige pondere ij. 3.℥. quas ieiune p̄beto: sumat ēt ex confectio-
 nibus, quas p̄cedenti capite huic vsui proficuas esse diximus. Conferit non mi-
 nus à purgatione castoreum, cuminū, pulegiū, anisum, iuniperi fructus in pul-
 uerē redigere, & cum xyloaloe, & saccharo tabellas efformare, vel cōditū cum
 melle addito modico vino albo. Præstat, & mercurialis cum castoreo, aut 3.℥. ec-
 legmatis diābræ, vel diamusci, seu de xyloaloe cū uino, aut aqua florū cinnamo-
 mi uel citrangulorū. Quo sanè factō, mox omni arte corpus calfacere, & exsic-
 care opus erit: primō qdē balneis naturalibus ex sulphure, q̄ summo pere esse
 vtilia diutino experimēto didicimus, vel alio arte parato, ex p̄dictis medicamē-
 tis. Ex vsu non minū est sudorē euocare decocto ligni guaiaci, simlacis asperæ
 aut radice chinæ, qdē multū profuisse scimus: ad quod quidē auxilium cōsu-
 giendum esse in pituitosis, & albis fœminis arbitror. Verū si sudare renuerit, B
 syrupū ex decocto ligni guaiaci cū floribus stachados & semine masculæ mer-
 curialis, noctuq; per dies triginta porriges, quē magni vsus fore, certo scio. Qd
 si hæc non satis sint, ad fomenta, & encatasmata veniendum esse consulit neces-
 sitas, & rei rō: p̄stabis quidē vaporē per infundibulum fœmina vndiq; cooper-
 ta, ne in aerē spiret. Euaporationes hoc mō cōficio: excipe artemisiæ, betonicæ,
 chamædrios, camephythios, chelidonæ, gallitrici, foliorum lauri, maluæ maio-
 ranæ, nepetæ, melissæ, chamæmali, meliloti ana m. j. carui, cimini, sileris mōta-
 ni, anisi, seminis lini, anethi, fœnugræci ana. 3.℥. fiat decoctio, q̄ pro balneo etiā
 naturali administrari pōt. Sed probatior mihi vī fœtus, qui fit ex aqua calida, in
 qua prius fuerit decocta artemisia, saluia, ruta, cuminū, pulegiū, ciperus, iuncus
 odoratus, acorus, & reliqua semina odorifera. Verū in his, & suffitiis nō o-
 portet diu immorari, ne maior in pudendis concitet calor, q̄ par sit: sat. n. erit fre-
 quentius his vti. Cataplasma quoq; ex his oībus confectum, & pubi appositum
 magni est momenti, qd vterum calfacit, & roboret. Suffitus etiā parari possūt C
 ex calidis odoratis, ut cassia, cinnamomo, costō, aniso, thure, myrrha, styrace, &
 alijs ex his compositis, q̄ recipiant pilularum cupressi, mastichis, thuris, ladani,
 baccarū lauri, bdellij, styracis ana 3.℥. ambre griseæ 3.℥. misce, & per infundibu-
 lum suffitum suscipiat. Aliud ēt conficies, quod recipit styracis 3.℥. agalochi, am-
 bræ ana. 3.℥. balsami. 3.℥. moschi 3.℥. confice pastillos. Itē aliud recipit ladani pu-
 ri. 3.℥. styracis 3.℥. & fgariophyllorū, agalochi, sabinæ siccæ ana 3.℥. ambre, &
 moschi ana. g. x. fiant pastilli. Idē beneficium p̄stant alipta muscata, gallia mus-
 cata, & reliqua suffumigia, quibus fœminæ vtuntur ad conciliandum gratum
 odorē. Studebis ēt his factis sensim vterum purgare, calfacere, & roborare pes-
 sarijs, quæ recipiant artemisiæ, sabinæ, maioranæ, dictami, absinthij ana 3.℥. ani-
 si, ameos, rutæ, corticis thuris ana 3.℥. quæ oīa in minutissimū puluerē redacta,
 sinco mercurialis excipe, & in raro pāno locellos nocte immitto: quibus ad-
 dere aliqn oportebit oleū momordicæ, uel idē oleum bombacæ exceptum vte-
 ro impositum, qd incredibili efficacia prodesse scimus. Aliud item conficit qd
 recipit macis, bdellij, galliæ muscatæ ana 3.℥. pulueris hieræ 3.℥. cum ladano
 confice.

- A** confice pessarium, cui adde agarici modicum. Quam proculdubio curationem si quis diligenter examinet, reperiet vniuersam scriptam esse apud Hip. li. 2. de mor. mu. per hæc verba. Quum vero perfrigerat uterus, & omnis insitum esse vterus, & color non est clarus, & compactus est uterus. Quum sic habuerit, purgare oportet cum eo, quod pituita ducat, & extenuare, ac frequenter vomere, li. tñ. 1. pop. par. 6. tex. 34. huic subueniens sterilitati, inquit, ut mulier in utero habeat, polypos super flamma affatos, qui calidissimos, & plurimos semini vstos edendos dare, & nitrum egyptium, & coriandrum, quibus sanè tantum in hac causa utendum esse arbitror. Verum ut res ex voto succedat, non utcumque; adhibenda sunt prædicta auxilia, sed hac limitatione præhabita, quod inter vnum, & aliud auxilium, vel vomere, vel leui aliquo pharmaco corpus purgare studeas: aut adhibito catapotio ex hiera, ex mastiche ex agarico, vel decocto ex syrupo guaiaci cum sena, vel ipsa foliorum senæ infusione cum melle, aut saccharo. Præstat ite pulvis senæ cum saccharo, & succo mellissæ in tabellas formatus. Præterea prædendum est, ut ex prædictis auxilijs vnum quodque iuxta effectum à frigiditate indutum adhibeatur: quippe suffitus ijs maxime profunt feminis, quibus ob frigiditatem menstrua, vel nulla, uel diminuta, prædierint, præsertim si aquosa humiditas adiungat. Suffitus aromatum (inquit Hip.) muliebria educit. At euaporationes ijs, quibus os uteri, & oscula venarum ipsius frigore constipant, ita ut semen suscipere non possint: omnia tamen hæc peculiare hoc habent, ut frigiditatem uteri compescant, quo minus semen extinguatur. Sed quod uterum purgant pessaria illis tamen ex usu esse censeo, quibus pituita, aut aquosus humor in utero abundat, quod quidem cautè agendum esse arbitror, licet autores liberè colocintide, & alijs gravioribus utantur. In qua sanè rescriptum reperio, & uiris doctis non leuiter laudatum, pessarium de alio hortensii: referunt. n. aliis cum oleo de spicatricis, & in rarum linteolum oblongi sacculi modo conformatum, intrusis, ac in vuluam profundè pulsas, & dum lacebit, exclusis, cessantes menses (quod pituitoso utero non raro accidere conspicimus) potenter moneri, & uterum mira voluptate affici, ac repurgari, adeo, ut hinc facta sit via nonnullis ad conceptum longo tempore desperatum. Eandem et intentionem complent & purgationes, & balnea, & sudores, & medicamenta, quæ humorum reliquias coterere, antea diximus. Sed cum satis non sit ad fecunditatem conciliandam, hæc omnia præstitisse, nisi uterus ad antiquum vigorem redierit: ob id ventris inferioris regionem, & uteri locum in lateribus iuxta inguina inungere primo opus erit, oleo momordicæ, balsamo, oleo de styrace, naphthæ, liliorum alborum, de baccis lauri, de angelica, de cinnamomo cum musco, & alijs, quæ calida sint, & gratum odorem spirent. Præterea fomentis æquale vini portionem addes: cataplasmata ite conficies ex pulueribus prædictarum herbarum, & seminum cum aromatis, vino, & oleis prædictis, quæ iuxta inguina adhibenda sunt. Sed umbilico, & eisdem partibus. emplastrum quoque affigito prædictis viribus præditum, quale est, quod recipit ladanum depuratum 3. j. thuris, styracis liquidæ, an. 3. l. spicæ nardi, gariophyllorum, ambra griseæ, an. 3. f. cere quantum sit satis, ut fiat emplastrum cum oleo liliorum, nardino, & balsamo. Aliud quidem recipit emplastri ceronei 3. ij. ladani puri 3. j. & f. galliæ muscatæ, aliptæ muscatæ, pulueris cinnamomi, & baccarum lauri, ana 3. j. excipiantur omnia oleo ex angelica, & conficiatur emplastrum. Parabis et aliud efficacius, si exceperis styracis calamitæ 3. j. ambra 3. j. myrrhæ, thuris, gariophyllorum, ligni aloes, cinnamomi, nucis muscatæ, nucum cupressi, & seminis angelicæ

gelica ana 3.j. & s. cum cera, ladano, terebinthina, belzoino tecamacha indorū, A
caranna fiat emplastrum: quod ē ex eadem tecamacha vel caranna cum balsa-
mo, & theriaca vtilissimū cōficiēs roborant quidē vterū, quā c. de eius imbecil-
litate discimus, sed maximē id quod recipit pulueris granā, & gariophyllorū
ana 3.j. s. pulueris rosarū, coralli, sanguinis draconis ana 3.j. pulueris mastichis
3.j. s. diambra, & diamusci an. 3.j. ladani depurati, & cerā q. s. ut fiat mediocris
consistentia emplastrum. Quibus sanē ea moderatione uteris, ut ne vterū ultra
debitum calorem moueas, aut prae timiditate nihil efficias, sed ea prudentia rē
moderaberis, vt neq; noceas, aut frustra, & inutiliter labores.

*Humidi
uteri si-
gna, &
curatio.*

Humiditate nimia vterum laborare, & ob id non concipere cognosces ex fe-
minae habitu molli, pingui, & subalbido: ex precedenti uictu humido, aquoso,
ac potu immodico, & uita quoq; sedentaria, & otiosa. Ex largioribus itē mensi-
bus, ijs q̄ aquosis, tenuibus, & ichore plenīs. Præterea ex pudendo nimis humi-
do, ac madore pleno: ex nulla vel obscura veneris appetentiā nulla, ē delecta-
tione in coitu. Quā sanē omnia mira quadā breuitate Hip. lib. 2. de morb. mul.
cōplexus est dicēs; Si verò nō cōceperit, seu secūda aut tertia die exeūt ea, q̄ a vi B
ro emissā sunt, fluētia cū multa humiditate: manifestū est qd̄ uteri sūt humidio-
res: Ad q̄ sanē cām, uteri laxitatē, & nimia apertionē, reducere pōt: sed placet in
suū differre locū, & ad institutū redire. Quatuor igitur modis cōceptū humidi-
tas nata est impedire: primo dum vterus nimia humiditate luxuriat, & uiri ge-
niturā suffocat extinguitq; vt ex Hip. cōstat. 5. Aph. 62. Sed fieri id cēleo nō a so-
la humidi qualitate, uerū a copia ēt materiae per se geniturā suffocantis: non
enim datur humida intemperies euidēs sine p̄sente materia. Hoc proculdubio
cognosces, quia retento adhuc semine, & non prolabente, protinus fēminas cō-
cipit. Secūdo humiditas geniturā perdit, quia lubricitatē uterus ex humidi u-
bertate nō parua cōtrahit, qui facillimē semen susceptū prolabit: qd̄ percipies
ex fēminae relatione. Tertiò uerò, quia humida uteri intēperies nō p̄mittit fēmi-
nam semen fecundū generare, sed aquosum, p̄humidū, labile, & generationi
oīno, uelut aqua, ineptū: nā testīū & vasorū fēminae uis nimia humiditate obru-
ta neq; q̄tū par sit, semē coquere, ac p̄ficere. Id proculdubio cognosces ex semi-
nis fēminei tenuitate: nā mox a coitu procidit, & tenue atq; aquosum apparet. C
Quartò uerò, & vltimò, id malū humiditas affert, q̄ robur, & firmitatē ipsi⁹ deij-
ciat, ac veluti paralytū in ipso moliat: cuius rōne susceptū semē nō cōplectitur
vterus, nec ipsius osculū ea ui, & efficacia claudit, q̄ sufficiat ipsū cōtinere: cum
(vt refert Hip.) necesse sit os vteri ita claudi, vt nec specilli acumē admitat, q̄ sa-
nē vitiū pleraq; fēminas p̄dere certū est. Dignosces aut id priuatione aliorū si-
gnorū: p̄terquam q̄ hae fēminae p̄p vteri oris operationē, & laxitatē nullā sētiūt
in coitu delectationē, & madore nimio affectas semp partes pudendas habent.

In curatione q̄ dē licet cōi quadā indicatione, q̄ ad siccitatē vterum reducat,
oēs humiditatis actus cōueniāt: vt Hipp. docet li. 2. popu. par. 3. tex. 28. dicens;
Humiditas per exeuntia, victus rōne siccissima: nihilominus tñ peculiarem quē
uis agendi rō exposcit siccandi materiā, & curandi rōnē. Nā q̄ suffocat humidi-
tas, maiore ex postulat uacuationē: quā lubricū reddit vterum maiore cū ex-
siccatione absterfionem: q̄ imbecillā reddit coquēdi, & conficiēdi semē potē-
tiam, p̄ter exsiccationem ioborantia, & coquentia pharmaca exigit: q̄ uerò pa-
ralytū

- A** ralyſim infert, & os uteri laxū & molle redit, q̄ aſtringendi, roborandi & firmā di vterū vires habent cū exſiccatione deſiderat. Referā in primis q̄ ſiccitate eſſe p̄ficua in cōi ſcimus: deinceps cuiq; ſymptomati, & affectui ex ijs, quos retuli, peculiaria ſcribā pharmaca. Sed referā ante oīa uniuerſalē medēdi rōnē quā huic affectioni ſcripſiſſe Hip. cōſtat li. i. de mor. mul. p̄ hęc verba; Si verò humidi or fuerit, tales uteri, nullo ex his opus habent, ſed vice verſa, neq; cōtrectare, neque lauare recente motu factō oportet, neq; ſuffire: nā ad periculū hęc p̄cedere ſolent. Et ſi magis quā p̄ natura fuerint humectæ, ſiccare ſanē ac ſuffire oportet: ſi verò bili oſa in ipſos confluant, medicamētū dare, qd bilē purgat: ſi uerò ſaluginoſa, lac aſininum, & vinum, & alia auxilia. Morborū porrō vires cōſiderare oportet, & cauſas, ex quibus morbi fiunt exquirere, atq; ſic ad alia p̄cedere, & morbos circa locos curare: & quidē ob cām oſculorum hiantiū, phibētur, vt ne detineant in uentre horum oſcula p̄parare, vt p̄bē diducta ſint. Quū verò humiditas p̄hibuerit, hanc inſpicere, uēne impediāt totis mulierū negotijs expenſis, ſiue ex toto corpore qd moueri videat, ſiue ex ipſis vteris, ſiue ex vtriuſque.
- B** Vteros autē ſic curare oportet: im̄mo ſicciores qdē tāto magis bono ſucco, quāto ſunt ſicciores hmōi humiditate, vt pingues magis fiant, q̄ graciles. Humectos verò, & madidos ſiccare ita, ut relinquant, quō humidi ſint, & nō ualde reſiccantur: exceſſus in his ualde ſunt uitandi. Cōcipit autē in vētre neq; ea, q̄ humiditātē habet, neq; q̄ reſiccata eſt, niſi qd horū in ueteri natura fuerit. Placuit quidē ad uerbum Hipp. ſnām tranſcribere, vt q̄ prudentiā in curatione, & veram medendi rōnē, & metas ēt operandi adamuſſim doceat: quā ſanē curaturo expedit prae manibus perpetuō habere. Itaq; ſi cognoueris ſemen prae nimia humiditatis copia ſuffocari, eum uitae modum inſtitues, q̄ exſiccare quantū ſat ſit, poſſit, exhibitis ſiccioribus cibis, & vino vel decocta aqua aromatis, & calidis ſeminibus, ut aniſo, cinnamomo, radice chinæ, aut ſmilacē aſpera. Vtā quoque ſemina laborioſis exercitijs, lētē tñ factis, & frictionibus ēt, maximē ſuperiorū partiū. Quā uitae inſtitutione habita, p̄miſſa tñ leui purgatione, quanta ſat ſit, vt corpus eitra noxā exerceri poſſit, vacuare ipſum deinceps copioſius opportunum erit. Primō qdē p̄ ea pharmaca, q̄ pituitā, & aquoſos humores expurgare nuper diximus, idq; conſertim primō, deinceps autē p̄ epictaſim, exhibitis pilulis de agarico, de maſtiche, alephāginis, de hiera: vel ijs, q̄ conſciuntur ex rhubarbo, agarico, & aloe, uel ex pulueribus hieræ ſimplicis cū pulueribus radice chinæ, & rubræ æquis portionibus. Quod itē facies inſuſo aliquo agarici, aut ſyrupo ex guaiaco, radice chinæ, & agarico cum melle, & ſaccharo conſecto: cuius deſcriptio talis eſt: excipe decoctiones maioris ligni guaiaci, & radice chinæ li. i. agarici trochiſcati, ligati, & expreſſi 3. iij. foliorum ſenæ 3. ij. ſacchari, & mellis quātū ſit ſatis, ut fiat ſyrupus. His factis, ſemel aut bis in hebdomada uomendum eſt, praeſertim ſi totum corpus aut uentriculus utero cūm praeſtiterit. Quod praeſidium, ſi ſcēmina non reſuſauerit, praeſcindēdū nō eſt.
- Præterea has ſcēminas ſudare non minus, q̄ p̄dictas coges, maximē ex decocto radice chinæ cum aniſo, & ligno aloe: quod ſanē inter cetera auxilia peculiāres vires habere, experimento, & ratione didicimus. Quod ſi ſcēmina iecur habuerit calidius, aut timueris calorē ſuccedendi plus iuſto, decoques radicem chinæ, aut ſmilacē aſperam ſtillatitia aqua cichorij, borraginis aut bugloſſæ.

Quo

Quò facto, si opus fuerit, ad naturalia balnea, eaq; sulphurea confugies, q̄ cō
stāt sapissimè profuisse. Tandem si plurimū humiditatis p̄esse cognoueris, tan
quam vltimum præsidiū consulo fontanellam in altero crure aperire, p̄ quā
paulatim uteri humiditas dilabatur. Interim tamen studendum est topicis auxi
lijs vterum ipsum exsiccare fomentis, videlicet, primò siccis ex artemisa, cinna
momo, anetho, chamemalo, hyssopo, menthaastro, semine, & radice angelica,
baccis lauri, gariophyllis, & nucibus cum diambra, & diamoscho. Inūges quo
que vniuersam vteri regionē oleis, & vnguentis, ac emplastris, quæ nuper dixi
mus: pessaria tamen hac lege facito: excipe macis, bdellij, gullia muscata ana
3.ij. agarici 3.j. pulueris hieræ 3.ij. cum ladano fiat pessarium. Suffumigium id
parabis, quod recipit ladani puri 5.℥. styracis calamitæ 3.j. ligni aloes, sabina sic
cæ ana 3.℥. ambra 3.j. musci g.iiij. misce, & fiat suffumigium. Cui consimile pa
rabis, si exceperis styracis 5.℥. ligni aloes 3.ij. balsami, & ambra grise ana 3.j.
musci 3.j. fiant suffumigia. Prodest etiam aliud ex historia, xylobalsamo, nepe
ta, melissa, & ladano. Sed in hac potissimum causa paratur vtilissimum, quod re
cipit ambræ, styracis ana 3.ij. myrrhæ, mastichis, thuris, gariophyllorum, ligni
aloes, cinnamomi, nucis muscata, nucum cupressi ana 3.j. & ℥. conficiatur mas
sa cum ladano addito angelica semine, ex aqua pessaria, suffumigia, & empla
stra pro matrice, efformare poteris.

Quibus porrò factis, ad ea medicamenta veniendū est, quæ & cām elidāt, &
proprietas quadam conceptui aduinculo sint, quale est, qd recipit testiculo
rū veris desiccatorū, limaturæ eboris, seminis seseleos, vteri leporis, & coaguli
eiusdē ana 3.℥. fiat puluis, quo utatur manē, & cū iure pulli. Et semel in hebdo
mada pessario hoc vteris, qd plurimum vterum purgare scimus: excipit quidē
castorei, agarici, mastichis ana 3.℥. colocintidis 3.℥. buliant in vino albo, & post
colaturā adde mellis quātū sit satis, vt fiat lēto igne pessariū, qd insperge pulue
re nucis vomica combusta. Verūm si humiditatem cognoueris lubricū redde
re vterū, p̄ter dicta medicamenta ea adijcies, q̄ abstergerendi vires habeant: cui v
sui conficies clystere, quod recipit thuris 3.ij. aluminis 3.j. nucum cupressi pul
uerizatarum 3.j. ℥. vteri ceruæ in puluerem redacti 3.ij. mellis optimi 3.ij. bul
liant oīa in uini albi lib. 1. & ℥. ad consumptionē medietatis, cui adde theriacæ
3.j. & fiat colatura. Parabis etiam clystere ex decocto ligni guaiaci, radice chin
e, & smilacis asperæ cum melle, quod mirū in modū abstergere, & exsiccare
natū est: vti etiam pessarijs, & suffumigijs supradictis, ac postmodum confe
ctionē hanc sumat femina tertio quoq; die cū modico vino, recipit quidē ga
riophyllorum, cinnamomi, galangæ, zingiberis, xyloaloes ana 3.j. nucis musca
tæ, zedoariæ, seminis ocymi, spicæ, crocia ana 3.j. ossis de corde cerui, rasuræ e
boris, & margaritarum en. 3.ij. ambra g. x. musci g. iiij. sacchari quātū sit satis,
vt cū aqua rosacea fiat tabella, quarū 3.j. porriges. Ex quibus medicamētis dem
pto saccharo, & additis styrace, & ladano, emplastrum conficies, qd experimen
to didicimus vterum maximè calfacere, exsiccare, & roborare: & ob id eo vti
mur, vbi ex humiditate testes, & vterū malè affectum, & tenue effundūt semē.
Verūm si ex vteri laxitate, & osculi eiusdē resolutione ocysimè semē pbat:
præmissis vniuersalibus auxilijs, q̄ retulimus, & quæ mox diximus peculiare
exsiccandi, & calfaciendi vires obūnere, ad ea, quæ adstringendi, & roboran
di effi-

A di efficaciam habent, cōfugies, quale est, quod recipit rosarum rubearū 3. s. thuris, mastichis, myrrhæ, sanguinis draconis, boli armeni, myrtillorum ana 3. j. & scythracis calamitæ 3. j. ladani 3. s. ambre, musci, spice nardi ana 3. j. formentur trochisci ad suffumigia paranda, vel emplastrum vmbilico & imo ventri apponendum. Cuius naturæ aliud efformabis, quod recipit ligni aloes, & cinnamomi ana 3. j. & scgariophyllorum, cyperi, nucis muscatæ ana 3. j. radicum bistortæ, angelicæ ana 3. s. gallarum & aluminis ana 3. v. inusci 3. s. ex quibus item coctis, femina, si euaporationem susceperit, mihi non est dubiū, quin maximum sit cōsecutura beneficium. Quem quoq; vsum præstabit euaporatio ex decocto ligni aloes, radicis chinæ, aut ligni guaiaci: item ex eisdem suffumigium aut clystere. Cæterum ab his oībus cauendum proculdubio est, mensibus instantibus. Conferret insuper post menstruat purgationē, per metrachitam iniicere in uterum clystere, quod recipiat galbani puri 3. ii. lactis caprini 3. j. & s. bulliant, & facta colatura infunde. Cui consimile aliud efficies, quod recipit hyperici, radicis peoniæ, uel seminis eiusdem & angelicæ ana 3. j. myrrhæ, carpobalsami, gallarū, balaustij an. 3. s. trussa bulliunt in lib. ij. aquæ ad cōsumptionem medietatis. Nec difficile erit euaporationes varias, suffitus, emplastra & pessaria huic usui idonea efformare, si quis exactè expendat quæ hucusq; diximus.

Siccitatem quidem summè esse sterilem euidenti argumento ex terra desumpto probari potest: nam quid persimile fœminis sicca intemperie laborantibus, accidere comperimus, quale arene, argilose terræ, aut petrosæ accidit, dum illis semina committimus: dixerat. n. Hip. li. 5. aphor. 62. Et qui recunq; siccos magis, & adurentes: nam ex defectu alimenti corrumpitur, dissipaturq; facile semen: in fabuloso enim loco nihil fœliciter nascitur, sed semen ocysimè contabescit. Duplici quidem ratione sicci vteri concipere nequeunt, prima quidem, quia seminis substantiam ebibunt, & conterunt, terræ siccissimæ instar, quæ vberimas pluias confestim depascitur: secunda uerò, quia suscepto semini nullum præstant alimentum, uel quàm parcissimum, q̃ fœminæ sic affectæ sanguine careant: quò fit, vt facile id vitium cognoscas, quia per menses nihil instillat, uel exiguum aut crassum. Corpus item sic affectarum hirsutius & siccus existit, ac pilosum, aut citra pilos, si frigiditas accedat. Os item uteri siccum, labra scissa, ad tactum dura, nulla humiditas instillat, & coire plurimū appetunt.

Erit igitur duplex curandi rō, altera, quæ madidum & mollem reddat vterū, quominus semen conterat & ebibat: altera uerò, quæ humidū ac semine & sanguine mēstruo, vberem efficiat. Quamobrè primò vniuersum corpus humectare studebimus alimentis humectioribus & optimi ac multi nutrimenti, & tandē ijs, quæ aqueo humore abundant. Qua in re opus est vt carnibus auium aquatiliū, piscium nō salitorum, & auium domesticarum, ptisana & lacte nutritarū; carne item testudinū, limacū & ranarum: fructibus horarijs, melonibus & similibus, quæ multā substantiā aqueā præstant, dummodo eorum vbertas tanta nō sit, quæ corrumpi periclitetur. Quo facto, amylo, pulte, farre, ptisana, & alijs huius naturæ vti oportebit, donec s̃guinis & seminis maior subsit, & ad vterū cōfluat copia. Postmodū quidem frequentibus aquæ dulcis balneis totum corpus humectare oportebit iuxta Hip. p̃ceptum lib. i. de mor. mul. qua parte hæc refert verba. Et si quidem siccior fuerit, balneis pluribus, & obsonijs oībus coctis.

tum

*Siccitas
vteri
signa
curatio.*

tum marinis, tum carnibus vtatur, oleribus coctis, pinguiibus ac dulcis: vinò et vtatur aquoso, & diluto, hæc n. plerunq; faciunt, vt humiditas præsit tum in reliquo corpore, tum in uteris, maximè accedente uita sedentaria, & otiosa. Prætereà utero & ipsius regioni fons ex aqua dulci, & euaporationes adhibendæ sunt ex decoctis herbarum humentium, velut malua, viola, althea, rosa viridis, semen altheæ, fœnugræci, & citoniorum, ex quibus vel balneum, vel fomentum, vel euaporationem hac lege conficies: arietum duo capita, quo ad vsq; caro ab ossibus sponte separetur, decoquenda curato, quibus adde, vt leuiter bulliant florum salicis, violarum, chamæmali, maluarum ana m. ij. altheæ cum radicibus m. j. radicis valerianæ lib. f. fœnugræci, & seminis lini ana. ʒ. iij. fiat decoctum, quo vtare. Præstat item verum frequentissimè inungere oleo de floribus salicis, amygdalarum dulcium, uiolarum, de seminibus melonũ, & cucurbitarum, butyro recenti, lacte & similibus. Vtile quoq; est creatum rosaceum, vel unguentum ex cucurbitis, aut resumptiuum: In vterum etiam infundes ex prædictis decoctis vel lactis aliquid, olei amygdalarum dulcium, iuris pinguis, aut decocti carniū limaciarum, & hordei. Itē præstat pessus, qui recipit medullæ cruris vaccinis, adipis gallinæ ana ʒ. f. styracis ʒ. j. cum lana confice pessos, quibus adde olei amygdalarum dulcium q̃tum sat sit. Verum, vt summam referā, hoc vnum in curatione hac obseruandum censui, vt corpus omni arte reficiat & humectet: cui vsui præstat hoc medicamentum frequenter sumere, quod recipit sacchari albi lib. j. & samyli ʒ. iij. in qua rosacea coquito, & interim adde olei amygdalarum dulcium ʒ. ij. ac lento igne in eam consistentiam redige, quæ tabellæ fieri possint. Ex vsu quoq; est lac asinæ calidum exhibere, aut lac caprilum cum modico saccharo, & farina leuiter coctum, uel amyllum cum lacte, & vitellis ouorum, & tandem corpus vniuersum uelut hecticorum corpora reficere. Vltimò tñ in hac curatione expendes vteri osculum non rarò esse siccitate contractum: cui vsui inter alia præsidia, quæ passim retulimus, confert (multorum sententia) succus porri hortensis, si eidem misceatur adeps anseris, eoq; inungatur post menstruam purgationem collum uteri: quod sanè præsidium contractum uterum laxare procul dubio fertur.

Flatus
uteri si-
gna, &
curatio.

Ex diminuto uteri uel uentriculi calore præexistente ibidem humiditate, q̃ C
regulare nequit pusillus ille calor, faciliè quidem in utero flatus generari assolent, quos sterilitatis esse frequentissimam causam cognouimus, propulso nimirum ex utero impetu ipsorum suscepto semine, uel q̃ præ distensione apertum teneant plerunq; vteri ostium. Hos quidē scemina cognoscunt, præsentiumq; quia silentes, & strepentes non rarò profilire per os uteri percipiunt. Prædictis et feminis uenter inflatur, maximè a coitu, conate utero se ipsum claudere, sed mox quod suscepit, proijcit. Rugitus quoq; adest in inferiore uentre, tensio, & nō leuis molestia, q̃ protinus flatu excreto cessant. Huic sanè causa innitendū plurimū, esset, ut q̃ frequentissimè sterilitatem pariat, nisi communem obtinuisset curationem cum frigido, & humido uteri intemperamento. Cum hoc tamen duplicè hæc affectio sortitur medendi methodum, alteram, q̃ calori imbecillo ob frigiditatem uteri, aut ob suffocationem ex humiditate inundante prouideat, cuius nuper abundè meminimus: alterā uerò, quæ flatibus prorudeat ijs præsidijs, q̃ ipsos tenuent, discutiant, ac dissipent, qualia sunt (præter ea, quæ diximus) euapo-

po-

Aporationes, suffitus, & facculi ex ruta, cumino, anetho, aniso, apij femine, costo, cinnamomo, semine, & radice angelica, & huius naturæ reliquis. Quæ quoque usum præstant inunctiones ex oleo, in quo ferbuerint in prædicta oia, uel lauri bacca & folia, ex quibus cataplasmata, & emplastra parabis, quæ addita prædictis auxilijs calfacientibus, & exsiccantibus frigidū, & humidum uterū maximè attemperant. Cæterum frigiditati, humiditati ac flatibus prævalentibus hoc unum præsidium scio esse proficuum, ac non leuibus experimentis confirmatum, quod recipit nucis masticata, rasuræ corticū mori, rasuræ corticū nucis, florū rois marini, ligni cupressi mundati, & in puluerem redati ana 3. iij. cuius dosis est ʒ. iij. cum uino odorifero uel aromatis confecto. Confert item si dare decocto radicis chinæ facto ex aqua stillatiua buglossi. Item usus cardus hortenſis huius causæ, & ytriusque coniugis sterilitati ferunt grates autores providere, & ad masculorum generationem maximè conducere.

B Prædictæ quidem intemperantiæ secundis qualitatibus, quas sibi comites asciunt, frequentissimè uterum afficere solent ita, ut non minus sterilitate afficiant, ac ipsæ per se natae sunt efficere. Proficiunt etenim à primis qualitatibus durities, quæ uteri officio, & naturæ aduersissima existit: quamobrem dixit Hippoc. 5. aphor. 52. Quibus os uteri durum est, ijs os uteri comprimere necessum est. Constat ex hac sententia hunc affectum reducendum esse ad morbum in iua potissimum; nam hæc ratione fecunditati officit. Sed expendendum est de ea uteri duritie nos hic loqui, quæ morbosa est; non quidem de ea, quæ prægnantibus accidit, cuius meminerat Hippoc. aphor. 51. libr. 5. Ad hanc proculdubio affectionem os uteri pingue reducendum quoque est, quia in utrisque non suscipitur semen, sed hæc eadem causa longè diuersa est ab ea, quæ mille in locis de omento crasso, & crassis feminis Hippoc. refert, quas esse etiā ad concipiendum ineptas docuit 5. aphor. 43. 44. & 60. & libr. de natu. mulie. ac de sterilibus. Verum huius affectionis clariùs meminit libr. de locis, & aqua & aere, textu: Lunares purgationes, quod sanè uitium paulò inferiùs curare monstrabo digerentibus, & exsiccantibus auxilijs; ut expressè Hippoc. consulti libr. de steril. per hæc uerba; Si uerò mulier à pinguedine uteros sibi laesos, esse putat ad conceptionem, attenuato ipsam quàm maximè, & ad reliqua gracilem facio. Verum tamen ut crios, durum fieri est necessum aliqua ex his causis accedentibus, ob idque claudi, & mulierem non concipere, quod semen non susceperit.

Atqui licet durities possit separari ab utero cōcluso, est tñ illius signū, ut dixerat Hip. libr. de nat. mulie. Si os uterorum cōcludatur, spissum fit uelut grossus ficus, & si digito contigeris, cōperies durū, & contractum, ut digitum nō admittat, & menses occultant, & geniturā non suscipit hoc tpe, & dolor hēt imū ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem. Item paulò ante, hæc uerba refert; Si indurati fuerint uteri, os ipsorum asperum fit, & menses occultantur: cū uerò apparuerint, uelut areæ sunt, & genitura hoc tpe non fit: si uerò digito cōtigeris, asperum fit os uterorum. Qua sententia ostendit conceptui esse impedimentum prædictam uteri crassitiem, sicut antea dixerat libr. de steril. hæc uerba scribens: Os uteri phibet conceptionē, si auersum, si distortum, si cōclusum, si recens fuerit conclusum. Et eodē li. paulò inferiùs inquit; Cū stomachus ute-

*Durities
oris uteri
signa &
curatio.*

ri

ri durus fuerit totus, aut summa parte, & conclusus, ac non rectus fuerit, sed ad alterā coxā auterfus, aut ad intestinū rectū inclinatus, aut in se ipsum cōtractus, aut labrum stomachi sibi ipsi incumbuerit: vnde cūq; igitur aut asper fuerit, aut callosus, fit aut durus & à conclusione à callositate. Cuius ē cognitionē ad ducit eodē lib. dicens, Si os vterorū durum fiat, aut ceruix, ex digito contractu cognosces. Duritiei quoq; cām recenset eodem lib. dicens; Os vteri durum fit, aut dum concluditur, ut nuper adducta sn̄a in fine monstrauit. Ex quo constat posse concludi, ut in pręgnantibus citra duritiem. Verum si durities accidat vel à callo, vel à scirrho, vel à tumore aliquo pręter naturā, vel à nimia frigiditate aut siccitate, quę partes constringat: longē diuersā esse censendū est à pręcedēti. Contingit ēt ex alijs causis, maximē ex adnascēti membrana quadam, cuius meminit Hippo. lib. de natu. mul. per hęc verba; Si genituram nō suscipiat mēsisbus secundum naturam fluentibus, membrana ante vteri os excreuit. Cognosces autem hoc, si digitum admoueris, membranę prętextum continges.

Huic quidē affectioni medeberis iuxta differentiam cuiusq; dictarum causarum; nam licet Hipp. indistinctē videatur duritiei remedia scribere, si quis rē penitus consideret, reperiet vnicuiq; causę peculiare auxilium dicare, quemadmodum lib. 2. de mor. mul. dicens; Si verō obduruerint vteri, osculum ipsorum durum sit, & clauditur, & menses non prodeunt, sed pauciores & deteriores, & dolor incidit & febris, & rigor corripit circa imum ventrem & lumbos & laterum mollitudinem. Cū sic habuerit, multa calida lauato, & tepesfactoria adhibeto, si dolor habuerit, & uteros multo tempore cum aqua decocti cucumeris siluestris fouero, deinde mollitoria apponito, atque hęc per triduum facito: & si ex cōtractu osculum vterorum molle apparuerit, ex crudo lino tres penicillos suppuratorios indito, primum tenuem, secundum paulō crassiorē. Deinde subdit. Sed vbi fomentum adhibueris, ex odoratis glandem mollitoriā apponito. Item lib. eodem paulō inferius inquit; Si os vterorum non suscipiat genituram, sed durum fuerit ac conclusum, plumbeum penicillum apponat, velut dictum est, per triduum, vbi calida lota est, & mollitorijs vtatur, & supina decumbat, & in aquam calidam insideat, & lanam vnguento imbutam imponat. Ac rursus paulō inferius pulchra admodū & vtilia recenset medicamēta, quę diligens Medicus eadem parte reperire poterit. Item lib. 1. de mor. mul. inquit; Quibus autem statim vbi coeunt, fluunt ea, quę à viro sunt emissā, ijs os vteri clausum est: curare verō sic oportet: siquidem ualde conclusum fuerit, tardis & plumbeis fistulis immisis aperito, & molli fomento ex fœniculo foueto, & subductitijs, quę uteros attenuant & indirectum redigunt, purgato. Post purgationes autem & fomenta, ea infundito, quę causę sunt contraria. Quę sanē loca, & alia pleraq; euidenter monstrant cuiq; duritiei causę, peculiaria esse adhibenda pręsidia. Sic profectō si tumor aliquis pręter naturam causam clausio ni pręstiterit, vel callus, curare eo tempore oportet, ut lib. huius operis 2. abundē dictum est: quippe hac in parte eam duritiem curare in animo est, quę uel ex siccitate, uel ex frigore certum duxit.

Itaq; si ex siccitate durities suboritur, clausum vterū mollē & laxū reddes, pręterea, q̄ sicciori vtero prodesse diximus, ijs, quę ex Hipp. locis citatis attulimus, balneis aquę dulcis, fomentis herbarum & rerum remollitiuarum, aut laetis

- A** Etis aut dulcis olei, vel amygdalarum dulcium: ac rursus ex unguento, quod recipit axungie gallinae, anseris, & anatis ana. 3. j. olei amygdalarum dulcium, liliorum, & sesamini ana 3. j. & radice iridis, altheae, & assari ana. 3. j. cerae albæ quantum sit satis, ut fiat molle unguentum. Verum, ne circa methodum in curatione ultra procedas, scito, frigidam duritiem opus esse frenare evaporationibus, & fomentis, ac suffumigijs: siccitatis corrugationem balneis, fomentis, evaporationibus, inunctionibus, ac mollibus pessarijs: cui usui pessaria conficies: quæ recipiant radicem, & foliorum malvæ, & altheae ana. 3. iij. farinæ seminis lini, & fenugraci ana 3. l. adipis anseris 3. iij. croci, & musci parum, excipiantur in serico linteo, & involuta, pessaria fiant, quæ in oleo irino, aut de semine cucurbitæ intincta in uterum immirantur. Prodest, & pessus ex radice altheae, axungia gallinae, vel butyro inuncta, vel ex lardo suis sine sale, aut ex pinguedine anseris vel anatis. Cæterum si durities fuerit callosa, non plumbeos penicillos, ut Hipp. refert, sed ex radice altheae tres penicilorum ordines efformabis, & minorem primò per noctem, & diem butyro aut aliquo pingui inunctum appones, à quo secundum eadem lege, & tertium, qui crassior est, apponito, & immorari finito. Interim tamen partem fouebis, inunges, & omni ingenio emolles: & tandem ad pessaria, & subductitia, quæ Hipp. consultit, devenire poteris: corpore prius purgato per supernam, & infernam aluum, ac positis et subductitijs, quæ præter id, quod emolliant, digerant quoque, extenuent, ac repurgent partem. Quæ profectò in re, securè administrabis quod recipit hyssopi ceroti, medullæ cervinae, adipis porcinae recentis, terebinthinae, cereæ albæ ana. 3. l. & saloes. 7. s. butyri, adipis anserini, leporis coagulii, myrrhae ana 3. iij. cassiae, nardi ana 3. j. mellis quantum sit satis, ut fiant pessaria. Sed utilius longè est aduersus omnem duritiem, & conclusionem id præsidium, quod recipit lini semen, altheam, fenugracum, omnia æquis portionibus in uas novum immitteremus, ubi oleum dulce, & aqua æqua mensura fuerint, ut semina contegantur, quæ cum molli uapore coqui, & ebullire ceperint: spumam, quæ supernatauerit, colliges, cui anserinos adipis, & ceram inunges, & pessarium facies. Est & aliud valde utile, quod recipit cere punice 3. iij. mastichis, & styracis ana 3. j. adipis anserini 3. iij. butyri, & medullæ cervinae ana 3. iij. misce, & fiant pessaria. Aliud et recipit ceruse, medullæ cervinae, cere punice, butyri, olei amygdalarum dulcium, nardini & glaucini ana 3. l. resinæ, thuris, mastichis, spume argenti quantum sit satis, ut fiant pessaria. Consultuerat quoque Hipp. lib. de natu. mulie. utilissimam evaporationem conficere hac lege: vinum quod in cunctissimum cum pari aque temperatum, trium semicongiorum Atticorum mensuram, & feniculi radicis, & seminis feniculi quartam partem, & unguenti rosacei semiheminam, hæc in uas novum fundito, & vinum affundito, uasis autem operculo perforato, & impolita arundine foueto. Quod si hæc quidem prodesse videantur, pessaria ex omni gummi genere conficies, additis ijs, quæ modicè dissoluit & digerant partis duritiem, ut Hipp. consultuisse constat lib. de steril. his verbis: Si conclusum fuerit, aut durum osculum uterorum, sicut albam expurgato, & nitrum Aegypti purissimum tritum admisceto, & subductitium facito magnitudine gallæ non magnæ, quod in lana molli unguentum irinum tinctum apponat per tres aut quatuor dies, prout visum fuerit. Post hoc conducit fomentum odoratum, postea uerò molli quodam opus est subductio, quod saniosa maxime ducat: deinde

Z

mer-

mercuriali, si tenera fuerit, cum unguento rosaceo in linteo ad diem, & nocte subdat. Si quis tamen duritiem amplius emollire studuerit, legat lib. 2. nostrum de praef. indica. & reperiet.

*Apertio
nis oris
uteri si-
gna, &
curatio.*

Dum uteri os nimium hiat, laxum, apertumve existit, nulli fore dubium arbitror, quin sic affectae feminae steriles esse debeant: inquit. n. Hipp. libr. de nat. mul. Si hiarit os uterorum magis quam solet, menses plures fiunt, & deteriores & humidiores, & per longius tempus, & genitura ipsam non contingit, neque intus manet, sed rursus foras effunditur, & si digito contigeris, os uterorum hias comperies, & impotentia ipsam corripit praemensibus, & febris, ac rigor, & dolor tenent inum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem: & docens causas inquit, Paritur autem haec maxime si quid in ipsa fuissem fuerit, & corruptum computruerit: patiuntur etiam ex partu, & alia aliter. Eodem quoque libr. paulo inferius eadem refert: sed clarius ad huc lib. 2. de mor. mul. de eadem re verba faciens sic scribit, Si uteri praeter naturam hiarint, menses plures prodeunt, & viscosi, & frequenter, & genitura intus non manet, & osculum hians est, & fieri non potest, ut genituram attrahat (& subdens causas inquit) Morbus autem corripit ex fluxu sanguineo, & fit cum menses suppressi de repente eruperint. Eodem quoque libr. paulo inferius refert, Si os uterorum hiarit amplius quam in mensibus solet, menses ita fiunt plures, & deteriores omnes, & liquidiores, & per longius tempus, & genitura non attingit, neque manet, sed rursus exit, & fere eadem verba refert. Quibus sane locis constant, & signa, & causa plures praeter humiditatem, cuius hac in parte meminisse non est in animo. Cognosces ulterius huiusmodi affectionem, quod femina in coitu nullam vel leuissimam perferat delectationem, facile semen citra sensum pellit, viro ingrata existit, & pudendum humectum habet. Fit etiam uteri os molle, & hians, ubi leue efficitur, & lubricum, ut Hipp. refert lib. de steril. in principio dicens, Si leues fuerint uteri, contingit autem hoc, & ex natura quibusdam, etsi ulcera magnas cicatrices reliquerint: si leues igitur uteri fuerint, mulier in utero non concipit. Quam sane affectionem a natura quoque fieri refert, & immedicabilem iudicat, quia semen non continent, neque contentum amplexantur, & proprium ante tempus excernunt.

In curatione tamen si quis legat Hipp. reperiet geminam esse medendi viam: inquit. n. lib. 2. de mor. mul. quum autem magis, quam oportet, aperti fuerint uteri, purgatione opus habent, post purgationes autem collutionibus, & suffimentis. Si vero propiores sint, quam oportet, vomitibus uteri opus habet, & fomento foetido, donec ad suum locum redeat. Ex qua sententia euidenter constat aliam adhuc subesse causam apertionis uteri, nimirum ipsius prolapsionem, cuius paulo inferius meminero. Eandem quoque curationem adducit lib. 2. de mor. mul. sed clarius eodem loco paulo inferius dicens, Si uero conclusi fuerint uteri, velut oportet, in aqua desideat, in qua cocta sit myrtus, aut leuciscus, aut vitis, aut olea folia, aut rosarum. Dieta uero sit quae relata est in rubro fluxu. Optimum uero ipsi auxilium est sitis, frequens vomitus, & prohibitiones balnearum (dulcium aquarum ego intelligo.) Ex qua sententia euidenter constat hunc affectum curandum esse frequenti purgatione, sudoribus, balneis sulphureis, syrupo ex ligno guaiaco, & reliquis, quae superius dicta frequenter sunt. Sed expendendum est generale quoddam praesidium omnibus quibus semen susceptum effluit, commune & pro-

A & proficuum: quod scripserat Hipp. li. de steril. dicens; Si uteri geniturā non contineant, plumbum lapidem, qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, & in linteo alligato, quo in muliebri lacte tincto subductio utatur. Quod sanē præsidium omnibus causis esse proficuum præmissa tñ uniuersali prouidentia existimo. Cui etiam vsui idonea reperies cataplasmata, emplastra, & suffumigia pauld inferius c. de sterilitate ad tps paragrapho de articulatione dorſi. In peculiari tamē huius affectus curatione præmittenda est uniuersalis illa prouidentia in purgatione, & uomitu, q̄ pauld antē proficiam esse diximus p̄ humidis uteris. Qua facta uteri os peculiarius cōstringit fetus, qui recipit radicis bistorte, quinquefolij, & cyperi ana ʒ. ij. rosarū cum calicibus, corticis mali granati, & balauſtiorū ana ʒ. j. suberis ʒ. f. hederae m. j. fiat decoctio in aqua, & vino astringenti, & quo uis die fotu utat femina. Cui et vsui p̄sunt suffumigia, pessaria, fotus, & euaporationis, q̄ p̄dicto loco adduxim⁹, & pauld inferi⁹ dorſo exarticulato dicturi sum⁹.

B Constat ex Hipp. decretis inter potissimas sterilitatis causas unam esse, & maximē efficacem, oris uteri auersionē, quod euidentissimis verbis monstrauerat adducens causas, & curationem lib. de steril. dicens; Nunc aut ostendā ob quas causas mulieres omnino steriles fiunt, & cur non pariunt antē quā sanentur. Causam uerō hanc esse dico, si os uterorum omnino auersum fuerit a pudēdo, non concipiunt, non. n. suscipiunt uteri genituram, sed statim foras exit. Cōtingit autem hoc et si os uterorum parum distortum fuerit præter naturam a pudēdo. Et si omnino conclusum fuerit os uterorum, neq; sic suscipiunt, neq; si recens conclusum fuerit magis quā oporteret. Singula uerō relata manifesta sunt etenim si omnino auersum fuerit, aut conclusum, menses non prodeunt omnino, aut prodeunt uiolenter cū morbo, si sanguis coegerit uteros pro more, cōuerſi. Et si purgata fuerit mulier aliquñ os uterorum ipsi a pudendo auertitur. Si uerō parum distortū, aut recens conclusum fuerit, prodeunt quidē menses, prodeunt aut uiolēter, & paulatim per multos dies. Multis quidē modis refert Hipp. uteri os posse ad uarias partes torqueri, & subinde sterilitatē efficere: nā utcūq; siue sursum, siue deorsum, siue ad latera uterū torqueat, rectē uirile semen in uterū neq; ire. Qd sanē dignoscēs ex tactu obstetricis digitis facto, quo nō erit difficile qua uergat parte perdiscere, p̄ter q̄ quod ex dolore in loco, ad quē uergit, mille in locis posse cognosci refert Hippo. Sic. n. inquit lib. de natu. mul. Si uteri ad latus, allapsi fuerint, tussis detinet, & dolor sublatu, & uterus durus uelut pila infidet, & ad cōtactum dolet, uelut ab ulcere. Et post multa hmoi feminas purgare iubet, & calida lauare, & tepesfactoria adhibere. Et subdit pauld inferius; Si uteri obliqui fiant, & os ipsum obliquū sit, & menses ipsi nunc occultantur, hunc prius apparentes euaneſeunt, & non similes fiunt, sed deteriores, & pauciores, q̄ antea, & genitura nō fit hoc tpe, & dolor hēt imum ventrē, & lumbos, & coxam, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet, & calida lauare, ac fore. Vbi uerō recens lota fuerit, digito immisso os uterorum corrigat, ac dirigat, & odoratorum suffitum admittat, & ex potionibus dato iuxta experimentum, q̄ libenter suscipit. Ex his q̄ sic affectæ sunt li. 2. popu. p. 2. tex. 1. 9. q̄dam cum ei coxa doleret ex uteri recurſu ad eam partem concepisse refert, & coxam grauidationis tpe non doluisse.

Uniuersa tamē curandi ratio in hoc affectu stat in reductione uteri ad antiq̄

Z 2 sedem:

*Vitiosus
uteri situs
signa, et
curatione.*

sedem: quod equidem fieri nequit, nisi vel purgatis humoribus, quorum ratione laxat
 uterus, vel resiccatis auxilijs topicis, ac sedato dolore, & molliore facta parte, ut
 indolerosus ad sedem, citra inflammationem reducat. Quam sanè medendi rationem
 locus nuper citatus & mille alijs partibus adduxisse Hipp. euidenter constat. Itaque
 primò purgabis corpus, & fomentum, ac remollitorijs uteris, tandem digitis ob-
 stetricijs uterum recendum curato, & ultimo eiusdem manibus hinc inde per
 vniuersum ventrem, versus umbilicum vndequeq; oleo uteri regionem perfrica-
 bis mediocri compressione, donec uterum à parte, cui incumbit, separatū, & in
 antiq; sedem reductum cognoscas. Postmodum verò, ventri adhibebis quod calfa-
 ciendi, & exsiccandi, ac discutiendi flatus vires habeant: quemadmodū mulier
 eulæ citra ullam rationem, passim solent efficere. Cavebis tamen in hoc opere, ne mēstrua
 instent, vel multorum humorum copia in utero subsit, ne quid deterius praesistenti
 malo succrescat. Verū dum id facere studueris, post id opus, olei inungito vētrē
 rutaceo, liliorum alborū, irino, chamamelino, de baccis lauri, super sparsis pul-
 veribus ex eisdē rebus, & aniso, cimino, cinnamomo, & similibus: quorum siluā
 reperies in curatione humidi uteri. Quo facto, emplastra eadē parte adducta um-
 bilico, imo vētri, & dorso adhibebis, & pudēdi ostiū firmabis suffutib⁹, & alijs
 rebus, quae exsiccandi vires habeant. Proderit, & viri usus quo melius os distorquet.
 Menstrua quoque purgationis ultio haud raro feminas fieri steriles comperi-
 mus: nam siue copia exuberante, aut deficiente: siue ordine profluendi prauo, ipsae
 antevertente aut remorante, siue vitiosa qualitate, aut substantia prodeant, affe-
 cti, utique sit, semper sterilitatis existit causa. Quippe ex immodico sanguine,
 quantumvis laudabilis existat, obruitur, & confunditur genitura: nequit enim pusilla
 virtus generans tantum sanguinis principio facturam conficere, ut optimè aduertisse
 Hipp. constat lib. de steril. per haec verba; Venae enim sanguine plenae genituram non
 suscipiunt, & in uteris aliquid inueterati sanguinis in esse est, quod genituram
 nutrirī prohibet. Et paulò antea eodem lib. adduxerat alium affectum ex copio-
 so sanguine, dicens; Si quid ex mensibus in uteris remanens scissuram, ac legmē-
 tum habeas, quod circa osculum, aut paulò penitus incaleseat, & rursus frige-
 scat, neque sic in ventre concipit. Pari quoque ratione si menses omnino non pro-
 fluant, credendum est feminas steriles fieri: nam, ut paulò inferius probabo, ple-
 runque concipiunt feminas post menstruas purgationes, ubi ab illis fuerint ex-
 peditae: cum verò eis omnino carent, perdifficile est posse concipere. Cōceptus,
 inquit Arist. lib. 7. de hist. anim. c. 2. mulieribus à profluvio menstruorum sua na-
 tura contingit, & quae his carent, steriles magna ex parte consistunt. Verū fieri pōt
 ut aliqua et sine eorum effluvio concipiant, videlicet quibus tantum humoris colli-
 gatur, quantum ijs, quae purgantur restare solet, quod non tanta copia, ut foras possit
 effluere: Alibi et hoc idem refert dicens; Impossibile est concipere sine mēstruo
 rum excremento quod antea redundans foras profluxerit, aut intus satis sit. Prae-
 terea inordinata excretio non expurgat quantum satis est uterum, ut genituram
 admittat (praeterquam quod alimentum inopia arefcit non raro semen) sic inordi-
 nati plerumque semen succum deferunt, & ob id genituram prohibent. Inquit enim
 Hipp. lib. de steril. Si verò pauciores, quam debeant, menses prodeant, neque
 sic praegrans fit: ac si plures, quam debent, menses mulieri prodeant, neque
 sic in utero concipit. Vteri enim sanguine euacuato genituram non concipiunt pro debilitate.

Quas

Mēstrua
 sangui-
 nis ulio
 signa, et
 curatio.

A Quas procul dubio causas omnes Scytharum feminas efficere steriles recessit li. de loc. aqua & ac. dicens; Lunares nanque purgationes eis non eueniunt, quæ admodum est necesse, sed minus, & intempestiue. Et subdit. Vnde necessario sequitur non multum fecundam Scytharum gentem esse. Quod de reliquis feminis pari pensu intelliges. Item menses corrupti, & utrunque aliter vitiosi minus ad concipiendum idonei censentur: primum si aquei, fetidi, aut nigri proveniant; deinde si albi, crocei, virides, aut cærulei: si plurimum fluant, largiori aut breviori tpe, q̄ par est: & si non statuto circuito, sed seruius aut citius, aut si oīno non fluant. Cum hoc tamen ex, quibus menses non fluunt, non omnino sunt steriles iudicanda: vidimus enim plures, quæ conceperunt nuptæ, cum virginibus non fluere menses. Nosces tamen has esse sterilitatis causas ex signis, quæ retulimus lib. huius operis i. proprijs cap. ad quæ sanè recurre, si veram sterilitatis ex menstruorum vitio curandi rationem ediscere velis. Nam satis mihi est hac in parte docuisse, mensium vitio feminas steriles non raro fieri: est sane molestum, & tediosum multis in locis eadem referte. Ob id, cum ex mensium

B vitio infecunditas suboritur, nullam aliam ad inuenies potiore curandi rationem, quam menstrua ad statutum fluendi ordinem reducere, aut eorū substantiam corrigere, & moderari: quæ omnia prædictis cap. postquam sterilitatis causam cognoueris, facile inuenies.

Inter causas, quæ sterilitatem feminis præstant, potissimam frequentissimæque esse censeo seminis femine vitium, quale sufficit generationi ineptū ipsū reddere. Quod equidem tale fieri quatuor modis constat, nimirum dum aquosius existit ita, vt figuram seu delineationem præ tenuitate suscipere non possit. Id profecto dignoscis ex seminis excreti naturam, & consistentia, ex uteri etiā frigiditate vel humiditate, ex celerissima seminis ipsius citra delectationem excretionem. Secundò semen vitari assolet propter crassitiem immodicam, quam deuenire calor nequit, neque ex eo quicquam præ crassitie efformare. Quod nosces ab ipso semine excreto, & quia femina tardè ad coitū excitatur, & subinde parum excernit. Tercio quidem semen generationi ineptum fit, eo quod corruptione seu labem aliquam perpetiatur, siue ex gallico morbo, siue ex putredine quauis prodeat: vel ex vitio aut morbo aliquo cuiusvis principalium

C membrorum. Quod videtur insinuisse Hippo. lib. de steril. reddens rationem, quare semen retentum in utero non degeneret in conceptum: inquit enim; Si verò genituram continens, non prægnans fiat, id quod multis contingit stomacho uteri præter naturam hiante, menses plures, quam cōuenit, & humidiores procedunt, vt & id, quod à femina prodit semen, ad fertificationem non cōcipiatur, & viri genitura insuper accedens corrumpatur: contingunt autem hæc, & corpore, & uteris ægrotantibus. Sed vitia hæc cognoscis ex colore alieno, substantia, & odore insuauis, plerunq; fetido, & ex totius corporis acuteri morboris signis. Vltimò tñ semen conspurcatur, & generationi efficit ineptū ex vitio alicuius præter substantiæ, qua feminae uterus scatet. Quod perpēdes ex superfluis uteri purgamentis, quorū meminimus lib. huius operis i. c. pen. ac ex vitiosis mensibus, vt ex Hipp. constat lib. i. de mor. mul. Reperies huius maligna, & causas loco super citato. Sed præter has causas aliæ insuper reperiuntur duæ genituram uitantes, nimirum seminis paucitas, quæ genitura non sufficiat,

*Semini
vitiosi
signa, &
curatio.*

ac uberrima, & immodica copia, quæ virile semen suffocet, & extinguat. A
 His sanè seminis vitijs medeberis primò aquositati, & ybertati ea lege, quæ
 diximus paragrapho de vteri humido intemperamento, omni videlicet exsic-
 cationis genere tam per victum, & potum, quàm per exercitia, balnea sulphu-
 rea, ac sudores, quàm per alia pharimaca huic vsui proficua. Cui vsui ferunt pro-
 batissimo experimento multi, conferre conseruam ex flore stachados, aut ex
 saluja, vel saluiam ipsam hortensem commasticatam. Reliqua verò, quæ hic
 defunt, reperiens varia quidem, & proficua cap. de sterilitate vitiorum. Crassiori
 verò, aut paucò semini medeberis per ea, quæ aduersus siccitatem proficua es-
 se nuper diximus, & ijs etiam, quæ omni arte corpus humectent, & yberius, ac
 tenuius semen gignant alimentis, balneis aquæ dulcis, & medicamentis, ac mul-
 tis alijs auxilijs, quæ referam cap. de virorum sterilitate. Corruptioni autem se-
 minis prouidendum est per ea, quæ membrorum principalium affectiones au-
 ferant, aut putredinem curent sanguinis detractione, purgatione, & meliori
 nutritione; tandem ijs, quæ per epicrasim corpus euacuent ab excrementis pur-
 gatione, sudore, fontanella, vt iterum corpus probò alimento reficiatur. Cuius
 sanè affectionis, & curationis meminit etiam Hip. lib. 1. de morb. mul. per hæc B
 uerba. Quibus porrò intus manet uiri semen, & computrescit, & turbationem
 facit, his triplicis semen, aut succum cum melle, aut cumino delinguendum
 dato. Et subdit apponendam esse portulacam cum adipe anserino, refertque id
 malum fieri à bilis, & sanguinis influxu, quorum ratione curationem instituit.
 Nam quodammodo diuersum videtur, & diuersam exposcere uacuationem fe-
 minam proprium semen corruptum uiuaturne effundere, aut uirile semen su-
 scepium, alioqui sanum uitiare corrumpereq; & ineptum generationi effice-
 re, ut Hippocr. sententia insinuare uidetur. Prouidendum quoque est uteri ex-
 crementis, siue biliosa sint, siue pituitosa, frequentibus totius corporis purga-
 tionibus, ut ex Hippocra. mente nuper retulimus, & rursus eorundem excre-
 mentorum diuersione per alia emunctoria, & per ea etiam, quæ uterum à præ-
 dicta spurcitia uindicant, quorum non paruam copiam cap. citato adduximus.
 Præter quæ omnia peculiariter uterum in hac causa purgant pessaria adducta
 à Theodoro Prisciano, quæ recipiunt opobalsami. 3. j. peucedani. 3. j. & scario-
 lochia 3. j. myrrha 3. j. aloes 3. j. croci 3. j. & medullæ ceruinæ, & adipis anse-
 rinæ, ana 5. j. & sex quibus fiant pessaria, quæ huic vsui maxime proficua expe-
 rieris. Deficienti quidem semini medeberis eo modo, quem docet Galen. lib. 5.
 simpl. cap. 23. Quæcunque (inquit) semen aut procreare, aut prouocare possunt
 bene nutrant, & flatuosa sint oportet, ut bulbi, cicer, fabæ, polypodes, quæ mul-
 ti seminis edulia sint. Et eodem libro, cap. 21. inquit; Seminis affectrices facul-
 tates sunt, ut lactis, partim medicamenti tantum, partim alimentis. In medi-
 camenti, cum succos pituitosos calfacientes in sanguinem uertimus: in alime-
 tis autem secundum totius substantiæ similitudinem. Quibus perspectis faci-
 le erit uitiosum semen emendare: & materiam, ac modum duobus cap. sequen-
 tibus abundè reperiens.

A De Sterilitate, quæ sit ad tempus. Cap. 4.



ST quidem præter dictas alia sterilitatis conditio, & natura, quæ neq; in omnibus feminis, neq; vtcunq; reperitur, sed quibusdam solum: neq; integra est, neq; semper, sed ad tempus tantummodo, qualem accidere feminis comperimus, quæ ante maturam ætatē, & perfectum tempus nubunt: aut post ipsum grandioribus iam fa-
 ctis, & penè senescentib. Alia etiam sub hoc genere continetur sterilitatis spe-
 cies ijs feminis succrescens, quæ pepererunt quidem, sed à primo partu aut se-
 cundo vel steriles remanserunt, vel quàm rarissimè concipiunt. Quamobrem
 vniuscuiusq; seorsum meminisse oportebit, vt uel præpediatur, quominus cui
 quam accadat huiusmodi malum, vel auferatur, si forte iam adest. Docet quidē Hipp.
 li. de lo. aqua & ac. inter reliquas sterilitatis causas, eam feminis esse potissimā,
 quæ ex immaturo coitus tpe proficiscitur. Nanq; nuptiarum tps uarij uariè qui-
 dē scripserunt. Inquit etenim Moschio græcus. Tanto quidem tpe, donec pur-
 gatione superueniente cum uiro coire possit, natura & matrix officia adimple-
 re, & representare uideatur. Plato verò 6. de legi. in fine specialius de hac re sen-
 sisse uidetur, dū in masculis à trigésimo, ad trigésimū quintū, in puellis à sexto-
 decimo ad uigésimum, id est, non minor sextodecimo, neq; ultra uigésimū præ-
 crastinandū. Sed hac in re nō laboro in ijs, q̄ causaliter euenire solēt, & rarò, sed
 solū mihi est in animo docere, q̄ nubūt ante tps ex arte, & natura præfinitū, qua-
 le sterilitatis periculū subeāt. Itaq; q̄ ante decimū quartū annū nubunt, q̄ termi-
 nus est in plerisq; legitimæ cōceptionis (sed, vt mihi ex Moschione verius vī,
 anteq̄ mēses prodeant) plerūq; aut nō cōcipiūt, aut debiles, & cū periculo abor-
 sus manēt: nā vteri os efficit ualde debile disruptis uasis & maximè cōcalfactis,
 præcipue si virile mēbrū magnū sit, & puella parua, aut uirile semen senile, aut ui-
 tiosum. Alijs quidē ex à uillata pudēdo situs uteri uitiatur, & ob id perpetuò ste-
 riles euadūt. Pari prorsus pēsu existimare oportet uirgines, q̄ uel morbo aliquo
 afficiunt, uel nimis valetudinariæ existūt. Quippe dū sic affectæ deuirginantur,
 nulli certè dubiū esse dēt, quin eadē mala succrescāt, q̄ eis, q̄ ante decimū quar-
 tum annū, aut menstrua nō fluxerūt, deuirginātur, accidere solent. Imbecille. n.
 superest vteri os, & uterus ipse totus, ut nec suscipere, nec cōtinere deinceps se-
 men possit. Præterq̄ q̄ sic affectis, ac valetudinarijs feminis, dū ea dispositione
 deuirginant, motu & calore, ac dolore uteri in coitu primò excitatis, totū id ui-
 tiosi humoris, quod in corpore abundat, facilè ad uterū allicit, & obstructio-
 num, febriliū diuturnarum, & maiorū malorū sæpe causa existit: cū plerūq; viro
 accedere nō possunt citra oris uteri dolorem, & iudicio nostro maiori ex parte
 steriles euadūt. Ceterum uirgines, q̄ factæ sunt grādiore, cōtraria prorsus rōne
 difficulter cōcipiunt, aut nunq̄. Rō sanè est, quia & uterus induratur, semen ui-
 tiat, ac menstrua mille modis à debito euariāt ita, ut omnino uideant esse steri-
 les, nisi menstrua ordinatè, & copiosè pcesserint. Quibus sanè sterilitatis causis
 pueniendū est: primò quidē utile existimo in puellis rarissimè seminā uiro acce-
 dere, postq̄ semel corrupta est, donec grādiior facta itegritatē, ac robur ex itēpe
 sua de uirginatione amissū adipiscat. Cui vitā insitues vel sedētariā, uel min⁹
 laboriosā: uictū itē optimū nutrimentū: atq; et pudēdū sperabis ablati mox a pri-

De steri-
 libus ex
 asate.

mo cōcubitu ijs, q̄ posse astringere diximus. Deinceps verò cum iterū uiro accessura est, abluat pudenda ijs, quæ remolliendi, laxādi & humectādi vires habeant. Post coitum autē adhibenda sunt emplastra roborantia, umbilico, & dorso, donec grādiior, & robustior facta, viri accessum citra noxam ferre possit. Verum tñ de valetudinarijs fœminis vulgariter fertur, nil esse illis vtilius ad valetudinem recuperandam, q̄ viro committi, & sic multæ deceptæ falsā opinionione, in pericula, q̄ nuper diximus, deciderunt, malo præexistenti, nō curato. Qua in re certum esse scimus, q̄ si affectiones, quas fœmina patitur principium fortiantur à semine vel sanguine menstruo retentis aut vitiatīs, nullum aliud p̄stantius p̄sidium reperiri constat. Quippe hac via expurgatur vterus, & immunitis superest ab affectionum, q̄ præerant, causis. Verum si ob iccoris, splenis, vel totius corporis vitium fœmina laborarit, tñ abest, vt coitu leuetur, q̄ potius nō uo malo in vtero (alioqui sano) facto, euocatis ad ipsū agitatione illius actus humoribus, grauioribus efficiantur affectiones, quæ præexistebant, vt experimēto plerunq; didicimus. Si tñ fors tulerit, & aliud fieri non possit, consummato matrimonio abstinendum est a viro, donec in pristinam sanitatem restituta innoxie possit uiro accedere: ac si qñ accedere velit, purgato corpore uel aliter p̄munito, faciat. Grandiores verò fœminas alio modo tractare oportet: nā balneis aquæ dulcis calidæ menses euocandi sunt, inunctionibus, fomentis, & infusionibus, ac deniq; ijs omnibus quæ prodesse succo ac duro vtero dictum est, adhibitis etiam pessarijs, quæ mediocriter emolliant ac purgent, & quod corruptū, ac vitiatum est, expellant, admittantq; & amplexentur virile semen.

De ijs,
qua se-
mel pe-
pererunt
& steri-
le: sūmā
sumi.

Non minus p̄fecto negotium facessit ea sterilitas, quæ fœminis, postquā se mel peperunt, succrescere solet: maximè cū fœminæ corpus primo accessu sanū videat. Inquit. n. Hip. lib. de steril. Cuicunq; verò stomacho recto, & molli, & sano, & probè habente, & in debito loco sito, menses non apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani morbum perscrutati, quem vteri habent, & an corpus et aliquid conferat, comperies cām à qua prægna nō fiat. Quod si affectum aliquem compereris huic p̄sto esse oportet, ne affectio verustior facta, difficilius curetur. Sed clarius adhuc huius affectionis Hip. meminisse constat li. i. de morbo mul. per hæc verba; Si mulier parere nequeat, q̄ prius peperit, nitrum, & resinam, & myrrham, & cuminum æthyopicum, & vnguentum simul terat, & apponat, aut pulegium siccum in linteum subdat: bibata aut pulegium, vbi dormire volet. Sed rōnabilius p̄fecto eiusdem affectionis meminisse li. de steril. dicens. Quum aut mulier nō conceperit, prius concipere solita, vteri verò viri genituram in se ipsis suscipiunt penitus, necesse est mulierum ferosā hāc facere: quandoq; n. in vteris pus innascitur: pus aut in vteris à tuberculis fit, & sanè ob hoc genitura viri, qñ cū viro coit, vteros nō cōtingit, quò videlicet ipsa viri genitura compingatur: nā pus ipsam dissipat, ut ne afferatur: mortificat. n. pus, & putrefacit genituram. Proinde, & pus ex vteris expurgare oportet, & tuberculum in vtero sedare: quò de cætero ne impediatur genitura cōpingi ac afferri: festinate itaq; oportet ad expurgādū prius quā pus in vteris in callum concreascit. Qua p̄culdubio snā enarrare vī vnam peculiaremq; huius vitij cām. Si tñ quis rem diligentius pensaret, multo plures reperiet causas, quibus q̄ semel peperit fœmina, amplius parere non possit. Quippe contingit sæpe

id

A id malum cā defectus naturalis, qui vel ex morbo ac vitioso apparatu contrahitur, aut natiuus illi inest, haud paucas etenim reperies foeminas, quibus solum sufficit ad sterilitatem semel peperisse, et si partus laboriosus non fuerit: tanta proculdubio est in quibusdam naturalis compositionis tenuitas, & potentiarū, vteri imbecillitas, vt satis illi sit, nouē mensibus vtero gestisse, vt super sit ab hoc labore vterus ad eō imbecillis ac labore defessus, quod deinceps minimē possit amplius concipere, nec si concipiat, diu fetum continere. Quod sanē malū feminis praestantioribus, & illustribus, & ijs, quae in otio vitā degunt, frequēssimē accidere cōspicimus. Idq; certissimē est viū, qđ in Scytharum foeminas reiecit Hip. de lo. aqua & ac. & subdit hac rōne earū ancillas, & q̄ laboriosam vitā agunt, frequentius concipere. Hanc quoq; sterilitatem patiuntur foeminae, & eā cōmonstrant, quibus lac in māmīs diu durat: quinimo cenleo eam foeminā nō esse concepturam toto eo tpe, quo lac in mammis extiterit, & fortasse in his signum erit cōceptus, si menstruis deficientibus, lac quoq; ē mammis euanescat. In hanc pariter sterilitatem delabuntur foeminae, quae difficulter pepererunt: nā ex laborioso partu credibile est ijs, quae admodum robustae non sunt, uterum ad eō affici, labefactari, distendi ac dilacerari, vt praē lassitudine deinceps cōcipere nō possit, aut quā rarissimē, vt plerisq; contigisse scimus. Pari itē rōne alijs ex abortu idē malum succrescit: nā cū magis in abortu, q̄ in partu laboret natura, maiusq; inferatur in uterum damnum ex ligamentorum ante statutum tempus disruptionem: faciliē vterus eā dispositionē nanciscitur ab extensione, & molestia, quae nequat amplius vel tā citō, ad pristinum officium redire, ac semē continere, & concipere. Alijs quidē eadem sterilitas succrescit ex mortuo fetu: nam p̄ter laborē, quē veluti in abortu patiuntur, accedit insuper distemperies conspurcata ac fœda, quā de mortuū fetū posse ob viciniam vtero mutare credibile est: bene tēperatum. nā ad concipiendū debere esse vterum, Hipp. testatū reliquit. Sic proculdubio idē contingere scimus ex vteri mola: nam aut deinceps immodicus vteri flatus succrescit eō q̄ vasa dirupta permanserunt, aut nimia mensium suppressio obstructis venarū osculis ex crassa materia, q̄ molle p̄stiterat principium. Verūm praeter has oēs causas, hanc vnam omni partui laborioso vel abortui cōem esse cenleo, nimirum, vterum, aut eius collum vel retrahi, vel torqueri, vel quauis alia deprauata figura affectum superesse, aut fortasse prolapsū ita, vt amplius concipere nō possit, ni prius ad pristinam sedē reducat. Itē aliud quoque his ferē oībus cōe est, vt coxarum, ossis sacri, & dorsi, quibus vterum alligari fertur, in laborioso partu seu abortu articulationes ita extensa, aut a propria, & natua sede prolapsae supersint, vt minimē vterus deinceps cōceptionis officio fungi possit. Quae sanē oīa sicuti, & varias distēperies, q̄ vtero ex his causis succrescunt, considerare opus est, si uelis sterilitatem remouere.

Imprimis si foeminae natua constitutio delicatissima fuerit, ita ut p̄ uno partu deiecta vterus nequeat amplius cōcipere (vt Hip. scripsit li. i. de morbis mul. dicēs: Si verō nō cōcipiat, vteri autē sani sint: contingit. n. & hoc plerisq; cū debiles existentes vteri ab affectione macilenti fiunt, aut praē medicamentis, & fomento multo geniturā ferre non possunt, priusquā assueti fiant, & conualescant) id diligenter nosse curabis: quod etiā loco nuper citato dixerat Hippo. per haec verba; Hoc autē sic cognosci potest: cū ab ipsa exierint, secunda, aut tertia die exeunt,

exeunt, aut adhuc prius crassa, & compacta uelut mucus, nisi mali quid sit, & A
 propter alium uterorum morbum genitura discedat. Quum igitur talia appa-
 ruerint, curatione quidem uterorum non est opus, uerum reliqui corporis cu-
 ra habenda est, quo huiusmodi bonus habitus sit ipsi, aut contractum simul sit
 corpus, & iuxta mole praeditum, & paucorum balnearum, plurium uero, &
 leuium laborum usu. Quibus sane uerbis, & alijs, quae sequuntur, ut huius oc-
 casionis uniuersam providentiam complexum fuisse. Quamobrem ab hoc pre-
 cepto sumpto initio solidioribus cibis, uino, & largiori exercitio curandum est
 habitum reficere, & solidiorem reddere, adhibitis quoque utero, & lateribus
 eius emplastris, quae ipsum roborent, qualia sunt, quae pro matrice uulgo ex-
 runtur, ea maxime, quae temperata, & modice astringentia fuerint, qualia addu-
 ximus c. de uteri imbecillitate, & lib. 2. huius operis mille in locis. Neq; alia au-
 xilia utero adhibenda sunt, ut Hip. consulit, sed ea tantum, quae robur addere
 nata sint. Curandum praeterea est, ut frequenter foemina uiro non accedat, sed
 post aliquod grande interuallum, ut uterus ad antiquum robur restitui possit:
 nam sic auidius genituram complectitur, conficit, efformat, ac retinere oaleat ro-
 bustiore facto utero emplastris, & praedicto uitae modo. B

Verum si ex laborioso partu, uel abortu sterilis supererit foeminas, coniecta
 dum eo tempore est, an figura uitium aliquod contraxerit uterus, uelut est p-
 lapsio, aut a propria sede contorsio, uel in aliquam partem inclinatio, quod ex
 tumore, ac dolore partis, cui incumbit, facile percipies, ut frequenter ex Hipp.
 mente retulimus. Cui sane affectioni medebris per ea, quae diximus c. de uteri
 procidentia, sed specialius per ea, quae huic usui scripsit Hip. li. de nat. mul. di-
 cens: Si puerperae uteri in coxam incubuerint, aut ad laterum mollitudinem, ad
 sanam coxam oleum Aegyptium album, aut bacchari unguentum, apponere
 oportet, & in sanam decumbat, & peoniae g. v. bibat, & fructus sambuci, & ca-
 storei magnitudine fabae uino postea lota suffiatur. Qua sententia constat quibus
 medicamentis utendum sit in huiusmodi affectibus. Verum si ex disruptione,
 lassitudine, & tensione ipsius uteri sterilitatem prodire comperiamus: quae astrin-
 gendo roborant emplastra adhibenda sunt, qualia ca. de uteri imbecillitate ad-
 duximus, & dicturi sumus cap. de partu laborioso.

At quia plerumque accidit ex praedicto labore adeo imbecillitari uterum, ut C
 copiosa susceperit, aut aliunde trahat excrementa, ita ut mutata propria temperie,
 & natura, uel humiditatibus abundet quantum sat sit, ut concipere deinceps
 non possit. Huic curationem institues per ea, quae adduximus praeced. cap. insti-
 tuentes curationem humidi uteri, & frigidi iuxta qualita:em, quam praedomi-
 nari cognoueris.

Veruntamen si dearticulationem aliquam dorsi, ossis sacri, aut coxendiculi a
 partu, uel a casu, ictu, percussione, animi pathemate uehementi, uel quauis alia
 occasione foeminam perpeti comperias: ad cataplasmata, & emplastra confugien-
 dum est, qualia sunt, quae ex terebinthina, resina, & pulueribus calidis apud uul-
 gares obstetrices frequentissime reperiuntur. Ante tamen quae adhibeas, curandum
 est dorsum iuxta renes, & os sacrum prius blandis medicamentis emollire, & cal-
 facere, ut proprius luxatae partes, uel extentae cataplasmatibus cedere possint. Ap-
 pellant autem uulgariter huiusmodi blandum praesidium seuatum, quod maiore
 seui

A ſeni portione cōſtet. Efficitur probatiſſimum, & multis ſcēminis proficuum id, quod recipit carycarum pinguium 3. iij. daſtylorum ſine oſlibus 3. v. florū lauē dulcē p. ij. ſepi renū capri lib. ſ. radicū althēæ coctarum, & piſtatarum, 3. x. fecis ceræ lib. l. bulliant oīa in li. j. vini albi ad uini conſumptionem, & facta colatura, adde ſepi arietis liquefacti 3. vj. & fiat ceratum, cuius infima pars, quæ attingit os ſacrum, ſit amplius ſuprema. Quo ſanè vtendum eſt octo, aut duodecim diebus ante cataplaſmatis adhibitiōem, cuius prima deſcriptio recipit picis vtriuſq; terebinthinae ana 3. j. galbani, ſerapini, ammoniaci, myrrhē, maltichis ana 3. iij. cinnamomi, nucis ana 3. j. ladani depurati, opopanacis, ſarcocollæ, ana 3. iij. ſanguinis draconis, pulueris myrtilorum, coralli, roſarum, gariophyllorum ana 3. j. croci 3. ſ. fiat cataplaſma. Efficiēs tamē ex eiſdem rebus aliud efficacius, ſi omnia hæc aceto ſerbuerint, poſtea facta colatura omnia reiecto acetō coquantur, donec fiat emplaſtrum. Item aliud cataplaſma utiliſſimum conficiēs, quod recipit maſtichis, cinnamomi, nucis, belzoini, pulueris ligni aloes, gariophyllorum, ſanguinis draconis, pulueris granæ, ana 3. ſ. ſuccini 3. j. ambrae muſci ana g. vj. terebinthinae quantum ſufficiat vt fiat cataplaſma. Vmbilico et appones id emplaſtrū, quod recipit pulueris ligni aloes, nucis, gariophyllorū, ſuccini, & granæ ac roſarum ana 3. ſ. muſci, & ambrae ana g. x. ladani, picis, & ex tecamacha quantum ſit ſatis. Huic etiam vſui non parum confert ſuſſumigium, quod recipit ladani depurati, ſtyracis ana 3. ſ. gariophyllorum 3. j. conterantur in mortario lapideo cum piſtillo calido, & aqua roſacea, ac fiat paſta, ex qua poſt menſtruam purgationem ſuſſumigium ſuſceptet ſcēmina, & mox zibeto, inungat os vteri. Tandem curabis omnia arte antequam hæc adhibeas, ſi quid luxatum apparuerit, ad priſtinum locum reducere ſubleuata vehementer cure ſupra partem, quam exiſtimaueris dearticulatā eſſe. Ac ſi quodammodo diuulſa videatur alicuius partis dorſi caro, coniungere articulationemque roborare prædictis cataplaſmatis opus erit, donec citra dolorem, aut moleſtiam ſcēmina proprijs munijs fungi poſſit.

C Quod ſi ex ſortu mortuo deterrimam aliquam ſpurciſſimam ac ſcēdam qualitatem nobis compertū ſit vterum contraxiſſe; theriacæ vſu, mithridati, tum per peſſaria, tum verò exterius rem agere tutum erit: ſicut per metranchitas eadem liquata in vterum immittere. Cui vſui proficua ſunt odorata omnia, quibus vterus delectetur, & ad natiam temperiem reducat. Cuius indicationis gratia vteri regionem inunges oleo naphthæ, ſaſminorum, de ſemine angelicæ, de ſtyrace, ballamo, & alijs, quæ odoratiſſima ſunt, cauentes ne nares huiusmodi odores perſentiſcant, ne vterus ad ſuperna irruat.

Si verò molam id viſū præſtiſſe certum ſit, iuxta affectus, quem in vtero relinquit, naturam, & conditionem auferendam eſſe ſterilitatem cenſeo; nam ſi ſanguis immodicè fluxerit, eodem prorsus modo ei medeberis, ac dictum eſt cap. de menſtruorum ſuore: ſicut ſi ſuppreſſio pari penſu ac de reliquis vitijs, quæ vterus contraxerit, intelligendum eſt.

De

De virorum sterilitate. Cap. 5.



NON quidē minus virorum defectu per plures sēminas prole orbata reperies, sed forsitan magis, licet vulgari errore decepta se plerunq; steriles iudicent, & accusent, & mille praestigijis premant gratia pacādi viros: qui cū infēcundi, & ignaui sepius existat, in vxores omnem culpam reierunt. Fiunt itaque viri steriles multis de causis; prima, ex genitalium partiū ignauia: secunda, propter vitiatam figuram: tertia, propter seminis vitium aliquod, quarta ex vitio excretionis, quippe nonnulli ocus quam par sit, semē excernunt, quo fit vt virile detumescat & coire minimē possit: quinta verō, & vltima, ex totius corporis, vel partis principis impotentia, ob morbum, aut caloris defectum. Quibus sanē omnibus aut coire probē nō possunt, aut si coeant, semē nō emittunt, ac si emiserint, inutile est & inane, ita vt nullā in eius emissionē delectationem persentiant, quod non leue solet esse generationis impedimentū.

De genitalium ignauia

Est sanē genitalium ignauia impotentia quēdam ad rē veneream exercendā, quamvis ea vti cupiant. Quam proculdubio affectionem, symptoma esse cōstat in genere noxae functionū naturalium ac eiusdem pudendi propriē abolitarū: quippe hi neq; in veneream promptē ruunt, neq; etiam si conētur, ob genitaliū ignauiam atollere possunt, neq; nullo ingenio efficere, vt distendantur. Quibusdā quoque accidit, vt tamen virile arrigant, leuiter ac molliter id efficiunt, & mox in sēminē accessu substat, & collabitur semine ocysime citra delectationē emissō, vel excreto flatu per intestina haud secus: quam senib. in contingit, quibus protinus pudendum detumescit, flatu excreto; quoniam cum comprimeretur a flatu in recto intestino, exire nequibat spiritus expunēdo, & perstabat tentigo: quod locus reddebatur angustior, quo dilatato, tensio cessat.

Causa.

Accidit quidem plerunq; inter alias causas viris hoc impotentiae genus vel ex totius corporis mollissima carne, & pinguedine, quae effeminatam reddat neruosam pudendi substantiam, vel ex pudendorum resolutione, ac veluti paralyti; item ex seminis paucitate, & tenuitate: vel ex maleficio admodum, quem cap. praecedenti adduximus, cuius hac in parte non meminero, quod satis sint, quae illic retulimus, item si semē ocysime procidat, id fieri constat, vel seminis tenuitate, vel flatus defectu, vel uiarum laxitate. Atque praeter uitia quae in genitalium intemperatura simplici vel composita reperiuntur, alia itē cōperimus quae illis ut instrumentalia sunt membra, insunt, uelut obstructio in uasis seminarijs, qua fit ut semen eiaculari non possit. Sic, & ex defectu spiritus vel flatus, quos dissipat uel multus calor aut insigne frigus constringit, uel animi nimia distractio uel negotiorum detentio. Item licet flatus sint, colicis aut uiarum eius obstructio, distorsio uel compromissio id malum efficit. Vltimō tamen ex mille alijs corporis uitijs, quae paulō inferius referam.

Signa.

Dignosces uitio totius corporis fieri ex habitu obeso, & molli, ac uita crapulis, & otio dedita. Seminis uerō uitia signis non egent alijs, praeter ea, quae superius praecedentibus duobus cap. scripta reperies. Fieri pudendorum defectu, & mollitie narrabit ipse laborans.

Ve-

A Verum si ex iecoris vitio malum oriatur, ex proprijs particulae symptomatis deprehendes, & ex totius corporis vitioso colore referente sanguinis vitium. Si vero id ex defectu cordis, & spiritus ortum, habeat, pusillanimitas, ac timiditas id facile ostendet, sicut totius corporis frigiditas, vel pulsus parvus, debilis, & rarus. Tertium vero, calidum vel frigidum, aut quoduis aliud intemperamentum facile discies ex signis quae Gal. 2. theg. abunde scribit: quamobrem breuitati consilens subitico: praeterquam, quod semen ipsum excisum id facile monstrat, ut superius diximus. Flatus autem defectu cognosces, primo quia nulla apparent signa reliquorum affectuum, & quia nulla fit penis erectio: secundo quia plurimum profunt auxilia quae flatum generant: item ab excessu intemperanti, cum flatus a diminuto fiat calore solum.

Cui sane affectioni medeberis, si ex obeso molliq; corpore originem traxerit, per solidiores cibos, per laboriosa exercitia, per frequentes, ac duras frictiones: per victum et, & potus parsimoniam, qui sit vel vinum, uel aqua ex decoctione cinnamomi, anisi, dauci, vel radices chinae, aut similacis asperae. Purgabis item corpus per aliqua interualla medicamentis, quae primam regionem a crudis recrementis liberent. Tandem sudoribus ex ligno guaiaco, vel balneis sulphureis, quod magis probo, maiorem negotij partem committes: nam & exsiccant, & roborant, ac macrefactioni, & carnis soliditati aptissima sunt. Sed antequam peculiarem curationem aggrediar expendisse oportet ea omnia auxilia, quae venerem augent, in duplici esse differentia, quippe alia seminis abundantiam praestant, alia uero ipsum prouocant quod iam genitum est, propter quae et alia reperiuntur, quae flatum generat, erectioni pudendi maxime idonea: nam veneris appetentia frustra insurgit, nisi membrum genitale erigatur, quod fieri flatu, & spirituum copia antea diximus. Quae sane omnia siue medicamenta siue alimenta sint ut Gal. placet 6. de locis aff. c. 6. & 5. simpl. calida, & flatuosa esse oportet, maxime vero, si semine humore abundant, ut eodem simpl. idem Gal. explicat. Denique primo expendes natura ne insit coeundi impotentia, a cuius curatione, prudenter desistes, praeterea an ex obesitate: item ex defectu caloris, & vitalis spiritus, tandem colis iactura, & paralysi, an ex obstructione vel seminis aut flatus spiritus defectu, & iusta cuiusque harum causarum, quas retulimus, rationem curandi institues.

C Si seminis paucitate id malum accidere conuerias, reueres in testium, & uasorum seminalium refrigerationem, sicut caectionis defectum ad molliem, & relaxationem fistulosi nerui collis, ut ambo haec vitia simul complectar, & cure. Quippe ad testium refrigerationem sequitur seminis paucitas, & aquositas, ac flatuosi spiritus, inopia: nam copia ex diminuto calore potius quam frigidityte prodit, ad nerui et fistulosi laxitatem sequitur impotentia erigendi pudendum: quo fit, ut sic affecti neque arrigere, neque semen expellere possint. Causae proculdubio sunt, quae infrigidare, & humectare possunt testes, colic, & uasa seminaria, uelut otium, & nimia ventris pinguedo, siue omenti moles: potus aquae frigidae, usus medicamentorum refrigerantium, qualia in testium, & renium inflammationibus ad mouere solent Medici: Sed propter dicta pauci seminis signa, accedit quoque id excerni cum animi deliquio, & facultatum animalium euidentia noxa. Eius autem frigiditytem cognosces ex tenuitate, aquosa substantia, ac infecunditate. Nerui quidem fistulosi laxitatem deprehendes, quia sic affecti semine emittunt sine erectione, tamen veneris appetentia excitata,

*Curandi
ratio.*

citata, & modica tentigine perſentita. Horum aut̃ omnium curationē inſtitues per ea, quæ ſemen generant: quorum natura calida exiſtit, licet non plurimum humida tñ, & flatuoſa, velut ſunt cibi, qui optimè nutriant, calfaciant, totisquẽ ſubſtantijs familiares exiſtant, dummodo ſiccitatis nihil obtineant: quippe talia ſemen interdiciunt, quemadmodũ dixerat Gal. 4. ſimpl. 2. præſertim ſi eis flatuoſa conditio accedat. Sed ſunt prædictæ naturæ bulbi, cicer, fabæ, nux pinea, paſtinacæ radix, rapa, porri, horminum, aniſum, fœniculum, amygdalæ dulces, polipodes & concharum genera, uua recens, & erucæ ſemen tritum cum vitellis ouorum, uinum odoratum. Poſt quæ alimenta infernas corporis partes exerceri conuenit, & rursus ad alia, quæ uenerem excitent confugere. Proſunt quidem denorata fruges cum lacte, præſertim fabæ, hordeum, dactyli pingues cū lacte, vino, & cinnamomo: itẽ columborum carnes, anatis, pudicis, turturis, ſed præcipuè anſeris lingua, teſtes et̃ gallorum, & aliorum animalium, quæ comēſtilia ſunt. Quæ quidem in puluerem reducta proſunt: quorum ſuſcipe 3. j. galangæ, piperis longi ana 3. j. & ſ. ſacchari ad pondus omnium fiat puluis, cuius manẽ laborans cū vino ſumat 3. j. Cæterũ hic tacendum non eſt fœniculũ quomocunq; hauſtum pudẽdis eſſe amiciffimum: ſiue ad fouendum radicẽ cum uino cocta, ſiue ad illiniendum eadem cum oleo trita. Præterea expende, quod ruta, & mentha uirides ex Hipp. & Gal. ſententia ſtatus, ac veneris pruritum excitare ſolent: ſiccata uerò uel frixa, & præcipuè ſemina eoſdem diſcutere, ac veneris impetum compeſcere, ſeminisq; profluuium gonorrhœam nuncupatum ſiſtere. Sed ad inſtitutum redeamus. Præſtat quoq; multorum decreto ſucus pulmonis arietis aſſi, puluis ex genitali tauri cum ouo ſorbili in paruiffima q̃tate, q̃ de ſtercore accipitris et̃ ferunt, puluis de oſſibus pedis hirci, vel de teſta teſtudinis, lac item. Prodeſt meliſſa, pulegium, oeymum, fatireia, urtica, fœniculum, qua lege dictum eſt, ſumptum, acori radix, alliũ, cepa, enula, ſatyriõ, napi, raphanus, & ſemina omnium. Valent itidem composita plurima, uelut eſt illud, qđ recipit ſeminis erucæ, pulueris pudendi tauri, & teſticulorum vulpis ana 3. j. galangæ, & piperis longi ana 3. j. zingiberis, & cinnamomi ana 3. j. caudæ ſtyncorũ 3. j. fiat puluis, cuius modicum ſumat laborans in ouo cum it dormitum. Aliter conficitur, ſi exceperis ſeminis erucæ, ſeminis urticæ, ſatureiæ, teſticulorum uulpis ana 3. j. & ſ. caudæ ſtyncorũ 3. j. cum cerebellis paſſerum conſice pilulas, quarum laborans capiat 3. j. Sed utiliſſimam parabis confectionẽ, q̃ recipit ſeminis erucæ, urticæ, aniſi, fœniculi, & paſtinacæ an. 3. nucis pineæ: amygdalarum dulcium ana 3. ij. piperis, cinnamomi ana 3. j. ramenti genitalis cerui, & ſatyriõis ana 3. j. diambra, aut diamuſci 3. j. ſacchari diſſoluti in aqua meliſſophylli quantum ſit ſatis, ut fiat in morſulis. Vuliſſimum aliud parabis, q̃ recipit ſatyriõis lib. ſ. dactylorum 3. iiij. zingiberis conditi, iuiubarum ana 3. iiij. coquantur in lacte ouillo, & piſtentur: tandem accipe teſticulorum gallorum, & uerris ana 3. ij. cerebrum columbauũ, & paſſerũ 3. iiij. cerebra hæc, ac teſticuli in lacte coquant, & cum modico butyri recentis quodãmodo frixa parentur additis vitellis ouorũ tribus: demum accipe mellis deſpumati lib. ij. ſacchari tantundem, mel, & ſaccharum ſimul coquantur leuiter comiſcendo omnia, q̃ prædiximus, qbus facta coctione, addes pulueres, qui recipiũt pudẽdi tauri, ſeminis erucæ an. 3. ij. galagæ, zedoariæ ana 3. j. cinnamomi 3. v. piperis longi, ſemi
nis

A his fraginæ ana 3.ij. seminis mercurialis & maluæ ana 3.ij. medulle nucis indicæ, pinearum mundatarum, fisticorum, amygdalarum dulcium ana 3.ij. quibus vel minutim incisis cum prædictis admiscebis, & summo manè bolum ex his magnitudine castaneæ præbe. Quæ sanè omnia ea prudentia, & moderatione adhibebis, qua finem consequaris citra alterius mali interuentum, vt multis enenire assolet, qui sterilitate non curata, nouum affectû veluti manu faciunt.

Verum inter reliquas compositiones, probata maximè est, quæ recipit testiculorum vulpis decoctorum in hidromelite 5.ij. contulis adde pinearû, & auellandarum in paucò lacte & melle infusarum, vbi leniter ferbuerit ana 5.ij. carnis leutræ, stercoris muris, moschi ana 3.ij. cum syrupo, cortice, & conserua citræ fiat opiata. Cæterum efficacior, & utilior exiit, quæ recipit corticis citri, zingiberis viridis ana 3.ij. conseruæ eryngij 3.ij. carnis leutræ 3.iiij. testiculorum vulpis, vel pudendi eiusdem, & tauri ana 3.ij. pulueris diamusci 3.ij. cum melle fiat opiata, cuius porridge magnitudinem auellane parum ante egnam, superbito modico vino.

B Cui consimilem vsum præstant renes styncorum, cæterum veteri ad nos non asportantur, neq; apud Venetos adhuc reperiuntur. Præstat quoque cibus, qui profectò peculiare est huius mali beneficiû, si receperit oryzâ, ablutam & remollitam in lacte die ac nocte, coquatur in aqua, & oleo, & sanguine gallinarû vnico feruore, & paulatim bulliat deinceps, donec integrè coquatur, & postmodum adde zingiberis, erucæ, piperis longi ana g.x. sacchari quod sufficiat, vt gustui gratum fiat. Sed præstat non minùs cepta cum ouis, & butyro frixa, castaneæ ex corticata decocta in iure gallinæ primò, & postea in lacte cum zingibere, & eruca.

Pudendo quoque robur addit & firmitudinem, maximè dum laxum fuerit, inunctio circa ipsum, & partes vicinas facta ijs, quæ calfaciant, & exsiccant, velut est oleum, cui adiectum sit radicis narcissi parum, cocci gnidij, seminis vrticæ, pyretri aut viticis, leporis item coagulatum, aut leonis adipem pudendo illitum: deinde aliquot piperis grana cum tragacanthi succo trita, quo postea testiculos, & interapedinem inter anum, & pudendum ac lumbos illinito, præcipue addita leonis pinguedine, vel oleo ex semine aut radice angelicæ. Cui consimile parabis, si exceperis olei liliacei, mastichini, de castoreo ana 5.ij. adipis leonis 5.ij. piperis, pyretri, cypeti, myrrhæ, ac sulphuris viui ana 3.ij. moschi g.iiij. cum cera fiat vnguentum, quo lumbi pudendum, & testes vngantur. Simili ratione iuuat pedû plantas inungere oleo, in quo cyperus, & synapis ferbuerint, vel oleo sambucino, & vulpis cum pyretro, addito musci momento. Conficies

C vtile aliud si in oleo formicarum, & maximè volatiliū duo oua ferbuerint, cuius olei postea recipe 5.ij. seminis erucæ, cepæ ana 3.ij. & leuphorbij, castorei ana 3.ij. ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum molle.

Aliud itè vtilissimum paratur, quod recipit axungie vulpinæ, succi erucæ ana 5.ij. testiculorû vulpis 3.ij. coquatur ad consumptionem succi, & colentur: Cui adde lento igne ceræ 3.ij. seminis cepæ, baccarû lauri ana 3.iiij. quibus fiat vnguentum. Sunt præter hæc omnia alia non pauca, quæ venerem excitant, inter quæ summopere commendatâ reperio inunctione, quæ recipit olei castorei, & de nucis indicæ ana 3.ij. olei musci 3.ij. castorei, euphorbij an. g.x. muschi 3.ij. alyptæ muscatæ 3.ij. & ceræ quantum sit satis, vt fiat vnguentum, quo manè vngantur plan-

plante pedum, regio pubis, renum, & perinaei, quo facto, parum galagae ofema
sticando detineatur aliquando verò sumat laborans castaneas decoctas cū dacty-
lis, & eruca, ac bulcos etiam cum melle, & sinapi. Ad quorum rationem, & mo-
dum alia pleraque effingere poteris huic vsui idonea. Verum si semē ocysimē
plabatur laxitatis viarum ratione, balneis sulphureis vteris, vel sudoribus ex
guaiaco, aut radice chinae, & aliquo ex praedictis, testes, & pudendi radicem
inunges. At si flatus defectu vel seminis tenuitate id vitium fiat, ei medeberis,
hic quae crassos succo gignere possint, qualia superius abundē diximus.

*De pu-
dendi fi-
gura.*

Secunda sanē sterilitatis causa ex pudendi virilis figura proficiscitur: nā aut
nimia paruitate debitum vteri locum non attingit, quod vitium remedijs cede-
re nequit: aut longiore extensione, & magnitudine ipsum praetergreditur, ex
quibus causis tria vitia proculdubio subsequuntur. Primum, quod semen, vt
Avice. fatetur, in longissimo itinere vitatur, quod proportionatum requirat
a testibus ad vterum spatium. Secundum, quod foemina minus delectatur, si
locum, vbi tiillationem perferent, praetereat pudendi caput. Terium, verò
eò quod improporionatum, & quodammodo dilaceratum, dolore, & mala
figura affectum relinquit vteri collum, ita vt proprium semen, & foeminae vte-
rum sterilitate afficiat. Cui sanē vitio nullum aliud adinuenies praesidium,
quam quod pudendum totum foemina non suscipiat. Quibusdam etiam adeo
in altitudinem turgit pudendum, & extenditur, vt foemineum receptaculum
ipsum capere non possit citra euidentis nocumentum: quod non minus imme-
dicabile existere arbitror. Verum si ex tortuositate obligamentorum breui-
tatem deprauata figura accadat, vel ligamentum abscinde, vel mollioribus la-
xa pharmacis.

*De semi-
nis vitio.*

Tertia verò causa ad seminis vitium referenda est: quippe aut vile semē fer-
uidum, & veluti torrefactum existit, aut frigidum, tenue aquosum, & langui-
dum, quale decrepitorum est, vel crassius quam oportet, emittitur: vel parcius
aut copiosius, quam par sit. Sed quia plerumque haec vitia proficiscuntur, vel vi-
tio totius corporis, aut partis alicuius praecipue: ob id illarum omnium eorum
meminisse oportebit, si prius dixerō non raro etiam prodire testium affectorū
occasione. Sic etenim ex peculiari eorum calore semen vritur, & concrefcit ari-
ditate, ita vt ineptum prorsus generationi reddatur. Alio autē modo ipsum vi-
tiatur testium abscessus, vel simile quidpiam: sic & vlcus factum in calculi extra-
ctione, aut herniae curatione. Praeterea testium frigiditas modò ex natura sit,
modò ex senectute, id malum quoque efficit: sicut quoduis eorum iam factum,
& habitabile. Quorum omnium nouitiam ediscere oportet, vt iuxta cuiusq; in-
digentiam auxilia adhibeantur, quae vel calidos testes moderentur, vel frigidos
calfaciant, & sic de singulis causis, quarum praesidium adinuenire facillimum
erit, si expendaris quae hucusque tam copiose dicta sunt.

*De vitio
corporis,
aut par-
tis prin-
cipis vi-
tio.*

Cōtingit proculdubio maiori ex parte viris sterilitas ex aliquo totius corporis
vitio, vel naturali, aut nō naturali impotētia ob impēsum aliquod in tēperamē-
tū, vel morbi gallici accessum, quorū ratione nullū, aut infecundū, vitiosum, ac
inutile semen gignunt. Item ex nimia obesitate, quae, & viros, & foeminas infecū-
dos plerumque efficit, quod quidē euidentissime ex Arist. probatur lib. 1. de gen-
ani. c. 18. cum ex professo doceat, pinguedinis, & seminis eandem esse materiā:
quo

- A** quo fit, vt minus fecundi sint, qui multā coacerbant pinguedinē, quā tm̄ illis de semine deest, quantum pinguedinis abundat: Arist. verba hæc sunt; Hominū nonnulli, vbi per habitum corporis bonū carnulenti; aut pinguiore euaserint, minus semē emittunt, minusq; rem venerēā expetunt. Et paulō post, viri et mulieresq; pingues minus fecundæ esse, quā graciles vidētur, qm̄ in vegetioribus excrementum cōcoctum transit in pingue. Refert et lib. 2. de gene. ani. cap. 19. Pingua minus seminis habent, quam macilenta, præter quam, quod penis breuior efficitur. Itaq; ratione optima fit, vt cū materia superuacua consumpta in pinguedinē sit, deficiat genitura. Cui etiā dogmati Plinius his verbis assentitur. Steriliora cuncta pingua, & in maribus, & in fœminis, sic quidē castrata animalia pingua sunt, quia seminis materia in pinguedinē abit. Quamobrē in his potissima curandi ratio erit ipsa corpora macrefacere, & exercitijs dare, ac sudoribus, & balneis, vt consumpta pinguedine postmodū vxoribus dediti, seminalē materiā ad testes, & vasa spermatica euocēt, vt copiosius fiat deinceps semen. At ex alicuius partis principis graui aliquo affectu steriles fiūt, vt de testiu morbis dictū est: sic si in cerebro epilepsia, vel quouis alius affectus præsit, qui magnam inferat nervoso generi, aut reliquis particulis imbecillitatē, steriles fieri viros conspiciamus. Pari p̄su iecur, ac vētris os, & tandem oīa membra, quæ aliquod habent officium reliquis partibus proficuum, & necessarium, si grandi affectu, aut habituali corripiantur, id malum efficiunt. Sed potissimū id mali subori scimus cordis, & arteriarū affectionibus: ob id valent in trij homines, in quibus calorem innatum minus valere coniectabile est, plerunq; steriles sunt. Nā cū potissima seminis prolifici ratio stet in spiritus vitalis, ac natiui, & influentis caloris influxu ad testes ipsos, & hi à corde velut à fonte prodeant, fit facilē, corde aut arterijs affectis steriles superesse tales viros. Hac. n. rationem arbitror Hipp. lib. de lo. aqua, & ac. dixisse Scythas steriles esse, quia uenas retro aures scindunt, & copiosē sanguinem fundunt, donec homines præ frigiditate obdormiant, ex quo qui euadunt, steriles caloris, & spirituum defectu, supersunt.

- C** Sed ne quid huic tractationi deesse uideatur, paulō diligentius virorū impotentia expēdere insitui. Cuius rei gr̄a asserimus quatuor esse in uiris potissimū ad fecunditatē necessaria inter se inuicē coordinata: quorū si aliquid deficiat, fecunditatē quoq; deficere necessum est. Primum quidē salicitas est, seu appetitus ad uenerē: secundum seminis copia: tertium erectio ualida membri: quartū & ultimum fecunditas. Inter quæ sanē oīa salicitas minor est ad generandū, q̄ hæc ēt in senibus ac decrepitis reperiatur. Postmodū magis necessaria est seminis generatio: q̄ in ipsis quoq; senibus reperitur, non tamen adeo copiosa neq; bona, vt in iuuenibus. Vtilior quidē est erectio membri (licet non sufficiens, ut in eunuchis) quæ sanē non quia talis est, sed quia multis indiget: & ideo in senibus minor reperitur, neque fit nisi post somnum, & cibo cōcocto, præsertim calido potestate cum potu modico, & ante mictum, ac sine ventris crepitu. Causa porro huius erectionis est robur cordis, aut valida imaginādi uis, quæ cogit cor impellere spiritum flatusum: caliditas insuper renum validorum, & pinguium trahentiū, & transmittentiū: quæ si adsint, secundus erit homo, & ad uenerem potens. Verim, ut in summa dicam, quatuor etiam reperiuntur causæ,

Aa qui-

quibus hoīs corpus sterile fiat, quarum prima frigiditas est, cuius potissimum **A**
 rōne dixit Hipp. loco citato Scythas steriles esse: nam inquit; Scytharum genus
 fului valde coloris existit pp frigus ingens, non. n. vehemēs accedit ad eos Sol:
 à frigore verò albedo exurit, & fit fulua. Ac subdit. Neq; verò possibile est, fē
 cundam eorum esse naturam, cum viri minimè cupidi sint cum fēminis cōmi-
 sceri ob nimiam corporis humiditatē, ventrisq; molliem, ac frigiditatem. Quē
 causa est, q; nec semper probè fiat, nec spiritus vitales ad tensionē suppedient:
 quā duo ad venerem necessaria esse diximus. Quibus accedit ex accidenti hu-
 miditas, vt Gal. aduertit 2. de temp. c. 3. quā causa mollietati existit, & infēcundi-
 tatem quoq; mollitur. Quapropter censeo Hip. dixisse: Scythes eunuchos natu-
 ra esse, inquit. n. loco citato: Amplius aut præterea, plurimi Scythæ eunuchi na-
 scuntur, & muliebria officia obeunt. Cuius loci ratione, qui difficilis vī, q; vix
 credi possit hoīs nasci eunuchos, expendendum est, tria nomine eunuchi an-
 tiquos intellexisse. Primum ergo hoc nōmen generaliter accipitur pro omni
 hoīe, qui impotens sit ad venerem: nam cū antea declarasset Hip. Scythas esse
 frigidos, ob id ēt hac in parte steriles vult subaudire, quia ad venerem sunt im-
 potentes, propriè. n. frigidi dicuntur hoīs, qui ad venereos actus inualescentes **B**
 sunt. Vnde titulus est apud iurisconsultos. De frigidis, & maleficiis: quos spa-
 dones vocatos reperiō, sicut eos quoq; quibus meatus pudendi contortus est,
 aut pudendum ipsum admodum breue, & virilia effecta sunt. Secundū hoc no-
 mine eunuchi thlibiæ appellantur, & sunt, quibus testes in manibus obstetri-
 cum contorti sunt. Tertium vero, eunuchi castrati dicuntur, & sunt ij, quib. adē
 pta sunt virilia oīa, & impotentes sunt ad venerem, vel soli testes, & hi non sunt
 fēcundi, cæterum potentes ad venerem. Itaq; eunuchi trium sunt generū, qui-
 dam ob priuationem virilium, aliqui ob vitium in illis, multi ob naturæ impo-
 tentiam semen non generantis, aut flatum transmittentis. Quippe hæc tria ne-
 cessaria sunt ad venerem, membrum nimirum cum suis partibus, materia, & ia-
 culator spiritibus. Sed in hac re, vt ad pensum redeamus, expendendum est, q;
 vt habetur 1. de semine, priuatio, aut corruptio testium causa est frigiditatis in
 toto corpore, & vicissim frigiditas causa est impotentiae ad venerem. **C**

Præter adductā ab Hip. causam sterilitatis Scytharum, aliā superaddit, dicēs:
 Ab equitatione ipsa diuurni eos corripunt dolores, nimirum pro pendentib.
 semper eorum cruribus, deinde claudi fiunt, contrahunturq; vertebrae, cū inua-
 luerit morbus. Et paulò inferiūs de reliquis hoīb. inquit. Simili aut modo, &
 reliquis hoīb. euenit, vbi. n. frequenter, & continuè hoīs equitant, ubi pluri-
 mi à diurnis doloribus vertebrarum maximè, & pedum corripuntur, ad coi-
 tumq; fiunt impotentes. Ac licet Arist. 4. probl. 12. asserat, equitationem assiduā
 facere libidinosiores, intelligendum venit, si non læduntur, & commodè equi-
 tent: nā de alijs, quorum Hip. meminit. Arist. ēt 5. probl. 31. refert, genituram p
 somnum pfluere, vt perspicuum sit huiusmodi homines ad concubitum fieri
 impotentes gonorrhæa enim, qualiscunq; sit, debilem reddit hominem ad ve-
 nerem, tum quia minuit illius materiā, tum quia humectat membra genitalia,
 tū verò quia facit incontinentē, adē vt semen effluat ante pudendi tensionem.
 Potentissimi enim sunt ad venerē quicunque tardius, & non nisi maxima cum
 ten-

A tensione membri, & confricatione semen emittunt. Sed ad rationem redeunt: ex incōmoda equitatione, & quouis labore ualido, vt refert Gal. 1. in 6. de mor. uulg. comm. 6. confluunt humores ad prædictas partes, & mala, quæ Hip. recensuerat, scribit. Cui sanè accedit alia, quòd ex longa equitatione, & ualidioribus exercitijs summopere imbecillitentur renes eò quòd calidiores præter naturam efficiantur, & seminis fecundam temperiem euertant: faciunt etenim renes plurimum ad ueneris appetitum, & robur seminis. Vnde qui generationi student, raro debent, & parum equitare, magis tamen in pedestribus exercitijs se exerceri conuenit; parum edere, & cibos crassos, & boni ac ualidi elementi, ut suillas carnes assas, caseum modicum, uinum rubrum potens: à quibus probè dormire est opus: porrò omnia, quæ inimica sunt cordi, & ueneri officium generationi. Præter dictas sterilitatis causas superaddenda est ultima exemplo sumpto à causis sterilitatis Scytharum, quæ ustio est, vel sectio uenarum post aures, uel seton, aut fontanella. Quæ in re, inquit Hip. lib. de lo. aqua & ac. Medicantur autem sibi ipsis hoc modo: à principio morbi utranq; venam retro aures inscindunt: quo facto, sanguine multo promanante somnus eos corripit præ imbecillitate. Et subdit, At mihi sanè uidetur, ea medicatione se ipsos perdere: uenæ enim retro aures sunt, quas si quis secet, sterilitatem inferret ijs, quibus secantur. Quod proculdubio vitium ijs etiam, qui uisionem vel profundam vel diu manantem in aliqua corporis parte patiuntur ex aliqua morbosa occasione, certum est subsequiturum, id quod ab Hip. etiam est proclamatum: nam inquit; Scythæ omnium hominum minimè sunt ad coitum valentes. Ac reddens rationem subdit: Et q̃ humoris detractiones ex perustione cauteriorum semper habent, & plurimum temporis in equis degunt. Cuius rei iterum adducit rationem lib. de genitura dicens: Quibuscunque uenæ post aures sectæ sunt, hi coeunt quidem, & genituram emittunt, verum modicam, debilem, & infecundam, nam plurimū genituræ pars à capite iuxta aures in spinalem medullam procedit, ipse autem litus, cicatrice sectioni inducta consolidatus est. Lib. tamen de loc. in homi. hæc refert: Aliæ uenæ à vertice iuxta aures ab anteriore colli parte vtrinque ad caua venam appellatam feruntur, ex infecundum faciunt hominem, cum fuerint sectæ, & in magnos digitos desinunt.

C Quam sententiam quoq; profert Arist. li. 1. de gen. ani. q̃ semen habeat quipiam cum cerebro affine: Inquit enim; Sedes oculorum maximè omnium capitis locorum seminalis est, q̃ sola ipsa per coitum uenerem manifeste immutetur, & usu immodico rei ueneræ oculi aperti langueant, & subsideant. Quæ omnia sano modo esse intelligenda arbitror, ac cenſeo præcipuam sterilitatis rationem in hac causa pendere ab ingenti frigidityte, & impotentia, qua totū corpus ex copiosa sanguinis profusione afficitur, & cerebrum maximè, licet semē non decidat ab ipso cerebro, est tamen pars, quæ vim & efficaciam semini, ac testibus tribuit, qua genitale constat euadere semen, & ob id ipsa sublata, vel diminuta nil mirum si semen infecundum fiat. Quæ si expendere, & antequā auxiliares manus adhibeas, probe consideraberis, certo scio te profuturum summopere. Cuius rei exemplum reperies in ijs, quibus fontanella occipitio, vel brachijs diu aperta est, & plurimum fundit; nam licet ad sanitatem alicuius

affectus prodest, mirum non est, si ad integram individui perfectionem non sufficiat. Atque haec sunt, quae corpus infecundum, & imbecille reddunt.

*Curadi
talis.*

Quibus omnibus ea erit utilis providentia, quae affectum corpori communem, aut alicui parti principi proprium auferre, & valeat: nam qui morbo gallico affecti steriles existunt, sudoribus ex ligno guaiaco, & aliis huic malo aptis praesidijs haud difficulter fecundi fient. Sic frigidos ex quavis causa calfacies prudenter, & omni arte ijs, quae superius retulimus balneis, sudoribus, exercitijs, frictionibus, inunctionibus, foribus, & alijs, quae intus sumpta, siue alimenta sint, siue medicamenta, calfacere, & flatus generare nata sunt. Pari quoque ratione providendum est cuique membrorum principalium, si huic malo causam praestiterit, iuxta cuiusque intemperamentum & vitium: ex ijs enim quae diximus, satis ampla subest cuique ad curationem materia: & ob id huius cap. hic esto finis.

De conceptu. Cap. 6.



REATIS vniuersis, quae in caelis terrisque continentur, summus ille rerum conditor. Deus, terram ut implerent cresceret, & multiplicarentur iussit, ut habetur Genesios. 1. Quamobrem quandam inclinationem, propensionemque ad generis sui propagationem cuique indidit, ne breui temporis spatio corruerent, quod omnia ex corruptibilibus essent conflata: unde appetitum illum conseruationis propagata specie, ortu duxisse constat. Hinc effrenis generandi cupiditas emanauit, ut pulchre Arist. innuit li. 2. de ortu & interdicens, Nam cum in omnibus quod praestabilius est, naturam semper expetere dicatur, praestabilius autem sit esse quam non esse, hoc enim in omnibus impossibile est, propterea quod longe ab ipso principio distent, reliquo modo Deus ipse vniuersum compleuit continue facta generatione. Quibus verbis constat hinc esse deperdiri restaurationem, qua noua prole facta, vniuersum indies quotidiana generatione continuat. Ob id etiam idem Arist. 2. de ani. c. 4. dixit, generationem esse operationem maximè naturalium viuientium, quae sunt perfecta, non imminutam, neque fortuitam generationem habentia, nimirum animatum simile procreare, plantam autem plantam, ut quoad fieri posse, durationem participarent: omnia. n. haec appetunt, & huius gratia agunt quaecunque secundum naturam operantur. Sic philosophi omnes affirmant generationem primam esse, ac perfectissimam viuientium operationem. Perfecta quidem dicitur, quod aliud sufficiens est generare, ut ex Arist. 3. meteor. 3. euidenter constat. Quare si nutritio & accretio ad animalis sunt perfectionem, haec autem ad generationem, erit sane generatio omnium aliarum naturalium operationum finis, ac idem prima dignitate, & perfectione: finis. n. teste Arist. 2. phy. perfectior est ijs, quae sunt ad finem. Quod est elegantissima quadam sententia Plato in Symposio probauerat. Ex quibus constare cuius arbitror, quanta naturae succrescat generandi solitudo: nam cum rerum species deficere naturae vitium foret, ac mostrosus, praecanet diligenter ipsa ne eius perfectio (quae in specierum varietate sitam esse cognoscit, idque nullo alio modo, quam per nouam rerum propagationem) corrumpat dilabaturque.

Verum

- A** Verum cum hanc ex materiali aliquo principio fieri oporteat, licet omnia ex elementis consent, expendendum subinde est, non omnia immediate ex ipsis fieri: sed ea immediatius, quam ipsorum naturae magis congruunt, ut lapides, & metalla. At verò animalia, ut quae longe ab elementorum natura distideant (licet ipsis constet) fieri citra maximas transmutationes nequeunt: nam ipsa in plantas, & reliqua alimenta primò mutari oportet, haec verò in sanguinem & semen, ex quibus ut generatio fiat, multa profectò requiruntur, quae mox referam. Cum nam ad fetus generationem satis non sit seminis, ac sanguinis menstrui bonitas, neque corporis aut partium principalium eius temperies, ac sanitas; fit quidem ut necessum sit, utrum quoque aptum fieri per commodationem, & temperiem, ac virium integritatem, quibus accedit calor et vis, & efficacia, ac puritas: ex quibus id futurae opus, cui primò ipse uterus incumbit, conceptio est. Erit igitur conceptio, ut ex Gal. colligitur lib. de semine, attracti ab utero seminis commixtio in sanguinis menstrui puriori parte, in quam locellorum calor nativus ita agit, quod vivificato seminis genitalis calore, demum fetus generatio sequatur. Conceptionis porro nomen à comprehensione dictum esse constat: refert quidem Gal. loco citato mulieribus praegnantibus futuris intus remanere semen, alioqui tales non fieri. Primum itaque opus uteri à proprio calore fit: nam attracto semine tamen aut de se se uterus colligit, ut seminis vel sanguinis menstrui egredi permittat nihil. In calore quo sanè opere seminis cum sanguinis puriori parte commixto fit: in quo calore uteri cogente, seminis calor ad actum reducitur, ut deinceps sua specie in futurum opus progrediat. Antè tamen, quod hinc discedam, ex quo sanguine conceptus fiat, docet necessum fore duxi. Quia in re, quo tempore mulieres potissimum concipiunt permittendum est: cuius gratia, ut ex Hip. lib. de septimes. partu colligitur, accipiamus conceptum fieri, aut in ipsis interlunijs, aut ante plenilunium, aut decrescente Luna: si in ipsis interlunijs conceperit, rarissime quidem fiet, idque in illis praecipue mulieribus, quibus accidit vel in ipso mensium fluentium impetu, semen masculinum retineri, propterea quod parcissime purgari sunt natae. De quibus Arist. li. 7. de hist. an. c. 2. & 4. de gene. ani. c. 4. haec scripsit: Nonnullae et, dum profluunt menses, concipiunt, postea concipere, nequeunt, quibus vult statim à purgatione comprimitur. Ceterum de reliquis antea dixerat. Conceptus mulierum à profluvio menstruum sua natura contingit. Hip. tamen lib. de nat. pueri, singulis suum tempus concipiendi praescripsit: inquit. n. Oportet igitur mulieri tempus dare mensis, in quo ipsa purgatio contingit. Ex quibus conclusit, necessarium esse plerasque mulierum circa plenilunium, & ultra concipere: quibus equidem luce clarius constat, ut plurimum mulierum concipere post menstruas purgationes. Praeterquam, quod decrescente Luna, tempus existit frigidius, & humidius, quo minorem facit abundantiam excrementorum coctorum: & ob id minus eo tempore feminae concipiunt. Itaque & fluentibus, & iam fluxis mensibus feminae concipere constat. Verum quaecumque feminae menstruant sunt, vel non concipiunt, vel statim abortiunt, licet concipiat, ut inquit Arist. loco citato, vel vitiosos fetus edunt: non quod feliciter concipiunt ut ex, quod à purgatione. Quod et protulerat expressis verbis Hip. li. 2. pop. p. 3. text. 27. dicens, post menstrua aliquando dextra aliquando sinistra hiant: quasi reddens rationem, quo tempore fiat potissimum conceptus, nimirum quia, & uteri sunt aperti, & venae, quae in ipsum finitur, &

*Conceptio
quid.*

tur, & quia inanis vterus eo tpe auidius trahit, & rursus idem probat eodē lib. A
 p. 3. tex. 31. dicens aut a menstruis numerandi sunt nouem menses, aut a conce-
 ptione. Quippe (vt ad institutum redeam) mulieres nō concipiunt ex sanguine,
 qui fluit, quod multis tum causis, tum indiis fieri, & nosse datur: primum, q
 non par sit nutrirī fœtum ex recremento: secundum, q propensius est sanguis il-
 le menstruis effluere, non retineri: tertium, q a purgatione, cū nihil sit, qd na-
 tura teneatur expellere, facilius semen cōcipit: demum, q par sit fœtū nutrirī ex
 defæcato expurgatoq; sanguine, qui est circum vterum, vt pars superflua ei iicia-
 tur, & pura nutriat fœtum. Ex quibus iam constare censeo, ex quo sanguine fieri
 fœtum oporteat. Sed qm dixit Hip. 5. aphor. 18. Mulieri si menses eant, impossibi-
 le est fœtum esse sanum. Retentis ob id mensibus arbitrantur multi mēses in ali-
 mentum infantis absumi. Itaq; in primis duo semina in vnum coire in vtero te-
 nentur, postea verò sanguinem purissimū accedere par est, vt prosperē fœtus for-
 mari possit. Sed p̄dicto operi multa proculdubio requiruntur: nam primò mas,
 & femina, non vtunq; concubant oportet, sed femina in concubitu capite pa-
 rum demisso, coxendices, clunesq; altiusculas habeat, feminibus latē patētibus B
 donec vir tandem genitale semen ante vuluæ ostiū emittat. Cui semini spirituo-
 sa substantia, q̄ genitiuum appellamus spiritum, permiscetur atq; confunditur;
 q̄ inquam, sicut humiditas, procul expellatur oportet, tantò seminis humidita-
 tem peruincens, q̄d ocyus egeritur efferturq; longius: nihil. n. procul citra spiri-
 tum vehementiam proijci pōt. Cæterum virilis feminis profusio, non intus, vt
 pleriq; censent, fit: nam os vteri angustum est; sed ante ostiū, quo & femina suc-
 cum quendam nihil ad conceptum conferentem secernit: in quibus prorsus ex-
 cretionibus paritermē voluptate mas & femina affici solent. Viri aut profusum
 ibidem semen intus ab vtero auidissimē rapitur, si calidus, & modicē tempera-
 tus, si oris labra asperiuscula, & herentia: si et nunc tenuiora sint, qnquidē ad cō-
 ceptum ita se commodē habent. Sed p̄ter hæc oīa, q̄ nuper & c. p̄cedenti dicta
 sunt ad concubitum esse necessaria, vt conceptus fiat, alia insuper quatuor p̄re-
 quirrit grande hoc opus, imaginariam nimirum cupiditatem, affluentiorē succū
 spiritalem substantiā, & flatuosum materiā. Quæ oīa a cerebro, iecore, toto cor-
 pore, cordeq; proficisci æquum est. Quocircā voluptas ex deprehensio rei dele- C
 tabilis, & cōcupitæ simulacro concitata (qd inchoans primum est) protuberat
 vehementer: mox inanē spongiositatē, q̄ in medio glandis colis apparet, cupidi-
 nis spiritus confestim subit. Deinceps verò alia vis, q̄ huic obtēperat, genitalis
 feminis materiam discindens ad seminales meatus peculiari titillatione excita-
 tos expellit: quo cū tetenderit humoris portio calorigica cā agens in flatū ver-
 titur, quò genitalia extenduntur: virorum nimirum rigescunt intumescuntq; fe-
 minarum verò faiscunt atq; extuberant. Quibus medijs, q̄ in hoc opere necessa-
 ria existunt, ab vtroq; parente semen prolificum in vterū excidit, qd equidē si
 vterus vndiq; complectat ita auidē, vt internū vteros ad eō astrigatur, qd ne mi-
 nimū quidē seminis, aut sanguinis menstrui exire p̄mittat, cōceptus eo tpe dici
 meretur. Quippe simul, ac geniturā intra se vterus traxerit, in vniuersum alueū
 se supra semina duo colligēs, ac vndiq; eā cōphēdens ita cōtrahit, vt nulla peni-
 tus, siue multū, siue parū feminis iaculatū fuerit, vacuitas relinquat. Cū verò se-
 minalia hæc recrementa in vtero cōstituerint, atq; et intra septenas horas post eia-
 cula-

Nec di-
 splices
 prolificū
 etiam se-
 men ad
 eam par-
 tem mit-
 ti; argu-
 mento est
 grauidā
 mulier,
 qua in
 vteri cer-
 uicem se-
 men af-
 fundit.

A eulationē in effusione relapsa neutiq̃ fuerint, si uteri calore cōseruent regantq̃, concepisse feminā credendū est. Et, vt in summa dicā, conceptionis causae sunt proba uteri cōmoderatio, recens mensiū purgatio, idonea etas, & congressus ap-
 positus: in viro aut̃ bonus corporis habitus: ad calidum p̃sertim, & humidū in-
 clinans, seminis prolifici copia, robusta, & virilis etas cū viriū robore coniūcta
 concubitus moderatus, & plenior victus rō. Quae quidē oīa ad conceptū conci-
 liandū necessaria sunt. Quid verō a conceptu ipso fiat, vbi semel probē a mulie-
 re in alueo retēta fuerit genitura, iam explicandū aggredior, si prius quid fetus
 efformatio sit, dixerō. Est sanē virtutis seminis in menstruō sanguine tā efficax
 actio, vt materiam illā efformare, ac incepta informatāq̃; ad membrorū formae
 susceptionē ducat. Dissidet quidē a cōceptu, proprio seminis calore perficiatur,
 licet seminis quoq̃; vis accedat, at fetus generatio, q̃ ille uteri calore efficit. Que
 vt probē teneas, p̃mittendum est B. Tho. p. 1. q. 118. art. 1. arbitrari, materiā a fe-
 mina ad cōceptū p̃stitam, statim a principio actū esse animā vegetatiua donatā:
 non tñ esse in actū secundo, sed in actū primō: q̃ mihi de semine vtriusq̃; paren-
 tis intelligendū fore non oīno improbabile vī (saluo tñ meliore iudicio) itaq̃;
B semen vtero cōprehensum, mox actus secūdos efficit, disponēs, & delineans fu-
 turi fetus mēbra, educansq̃; de potētia materiā animā vegetabilē, qua deinceps
 alatur, & sensitiuam, donec rationalis introducat. Quod sanē alijs corruptis om-
 niū virtutes eminenter obtineat, & operet q̃ ipsa antea efficiebant, & quid am-
 pliū. Formatiua itaq̃; facultas nō quiescit ab opere, donec vegetabilem, & sen-
 tientē animā educat de potētia materiā: & postea ab ipsa ingeniū p̃cipuis mē-
 bris in plantata, opera nō mediocri momenti agit, vt inferius mōstrabo. Postea
 vero opus relinquit vegetatiuē, & sentienti, q̃ ipsum perficiant iuxta formatio-
 nis varietatem, vt mox scribā. Sed suspico, licet virtus seminis transmissa a parē-
 te, se habeat velut instrumentū, qđ artificis, aut motoris motū exequit, nō subin-
 de cōstare, hanc virtutē posse citra aliqd̃ aliud agens, qđ simul coagat, ipsum se-
 men solū posse virtute illa opus ita grande perficere: sed cōseo (saluo meliori iu-
 dicio) concurrere actualē matris virtutē, non quae in semine est solum, q̃ anima
 actū in id, & reliquā materiā mediantibus venis, & arterijs transmittit. Verū id
 alibi latius sum disputaturus. Multa sanē eaq̃; mirabilia vno tēporis momento
C circa animalis generationē fiunt naturae opera: nā sex septemve diebus primis
 semina duo ociosa nō sunt, sed sanguinē trahunt, in sui q̃; naturā cōmutāt, & ve-
 luti alunt, qđ sanē opus inter Barbaros muli lactationē appellarūt. Post verō
 in semine ipso duo cōsiderat Gal. corpus nimirū seu corpulētā crassāq̃; subitā
 tiā, & spiritū, & in eo calorem natium, quibus formatiua facultas veluti instru-
 mētis vti ad fetus generationē. Qua p̃culdubio rōne Hip. dixisse arbitror, Scy-
 thas steriles esse: nā ex arteriarū retro aures sectione tāta spiritūū vitaliū copia
 effundit, vt semen ob id infecūdū supersit, evanescētibus spiritibus, & calore,
 Formatiua itaq̃; facultas, q̃ in semine viget cōcepto intra uterū iā semine, tam
 est a summo rerū cōditore erudita (licet cognitione careat) vt uniuersa, ac neces-
 saria in animalis cōformatione nouerit, mēbrorūq̃; vsus, & formas, ac faculta-
 tes eadē certis tēporibus, & partes et̃ efformat, auget, exornat, & tādē ad debitū
 perducit statū. Quae profecto opera tāta sunt admirationis, dignitatis, & excel-
 lenū, vt non naturae, sed uñ Dei opt. max. potentiae, & maiestati tanquam au-

Non gi-
 gnit indi-
 stincte
 quodli-
 bet mem-
 brum ex
 qualibet
 parte se-
 minis,
 sed cali-
 dum ex
 calida,
 & frigida
 ex
 frigida
 distā si-
 gillatio-
 nem se-
 mini, &
 sangui-
 nis illa
 tam.

- A** tericorū vīsum est. Verū ego clarioris doctrinē gratia mēbranas sic distribuō. Vbi. n. fētus concreſcere cōpit mēbrana vna tenui, q̄ amnios (hoc est muſcus: adheret. n. fētui, vt muſcus arbori) nominatim inter q̄ & fētum non ſudor, ſed pingue quoddā exiſtit. Hanc circūdat corion mēbrana neruea craſſa, dura valde, multis vaſis, ac vinculis in texta vtero, & exterius carnea ſubſtantia tota obducta, vt firmior eſſet: inter hanc aut̄ & amnion vrina fētus cōtinetur. In qua ſanē re, qd̄ magis mihi eſt experimēto confirmatū, illud proſectō eſt: nullā aliā in fētibus humanis reperi mēbranam: in cornigeris media eſt alia, vt Fallopius autor eſt in anatomicis adminiſtrationibus. Quod ſi p̄ter has (vt multi faciunt) velis carneā placentulā, ſtratum quoddā ſuppoſitū vaſis craſſum, carneū ac firmū ſuperaddere, nō diſplicebit. Ego tñ arbitror carneā, & craſſam ante dictē mēbranae partē eſſe. Vaſa verō, q̄ ex corio in vmbilicū ferūtur, duo ſunt, q̄ pulſant; & totidē quæ non pulſant, alternatim poſitæ, & aliqñ vna ſola reperiitur magna, q̄ pulſat in medio duarū quietarū ſita, & prope vmbilicū diuiditur: poſtea verō vnum fit corpus ex his tribus quatuorve: meatus ē vrinarius, qui ē veſica fētus fertur extra amnion in medio poſitus exiſtit. Ac ſi quis dixerit, plures alias tunicas Hipp. nomināſſe, intelligat carneā partē vnus tunica, & membranā ipſius bis recensuiſſe. Contingit tñ quibuſdā in partu amnion nō rumpi, & puerū veſtitū naſci: quō fit, vt vulgus exiſtimet aliā præter dictā ſub eſſe tunicā. Sed vt eod̄, vnde abiit, redeat oratio: in harū tunicarū medio dum generantur, conſtat, locū ſanguini cōcreto per ſimilē apparere, quo ſpiritu intus deferente, & calore extrinſecus exſiccate, cordis bulla tumet vitali ſpiritu referta: deinceps verō, bullulæ geminæ ſuperna parte pro cerebro vna: dextrorſum pro iecore altera extuberant; q̄ nihilominus ſpiritu ſuperna animali naturali altera replentur. Quæ ſanē vnā cū ijs, q̄ in mēbrana illa continentur, q̄ totum embrionē eſſe arbitror, enutrire, incrementūq; recipere neceſſe eſt: ob id per vulnæ acetabula cruentus ſuccus reſudant aluē ſubiens, membranā circumambit; quē ſimul cū refrigeratū ſpiritu per meatulū, quem genitiuus ſpiritus ſibi efformauerat, intra panniculū a genituris attrahitur, quo perfectē, & ad integrum cocto partes, quas modō diximus, aluntur augenturq; dixerim, has tres præcipuas: nā reliquæ poſtea fiunt, & aluntur. Mox tribus ijs, quas nuper memorauimus bullis, tres p̄tenuēs
- C** admodū obductæ mēbranæ, cuiq; vna, ſexto ſeptimove à conceptu die procreatur, vt ex Hipp. conſtat lib. de natu. pueri, qui in hunc modū ſcripſit. Qualis aut̄ erat, ego referā, veluti ſi quis ouo crudo externā teſtam circū circa adiinat, in interna verō pelliculā incluſus liquor pellucēſcat; modus quidem talis erat, & vt abundē dicā, ruber erat liquor, & rotundus: in pelliculā verō fibræ quædā albæ, & craſſæ videbantur cū cruore craſſo, & rubro obuolutæ, circum aut̄ pelliculā foris cruenta veſtigia inſtar ſuggillatorū, iuxta mediū verō, tenue quidē inerat, quod mihi vmbilicus eſſe videbatur, & pillud ſanē expirationē extrā, & intrō fecere apparebat. Quæ quidem oīa ſex dierū ſpatio fabrefacta eſſe dixerat, licet mihi non diſpliceat. Aui. ſententia Fen. 2. 1. 2. tract. 1. cap. 2. qui tenet naturā minimē poſſe primū delineationis tēpus ſex Solis ortibus tātum perficere, ſed ad ſeptem neceſſariō ſe extendere. Quod probatum etiam reperiēs lib. 1. in ſomniam Scipionis ca. 6. & apud Plin. lib. 7. natur. hiſt. cap. 5. & apud Ariſt. qui numeri ſeptenarij dignitatem exponens, huic operi idoneum eſſe fatentur. Sed Hipp.

*Simul
fieri incō
pium, ob
cor ac co
rebrū vl
timo et ſi
mul per
ficiuntur.*

Hip. has lites dirimit lib. de nat. pueri dicens: Fiunt verò hæc è dieb. plurib. aut pauciorib. Quā diuersitatem suboriri arbitror ex maioribus, vel minoribus facultatis formatiue virib. His itaq; diebus sortitur hæc substantia rudem quaudam vitalium principiorum delineationem, itaq; non vt fors tulit, & à casu, vt Democriti ex snia referente Arist. sed miro profectò naturæ ordine, nam cum primum fœtus planta sit, radicationem, hoc est, iecur primò sortiri necessum erat. Verum, quia neq; vita animalis viuere vilo mado poterat, quin præsto illi esset cordis beneficium per calorem: ob id, vel simul, vel propius obtinuit cor. Ceterum vt ex toto esset ab iniurijs genitura immunis, prouidit natura vltimò sensus principium, putà cerebrum tribuere, & neruos obscura quadam & confusa delineatione non distinguere quidem & efformare, sed initiari tantummodo, quantum sat esset ad genituræ nomen adipiscendum.

Nam vt constat apud Medicos, iecur primo efformatur, & mox cor, tandem cerebrum, sed hæc est formationis ratio, & ordo, quod à iecoris generatione, cor primo incipit esse, & mox cerebrum. Verum hæc duo membra vni potetia animali necessaria sunt: ob id quæ sequitur, simul perfectione consequutura: falsum. n. est, cor prius q̃ cerebrum formari, quia ociosa esset ipsius formatio, si ambo mēbra vnius potetia sunt instrumenta. Et cum fœtus dum format, & in utero est, matris potius q̃ proprio calore viuat, ob id non opus fuit, cor primo viuere, sed prædicto ordine oīa generari. Et licet Hip. refērat lib. de carnib. hæc septem dieb. fieri, hoc tñ verum est, quia nutritionis principium eo loco intelligo vitam appellare: quippe hæc his diebus incipit: quo tpe anima seminis vegetatiua mediante formatiua virtute prædicta opera effingit, & fœtui educit vegetabilem animam de potentia materiæ, ex vi generantis sibi cōmissa, ac p̃cipuis membris efformatis, corruptoq; iam semine, & mutato in eadem membra, sensitiua facultas q̃ eduxit de potentia materiæ, vegetatiua opus inceptum, quoad nutritione, & augmentum perficit: inarente virtute formatiua in membris p̃cipuis: saltē formaliter, vt B. Tho. optimè aduertit par. 1. q. 118. ar. 1. ad 4. Caiet. eo loco. Quippe ad corruptionem seminis arbitror eius formatiua corrumpi, saltē mutari in formatiuam alterius potetia vegetatiua, quæ denuoeducta fuit de potentia materiæ. Neq; obstat contrarium protulisse B. Tho. q. de potentia art. 9. ad 16. nam ea parte refert manere eandem in specie, hic verò corrumpi eo modo, quo dictum est, vt exponit Caietanus loco citato.

*Secundū
forma-
tionis ic-
pus.* Mox verò à genituræ formatione, nouem, aut quindecim, vel intermediorū dierum spatio (iuxta maiorem, aut minorem facultatis formatiue, vt dictū est, efficaciam) operante iam vegetatiua ipsius fœturæ, vt explicatum est, nō seminis quia iam corruptum est, & ingenituram mutatum sanguineus succus in carnē conuertitur: nam id tempus conerit in carnificatione incipienda explendaque sanguine prædicta genitura, quo incrementum susceperit: licet perfectione prædictæ membrorum delineationes, quantum sufficiat, vt nomen fœtus, ac dignitatem obtineat illud, quod antea genitura erat. In quo etiam tempore membra, colores, & mollitiem, duritiemq; adipiscuntur, quæ omnia circumscribunt secundum formationis tempus.

Tertium porro tempus sequitur, in quo tria illa primaq; principia, iecur vi-

A delictet, cor & cerebrum exquisitè fiunt perceptibilia, reliquorum autem membrorum descriptio tantum, vt in secundo tempore dictum est, vt delineatio appareret. Tunc verò euidentior est principiorum formatio: verum enimuero partium ventris obscurior longè his omnibus, brachiorum, & crurum distinctio conspicitur: quod sanè tempus ramificationis appellauit Hip.

*Tertius
forma-
tionis tē-
pus.*

Quartū verò, & postremū formationis tempus mox sequitur, quo nō solum interiora mēbra delineata perfectè, ac cōspiciē sunt, sed tunc brachia distinctè absoluteq; cernuntur clariora naturæ opera. Quo tpe non amplius sētum, sed infantiē, id quod in vtero gestatur Hip. appellauit: tunc. n. & pedibus calcitrare, & veluti perfectum animal moneri incipit: cuius integrā delineationem depingit dicens: Caro augetur ab spiritu articulatur, & abit vnumquodq; simile ad simile, densum ad densum, rarum ad rarum, humidum ad humidum, & vnumquodq; ad propriam regionem abit iuxta cognationē ad id, a quo genitum est. Et quæcūq; subdit, à densis genita sunt, densa sunt, & quæcūq; ab humidis humida, & reliqua iuxta eandē rōnem fiunt in incremento. Et ossa durescunt à

*Quartū
forma-
tionis tē-
pus.*

B calore conglutinata, & sanè ramificantur, velut arbor, & tum interna, tū externa corporis adhuc melius articulantur: ipsumq; caput distantia acquirit ab humeris, & brachia, ac cubiti à laterib. & crura inter se disparant, & nerui exiliunt circum naturas articulorum, & os per se diducitur, & nasus, & aures eminent in carne, & perforantur, & oculi implentur humore puro, & pudentum cōspiciunt fit. Quam suā ad vnguem transcribere placuit, vt quæ huic vsui cōmodissima mihi visa fuit. Sed supersedendum mihi est hac in parte à disputatione de primæua membrorum principalium generatione, q̄ proprium hac in parte non obtrineat locum, & ei sint satis quæ hucusq; diximus. Ad institutū igitur rediens totum formationis tēpus hac lege partiti oportet. Sic. n. Soles spumificationi dicere autores constat, quatuor lineationi, octo lineationis repletioni, quatuor, & decem carnificationi, terdecim efformationi quoq; attribuit. Quibus proculdubio quadraginta quinque dierum numeris constat, quē esse maiorem formationis terminum oēs ferè asseuerant, sicut minorē triginta dierum, vel triginta quinque spatio constare: quoniā Soles sex spumificationis, duo lineationis, quatuor lineationis repletionis, nouē carnificationis, totidē formationis sunt, neq; his pauciores esse possunt. Quod quidem cōputationis genus de maris generatione subaudiendum est: secus quidem res se habet de feminæ cōceptu, & formatione: quippe q̄ longioribus temporum impendijs absoluitur. Decē nanq; dierum spatium (licet non desint qui pauciorib. formari referant) vltra masculi spatia ad sui efformationem expostulant. Verum cum in lucē prodierit femina, ocyus, q̄ mas accrescit, & ætate floret, ac viget, demūq; senescit ob materiæ fluiditatem, & caloris inopiam, q̄ Hip. dixerat li. 2. pop. par. 3. tex. 29. dicēs: Quod citius discretum, & motum est, augetur rursus sanguis in longius tempus. Itaq; mas intra triginta quinque dierum spatium, & femina quadraginta quinque ad summum efformat, & anima rationali informari certum est. Quō autem termino præfinito, vegetatiua incipiat operari omnino ignoro. Vnum hoc certo & circa vllam dubitationem scio vegetatiuam, & formatiuam potentiā seminis eo vsq; durare, quo vsq; semē corrumpatur, & factus mēbra degeneret, vt antea dictū est: tunc. n. uegetatiua ipsius fœtus opus excipit, & nutritionē, ac augmē-

to,

to, & perfectione factum distinguit. Quo tempore factis iam instrumentis, & organis conspicuis, suspensor sentientem animam educi de potentia, materia: quae vltimius factum perficit disponitq; ad praestantiorē formam, & factui sic efformato & constituto rationale animam aduenire, q̄ alijs formis corruptis earū vires hēt ac exequitur, quod monstrant dictis terminis infantium motus. 35, nimirū aut 45, vt dictum est. Quo tempore est arbitradum animam rationalem introduci, vt quae perfectissimam praerequirat organizationem, quam ante id tempus nō potuit natura perficere, etiam si sensitiua fetus anima praefuerit: nam ad eius introductionē non opus erat tanta organizatione, vt q̄ imperfecta esset forma, & solum se haberet velut via ad maiorem perfectionem. Quae omnia si exactē expendisti, monstrabunt faciliē qua prouidentia te vti oporteat, vt quantum fieri possit cures feminam vtero gerere: & pro defectu cuiusq; eorum, quae ad conceptum necessaria esse diximus, prudenti consilio providebis, quae ad supplementum opus esse cognoueris.

Ne videar aliquid eorum, quae nonnulli ex autoribus proferunt huic operi vtilia, p̄termisisse, licet mihi non plurimum arrideant: meminero quorundā eorū, quae referunt proficere ad masculū, vel feminae generationē, nā id quoq; parentes plerunq; desiderant. In qua quidē re nonnihil mihi prius immorandum est, nimirū quantum sat sit, vt constet, quae sit potissima masculorum, aut feminarū ratio. Cuius rei nō leuis est apud Arist. lib. 4. de gener. anim. c. 1. disceptatio. Sunt etenim, qui in seminibus hanc esse contrarietate dicunt: semē nanque, qd a parte dextra excernitur mare gignere, si praeualeat ei, qd a sinistra: & contrariū accidere, si femina gigni det. Et ob id profecto, qui masculos generare student, sinistrū testē lignant. Sunt & alij, qui masculos fieri asserunt ex p̄dominio seminis masculini, & feminas ex p̄dominio seminis feminei: itaq; pro exuperatis seminis uictoria masculū, aut feminā generari referunt. Alij verō uniuersam huius rei rationē reiecerunt non solū in seminis p̄dominium, sed in efficaciam quoq; & praedominium partium, quibus mas, & femina differunt. Gal. aut lib. de sem. huius rei causam esse censet seminis caliditate, aut frigiditate: quippe existimat partes genitales uiri a genitalibus feminae: solū loco differre, idq; calore fieri, qui foras trudit genitalia uiri, cuius defectu in feminis intus recondita manet: & sic p̄ualente frigido tēperamento feminas, & p̄dominante calido, masculos fieri. Nec desunt, qui arbitrentur, id esse reierendum in uterum ipsum, qd duobus modis posse accidere censent: primo, ob uniuersam vteri temperiem, quae si calida fuerit, masculos; si uerō frigida feminas generare nata est: secundo uerō (cuius opinionis creditor fuisse Hip.) ob situm uteri, inquē incumbit semen: iudicant. n. in latere dextro uteri mares, & in sinistro feminas fieri. Sed Arist. lōgē aliter proferre v̄ loco nuper citato, causam huius rei ad actionē, & passionē referens. Cum. n. (inquit) principium non superat, neq; cōcoquere pōt propter caloris inopiā, nec ducit in suā formā, sed tantisper superatur: mutari in contrarium necesse est: cōtrarium autē mari femina est, nimirū, quo alterū mas, alterū femina est. Hec sanē sunt antiquorū sententiae, quas breuissimis rationibus refellere non erit ab re, et si crediderim aliquid uerum obtinere, ut inferius referā. Sic profecto ijs, qui ex testium diuersitate, id referunt fieri, cōtradicit experimētū: nanq; non minus nisi sunt, qui dextro teste carent filios generare, q̄ reliqui.

At

- A** Atqui, exuperante alio semine masculinum, aut foeminam fieri pro exuperatis natura referunt, tenentur asserere foeminam matri non solum in sexu esse similem, sed in omnibus alijs, siquidem semen matris vincere dictum est: contrarium tamen frequenter reperitur, nimirum, filiam patri esse similem, ergo alia est constituenta causa. Qui verò ob seminis partem venientem à pudendis id fieri referunt, intelligant semen non ab omnibus actualiter semen factum, sed à testibus tantum & valis spermaticis provenire: unde non militat eorum ratio. Gal. autè rectius sentit tribuens vniuersam rei rationem calori: sed credendum non est, differentiam sexus ex solo calore fieri: nam potissima differentiae ratio non situ solum, sed in figura consistit, quae proprius, quae situs, sexum distinguit. Præterquam quod credere intus esse conditos uteros mulierum ob debilitatem caloris rationi consonum non est; cur. n. vesica, & aliae internae partes in viris pariter, ac pudenda non prominent? Pertinet igitur sexus differentia ad formatricem facultatem, non ad calorem. At si conformatio præcipuam ostendit differentiam, constat, conformationem longè fore diuersam. Sunt. n. concavae partes mulierum (& utero abundat, quo viri carent) solidae verò virorum: conformatio autè, in qua spectamus figuram concavitatem, asperitatem, & lenitatem partium, numerum, magnitudinem, situm, & connexionem: formatricis facultatis, non caloris solum sunt opera. Verum, qui ad uteri caliditatem referunt, siue in toto, siue in dextra sit, videtur recedere à principijs, quae alioqui ipsi concedere tenentur, nempe, id opus pertinere ad eandem potentiam, cui conformatio omnis factus incumbit: sed huiusmodi potentia adest in semine, ergo ad ipsum, & non ad uterum, pertinebit conformatio illa, quae sexum distinguit. Præterquam, quod non ita distincta est sinus dextri, aut sinistri natura, ut tam longissima differentia dissideant. Arist. verò demonstratio non omnino evidens est: nam conformatio diuersa partium diuersi situs connexiones differentes fieri quidem non possunt, eo quod materia resistat agenti, & se planè vinci non patiatur: requirunt etenim hæc omnia alicuius agentis vim, qua possit sibi assimilare, & formare in suam naturam id, quod paritur. Ego tamen bona venia tantorum virorum arbitror differentiam sexuum fieri potissimum, & maximè caliditatem, & coctionem perfectiorem, aut deteriorem. Nam constat euidenter utrumque semine pariter in se habere vim, & efficaciam gignendi hominem, quoniam in semine est solum potentia, & facultas ad organizationem formae hominis, cuius mas & femina æqualiter sunt participes. non est autè in semine potentia ad formam foeminae potius, quam maris, quoniam mas, & femina forma non differunt, sed solo sexu: in quo cognoscitur perfectio maior, & minor iuxta maiorem, aut minorem calorem ad opera perficienda: mas. n. feminas perfectior, & calidior est, & ob id a calidioribus, & perfectioribus principijs debet gigni. Et cum perfectio hæc non possit sumi, à substantiali forma, necesse est, ut sumatur ab accidentali forma, nempe, à primis qualitatibus, quibus illa utitur tanquam instrumentis ad naturae opera efformanda: sic. n. vir calidior, ut plurimum existit: nam sunt inter foeminas quae multis viris calidiores existant, quas non arbitramur calidas extitisse post generationem, & ipsa genitalia habuisse viro frigidiora, & ob id non enasisse virum, ut aliqui censerent, sed quia id vetuit materiae soliditas, & densitas, licet tamen caloris obtinuerit, quantum viri, & hæc est quaestionis huius solutio. Ad pensum igitur rediens fit sanè, ut natura, quae eadem est in semine ob diuersa instrumenta, seruata eadem forma totius, diuersum sexum efficiat. Itaque, semine

ca-

calidius optimeq; concoctum, mares gignit: quod uerò frigidius est, & malè **A** laboratum, vel gignere non valet, vel feminam procreat. Quam equidè varietatem ostendunt, quæ in generatione accidunt: quippe ij, qui frequenter coeunt, aut vesperi, aut vino, & crapulae sunt dediti, aut studiis animi incumbunt, aut seniores, vel iuniores existunt, tandem utcumque sint affecti, ut probè semen non concoquant, illi feminas procreare solent, masculos uerò, qui coctionem perficiunt. Quibus exactè pensatis, licet antiquorum sententia, quas refutauimus, omnino veræ non sint, nihilominus in non temerè creditur conferre semē, quā emittura est, à teste dextro, ut qui calidior sit, & aptior ad perfectius semen efficiendum. Quæ est ratio ad masculorum generationem coadiuuat aliquid menstrui sanguinis, & uteri caliditas maximè dextræ eius partis, ut Hip. docuisse diximus, & maxime lib. 2. pop. p. 6. tex. 21. dicente, Circa naturam plurimam vim habet mamma dextra, & oculus dexter, & qui in fra sunt: nam & mares dextris partibus hærent: quæ omnia veluti concausæ sunt adiuuantes seminis utriusq; colorem, & optimam elaborationem, in quibus sitam esse arbitramur quodam modo masculorum generationē. Ob hanc igitur rationem dixit Gal. 2. art. med. **B** Temperatura uerò testiculorum calida quidem ad uenerē procliuis, & masculorum generatrix, & fecunda. Ex quibus euidenter constat ad masculi generationem duo concurrere, locum nimirum in dextris, & feminæ in sinistris: secundum uerò ut semen calidum validiusq; tam maris, quā feminæ prædominetur: in utroq; enim parente calidum semen masculum est, & masculos gignit: imbecillum uerò, & frigidum in utroq; feminas, ut ex Hip. constare videtur lib. de genitura. Quum ergo genitura sit calidior, & siccior, quod ad spiritum, qui format atinet, seu sanguis ille postmodum mensruus calidus sit (quod melius esset) siue frigidus, parum interest: nam pœonia mascula in frigida terra, pœoniā masculā generauit, sed inuvalidam: & pari prorsus modo pœonia femina in calida terra feminam. Quamobrem nullam aliam viam ad masculorum generationem certiorē esse arbitror, quā eam, quæ hanc euocat in semine conditionem. Cui vsui expedit, ut vir ex longissimis coeat interuallis, victu utatur, plurimo, & qui robur, & calorē augere possit, & vino aromatico, ac potēti utat, tādē **C** iis, quæ superius diximus impotentia prodesse. Cui rei fertur ex vsu esse cubare feminam, dum viro accedit supra latus dextrum, ut deciso ibidem semine, aptius ad masculos generandos fiat. Femina item calidioribus utatur cibis, & sit exercitiis dedita, non utatur iis, quæ semen refrigerant: nam utrunq; semen calidum esse oportet. Verum ad feminæ generationem vir, & femina temperatioribus, aut paulo temperato frigidioribus utantur. At ne videar silentio celare quæ alicui prodesse possunt, referam quæ apud grauissimos autores de mercuriali herba ad masculorum, vel feminarum generationem legi. Hæc itaq; planta in marem, ac feminam distinguitur: hæc candidiora, illa nigriora habens folia. De quibus sanè mirum est, quod proditur, marem scilicet facere, ut mares gignantur, feminam uerò, ut feminæ: sed id contingere, si à conceptu succus statim bibatur in passo, edanturq; folia ex oleo, & sale decocta, uel cruda ex aceto. Sed uerendum quidem est, ne foetura proijciat vis harum herbarum purgatiua. Quamobrem placet magis Dioscor. sententia, qui, licet in ea re astipulatur Plinio, nihilominus tamen consulit succum iam dictum bibendū esse à mēstrua purgatione.

A tione, & trita folia genitalibus adhibenda. Experientia addidit oportere altero à purgatione die dare mulieribus per triduum, & quarto die à balneo viris accedere. Quam sententiam Hip. antea protulerat.

Quàm cautè, & prudenter pronuntiandum sit fœminâ concepisse, norūt oēs qui ignoratione, vel audacia decepti infamia periclitauerunt: quod turpissimū esse cenfeo, nā pronuntiato semel conceptu, quid vilius, aut turpius accidere potuit, q̄ mox, aut menses profluere, aut flatu excreto ventrem subsidere, qđ multis viris et doctis euenisse legimus, & experimento didicimus. Sunt etenim inchoati hoīes notæ fallacissimæ, & quibus minus credendum est, q̄ oēs similes existant eis, quæ apparent menstruis deficientibus. Igitur si noscere libuerit, cōceperit ne mulier, cuncta diligenter obseruare oportet, in viro quidē si pudēdo discedat à coitu nimis exucato, præsertim si suctionis sensum perceperit. In fœmina verò si nihil aut parum feminis defluerit, maximè si gratissimā cōsecuta sit delectationem: tandē deinceps ipsa accedit insolita pigritia, dolorq; inter vmbilicum & fœmora: item paruus quidam horror sese vtero colligente, & seminis nouitatē alterato. Præterea si fœmina à conceptu decimo Sole, aut maturius vel serius ex superuacua materia tentatur capitis dolorib. & inquietudine infestæ, id ē cognosces si caliginosa vertigine oculorum acies hebetet, si pupillæ imminuant, si candida particula amplior fiat, si flauescat, si eiusdē uenulæ cruore turgeant, si cauent oculi, si palpebræ molliant, & ob id eius aspectus grauior magis reddat, si pannus rufæq; lenticulæ earum faciem defoment, si uenę inter oculorum angulos, & nares litæ conspicuæ magis appareant. Quippe ex oculis Hip. id quoq; rimari docet dicens: Mulierem grauidā si aliter non cognoscas, oculi tibi demonstrabunt: nam retracti & caui magis sunt liuidiusq; eorū albū est. Item si sub lingua uena uirescat, si ceruix calidior, tergus algidius, si colli venæ arteriæq; extendant, pectoris venæ liuescant, nigrescantve, aut alio calore sedent, si mammae obdurescant, extuberent, prædoleant, & caput doleat, aut antiquæ capitis affectiones exacerbentur iuxta Hip. decretum, lib. 2. pop. par. 3. tex. 3. 2. dicentes: Cibis, & potionibus humorem, ac mammae inflantur, & eorū quæ sunt in capite in firmitates, & inflationes incrementa recipiunt, si papillarum color in rubeum demutetur, si potus quiuis in mammas recto tramite frigiditasve, vel calor sentiatur. Insuper si in cibis fastidium, si malacia apprehendat: quæ sit, ubi quicquam gustare improbè appetat, aut enormiū appetitus varijs assurgant, citoq; commutentur: si cibi appetitus auferatur, si ventriculi redūdantiam succorum pariter, atq; cibariorum vomitiones acciderint, si acidè ruētent, si dām biberit, languida fiat mulier, flaccescatq; si cordis pulsus, perturbetur, si lætetur, tristeturve ocysimè, si tormina aluū vmbili cunque præcipue fatigent, si renum, & coxendicum grauitas uexet, si uenter, illa potissimū intumuerint, si inguina persenscat, contorqueanturq; ea parte, si coitū renuerit, vel si solito accidentius cōcupierit, si vteri os arctissimè cōiuerit, molleq; & naturale cū hoc extiterit, si mensibus p statas perhiodos priuetur, si etiam nunc dolores, tumores, extuberationesq; carnis in cruribus succrescant, si corpus uniuersum grauetur. Atq; præter hæc oīa si pulsus protinus à principio vehemens, & magnus, procedente verò tēpore paruus, & velox perstet. Ex urina verò licet

incer-

incertum in hac re praestet iudicium, aliquñ tñ certi aliquid elicere possumus, vt
 si subalbida sit, clara, nubilofo rore supernatante, ac stellati lapidis colorē prae
 se ferente, maximè atomis ipsam variegantibus. Itē si à conceptu primò mense
 ima sui parte candicantia corpuscula, ad farinae crassioris specimē subsideant, q̃
 cōnota carminati filii effigiē repraesentat. Praeterea si accedente adhuc tpe flaua,
 deinde rubra, puniceave, postremo atra nubecula partā superna rubore suffusa
 euadat: si quocunq; tpe subsidentia tenuis, dissecta, carminato gossypio perquā
 similis in ea ipsa congeratur. Idem quoq; iudicium elicies Hipp. & aliorū viro-
 rum, qui docti sint, experimentis factis, nimirum si venter torqueatur ex mul-
 so epoto. Alia tamen, quae passim ab Hip. scribuntur, breuitatis causa praetermit-
 to studens masculi foeminae conceptus signa aliquot scribere.

Huic sanè rei nō parū conducit, nouella ne sit foemina, an senescens, vel etate
 florens nolle, qñquidē hae mares, illae maxima ex parte foemellas procreant ob
 calorē vegetiorē, aut magis deiectum. Ventorum cōsideratio huic rei plurimū
 quoq; conducit, siquidē aquilonares ventos magis generare mares cōperimus.
 Item scripsit Hip. 5. apho. 40. Mulier si mare conceptit, bene colorata est, si femi-
 nā, malè colorata. Libro et de steril. inquit; Quaecunque in vtero habentes, ma-
 culā habent solarem in facie, foemellam gestant; quaecunq; verò bene coloratae
 pmanent, masculum plerunq; item si papillae sursum conuersae fuerint, mascu-
 lum gestat. Idē iudicium pstat si lac contempleris super folia emunctum: nam si
 condensatur, masculum gestat, sin aut diffunditur, foemellā. Praeterea si pastillos
 formaueris cum farina ex eodem lacte, ac lento igne cōmiseris, si fundat pastil-
 lus, foemellae est signum, sin aliter masculi. Id quoq; monstrat tumor in dextra
 ventris parte, & sensus motus ab eadem, sicut in sinistra foeminā: Sic ex Auic. mē-
 te. 2. 1. 3. tract. 2. c. 13. pulsus dexter ex masculo maior, ac si foemina assurgit, ma-
 nium primò porrigit dextrā, pedemq; dextrum praepōnit: mamma item dextra
 maior & durior, oculus quoq; dexter maior: contra autem in foeminis. Hec et-
 enim scripta sunt, nequid huic tractationi deesse videatur, quae cautē, & nō, nisi
 sub dubio pronuntiare tenetur peritus, & cordatus medicus, aut maxima dilige-
 tia omnia intueri, neri sum aliquando temeraria pronuntiatione moueat.

De su-
perfoeta-
tione.

Dictū proculdubio hucusq; est, quantā rōne infans in vtero generet, mirabi-
 le quidē opus. Verum non minus admiratione dignum est vtero clauso existen-
 te, formatoq; iā foetu, alterum posse denuò generari, quod opus superfœtationē
 medici appellant. Quippe verò gerentes superfœtare, neq; fabulosum, neq; no-
 uum est: quoniam oīum maximè animalium mulier, & equa grauida initū no-
 uere. Caetera (vt pote quorum natura, more leporis, superfœtare recusat) vbi gra-
 uida extiterint, mares contemnunt. At mulierem superfœtare certum & euidēs
 est. Sed superfœtationem esse in duplici differentia euidenter constat: alteram
 quidem improprie, qñ plures foetus vno concubitu generantur, quos gemellos
 vulgari nomine appellant: alteram quidem cum vno conceptu iam facto, secū-
 dus proximè secutus denuò nouam domum sibi parat. Nec desunt qui tertium
 & fortasse plures admittāt: qbus accidit alia differentia ex tpe noui conceptus
 desumpta: nā sunt qui longioribus tempotum impendijs, post concepti sunt ni-
 hil quicquā proficere valentes: sed dolorem, quo & ipsi, & primus partus inte-
 reat

- A** reat prematurus concinant. At verò si a primò conceptu secundus proximè secutus sit, paululumq; temporis inter eos intercesserit, quod superfœtari, absolui ediq; potest. Sunt & fœmina, quæ tertium superfœtatur: verum dum iustū pariendi tempus instaret, primos vitales edidit: secundum, qui obiter diem suū obierat, mense quinto elisit. Altera rursus inuenta est fœmina, quæ cum primū vitalem mense septimo peperisset, mox geminos iusto mensium numero vitæ compotes exina est. Neq; desunt quæ octauo mense concubuerint, & partus mureore plenos ediderint. Sed in hac re illud summopere difficillimum vī, nimirum, si carylidones, & vasa omnia primi fœtus corio, & inuolucro ita adherēt, vt ob id menstrui sanguinis nihil profluere possit, ac si profluat, quia vincula, & vasa dirupta esse monstrat, abortus periculū prælagiunt, qui fieri pōt, q̄ denuò fœtura huius nec sint vasa, quibus nouum corium generari possit, nec per quæ alimentum nouo fœtui natura præstet. Cui dubitationi respondendum est, id perpetuo sagacissimam naturam cauere, ne omnia vasa in vnius fœtus nutritio ne dispendat, sed aliqua vel ad mensium purgationem, si fortè redundauerit sanguis, ne fœtura abundantia suffocetur, adseruat, vt in quibusdam, fœminis vterogredientibus, & menstruis adhuc fluentibus experimento comperimus: vel ad nouos conceptus alendos, si fortè fœmina concubat, & seminis aliquid vterus suscipi. Ex quo per prædicta vasa, quæ vacua huius vsui, & otiosa melioris gratia reliquit natura, nouum artificium prædicto simile, superfœtationem videlicet vnam, aut plures fabrefacit natura non raro.

De monstruoso conceptu.

Cap. 6.



- V**M fœminis haud raro accidisse constat monstruosos peperisse fœtus (quoddam profectò miseræ genus) ob id qualem affectum in huius opere natura patiat, expendendum est, vt quū fieri possit adiuta naturales conceptus, & partus, ac parentibus similes efformet. Mōstri igitur conceptum semper esse præter naturæ institutum, & rationē euidenter constat: ob id iure optimo quid naturale, quidve præter naturam insit conceptibus considerandū est.
- C** onstat quippe dictum esse Arist. 2. phys. naturam esse materiam vel formam, hancq; vocadam esse magis naturam: & rursus subdit, illa habere naturam, quæ huiusmodi habent principium: & ea ēt secundum naturam esse, & appellari quæcunq; his insunt secundum se. Hoc n. (inquit) natura est, neq; naturam habet. Ex quibus sumpto principio sic formo rationem. Si natura est forma, & materia, sequitur illa maxime esse secundum naturam, quæ ab vtroq; principio sibi ratione specie necessario proueniunt. Mox ab his secundum ordinem constituunt, quæ solum ab vna suæ speciei natura fiunt: & qm̄ forma est magis natura, q̄ materia, ideo in quibus forma suæ speciei seruatur, & formæ vis, illa magis secundum naturam existere censemus, q̄ alia, in quibus forma vel penitus est deperdita, vel obscure operatur, propria in materia remanet. Ea verò, in quibus neq; forma, neq; materia suæ speciei seruatur, nullo pacto, profectò secundum naturam vocari possunt. Atq; vt illa prima, in quibus formæ, & materiæ rō adseruat, plane secundum naturam sunt: ita hæc postrema toto genere esse præter naturam certum

Bb est:

est: media verò inter hæc extrema non facile constat, an prorsus sint secūdū, vel pter naturā. Ex quibus patet, animalia & eorum partes in humanis cōceptibus optimè esse & appellari pter naturā: at lapidis in uesica, uel renib. ac lumbrico rū generatio toto genere esse pter naturā dubitauit nemo, id ē Gal. asserēte. Verum monstra, ut ex Arist. constat 4. de gen. anim. c. 4. pter naturā quoq; sunt, sed partim quodammodo secundum naturā: nā in illis eadē met materia adseruari solet, naturalis tñ forma mutari, veluti in yteri mola a Medicis appellata, euidenter monstratur. Cum hoc tñ in rigore philosophico illud ē, quod habet aliqd secundum naturā, monstrum, & pter naturā appellamus, siquidē degenerare constat a generantis natura. Cæterum monstra, ea propriè erunt, q̄ contra naturam fiunt, neq; solum monstra, ea dici merentur, quæ diversorum animalium speciem ex parte, aut ex toto referunt, sed ea ē, quæ forma prodeunt multi membri, multi nimirum pedib. aut capitib. ut ex Arist. euidenter constat li. 4. de gen. ani. c. 3. Itaq; rationes monstrorum, & oblaforum animalium propriæ, & similes inter se quodammodo non sunt, monstrum. n. esse, oblafo quādā est, deesse ēt facti quicq̄ aut superesse monstrum est: Verum tñ monstri rōnem tradit idē autor lib. eod. c. 5. dicens: Cum ita feminis genitales, & naturæ in efformando factu motus soluantur, & inordinantur, & eo vsq; procedendo a semetipso degenerent, ut deum ne homo quidem, sed animal tantum aliquod existat, huiusmodi quæ gignuntur, monstra appellari meritò solent. Neq; n. quod genitū est, generanti vspiam simile euadit, sed extraneum maximè & alienum, & quæ superest materia a semine, & vi formatiua non superatur, homo quidem ex homine eo non nascetur, sed tantum animal, quod uniuersale seruetur in generatione, pereat autem quod singulare, & indiuiduum est.

De mon
stri seu
prodigio
si conce-
ptus dis-
ferentijs

Sunt proculdubio tā prodigiosi cōceptus, tantaq; in his uarietate natura ludit, ut difficulter possis eos numerare. Nā primo ferunt non solum geminos ter nosve, sed numerosa sobole posse una factura fieri conceptus, q̄ licet forma, & natura totali genitorib. existant similes, numero tñ & naturæ ordine, ac instituto dissident. Idē alios producit natura, quibus gemina habere genitalia cōcessit, hermaphroditos appellant, olim androgynos vocatos: sexus vtriusq; inter se viciis coeuntibus: nā mammā dextrā uiri, in mulieris dextra generari multis est cōpertum. Itē duplici genitali nōnulli visi sunt: sic & frequentius supracaneis partib. p̄ditos plerosq; uidimus. Hinc nonnullos geminato capite, cruribusque geminatis corpore ferè toto geminato esse, nec fabulosū est, siqdē semel duos tergoribus iunctos, immo potius terгоре uno p̄ duob. corporib. fuisse perfungentes traditū est. Qui ēt nunc uiginū annorum tractu motibus plurimum differentes uixerunt, quorum alter cum mortem obiret, alter tandiu superstes fuit, donec iā emortui germani corruptione, putrilagineve, ac graueolentia discesserit. Præterea aliqn̄ euenit, partem aliq̄ aliis esse iusto maiore & deformiorem, ut digitus, aut manus, aut caput, vel plures q̄ par sit euadant, & rursus, uel minores uel pauciores, q̄ hominis naturæ conueniant. Atq; ita in his naturam ludere cōspicimus, & uarietate luxuriari, ut ad deformiores alios conceptus sese quoque ueluti delirans irruat. Nam ferunt castro diui Amandi Alliferi in solo Borbonico, ex iuuenula quādā natum puerum ab umbilico supra hominis figuram referentē, infra verò Syrenæ modo in pedem minicum desinebat. Itē fertur foeminam

A minā sine brachijs natū, q̄ pedibus ad nendū, & suendum loco manuū utebat. Refert quoq; Plin. li. 6. c. 30. in orientis parte intima gentes esse sine marib. alias superiori labro orbatas, ac nonnullis sine linguis: Quidam & Pigmeorum gentes prodiderunt ante paludes, ex quibus Nilus oritur Nomades cynocephalorū lacte viuentes. Verū ex integro naturæ errore horrenda interdum videre est animalium figmenta. Puerum. n. ortum capite arietis, & alium capite bonis accepit Arist. & ouē bouis capite natā. Alcipem et feminam elephantum peperisse fertur. Ancilla itē cuiusdam, q̄ serpentem peperit indubitatum exemplum est, quale in vbrā extitisse Lucanus eleganter præcinit. Matrem, q̄ suus conterruit infans, fertur repertam esse. Hippocentaurum quoque in Thessalia ē muliere natum Claudus Cæsar non dubitauit. Dimitto quidem plura alia exempla, ne alicui redio esse possim, & vt ad horum omnium differentias deueniam.

B Ex ijs, q̄ diximus constat quinq; reperiri monstrorum genera: primū, qd̄ vī quodammodo secundum naturā existere, cōprehendens oēs nationes, quæ defectu aliquo insigniuntur. Ferunt etenim quosdam vnico in media fronte oculo insignes esse: alios in humeris oculos habere, quippe quibus ceruix minimē sit: itē alios in montis Amiai conualle siluestres pone crura plantis auersis; alios quoq; sine ore, corpore uniuerso hirsutos, halitu & spiramentis naso tractis viuentes. Sic Sciapodes reperiuntur, hoc est, qui se vmbra pedibus facta tegunt. Alios geminas in singulis oculis pupillas habentes, visu quos irati intuenē intimentes: aliosq; eiusdē naturæ cōplures, quos monstrorū à cōi hominū generis signa esse formatos dubitauit nullus. Secundum genus monstrorum ex his est, quorum corpora magnitudine, aut paruitate à natua hominum cōmoderatione deficiunt, vt pumiliones, vel gigantes. Tertium verò ea continet corpora, quibus aliquod mēbrum deest, vel superabundat, quod sanē complectitur her maphroditos, vel ea corpora, q̄ plures digitos manuum, vel pedum, aut plura brachia, vel crura, aut capita habent, vel ex necessariis defecta existunt. Quartū quidē ea monstra cōplectitur, q̄ partim humano corpore fruuntur, aliqua tñ particula, aut pluribus bruti alicuius speciem refert. Quintum autē & vltimum eorum est corporum, quæ bruti alicuius animalis ex toto, vel plurium mixtim speciem, ac figuram representant, quorum omnium causas iam audies.

C Ad verā causarum monstri indagationem prius operæpretium duxi docere yniuersam rōnem monstri pendere ex defectu similitudinis natorum ad parentes, q̄ a forma, & a materia proficisci ex Arist. mente antea retulimus. Verū circa primam naturæ partē, vt constat ex B. Th. 1. p. q. 4. ar. 3. Cum similitudo attendat secundum conuenientiam, vel cōicationem in forma, multiplex subinde erit similitudo, secundum multos modos cōicandi in forma. Quædam. n. dicuntur similia, quæ communicant in eadem forma secundum eandem rationem, & secundum eundem modum, & hæc non solum dicuntur similia, sed æqualia in similitudine, sicut duo æqualiter alba. Alio modo dicuntur similia, quæ cōicāt in eadem forma secundum eandem rōnem, & non secundum eundem modū, sed secundum magis, & minus, vt magis album, & minus albū. Tertio modo dicuntur similia ea, quæ cōicant in eadem forma, sed non secundum eandem rationem, vt patet in agentibus non ynuocis. Cum. n. omne agens agat sibi simile in quantum est agens, agit autem ynumquodque secundum suam formam,

*De mon
strorum
causis.*

Bb 2 neces-

necesse est, quod in effectu sit similitudo formae agentis. Si ergo agens sit contē-
 tum in eadem specie cum suo effectu, erit similitudo inter faciens, & factum in
 forma secundum eandem rationem speciei. Si autem agens non sit contentum
 in eadem specie, erit similitudo, sed non secundum eandem rationem speciei,
 velut ea, quae generantur virtute Solis, accedunt quidem ad aliquam similitudi-
 nem Solis, non tamen ut respiciant formam Solis: nisi secundum similitudinē
 generis, & non speciei. Præterea dum agens est contentum in eadem specie cū
 suo genito, tres similitudinis naturarum ad parentes species apud peritiores vi-
 ros scriptas reperio. Prima quidem est in specie: secunda in sexu: tertia verò, &
 vltima in proprietatibus individualibus. Sed anteq̃ vltra progrediā, dubitādi
 rō sese offert circa similitudinem in specie, qua homo hominem generare nititur,
 videlicet quam rōne formatiua facultas, cum de genere sit naturalis potētiae,
 disponere possit materiam sibi subiectam ad suscipiendam sensitiuam formam,
 cum agens nullum vltra suam perfectionem agere quicq̃ possit: eo maxime cū
 eiusdem fortis instrumenta obineat, temperamentum nimirum, calorem, & spi-
 ritum. Quo fit profectò, ut difficile videatur eandem posse his instrumentis or-
 ganicum constituere corpus: cui si accedat secūda dubitatio de similitudine in
 particularibus cōditionibus, difficilius reddet dubium. Sed huius rei gratia in
 memoriam reuocare oportet illud Arist. 2. de ani. c. 1. nempe, ipsam esse actum
 corporis physici organici. Quò fit, ut potentia inferior aliq̃ teneatur organiza-
 tionem instituere, & parare iuxta naturā formae introducendae, cuius naturam
 sapiunt potentiae oēs, quae cum instrumenta sint agentis principalis, ab illo mo-
 ventur ad actiones, & fines sibi necessarios: ob id profectò naturales potentiae
 habent mutuam à forma superiore perficiente inferiorum adiones, & ideo
 videntur aliquo mō vltra sui naturam agere: haud secus q̃ rude instrumentū in
 peritissimi artificis manibus. Quamobrem in hōi actionibus talis ingentura
 pullulat delineatio, & figura, qualis fuerit editio, & natura agentis principalis
 ris, à quo mouetur: & ob id mirum non est, vegetabilem potētiam corporis or-
 ganicum effingere adiuta, & ducta altioris potentiae vi, & efficacia: quam sanē
 efficaciam inceptam, ac receptam in semine, perficit, & adiuuat feminarum v-
 terus, cui ē efformandi vim auctores nō contēnendi praebeuntē, & semen eius-
 dem cui ē assistit feminae forma. nam per difficile esset credere solam illā vim
 à generatē transmissam semini virili posse formam formare in concursu vteri,
 & seminis feminei vis. Ex quo quidem difficile videri non debet primā simili-
 tudinis differētiā, quā in specie sitam esse diximus, proficisci ex facultatibus in-
 ferioribus corporis organica harmonia disponētibus ad introductionē formae
 rōnalis, q̃ specie, & substantiam rei genitae constituit, similem quidem parenti-
 bus in specie, licet parentes hanc formā non p̃stiterint, sed dispositum corpus,
 hoc est, semen formatiua facultate donatū, q̃ postea in vtero organizationi in-
 cumbit. Difficiliore aut dubitationem constituit similitudo, q̃ sita est in indi-
 dualibus cōditionibus, & cuiusq̃ rei proprietatibus. Quam sanē similitudinē
 sitā esse in facultate quoq̃ formatiua individuali, non quidē specifica, ut in pri-
 ma similitudine, suspicamur. Ad cuius dubij intellectum expendisse oportet ad
 cunctarum rerū generationem, ut auctores non contēnendi arbitrantur, hu-
 ius facultatis seminaria plurima expandi per continentē aerē a caelo gignenda
 plan-

A plantas, & animalcula quædam: tñ hæc manent actus non contractus ad naturam indiuidui per signatam materiam: ob idq; non adseruat indiuidualem similitudinem: & cum non sit per proprietates propriæ materiæ coercitus, producit semper sibi simile in specie, non tñ sibi simile indiuiduo. Verum informatrix animatorum in semine facultas, cum sit per signatam materiā contracta, ab illa recipit, vt producat speciem similem, respondentem tñ certis et definitisq; affectibus eius indiuidui, vnde decisa est. Cum. n. formatrix sit vis corporea residua in parentum membris, & sui similitudinem semen inducat, quia facultates has potius ex subiecto, & materia, cui inhaerent, diuersas esse credendum est, q̃ ex propria natura, si quidem potentiæ per materiam indiuiduatur, ob id hanc peculiarem similitudinem non à facultatis formatiue diuersa ratione solū (licet eam consciam eius similitudinis esse oporteat) sed ad materiam seu instrumentum, et quo vtitur, & cui veluti subiecto alligatur, referendam esse proculdubio arbitror. Subiectum aut, cui formatiua hæc facultas inest, tñ esse censeo spiritus, & temperamentum illius seminalis substantiæ, cui inhaeret, vt semen illud in aliud transmissum simile ei, à quo decedit, generare possit. Sed explicare nūc incumbit, quas habeant téperamentū, spiritus, & semen conditiones, quasve vires, vt tam grande possit eis vtens formatiua vis effingere opus, quale est nō solum organizationem absolute efformare, sed cum hoc ad materias has sese contrahere, ac determinari ad indiuiduales conditiones. Quas proculdubio existimamus sortiri ex parentū corporibus: quippe cū hæc potentia naturale sit agēs (non quidē absolutū, sed ad indiuiduālē quandā proprietatē reductum) & agēs omne, oīs q; potentia sibi simile producat, q̃ studeat semper passum sibi assimilare: sequitur easdem indiuiduales conditiones suscepturum semen, & eisdem pollere factum iam in vtero genituram. Quas sanē vires exerit calore seu temperamento, & spiritui: quibus sanguis menstruus facile accersitur ex innata dispositione, ac deinceps sigillatione, q̃ ex principalium mēbrorū temperiem genitura principium sortitur. Expendendum tñ est, vt clarior euadat hmoi doctrina, quam rōne eas vires parentum téperies semini præstare possint. Temperamentum quidem, vel nullo dubitante omnium humani corporis actionum immediatum esse instrumentum euidenter constat. Præterea temperamentum duplex existit: cōe seu totale vnum: & peculiare cuiq; partū propriū aliud: hoc quidem veluti cuiusq; partis forma illi inhaerens: illud verò ex omnibus particulis constans, hoīemq; taliter, vel taliter temperatum denominans, continens virtualiter oīum particularium téperamentorum aliarū corporis partium vim, & rōnē. Insuper, licet téperamentum non sit præcipuū agens in hoīs formatione, augmento, & nutritione: est tñ proportionatū instrumentū huic actioni: & quemadmodum in virtute causæ cōtinentur effectus cāe principalis, ita in virtute instrumenti immediati, p̃sertim determinati ad illam actionē, continentur quoq; effectus. Siquidem in artificialibus, & naturalibus et vnūquodq; instrumentum peculiari cuiusdam actioni dicatur, velut ferra, aut malleus, aut pinicillus. Sed probare nunc interest, temperamentum virtualiter continere omnium partium organizationem, vt dum in actū dirigitur in semine, eā, & patri similē efformet. Cum dictum sit duplex esse téperamentum, partiale nempe, & totale constat temperamentum partis cuiusq; esse illud, qd taliter partis, cui inest, na-

turā constituit, & substantiā, qđ alteri parti inutile esset contrariū, aut diuersū: **A**
 in quo sanē téperamento tota partis natura, & conditio, ac pprietas sita est, non
 solum ea rōne, qua similis, verum ēt quatenus organica est, quia téperamētū
 & simplicib. & organicis proficuum existit instrū, illis quidē tanq̄ proprium,
 organicis uerō tanq̄ cōe. Ex quibus constat uentriculū, iecur, cor, caput & cete
 ra totius corporis mēbra suum sortiri peculiare téperamentum, qđ sanē si alteri
 particulæ p̄stes, non ob id p̄fecto officium eius, qđ id recipit, eo téperamēto opti
 mē fiet, sed singulis actionib. corporis singula quoq; sunt téperamēta, actionib.
 illius partis p̄ficua, & formæ eiusdē immediata. Ob id cum totale illud tépera
 mentū uirtualiter contineat reliqua oīa, sic semen fit (ad cuius materiā ea humo
 rum pars, qđ totali hoc téperamento fruit, separat, & ad testes deferret, vt semē fiat)
 vniuersali quoq; téperamento p̄ditum, velut corpus a quo decedit. Quod semē
 cum deinceps præstaturum sit in generatione materiā, faciliē in similes partes
 eis a quibus decedit, cōmigrat, quia facultas formatiua, qua fœtus producit, hoc
 téperamento cōi utitur tanq̄ instrū, quod cum in se cōtineat proprietates, & in
 diuīdualcs conditiones oīum partium, a quarum téperamento sigillatum cōflu **B**
 xit (siquidē postq̄ illarum conditiones indiuiduales, & proprietates illas rece
 pit, retinet quidē & ad actum reducit suscepto in vtero semine) fit faciliē, ut fœ
 tum efformatū parentibus similē effingat formatiua facultas. Ex quibus constat
 qualiter téperamentum p̄stet ad similitudinem efficiendum. Intē est mō docē
 re qua nā ratione seminis, & sanguinis materia huic quoq; similitudini princi
 piū præstare possit, quod ex eo p̄bandum est, qđ sanguis vel menstruus, uel ex
 quo semen fit, vt ex B. Th. constat, sigillationē quandā in iecore suscepat, tanq̄
 ab opifice cōmodum, & naturā particularium mēbrorum respiciente. Quā sa
 nē rē paulō diligentius cōprehendisse oportet, docet. n. p. i. q. 119. art. 2. cōstare
 in natura animalium verum esse, uirtutē reperiri cōicatiuā sui in materia indi
 uiduo proprio, ex quo sequitur alimentū, quod in principio est dissimile, & in
 fine oīno simile, in medio esse in potentia proxima ad finē. s. formā determinatā
 mēbrorum. Quod si aliter esset, forma non esset cōicabilis. Præter qđ quod natu
 ræ ordo habet, ut gradatim procedat, de potentia ad actū. Sic igitur alimentum **C**
 ipsum primo accipit quandā uirtutē cōem respectu oīum partium corporis, qđ
 sanē in fine determinatur ad hanc partem, uel ad illā, quod ēt de spiritibus qui
 ad testes descendunt, subaudiendū puto: nā in materia, qđ ex hoc sanguine, & spi
 ritibus in testiculis conficitur, uirtus qđā est deriuata ab anima generantis, at p
 ductionē totius corporis. In qua sanē rē expendendum est, uirtutē hanc forma
 tiuā in principio generationis imprimi in mēbris præcipuis a semine ex quo fit
 fœtus. Quo facto constat ab eisdē membris transmissā substantiā (siue sanguis
 sit, siue spiritus) in totius vitæ discursu, secū ferre eandē vim formatiua in potē
 tia remota, impressā p̄dictis substantiis a mēbris his, uirtute animæ corpus in
 formantis, ita vt necessum sit, quantū rei natura patit, similē fieri fētū genitorib.
 quia in materiis ex quibus geniturā fit, adēst uirtus oīum partiū, & rursus potē
 tia formatiua, a p̄dictis mēbris cōicata, qđ necessario fœtum formabit iuxta sui
 naturam, & conditionē. Cuius rei probatio hæc est, iecur non generat sanguinē
 in genere, & citra aliquem respectum, sed ipsum perficit ad indiuiduū habito
 respectu, cuius nutitiuonem intendit, quamobrē, tenetur non utcunq; sanguinē
 gene-

A generare, sed certum, & determinatū pro hoīs ipsius peculiari natura, & conditione. Præterea non sāt est sanguinē sic inconsulō genuisse, sed eis conditionib. præditum, quibus possit singulis particulis respondere, easq; reficere, & alere: siquidem non quæuis sanguinis pars quīs particulam nata est alere, sed determinata sanguinis natura, & conditio determinatā quoq; particulā adit, & alit. Quod ēt probari vltius pōt ex iecoris officio & præstantia, quippe id generari tibi soli sanguinem non est credendum, sed pro reliquo corpore, q̄ hac rōne membrum princeps sit appellatum. Quapropter non vtcunq; & indeterminatē, sed iuxta naturam corporis alendi, id perficit in quo opere impressionē & sigillationē quandam sanguini præstat, vt eis partibus ex usu sit, quas alēdas sibi natura tradidit. Ex quibus iam constare arbitror, semen & sanguinē menstruū naturā, & uim a conficiente iecore suscipere, qua parentum particulis correspondere teneant, si illis futurum erant alimentum, si quidē alitionem ex similibus fieri erat necessum. Eam aut similitudinem, q̄ cum membris alendis obtinet, seruat sanguis menstruus, & qui semen fit, vt postea in utero ex hac materia facile sit reliquis consentientibus, in membra similia eis, quæ in corpore parentū alere tenebantur, commutari, & commeari virtute formatricis potentia operātis, quam indiuiduari per hanc materiā antea diximus. Et hanc arbitror esse materiæ sigillationem, q̄ in sanguine fieri B. Th. profert. Similitudini quoq; consequendæ innititur spiritus quidā genitiuus, seu calor, cui formatiua facultas ēt inhereret. Cuius sanē spiritus magna copia cum sanguine defertur, continēs ferē formale seminis, quatenus genitale est, rationem. Nā ob id testibus tribuit natura arterias, nervos, & venas, vt possit oīs spiritus suppeditare vberem copiam, q̄ testes coctione in seminis materiam implantant, & ipsum hac ratione efficiunt prolificum. Quippe testes nil aliud semini (quo genitale sit) pstant, & in hoc differt semen, quod vasa spermatica conficiunt, ab eo quod testes, quia illud infecundū est, hoc verō hac rōne fecundum, cum formatiua hoīs uis in ipsum his spiritibus medijs, sui similem vim formatiuā inducat, testibus coctione huic operari ministrantib. Qui sanē spiritus sic transmissus genitibus appellatus, continet ēt in se virtualiter oīm membrorum indiuidui a quo decidit, proprietates & conditiones, quod iam probare aggredior. Spiritus quidē hi de genere & fortvitalium spirituū existunt, & cum vitales sint (quod nullus dubitauit) iidē re cum tēperamento influente, seu, vt rectius loquar, cum calore influente, sunt. Præterea, huius temperamenti gratia oēs nostri corporis partes viuunt, & actiones perficiuntur. Quo fit profecto, vt verum sit, hos spiritus, seu hoc tēperamētū influens virtualiter quoq; in se includere oīm particularium tēperamentorū virtutes & efficacīa: siquidē totale temperamentum, quo homo a prædominio taliter tēperatus existit, ex oīm partium temperatura resultat, & tēperamenta hæc particularia illud totale habent constituere rōne influxus a corde mutuati. Qui sanē influxus (si oīm temperaturarum particularium custos est, & alimentū, & hæc sunt variæ, & differentes iuxta varias partiū corporis naturas) potentia omnium temperamentorum partium corporis virtutem obtinere oportuit: siquidem si alter esset, non posset proculdubio actioni cuiusvis partis, cum ipse iam diuersæ naturæ sint, adminiculo esse: neq; earum innatum temperamētum fouere, ac in actum dirigere partiū potentias: & rursus quando vitiatum est,

Bb 4 resti-

restituere, nisi huius spiritus haberet rationem causae vniuersalis, in qua particularium causarum virtutes debent contineri. Cum ergo facultas formatiua subiectetur in his spiritibus, mirum non est, illorum conditione insequens proprietates, & naturas individuales, quas spiritus semini adiunctus secum affert, inducat in foetum ipsum, quem gignit, ut similem parentibus efficiat. Quae in re expendendum etiam est, totam horum spirituum praestantiam atque efficaciam in moderandis, & fouendis varijs corporis particulis perdere ex efficacissima cordis virtute, quod Solis instar in medio corporis situm, calore suo, & spiritu omnia sibi subiecta, & commissa membra fouet, tuetur, & nouo spirituum influxu reficit, cuique tribuens quantumuis diuersum sit, quod illi est proficuum, & necessarium. Quippe temperamentum cordis et si videatur peculiare, respectu tamen totius, est veluti vniuersalis causa, qua omnes partes praedicta beneficia susceperant: & ob id necessario tenetur habere virtutes omnium temperamentorum, non secus quam caelum, quod licet particularis sit natura, est tamen vniuersalis causa, quae necessario continet in se virtualiter omnium inferiorum naturas, & proprietates. Sic profecto cor virtualiter omnium membrorum naturam obtinuit: cuius gratia censo Aristotelem dixisse cor tantum esse vniuersum membrum princeps, quod singulis partibus per spiritus communicet suas vires. Atqui cum in semine horum spirituum maxima reperiatur copia: sit profecto, ut illorum ratione inducat formatiua facultas proprietates individuales, quarum ratione similitudinem operatur. Quibus omnibus exacte perspectis facile est intelligere rationem similitudinis natorum ad parentes, auos, proauos, patruelos & ad reliqua individua cognationis intra quartam generationem. Nam euidenter constat sic contingere, & has esse potissimas huius rei rationes. Nisi quid aliud impederit, ut paulo inferius docebo. Superest praeter dictam similitudinem, similitudinis in sexu ratio, quae ad seminis efficaciam reducere Medici omnes. Nam dum semen virile, & femineum maiore calore participant ambo, nulli dubium est, quin masculus generetur: matri vero an patri similis euadat, ex efficacia formativae virtutis alterius seminis proficiscitur. Verum si ambo semina iusto frigidiora existant, certum est feminam generari. Quod si quis dixerit, maiorem similitudinis in sexu parte pertinere ad figuram, & organizationem partium, idque minime posse ex calore, aut frigiditate, vel temperamento proficisci: respondemus hanc similitudinem ratione materiae, cui inest temperamentum, & ratione formativae potentiae fieri; nam materia, quae ratione sui temperamenti apta est ad certas partes simplices efformandas, dispositionem quoque habet ad figuram seu organizationem adquirendam, non ad quicquam, sed ad certam, quia organizatio non ex quibusvis simplicibus, sed ex certis, & determinatis proficiscitur. Cum vero materia ad certas, & peculiare partes simplices determinata sit, sequitur quodammodo determinari ad eam organizationem, quae ex illis nata fuerit proficisci. Quibus constat quantum proficit materiae temperamento organizationi perficiendae. Praeterea formatiua facultas, quae temperamento omnibus partibus efformandis eorum vitur, supplet sua vi, & natura defectum ipsius temperamenti, quod nequit ex proprijs viribus figuram construere: construit tamen ipsi formatiua facultas: nam ea ratione tributum est illi id nomen ex dispositione nimirum instrumenti, & spirituum. Sed genitalia sic formata intromanere, aut prominere extra, non quidem solum ex formatiua facultate, & mate-

- A** & materiæ aptitudine. Sed ex calore proculdubio proficisci, credendum est. Sic profectò dum semina ambo calore pollèt, facillè hæ partes prominent, dum verò calore sunt orbata, aut diminuta, intus latent, sexum constituentia diuersum vt paulò superius docuimus, & hac rōne intelligenda est sn̄a eorum qui tenet sexum proficisci à calore, non quidem, vt multi interpretantur, quod nos antea refutauimus. Et hæc est in genere similitudinis ratio. quare verò dissimilitudo vel à sexu, uel à parentibus, uel ab specie fiat, iam audies. Ab his igitur similitudinibus ex prædictis causis promanantibus, tria etiam dissimilitudinis genera prodire comperimus. in quibus quinque illas monstruorum species cōtineri dictum est. Quæ genera recensere mihi est in animo, si prius dixerò genitum fieri dissimile à generante duobus modis. Vno quidem, quòd informatrix facultas, licet habeant omnium paternorum membrorum simulacrum, cum hoc tamen non æqualiter ab omnibus illis excitatur ad simile opus perficiendum: quia informatrix seminis non applicatur singulis idolis sufficienter in fœtu efformando. Ex qua sanè causa prodit dissimilitudo natorum ad parentes modo in sexu, mō in accidentibus. Verum si non solum inæqualiter vis formatiua excitee, sed et inordinate per semen distribuatur, monstruosos fieri partus necesse est, quia partes in diuerso situ locat, vt cum aures in humeris, aut eadem parte oculos figit, vel vis generatiua pedū ad manus peruenit, aut contra: quibus constat monstruosum fieri quoque conceptum. Altera rursus causa dissimilitudinis, aut (ut rectius loquar) deformitatis est, qm̄ connata, & formatiua uis assimilare qnq; impeditur in opere, ne assimilet. Quod fieri profectò pōt vno è duobus modis: nimirum, quia similitudo diuersa in altero semine potètiore est, & evertit alterius seminis similitudinem remissiorem. Contingit. n. nō rarò patris oculos esse paruosissimos, & matris maiores; ac fœtum subinde altero oculo patrem æmulari, reliquo uerò matrem: qd̄ quidem de brachijs, & cruribus, ac reliquis partibus, q̄ binæ sunt in corpore contingere scimus; id qd̄ proculdubio monstruosum esse certum est. Secundo mō natū dissimiles à parentibus fiunt, qm̄ materia seminis uel menstrui, vel utriusq; nequiuit à formatrice regulari neq; quoad speciem in ducendam, neq; quoad similitudinem aliam: qua sanè de causa, non solum dissimilitudinem à genitoribus, sed mille monstra potissimum oriri arbitror. Hæc etenim causam retulit Arist. li. 4. de gen. anim. c. 4. nimirum cum materia facultates, & motus generantis uel minus impedit. Atq; hi sunt modi, quibus in uersum fieri dissimilitudines, & monstra contingit. Expendendum nūc est, quæ ratione materia inepta fiat ad motus formatiue facultatis suscipiendos. Fit autem materia inepta ad ueram similitudinem comparandam, multis modis. Primo ex defectu sufficientis copię, idq; aut in toto, aut habito respectu ad aliquam uel plures partes futuras. Ex quo prodit fœtus pumiliones fieri, vel aliquibus partibus constantes longè minoribus, quàm toti corpori gubernare potens est, gigātes, vel deformes magnitudine procreat homines, aut aliquas partes facta collatione ad totū corpus magnitudine deformissimas. Quòd si eadē copiam regulare nequeat natura, informem carnem, aut mille alia monstra, quæ inferius referā producit. Tertiò uerò modo inepta fit ad similitudinē cōparandā materia ex dissimilitudine, & inæqualitate substantię, uel ex effusione ipsius p̄ uterū ipsum; uel

luc

luti accidit plumbo calfacto, quod si inæqualiter fustum sit, inæqualia efficit simulacra: ex quo sanè vitio in semine deformes, & inæquales partes succreuisse comperimus: vt ijs accidit, qui caput habent crassius gradius, ac deformius, vel pedes, manus, aut nasum, q̃ reliquo corpori conueniat. Quarto mō id accidit ex vitio crassitie, duritie, vel fluibilitatis, aut corruptionis seminis, aut sanguinis menstrui, vt etiam si aliquid generetur, longissimè tñ à parentū natura dissideat. Sed anteq̃ ad vltimum materiæ impedimentum deueniam, expendisse oportuit quibus hæc monstra modis à parentibus dissideant. Dissidere aut monstra hæc à parentum natura tribus modis cōstat. Primò dum materia seminis idonea est, non tñ ex toto superatur: quo tpe proculdubio fit eorum, quibus assimilari pōt id, qđ maxime est vniuersale, & genericum, cum fieri nō possit simile in specie, neq; in indiuiduo: ob id pullulat eo tpe in generatione ex sanguine menstruo aliquod animal, cum homo fieri non possit: tendit. n. natura ad id, quod melius est, subsistit tñ in eo, quod pōt. Itaq; generatur tantummodo sensitiuum, in quo subsistit defectu materiæ: nam cum semen illud potentiam habeat ad sensibile, id ad summum consequitur; rōnale verò non fit, neq; anima talis introducitur pp̃ inceptitudinem materiæ, & organizationis. Seruatur tñ in generatione quidem vniuersale, quod est animal, & genitum remanet in forma dispositiua, aut degenerat in aliquam brutorum speciem. Cur verò potius hoc, q̃ illud monstrum suboriatur, ad imaginationem esse referendum pleriq; arbitratur, & paulò inferius docebo. Secundo modo ex hoc defectu à parentibus dissident nati, cum magis ēt impeditur seminis facultas ita, vt neq; animal adhuc gigni possit, sed tñ quid informe, medium inter viuientia, & non viuientia obtinens, cuius generis sunt molæ mulierum, vt sequenti c. monstrabo. Vltimò verò ex hoc defectu prodit tam esse mutatione penitus ineptam materiam, vt agentis facultas nullo modo ipsam immutare possit. Ex quo illud prodire certum est, quod toto genere præternaturam esse philosophi censent, & appellāt: cuiusmodi est in vteris feminarum generatio calculorum, aut tophaceæ substantiæ. Sed vt finem huic rei imponam, superest quidem aliud impedimētum, quo semen operari liberè nequit, nec natos parentibus assimilare, nimirum imaginatio varia, & vehemens inter concipiendum, vel in toto formationis tpe, quæ sanè dominatur formatrici naturali seminis, imperatq; ei eo modo, quo inferiores potentie parent superioribus. Et sic imprimatur potius idolum seu effigies imagine vehementer cōprehensa, ante quidem, q̃ paternum dolum in semine adseruatū ex quo vulgatum est apud plerosq; philosophos p̃dictum dogma. Quibus etiā astipulatur B. Tho. q. 4. d. art. 8. ad. 13. dicens, quod imaginatio est vis quædam in organo corporali, vnde ad speciem imaginatam mutatur spiritus corporeus in quo firmatur vis formatiua, q̃ operatur in semine: & idè interdū aliqua mutatio fit in prole ex imaginatione parentis in ipso coitu, si fit fortis. Ex qua sña, & ante ipsam multi censuerunt ex inepta materia, quæ hominis formam adipisci nequit, fieri aliquñ sensitiuum, eius tñ speciei, cuius est animal, qđ sc̃mina in imaginatione concipit, & vehementer apprehendit, aut expauescit. Cuius rōne ferunt accidere partus monstrosos, aliquñ canis effigiem præ se ferentes, aut uiruli, vel felis, vel cuiusuis alterius bruti iuxta imaginatricis apprehensionē. Ego tamen eidē B. Tho. sententiæ innitens proculdubio arbitror, tantæ esse efficacit̃

&

A & potentia imaginatione, vt ad specie imaginatā mutetur spiritus corporeus, qui ad testes feminæ, & vterum perueniēs, sit veluti facultatis formatricis fundamentum, & subiectum: qui postmodum iuxta imaginē imaginatiuæ impressam, ferū efformare habet, eò q̄ maioris sit efficaciam, q̄ genitiuus spiritus, qui in semine paterno præfuerat. Mouent. n. potentia superiores infimas, & aliquā earum actus potentius perficiunt, q̄ ipsæmet naturales, vt videre est in ira, timore & tristitia, ac cæteris animæ passionibus, quæ potentius, & efficacius vniuersū corpus turbare habent, & humores vndiq; mouere, q̄ ipsæ naturales. Ex quo constat spiritum illum ab imaginatiua potentia prædicto modo motū efficacius suas vires exercere, & formationis, effigiem delineare, q̄ ipsa formatiua, q̄ ex parentis membrorum conditione prodierat, & in semine, vt dictum est, præfuerat. Verum cum hoc (vt expressè ex eadem B. Tho. sententia constat) arbitror imaginationem posse aliquod accidens in generatione immutare, vt constat ex femina, quæ æthyopem tpe coitus intueas depictum, & ipsum vehementer imaginans, æthyopem peperit: nam id omne efficere potest hæc imaginatiua potentia, q̄ cā æquiuoca, putā Sol ex putredine terræ, vt murem, lumbricū, aut aliud animalculum ex ijs; quæ imperfecta sunt, & ex Sole, terræq; apparatu, ac putredine indeterminatè fieri conspiciamus. Verū animalia perfectā, vt canem, vitulū, aut huius naturæ alia, censemus citra vniuocum agens fieri sola imaginatione esse impossibile: licet dictum sit meridionalibus, & australibus feminis plerunque accidere, carneam quādam substantiam cū fœtu excernere, animalis alicuius speciem ferentem, quam feminæ illæ feram appellant: an tamen verū sit ignoro. Quod si aliquā quid simile contingere videamus, dubium profectò est, an femina culpa alicuius bruti accessus excusari possit: siquidē impossibile est (aut saltem intellectus non capit) potentiam illam imaginatiuā adeo posse materiā immutare, qd̄ ipsam ad peregrinam illā formā introducendā disponat; ni velimus Albertū magni opinionem sequi, qui tenet id fieri posse ex vi astrorū, q̄ apta est illis animalculis generandis, q̄ cum omnino integrum generare ex humano semine, & sanguine non possit partē aliq̄ illi similē effingit: quum varietatis obtineat dicent alij: & sic quodā mō vī experimentis acquiescendū, in ijs maxime, q̄ animal aliquod, aut partē eius appetierunt ingēti desiderio, & imaginatricis apprehensione. Nā ob id ferunt repertas esse feminas, q̄ suos filios pepererunt ore leporino, aliæ dedibus ouillis. Tñ hæc ita obscura sunt, vt videant in arcanis naturæ recondēda. Maxime cū ex professo doceat B. Tho. p. 1. q. 117. art. 3. ad. 2. materiā corporale nō obedire substantiæ spirituali ad nutū: inquit. n. Sed suprā ostensum est, q̄ materia corporalis non obedit substantiæ spirituali ad nutū, nisi soli Creatori, & ideò melius dicendū est (loquebatur de fascinatione) q̄ ex forti imaginatione aīæ immutantur spiritus corporis coniuncti, q̄ quidē immutatio spirituum maxime fit in oculis, ad quos subtiliores spiritus pueniunt, oculi autē inficiunt aerē continuū vsq; ad determinatū spatiū. Ex quo inferre oportet, qd̄ licet vehemēs imaginatio vires hēat spiritus mouēdi, efficiēdiq; aliqd (vt dictū est) immutare tñ materiā, vt possit pfecti alicuius bruti forma introduci, mihi vī perdifficile. Præsertim cū idē B. Th. q. 101. art. 2. ad. 2. referat, qd̄ animalia perfectā, q̄ generāt ex semine, nō possunt generari p solā virtutē celestis corporis: ex quo inferat minimē posse sufficere huic generationi cām aliā æquiuocā lōgē inferiorem,

feriorē, & impotētiore celesti, nimirū imaginationē. At licet huic adiūgat virtus **A**
 formatiua, quæ præfuerat semine parentum, hæc quidē sufficit os, carnem vel
 alias partes efformare, cæterum formam, & figuram earū ex æquiūoca illa cau-
 sa, videlicet imaginatione proficiscitur, & cum hæc sit minoris efficacæ, quàm
 Sol, non poterit æquē disponere ad generationem animalis perfecti, q̃ non nisi
 ab agente naturali fieri pōt. Atq; hæc sunt, quæ de similitudine, & monstrositate
 natorum colligere potui: quæ si quispiam aliter, aut curiosius velit scrutari, nec
 veto, nec displicebit. Dimitto etiā multa de similitudine natorum ad parētes,
 quæ huic vsui non erant proficua, licet pulchra. Huius profecto rei pauca (q̃d
 De mon-
 stroso cō-
 ceptu di-
 gnoscen-
 do.
 ego legerim) extant notæ, cū hoc tamen certissimum est, in monstroso conce-
 ptu matrem graui, & nouo aliquo symptomate, premi quod vel admirationem
 inferat, vel causam habeat occultam: nam cū mali alicuius causam nosse, sit
 perdifficile, & grande fuerit ipsum malum, coniectandum est, à prædicta aut si-
 mili causa proficisci, vt in mola generatione plerunque conspiciamus: quæ qui-
 dem si tam graui, & varia atque diuersa à communi conceptu adfert acciden-
 tia, quanto maiora sperandum est, monstrum posse præstare. Sic profecto Hip.
 lib. 2. pop. p. 2. tex. 20. retulit de Antigenis vxore, quæ monstrum masculum pe-
 perat, inquit. n. Antigenis vxor quæ circa Nichomachum peperit filium, como-
 sum quidem, habentem autem maxima discretā, magnitudine autē, vt quatuor
 digitorum, sine ossibus, post modum verò crassum rotundum. Hæc antè partum
 asthmatica fiebat, deinde simul cum partu pus euomit modicum, quale ex fu-
 runculo. Qua certè sententia probatur, quam graui, & noua accidentia ex mō-
 stroso conceptu subcrecant. Quapropter ne turpius aliquando decipiamur,
 id cautè proferre, & diligenter expendisse oportet. Mirum fortassis alicui vide-
 bitur, quorsum scripserim monstrorum generationem, si quidem postquam ge-
 nitum est, difficillimè cognoscitur, & curari auxilijs nequit. Verum mea mens
 De mon-
 strorū ge-
 neratio-
 ne praca-
 uenda.
 est, in hac affectione, quæ periculosa, & miserabilis censetur in femina, quæ se-
 mel monstruosum edidit partum præcauere quominus id malum iterum reuer-
 tatur. Cuius rei gratia duplicem oportet præmittere indicationem, alteram, quæ
 facultati formatrici prouideat: alteram verò, quæ materiam disponat, aptamq;
 reddat foetui naturali efformando. Circa primam duo nobis officere incumbit,
 primum, facultatem ipsam formatiuam roborare, vt commissum sibi negotiū
 perficere possit. Quod sanè fieri existimo ijs, quæ spiritum copiam generare sunt
 nata, & genitis calfacere, velut vinum ex aromatis confectum; cibaria facilli-
 mi nutrimenti, calida vel media temperie prædita. Instillatij etiam liquores
 ex vino, floribus calidis, & odoriferis: ac præcipuè instillatio, q̃ ex theriaca, vi-
 no oderifero, vitellis ouorum, melle, gariophyllis, cinnamomo, & pane recen-
 ter cocto, & calido paratur. Cōfert, & electarium de hiacinto, vel de gemmis
 cum speciebus, & prædicta instillatione, aut vino. Item omnia odorata, quæ ca-
 lidū, & suauē odorē expirent, velut vinum, aqua uitæ, aqua naphthæ, cinnamo-
 mi, iasminorū, & ea, quæ ex gariophyllis paratur. Exterius uerò corpi epithemia
 ta apponere oportet, quæ consimilem præstent virtutem, & tandē curandū est,
 totum corpus roborare leuib. frictionibus, exercitijs, somno medico, alimen-
 to multi succi, & animi hilaritate, ac delectamentis. Quibus facultas robustior
 facta iurij externis, imaginationi, & materiei uitij resistere vehemē? possit.

Sc-

- A** Secundum verò, quod circa facultates moliri oportet, est imaginatiuam potentiam perpetuò à brutorum terriumq; animalium consideratione distrahere, eamq; pulcherrimarum rerum imaginibus insignire, nò solum cuius spe, sed tota gravidationis duratione. Quamobrem distrahere oportet musicis instrumentis, gratis loquelis, pulcherrarum imaginum inspectionibus, & ipsa quoq; femina perpetuò conetur, quæ pulchra, & grata sunt, considerare, mœstitiâ fugere, timore oî carere, & hilari constantiq; nò esse, ne ex bruti alicuius, vt muris serpentis vel alterius inspectione terreatur, & expauescat. Circa materiam verò considerandum est, num ex paucitate, ex vberiori copia, ex crassitie, tenuitate vel aut partium inæqualitate, vel ex propria corruptione in hæc mala degeneret. Nam paucitate, ob quam pusillos fieri fœtus contingit, subueniendum est copiosiore alimento, maioris substantiæ, humidioris, & copiosioris succi, & abstinentiâ à venere. Vbertati verò, inedia, exercitijs, frictionibus, alimentis paucioris succi, tandem sanguinis detractione, & frequentioribus balneis ex sulphure vel ex calidis herbis. Purgabis quoq; has tertio quoq; mense, ante quàm grauida fiat cartamo, agarico, & alijs, quæ crudos succos, ac pituitam expurgare scimus, sic dum crassum existit semen, q̄ insecundant, attenuent, digerant, & expurgent, sunt adhibenda, & alimenta, ac potus, quæ fluidius reddat semen. Vtendum etiam est medicamentis calidis, quæ crassas partes seminis fundant, & ijs et q̄ superius diximus posse vberiore spiritum copiam suppeditare. Quod si fluidius semen fuerit, alimentis crassioribus, & solidioris substantiæ re agēs, diuurno, & laborioso exercitio, balneis ex sulphure, frictionibus, & puegantium medicamento, qd̄ serosos humores euacuare habeat. Partes et̄ genitales calfaciendæ sunt, & vterus calidis roborandus, & siccis, qualia abudè superius diximus. Item, si inæquale semen est, prosperam in omnibus alimenti officinis coctione conciliare oportet calidis roborantibus, & modicè astringentibus medicamentis. Interdicereq; ante oîa opus est cibarium varietatem, sed vnico tm̄ utatur femina, vel duobus eiusdem nature, seruata in q̄titate oîbus diebus pari portione. Vtrob̄ et̄ q̄ roborent, & semen probè conficiant, adhibenda sunt, qualia abudè superius diximus, proficiscitur non minus prodigiōsus cōceptus ex inæquali seminis vtriusq; patetis emissionē: cui rei primum ex vsu est, si ambo ad coitum ita se inuident, vt simul, & senel atq; cōferim possint semina emittere, excitato tardo parente, coercitoq; qui citius excernit ijs, q̄ superius diximus. Prodest quoq; si se parentes abstineant à frequenti coitu, maxime si semel mēstrua defecerint, & femina per se senserit se grauidam esse: nam ex huius concubitu facile ex nimio appetitu aliquid ei aculati seminis vterus rapit, cuius aduentu incepta formatio interuultur, vitiatur, & (qd̄ frequentius est) turpi aliqua nota fedatur, vel superfœtatio aliqua gignitur. Præterea cauendū est, à concubitu femina adhuc mēstruis occupata, donec ex toto purgata fuerit. Nil n. citius, & propius monstruosum conceptū efficere poterit, quàm si sanguis ille mēstruus, quæ natura tanquā inuile, & spurcissimū expellit, materia fiat gonitura: nam mirum non est si ex tā inepta, & fœdissima materia monstruosū, & horrendū animal fiat: superat quidē virus, & malitia illius sanguinis oēs genitalis seminis, & formatricis facultatis vires. Vltimò autē hæc monstra fiunt ex corrupto semine, vel sanguine mēstruo. Quamobrem quibus in seminis cognitū fuerit, sanguinem mēstruum

struum vitiosum esse, sanguinem ante conceptum mittes, & ipsum à putrilagio A
ne expurgabis cassia fistula, confectione amech sine scammono, & coiocin-
de, decocto foliorum sanæ, aloë, & pillulis ex mastiche, vel rhabbaro. Itē ali-
mentis moderari omnes humores oportebit, vt superius dictum est. Tandem ca-
uere feminae accessum conuenit, nisi quinq; aut sex diebus post menstrua pur-
gationem, sanguine prius misso, & sufficienter expurgato corpore. Seminis itē
vitia corrigere oportet pessarijs odoriferis, siccis, & q̄ putredinē exsiccent, sed
p̄cipue ijs, q̄ semen per vterum expurgent, additis alimentis copiosiorib. & bo-
ni succi, q̄ putrida substantia admisceantur, ipsamq; corrigant, & atterant.

De vteri mola. Cap. 8.



ATVRA proculdubio interdum certis quibusdā motibus ex
operatur, quæ fieri ex eiusdē legibus non posse vident. Verū
cum ipsi munus sit, sese quantū possit conseruare, & tueri, lon-
gē satius existimat, aliquid (vtcunq; sit) potius, q̄ nihil efficere
ea. n. est nature prouidentia, vt calor artifex, & autor eorum, q̄
generantur, nunq̄ sit otiosus, sed ex qualicunq; materia opus
aliquod artificio constituat. Sic in vermiū generatione, & aliorum, q̄ ex putre-
dine terræ fiunt, otari nequit: q̄ cum maius aliquid ex materia efficere nō pos-
sit, animalculum illud, in quo conseruari queat, effingit. Quod si materiā pro at-
bitrio tractare non possit, q̄ parcior, vberior aut ex diuersis generibus constas,
vel aliter affecta fuerit, monstrum generat, q̄ aliud perfectius efficere materiæ
defectu illi non datur: si tñ adhuc omnino inepta sit, vel herbam, vel rudius ali-
quid in terra efformat inducta perfectione, q̄ maximē pōt. Quæ quidem omnia
in feminarum vteris euenisse conspiciamus ab spiritu illo genituo, quē sui do-
micilij architectum veteres appellarunt. Quamobrē dum sibi conueniens ma-
teria, tractabilis substernitur, ex vtriusq; sexus semine cōstans, fetus ad vtriusq;
vel alterius effigie efformatur: p̄sertim si accesserit imaginatricis facultatis vis,
optimi moderatoris officium exequens. Ceterum si formatricis vis imbecillior
sit, & q̄ subijcitur materia, nequeat ad tantam perfectionē peruenire, eō q̄ qua-
litate, q̄ titate, cōsistentia, vel alicuius extranei permixtione, maximē aliena exi-
stat: fugiens nihil generare, aliquid effingit, siue animatū sit, siue inanime: nam
cum dictum antea sit, hominem esse parū mundū, proculdubio est, quia om-
nium, quibus mundus constat, perfectiones continet. Sic etenim essentiā cum
elementis, vitā cum plantis, sensum cum animalibus, & sibi peculiare intelligē-
tiā, seu animā rōnalē habet. Atqui cum ita ad hoīs perfectionem progrediatur
natura: sit quidem ob id, vt portentosa generationes haud rarō accendant: nā (vt
dictū est) rudis q̄dam moles gignitur, in quasi vitio ipsius materiæ, vel faculta-
tis formatricis defectu in ipso itinere, intercipiat, nil mirū si informē feturam
sine tpis ordine excernat. Quod si vltius progrediatur, nō tñ debita perfectio
ne, animal eius naturæ, q̄ magis conuenire materiæ videat, proficisci est creden-
dū: ex quo fortasse vel rudis aliqua mola differētia, vel fetura varijs animalū
imperfectorum figuris affecta conspiciē. Cum tñ præcedentiē abundē dictum
sit de monstroso conceptu, nūc verō de mola generatione, causis, signis, & cu-
ratione

A ratione agendum duxi. Est igitur mola, vt Gal. placuit li. 4. & 14. de vsu par. c. 7. *Mola quid.*
 & 14. meth. c. 23. caro quædam inutilis atq; informis, & ouo gallinarum subue-
 taneo proportionē respondens. Quæ verba si quis expendat, reperiet, molam mi-
 nimè esse tumorem, neq; vteri duritiem, sed quid proportionē ipsi respondens,
 q̄ adnascuntur. Cuius naturam optime depinxerūt Hip. & Arist. 4. de ge. an. c. 7.
 & 4. meth. c. censes ex diminuto calore vel ex defectu gignitiui spiritus, vt
 censuit Hip. fieri non quidē per omnimodam cruditatē, neq; per assationē, sed
 per mediā q̄dam caloris, & spiritu actionē q̄ imperfectæ naturæ actio cēsenda
 est. Quorum virorum sententijs refelluntur sniæ Auic. Pauli, & Aetij de molæ
 generatione, nī velis ipsas amice interpretari, vt sequenti paragrafo leges. Ex
 quo elicitur, cū mola caro sit informis atq; inutilis in vtero supercrecens, mor-
 borum esse ipsius in compositione, ex eorum p̄sertim numero, q̄ toto genere p̄-
 ter naturam existunt, velut est lapis in vesica: eò q̄ in eius generatione nil sit eo-
 rum, q̄ secundum naturam nobis in esse diximus: licet Arist. neq; perfectā, neq;
 omnino aliēnam à natura esse censcat. Itaq; eius natura consistit in omnimoda
 naturæ imperfectione, q̄ nondum vetuit animantis conditionem attingere, sed
 carneam substantiam adeptā, informis, & rudis nulla figura prædita vtero adna-
 scitur, & adhæret, donec tanq̄ quid inuile indiuiduo, & specie ocysimè proj-
 eiatur, natura ipsa lacescens, & defessa id molliente, nulla seruata t̄pis lege. Hu-
 ius porro imperfectæ genituræ multi existimant varias subesse differentias. *Mola differen-
 tia.*
 Nī Paulus, & Aetius nomine molæ tumore in vtero induratū lapidis duritiē re-
 ferentē intelligi voluerunt. Quā affectionē ego non ad molā, sed ad tumorū spe-
 ciem aliq̄ potius reducerem: rō profectō id conuincit, quia in virginibus rarō
 hmoi scit rhosa dispositio, quæ vterum in tumore, & magnitudinē insolitā at-
 tollat, reperitur: cū mola ex vtroq; semine fieri certum sit, vt inferius probabo.
 Barbari item ferè oēs crediderunt molā esse (p̄ter carnē illam substantiā, q̄ verā
 molam appellat) statuosam q̄uis vel aquosam, aut cuiusuis alterius humoris na-
 turam referentem, intra vterum conclusam, ipsumq; grauidationis mō, in tumo-
 rem attollentē. Quas oēs molæ species ego ad falsam grauidationē reducere, po-
 tius q̄ ad molā: nam nisi caro sit inutilis atq; informis qd̄ in vtero gestatur, haud
 quāq̄ molā esse appellandā, arbitrandū est, iuxta Arist. saltē, & Gal. sniā. Verū
 in ipsa carneā substantia, q̄ uerā molæ rōnē hēt, nō leuis existit differentia. Mul-
 ti n̄q; referunt in forme quidē esse carnīs frustrū, ceterū motum, qd̄ patuissi-
 mū extensionis, & contractionis obdūere, ac obscurū ēt sensu citra vlla formā.
 Constat t̄n maiori ex parte carnē solū esse plurimis venis, ac sanguinis ramifica-
 tionib. interseptā quibusdā albis ductib. vel viridibus, aut subcholoris nigris ve-
 aut varijs coloribus pmixtis sine sensu neq; motu nullā seruantē figurā, legē, ne
 que ordinē. Itē alterius substantiæ aliq̄n visitur, nimirū, pelliculosæ, & mēbrano-
 sæ, sanguine aliquo veluti affuso, & concreto, qui postea in aq̄ proiectus in ip-
 sam, qd̄ sanguinolentū est, abit remanente parte mēbranacea, q̄ seminis cōcreti
 naturā refert citra determinatā aliq̄ figurā. Sed cōpertū est quoq; grauidationē
 hanc degenerasse in membranaceā substantiā, globosamq; totā aquosis bullis
 rotundis, tumidis, pellucidis, & innumeris plenē, aliq̄n cum sanie fetida, & di-
 luta: quā sanē figurā iā cōperimus in vxore bibliopolæ cuiusdā, & se vidisse te-
 stant ex neotericis plures. Si quis autem rē diligētius consideret, reperiet uarij
 figu-

figuris insigniri posse, cum de genere sit eorum, quæ præter naturam existunt: A
 quæ sanè neque legem, neque numerum, neque certum naturæ, & generatio-
 nis modum usquam obtinuerunt, & ob id multi forma sunt, sicut & mole mul-
 tiformes apparèt sine ordine, aut figuræ integritate. Causas verò huius affectio-
 nis Hip. primum omnium literis mandasse constat inquit. n. i. de mor. mul. Mo-
 læ conceptus hæc causa est. Quum multi menses exiguum, & morbosum semē
 exceperint, neque conceptus rectus sit, & venter plenus est, veluti prægnantis.
 Confimilia quoque refert lib. de steril. dicens; Fit itaque mola in vtero, cum mē-
 sium copia exiguum, & minimè robustum semen virile conceperit, aut etiam
 muliebri. Ex quibus euidenter constat duplicem huius mali existere causam;
 alteram, copiosum sanguinem, ac fortasse fœculentum, crassum, & omnino in-
 eptum, quem natura ad menstruam purgationem tanquam inutilem adserua-
 uerat, copia, & natura à fœturæ perfectione alienum; alteram verò, vim seminis
 formatricem imbecilliolem. Quibus sic iunctis fit, ut desit motorium princi-
 pium formando fœtui idoneum. Quo circa constare arbitror, duo hæc esse ne-
 cessaria ad molæ generationem, nempe sanguinis menstrui copiosum affluxū, B
 & seminis virilis impotentiam. Primum quidem præter Hip. sniam probauerat
 quoq; Arist. 4. de gen. anim. nam quærens, cur cæteris animalibus molæ nō ge-
 neretur, nisi mulieribus duntaxat, respondet, eam inter animalia affectionibus
 vteri obnoxiam esse, & menstruis abundare. Quibus verbis euidenter fatetur,
 menstruorum copiam necessariam esse ad molæ generationem: ac probat eodē
 loco prærequiri et viri semen, dum inquit; Accidit quidem mulieri, ut cum con-
 cubuisset, & se cōcepisse putasset, primum ventris moles augetur, & reliqua
 ex ratione venirent: quæ demum difficultate intestinorum implicata, eoq; mō
 periculata peperit carnem, q̄ molam vocant. In cuius confirmatione dixit Gal.
 lib. 1. 4. de usu par. loquens de falsa quorundā opinione circa mulierum semē.
 Secundo aut, q̄ mentiuntur et in ijs, quæ accidunt, explorandis: nōn. n. sicut gal-
 linæ, sine maribus oua pariunt, ita mulierem, aliquā viderunt sine viro, vel mo-
 lam, vel hmōi quidpiam aliud concepisse. Ex quo patet non sufficere mulieris
 semen ad fœturam aliq̄ efformandam, sine viri semine, et si suscento ab ipso prin-
 cipio ad fœtus formationem concurrat. Quod si virginibus aliquā euenisse con-
 stet, aliquid molæ persimile præmissis grauissimis accidētibus excreuisse, id po-
 tius ad vteri lumbricos referendum existimo, q̄ ad veram molam. Neq; rursus
 credendum est, molam aliquā fieri ab exurente sanguinis menstrui, aut vteri ca-
 lore; nam carnis generatio non est solum caloris opus, sed moderati cum spiri-
 ta, & vi formatiua, qua carent vterus, & sanguis mēstruus; præterq̄ qd id ex pro-
 fesso docuerat Arist. loco citato dicens; Afficitur. n. conceptus eo mō, quo ea, q̄
 inquinari dicimus, cum elixantur: neq; per calorem, ut quidam volunt, sed po-
 tius pp caloris debilitatem. Natura. n. deuicta certare vī, neq; posse perficere, fi-
 nemq; apponere generationi. Et mox subdit; Causa nanq; duritiei cruditas est:
 quippe cum inquinatio quoq; cruditas quædam sit. Censeo tamen in hac re ali-
 quando molam fieri posse non ab adaucto menstrui calore, sed ab exurentis se-
 minis conditione, cum defectu, & resolutione spiritus genitui: nā constat opti-
 mē semen morboſo calore esse calidissimū, & de pauperatū ob id, atq; orbatum
 spiritu naturali: ex quo fieri quoq; molā existimandū est. Quibus iā cōstabit q̄-
 rum

A tum veritatis obtineat Pauli, & Aetij sententia, & eorum etiam, qui censent ex solo mulieris semine, & menstruo sanguine fieri, vel ex immodico ipsius menstrui calore. Superest igitur principium præstare paucissimum viri semen, morbosum, ac imbecille, & copiosum sanguinem, cum maximè, qui menstruationi paratus erat. Quo fit, ut mola plerumque suboriatur, si femina coierit menstruis eminenubus, fluentibus, vel nondum ex toto purgatis. Et vltimo cum antequàm femina, quæ concepit, & fetus formationem perfecit, viro avidissimè adhereret. Item his accidit, quæ diu habent menstrua suppressa, ut Hip. lib. 5. pop. refert de vxore Gorgiæ, cui menses per quadriennium non fluxerunt, & frumellâ pepererat, & subsequuto diuturno vteri fluore, proiecit molâ, postq̃ sana facta est. Præterea dictum est superius aliam aliquâ subesse molæ speciem, q̃ membranaea constat substantia multis bullis referta: cuius causam esse censeo aquosum, & frigidum mulieris semen, tpe concubitus vnâ cum vteri plenitudine in ipsû eiaculatum: quod à virili semine concal factum debiliter, nullum præstitit generationis principium: cui aliquâ accedit virile semē morbosum, copiosum, & flatibus plenu spiritu, & calore nativo orbatum. Aut credibile est, viri semen ab vteri ichoribus, & spurcitiâ extinctum, refrigeratumq̃, fuisse: semen verò feminæ, cum exigui sit caloris, membranam concreione fabrefecit, agēte adhuc imbecilli calore bullas ex eleuato flatu, quem discutere nequiu: quò fit, ut bullæ illæ succereuerint in genitura. Atq; hæc sunt molæ causæ, quas, p vario mixtionis modo, varias quoq; molæ configurationes, & varia accidētia procreāt. Quæ oīa diligenter cognoscere oportet, ne aut in sterilitatē, aut malum corporis habitû femina commigret. In principio quidē à vero partu difficulter mola distinguitur, ut Hip. lib. 1. de mor. mul. aperte monstrat, dicens; Si verò fluxus ipsi nō fiat, contingit, ut pgnans esse videatur, & cū viro coit, doleat, & putet quid incumbete, & grauitas sit in ventre, & venter prominēt, & desiderijs similib. afficitur, velut in ventre habeat, & stomachi dolore afficiē, maximè vbi quinquaginta dies præterierint, & dolor aliàs, atq; aliàs habet ventrē, & partes circa vmbilicum, & collū, & inguinā, & lūbōs, & postq̃ menses duo, aut tres præterierint, qnq; menses acervatim ipsi in pudendum erumpunt, & quæ prodeunt, velut carnem esse putant. Atq; licet pleraq; ex his signa veram quoq; gravidationē ostēdere soleant: cum hoc tñ distinguere eam oportet ex venteris umorem: nā is magis, & citius impletur in mola, q̃ in vera gravidatione, & durior efficitur. Menses item supprimuntur, nausea, & uomitus incurrunt, motus in utero tremulus percipitur siue à mola, siue ab utero, velut inutile pondus excutere contēdēte. Motus ē; quales fetus edere soleat, nullus persentiunt, et si trimestris, aut grandior existat. Accidit præterea corporis macies, deprauatus color, sanguine menstruo redundante, ac regurgitante ad supernas partes. Quæ accidisse constat, q̃ probi alimenti materia desit, & quod anorexia graui corripiantur, nec cibū ingerant: quamobrem extenuari est necesse. Sequitur et quibusdam sanguinis fusio per uterum, cum à mola conceptæ magnitudine vel fetus premitur, vel nolum suscipit alimentū, vel ad incrementū nullus illi subest locus, mola occupāte magnā uteri partē, & ob id aperiēte uasorū oscula. Vnde mox dolores, & cruciatus uteri, sanguinis tetri, & concreti ualdeq; corrupti profusio ingens, & per plures dies animi deliquia, enixus, febris grauis, insomnia, pulsus defectio, coloris

Mola signa.

loris pallor, angustia, symptomata melancholica, & timore plena haud raro subsequuntur. Verum cum hoc (nisi foetus simul adsit) nihil in ventre mouere vel quod exiguum percipimus, ut Hip. testatur li. i. de mor. mul. dicens; Nihil aut in ventre mouet, neque lac in mamminis generatur, licet plerisque mammae intumescant, verum sine lacte, & cum maxima lumborum grauitate, & in uentre cum pungenti dolore, utero ipso prolabente ad feminae decubitum supra dextrum, uel sinistrum latus. Verum de enixus tpe consideratione dignum est, quod ex his, primis statim mensibus quidam excernuntur, aliae diu durant per duodecim menses, ac per tres integros annos, ac multo plures. Aliae quidem cum fetu generantur, apertae, (ut dictum est) iterum uteri osculo nonnullae foetui alligantur, quodam secundo ita implicite sunt, ut difficulter excerni secundas permittant; aliae rursus tam grandis existunt magnitudinis, ut grande aliquod animal representant. Quas procul dubio esse periculosissimas nemo dubitauit, maxime si Hip. crediderit, quod li. i. de mor. mul. & lib. de steril. haec refert uerba; Si mola, una caro fiat, mulier perit, neque, nisi fieri possit, ut superstes maneat; si uero plures, erupit ipsi per pudendum sanguis carnosus plurimus; & si hoc moderate fiat, seruat, sin minus, effluxu correpta perit. Distingues autem haec accidentia ab iis, quae in uero conceptu reperiuntur, quod signa omnia certam quidam conditionem praeseferant, quae id facile monstrat; nam cibi fastidium non utcumque, sed maxima cum animi deiectione est: item immodicus appetitus non quiescit adhuc exhibere appetita: uomitus uel niger, uel foetidus, aut alterius deterrimae conditionis profilit: dolores frequentes, grauiiores, & acutiores: animi deliquia non sine periculo: enixus est cum grauissimis accidentibus, & toto fere gestationis tpe prope os pubis, pudendum, & imas uentris partes, pondus persentiunt, & non leue molestiam, quasi ad partum perpetuo pruritu irritatae, cum dorsii & inguinum doloribus. Quae omnia anxios, & quodammodo sollicitos nos reddere debent, suspicantes conceptum illum non esse legitimum: inquit. n. Hip. li. i. de mor. mul. Iudicare uero oportet ex plenitudinis mole, & quod in uentre non mouet: nam trimestris, foemina quadrimestris motum habet. Postquam igitur tpe hoc praetergresso, non mouetur, nimirum hic morbus est: est autem hoc signum, quod lac in mamminis non generatur. Curadi quidem rationem tribus omnino capitibus comprehensam esse arbitror. In primo quidem cum mola concepta esse certo scimus, quid agendum sit docebo. In secundo qualiter accedentibus, quae ipsa excreta subsequuntur, & in ipso enixu uigent, subueniendum sit. In tertio uero, ne iterum foemina in huiusmodi conceptum incidat, praecauere monstrabo. Primam itaque medicandi rationem maturo, & prudenti consilio aggredi opus est, ne loco informis foetus ambiguus signis deceptus, abortum prouocare contingat. Quam profecto rationem Hip. dixisse arbitror li. i. de mor. mul. Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum praedictione. Verum si certi fuerimus mola esse conceptam, (quia maius periculum est, si diutius in utero inueterauerit, ita ut plerisque scriptum sit, quod paucissimas fuisse superstites) pronuntiatio periculo curationem aggredi oportebit; laborante aeri temperato exposita, in cubiculo non admodum lucido, exhibitoque uictu optimi nutrimenti, & prohibitis animi affectionibus. Quo facto, si corpus plenum esse conpereris, sanguinem ex dextri brachii basilica extrahes, parces tamen ne doloribus, & sanguine nimis detracto, imbecillior foemina fiat. Nec conuenit malleolorum uenam tundere post praedictam sectionem, sanguine adhuc redundante. Quod si crassorum humorum copia subsit, praeparatione praemissa, pro-

Curadi
ratio.

Afos purgabis, ut e. de suppressis mēfib. dictū est. Præterea, si natura ad expulsionē non gliscat, neq; partum acceleret (qđ melius foret) eis vtendū est medicamētis intus, & extra, q̄ laxandi, emolliendi atq; mitigandi vires habeāt. Sic. n. inquit Hip. li. i. de mor. mul. Et primū quidē totum corpus foueto, deinde per sedē clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat: fortassis. n. qđ cōpactum est, cōmoueris, id quod fœtus esse putatur, muliere a pharmaco cōcalfacta: sed & vteros colluito, quo sanguinem educas, sin minū, subdititijs vtatur fortissimis: ē bupræsti, & dictamum creticum ē vino bibat: sin minū, castorei testē, & retro cucurbitulam ipsi ad laterum mollitudinē effigito, & plurimum sanguinē detrahitō: atq; hoc maxima rerum, ac viriū ipsarū cōiectura facta, facito. Qua snia pulchrē docet, vniuersā huius affectionis curationē, à qua sumpta rōne licet fœmēta in principio parare, q̄ vteros aperiant, vt faciliē sanguis deinceps fluat. Huius naturæ sunt quæ parantur ex decocto maluarū, altheæ, chamæmali, seminis lini, fœnugræci, fertulæ, & anethi, factō quidē ex aqua, aut hydræleo, q̄bus paulo post addes lauri folia, thymum, pulegium, hyssopum, poliū, centaurā, & crocum. Sed peculiarius huic vsui cōpertum est prodesse decoctum, quod recipit altheæ, maluarum cum suis radicibus ana m. j. radice aristolochiæ rotundæ, & longæ cuiusq; m. j. & s. (longæ, item aristolochiæ radix fœmori alligata partus accelerat) foliorū artemisiæ, mercurialis, saluiæ, hyssopi, calamēti ana m. s. seminis lini, altheæ, fœnugræci, & leuistici ana s. s. florū chamæmali, meliloti, toris marini, geniste, artemisiæ an. p. j. fiat decoctio in hydræleo, & cū philtis foueantur muliebres loci, inguina, & coxendicū partes. Quo facto, hoc linimentū p̄dictis partib. adhibebis calidū, qđ recipit olei irini, liliorū alborū, anethi, & chamomillæ ana s. j. butyri recentis, adipis anserini ana s. j. & s. vini odorati. s. j. bulliant ad consumptionem vini, & addē ladani s. j. ceræ q̄tū sit satis, vt fiat vnguentū. Aliud quidē maioris efficaciz experiri poteris, qđ recipit dialtheæ. s. ij. emplastri filij Zachariæ. s. j. axungie porcine, pinguedinis gallinæ, anseris, & medullæ cerui an. s. s. styracis calamitæ s. ij. colocintidis, pulueris radice vtriusq; aristolochiæ an. s. j. oleorū de lilio, & violarū q̄tū sufficiat, ut fiat linimentū addito croco. Verūm si hæc prodesse nō possint, vt mola decidat, & angustia, ac dolores creuerint, ad maiora deueniendū esse cōsultuit vrgens necessitas: quo casu confert potius, qui recipit cinnamomi electi, myrtæ electissimæ an. s. s. pulueris aristolochiæ lōge. s. j. pulueris diamargaritonis frigidi. s. ij. fiat oīum puluis, cuius det. s. j. cū aqua decoctionis phaseolorū. In qua sanē re si plurimū necessitas cōpulerit, ad ea q̄ fœtus mortuos eijciūt, deneniendū est. Qđ si hæc uelis experiri, li. huius operis. 4. c. de secunda relicta, abundē reperies. Ceterū cū in laborioso hoc enixu vires tm̄ labi possint, q̄ fœminæ frequenter præ animi defectu, & spirituum resolutione periclitentur, omni arte curandū est vires reficere, & robustiores reddere, maximē si a partu anteq̄ mola excernatur, vel anteq̄ ob molæ vitiū copiosior sanguinis fluxus p̄cedat. Optimis itaq; insculis, & carnibus caponum atq; perdicū, uel succo carnis cum margaritis, vel pulueribus cum electario de gēmis laborantē reficere oportet, vel iecore gallinaceo elixo cum iure gallinæ uel capi, factō ex prædictis puluerib. salamento cū saccharo: succo ēt reficere oportet ex caponum, & perdicum carnib. in balneo mariæ extracto, dummodo puluis margaritarum, gariophyllorū, cinnamomi, & coralli

Cc 2 rubei

rubei de super spargatur. Sed potissimum id opus facies vino albo, tenui, & odorato, ac si sanguis copiose fluxerit, admixto modico rubro. Quib. factis Deo op-max. iunante vires facile restituentur, ac fortura discedet, obstetrice manibus conante carnem illam comprehendere, ac leuiter extrahere.

Secunda curandi ratio, ab excreta mola principium sortitur, quae proculdubio tantum praecipit viribus prouidere, & dolores mitigare: hoc quidem anodynus, quae superius diximus, & oleis liliorum, de semine linai, lumbricorum, de radice, & semine angelicae, & axungijs gallinae, & anatis cum croco, & butyro recenti, & alijs huius celsus: illud vero praedictis cibis quae reuertiendi vires habeant, veluti usculum cum vitellis ouorum, pauco uino albo, saccharo, & cinnamomo. Praestat, & vinum ex odoramentis confectum, electarium de margaritis, vel conditum ex conseruis rosarum, buglossae, & violarum, adiecto pulvere margaritarum, vel electarij de geminis: confert etiam alchermes uel confectio de hyacintho. Quod si sanguis plurimum irruat (quod grauissimum saepe infert periculum) viriliter cibum ingerere oportet, & partes supernas leuiter vincire, ac fricare, & alijs praesidijs uti, quae c. de immodicis ment. dicta sunt.

Tertia vero, & vltima curandi ratio praecauere docet, quo minus iterum generetur mola in ijs, quae semel id malum perpessus sunt, qualia reperies c. praecedenti. Quam etiam indicationem adimplebis purgatione ante menstruum fluorem, sanguinis missione ex talo, si improbe menses prodierint, & ex brachio, si sufficienter fluxerint. Proba item victus ratione, moderatis exercitijs: cauentes ne concubitum admittant mensuris non satis purgatae, aut mox a conceptu, si femina se concepisse senserit: quod partu peritis facillimum est.

De falsa grauidatione.

Cap. 9.

NON citra optimam considerationem factum est, falsam grauidationem a mola me separasse: quidem, ut mea fert sententia, & mox probabo, & generationis modum, & affectus naturam, & curandi rationem, ac signa ipsa longe diuersa habent. Fit itaq; grauidatio falsa, cum feminae cuiuspiam viro uten- ti menses supprimuntur, venter intumescit, accidentiaq; verae grauidationis simillima ad sunt: cum hoc tamen nil vitae particeps in utero efficitur, sed aliud, quod cuiuspiam elementorum proportionem, & natura respondeat, velut flatus, aut quid aquae simile. Cuius rei gratia dictum est praecedenti c. ob id hominem esse perfectissimum inter cetera animalia, quod omnium perfectiones complectatur. Nam cum quatuor sint naturae perfectiones, esse quidem ut in elementis, viuere ut in plantis, sentire, ut in animalibus, ac intelligere, ut in homine: fit quidem, ut inferiores superioribus contineant, sicut binarius numerus continet unitatem, & ternarius binarium, & unitatem. Sic prorsus pari ratione id, quod essentia tantum gaudet, necessum non habet, ut viuatur, neque quod viuatur, ut sentiat, aut quod sentiat, ut intelligat. Verum in homine omnia praequiruntur, ut praecedenti c. dictum est. His suppositis, cum natura progrediat in generatione perficiendo per ascensum: contingit non raro in prima perfectione ipsam subsistere. Nam susceptis seminibus non affluente sanguine, & utroque semine morbofo existente ex calore imbecillo uteri, & viriusque seminis in aqua vel in vaporis utrunque semine degenerat non quidem agere nec debilitate, nec alio modo, ut in praedictis facultatibus, facultate formatiua, sed extincta ferè omnino existens permittit calorem vel semina liquari, vel in hali

A halitum mutare citra aliud conceptus principium, prohibens tatum, ne in corruptionem genitura commigret. Id. n. est, quod solum efficere valet subsitēs in eo, quod potest, nimirum in specie illorum elementorum. Non quidem q̄ ipsa formatrix facultas elementa illa possit efficere, sed tū impedire, ne materia illa in corruptionem commigret. Calor tū, cuius hæc opera sunt, per diminutā coctionem vaporem seu aerem creat, & per liquationem, si imbecillior fuerit, aqueam substantiam: à quibus, postq̄ uterus semine suscepto conclusus est, venter intumescit, & reliqua subsequuntur grauidationis indicia. Atqui cū facultatis formatricis nullum in hoc opere, elucescat vestigium: à prædictis cōceptibus hunc affectum separare mihi fuit visum; & quia semine concluso hæc mala succrescunt, grauidationem, eamq̄; falsam appellare placuit. Quamobrē cēseo Hip. dictum esse lib. de mor. mul. & multis alijs in locis, loquens de fœminis sic affectis. Et putant se in ventre habere. Sed clarius profert lib. de nat. pue. qui eas, quæ longius, quàm decem mensium tps uterum gestare sibi uisæ sunt, deceptas esse testatur, idq̄; in hunc modum. Quod uteri sæpe spiritum capiant in se ipsos à ventre flatum exhibente, elevato tū atq̄; intumescere vtero: vř sanè sibi tū mulieres concepisse. Quin et menses non procedentes atq̄; in utero congregati, aut calescentes, aut flatibus mixti falsam quandam grauidationis speciem nō raro mulieribus præbent, ut sibi in utero habere uideantur, nimirum menstruis nō prodeuntibus, & uteris eleuatis. Quod his verbis etiam Hip. dixisse constat li. i. prædictionum. Quæcunq̄; in utero se concepisse putant, & non cōceperunt, & per multos menses falluntur, menstruis purgationibus non apparentibus, & vtres augeri, ac moueri vident: hæc & caput dolent, & collum, & præcordia, & in mammis lac ipsis non est, nisi modicū quiddam, & aquosum. Cuius et affectio nis Barbaros medicos meminisse constat, nec non, & neotericos, qui sub nomine molæ non ueræ, eam complectuntur: inquit. n. Matthæus de Gradi. Fit etiam alia apparentia prægnationis, & falsa prægnatio ex inclusione aliarum materiarum ex matrice non sic in duratarū: de quibus aliquoties est uentositas sola generata in matrice, siue in concauitate eius, siue in uenis extendens eam præter naturam; & generatur ex humiditatib. ibidē inuentis clausa matrice. Quā quoque sniam Auic. obtinuisse constat: à quo Matthæus ad verbū transcripsit, cōstituens prædictas differentias; in quarum una, aquosa præest substantia, q̄ tps tractatu in corruptelā degenerat. Huius primū meminisse Hip. legimus li. i. de mor. mul. per hæc uerba; Multis uerò contingit, ut putent se sex mensib. in utero habere, aut et paulò breuiori tpe, & ueter prominere, & alia sibi fieri putat uelut in ventre habent, postea sunt, quibus suppurati erumpunt supra inguen simul cū quinto, aut sexto mense, & uia ea patefecerūt. Quibusdā aut ulcera fiunt in vteris et infra sub inguine, & periclitat mulier de uita. Quibusdā et (subdit) in pudendum erumpunt, & prodeunt ipsi putrefacti, ac purulenti. Quibus euident fit argumentū, fœminam sic affectam in ventre habuisse, ceterum id aquā, eāq̄; corruptam fuisse: quibus constat, falsam grauidationem à mola longè differre. Sunt equidem non pauca falsæ grauidationis differentie; nā quibusdam in aqueum humorem genitura cōmigrat: alijs in flatum; nonnullis in pus: plerisq̄; in mucorē fœtidū, acrem, & mordacem: alijs et in ichorem tenuem, & fœtidum subalbidum, uel in globosam tofaceamve pituitam uel caloris præter naturā vteri

Cc 3 in.

Differen
tia.

in eodem induratum. Quae omnia vterum in tumorem eleuasse, ac postea excreta fuisse autorum decreto, & obseruatione comperimus. A

Causa. Causam habetis affectus primò feminis morborum, & inutilis susceptionem, & conclusionem: item vteri intemperamentum, quo genitalis feminis spiritus perit; quibus accedit, vel pituita, vel aquosi humoris, aut diluti sanguinis aliquid, maxime si foemina sua sponte menses decolores, pituitosos, aut ichorosa substantia conspurcatis habeat. Quibus proculdubio facile constat id, quod vtero susceptum est, in aliquam ex praedictis substantiis migraturum.

Signa. In ijs verò, quae apparenter grauidae sunt, primò menses supprimunt, quos antea necesse est, non fuisse boni sanguinis: ob idq; his suppressis dolorem perferunt molestum capitis, lumborum, dorfi, ventris, & inguinum. Venter celerius intumescit, quam in vera grauidatione: nam in ijs, quae grauidae sunt, ferè a principio subsidet, & postmodum eleuatur: at in his, conferunt intumescit, & percussus tympani sonum edit. Verum si sonitus aquae naturam referat, grauitas & fluctuatio in ventre perferuntur, & albis humiditatibus quid per simile ab vtero instillat foetidum, acre, ac mordax. Pedes item nonnunquam intumescunt, & facies, sed potissimùm oculi, nisi ex flatu sit, totius corporis color in pallorem mutatur: & tandem omnia ferè accidentia haec foeminae habent, quae in hydrope, vel vteri inflatione reperiri diximus. Quibus etiam accedunt febres inordinate, cibi fastidium, appetitus deprauatus, & animi defectio, & alia his similia. Preterea in huiusmodi foeminis grauidationis tempus, neq; vnum, aut ordinatum existit, sed ante in plerisque vterus proiecit praedictas foeturas, in aliquibus verò multo post statutum tempus, ita ut non paruum inferat admirationem. Euadunt quidem ab hoc malo foeminae, vel steriles, vel pudendis exulceratis: quapropter diligentia non leui futurum malum precauere oportet, & praesens curare, maxime si affectio antiquior fuerit, nam eo tempore suppurationem subit aut vterum, ita male afficit, quod immedicabilis superfit. B

Cura ratio. Obtinet quidem id affectionis genus, a quavis prodeat causa, vnam communissimamq; curandi rationem, nimirum, euacuationem eius, quod praeter naturam in vtero concluditur, siue flatus, siue aqua, siue pus, quatenus alia substantia sit. Habet etiam vnaquaeque praedictarum causarum aliam peculiarem medendi viam, nempe peculiaribus, & sibi propriis auxiliis debere vacuari. Quamobrem praemisso optimo vitae instituto, frequenti exercitio, paucissimo potu ex vino, vel aqua cinnamomi, anisi, corticum citri, aut radice chinae, omni abortum mouere oportet. Caueat tamen diligens, & prudens medicus, ne falsa falsi conceptus imagine decipiatur, & partum legitimum perdat. Cuius rei facta diligentia distinctione, validis exercitiis foeminam committere oportet, velut saltus est, aut cursus, idq; in primis grauidationis diebus. Tandem fomentis, quae c. praecedenti adduximus, vtendum est, & inunctionibus ex oleo, croci, spice, & liliorum alborum cum vino, in quo ferbuerint radix aristolochiae, ciminum, ruta, & anisum cum artemisia, in fessionibus etiam rerum, quae valenter menses, & urinas mouent: pessariis, quae uterum irriterent, & purgent, veluti ex hiera, ex aloe, C
ex

A ex agarico, ex fuceo sicla, & alijs grauioribus, quæ paulò inferius cap. de secunda relictâ recensebo: clysteribus etiam acrioribus, & quæ flatu discutiant, ac ventrem purgent. Per superna verò porriges, quæ valenter menses mouere proprio cap. diximus, & alia, quæ vrinas ciunt. Quæ proculdubio omnia admiscebis ijs, quæ è directo prodesse profunt flatui, aut aquoso humore. Quo in opere cautè corpus, facta leui ex melle rosaceo, vel syrupo absinthij, aut de thymo præparatione, purgato ex hiera, pillulis mastichinis, ex aloë, aut confectis ex agarico, cartamo, & aloë, si humoris huius copiam, à quo flatu eleuantur in corpore, redundare cognitum sit: nam si solo defectu caloris flatu orientur, purgandum minus est, & discutiendum, ac roborandum magis. Facta tamen purgatione flatui discutiendo innitendum est, facta per vterum inunctione oleo ex radicibus liliorum, cui in decoctione adijcto cardamomi, seminis apij, & ameosana partes æquales. Præstat & oleum de cinnamomo, de baccis lauri, & reliquis discutientibus: item emplastrum de baccis lauri, vel ex prædicto oleo, & stercore bouino, aut columbino, addito vnguento marciaton, & alijs, quibus in tympanite vti conceditur. Vterum autem prius mollificato, vt facilius, quod ex flatu attenuatur expiret: cui vsui in sessionem parabis ex althea, semine lini, femigræco, floribus chamæmali, anethi, & semine rutæ: quibus euaporatione, & fomentum cum filtro parabis. Item suppositorium indes ex linteo prædicto decocto, madido superparso puluere aristolochiæ longæ, calamenti, rutæ, hyssopi, & trochiscorum de myrrhâ: quo non erit ab re suffumigium aliquod parare ex ruta, picra, aloë, & similibus. Loco autem suppositorij vtere radicem maluë, althææ, vel tassi barbaßi inunctio oleo costino, de lilio, de ruta, de croco cum puluere rutæ vti tor. Clysteria etiam, quæ discutiant, profunt, si acceperint decoctum chamæmali, anethi, rutæ, serpylli, sisymbrij, artemisiæ, seminis apij, feniculi, cimini, ameos cum oleo rutæ, vel de baccis lauri, additis hiera, & melle rosaceo. Quod sine hæc prodesse videantur, electarijs, quæ flatibus discutiendis sunt idonea, vt edum est, vt diacimino, dianiso, theriaca instillatio liquore ex vino, aniso, dauco, cinnamomo, theriaca cum mica panis recenter cocti, & pulueribus radicis angelicæ, cum decocto lupulorum, & melle per chemicam artē in balneo mariæ extracto. Ex vsu quoque est, summo mane parum aquæ sumere decoctionis cardamomi, seminis apij, ameos, & cassiæ lignæ cum passularum carne, & modico vino. Si tamen aquosum humorem in vtero contineri comperearis, frequentioribus vtendum est purgationibus ex agarico, pillulis mastichinis ex hiera, cartamo, diaphenicone, vel syrupo ex artemisiâ, decocto radicis chinæ, agarico, & cartamo confecto. Tandem eis vteris, quæ cap. de vteri hydrops dicta sunt. At si icho rosam, putridam, aut fetidam substantiam ab vtero promanare comperiamus, adhibenda protinus sunt ea, quæ vterum, & purgandum abluant per metranchitam iniecta: qualia cap. de vlceribus dicta sunt.



INTER ea, q̄ p̄gnantibus frequentissimè accidere cōspicimus mala, primū & vulgariū euenit appetitui quoddā vitium, ob varietatē, & instabilē conditionē, picaceum appellatum. Quē sanē affectū appellant, picā, seu chitam, ex auiculā cuiusdā similitudinē, q̄ varijs ex albo, & nigro pingit colorib. aut hederæ similitudinē, q̄ varijs rebus sibi obuijs adheret, & inserit: malaceā Latini appellant. Est quidē hāc affectio vna ex ijs, q̄ ori ventriculi accidunt: appetentiam (propriam illius pars officium) deprauans, non quidē in intentione, & augmento, vt in canino contingit appetitu, sed in deprauata appetitione, eaq; varia. Quamobrē huiusmodi affectum iure optimo prēdictis nobis insignierunt antiqui: ac reduxerunt ad earum rerum appetitum, quæ nobis extraneæ, & alienæ existunt, velut sunt carbones, gypsum, terra, & alia huius conditionis, vt virginibus morbo virgineo correptis, ac viris atro humore infestatis, accidere passim conspiciamus, sed frequentius, vt ero gerentibus.

Causa.

Succrescunt his fœminis huiusmodi accidentia, mille alijs varietatib. implicata ex mensium suppressione: quorum causā tot accidunt malorum varietates: vt vix numero complecti possis. Sed antequam hinc pergā, nosse oportet, plerū que ea magis profecto ijs euenire, q̄ laudabiliori abundant sanguine, licet alijs quoq; non desint. Sed ea interest differentia, quod fœminæ optimo prēdictæ temperamento pulcherrimos producant partus, ipsæ in frequentissimè toto grauidationis tpe laborant. Ratio potissima est, q̄ adducit Hipp. lib. 1. de morb. mul. nimirum, quia fœtus præstantiorem sanguinis partem ad se alliciunt. impuriore, & fœculentiore relicta: ex qua consonum rationi est, fœminam malum habituram. Quod plerisq; accidisse scimus, & idem refert Hipp. li. 2. pop. par. 2. tex. 19. dicens. In vtero habentū in tibia dextra infernè tertio, aut quarto mense exanthemata. Ex quo loco constat iecur ex praua redundantia affici, & in dextrū cruris sese exonerare. At eę, quæ valetudinariæ sunt, morbosos edunt partus, ipsæ verò à fœtu expurgantur copia fœdi sanguinis, & ob id plerunq; in grauidatione melius se habent fœtu sanguinis vitiosi copiam minuente. Vtūq; tamen sit, primis mensibus constat sanguinem menstruum redundare, qui non expurgatus, præsertim attracta puriori eius parte à fœtu, facillimè conspurcatur, & ea labe vitiosus efficitur, vt quancunq; adeat partem, grauissima accidentia concitare possit. Atqui non solum sanguis id malum efficit, sed eius ēt halitus tam est pernitiōsæ naturæ, vt non minus molietur damnum. Quem sanē cum ad os ventriculi transierit natura, inter alia vitia, quæ excitat, appetitum deprauare nō raro habet, ita vt iuxta eiusdem naturam, quibusdam carbones, plerisq; terram & id genus reliqua abominatur digna, degustare in mentem veniat: talia pculdubio, qualis humoris redundantis conditio extiterit. Nam licet appetitus semper suo pte motu contraria fugere, & similibus delectari habeat, tam vehementer hāc humoris natura imprimit suum vitium partibus quibus adheret cōnaturalis fiat, & appetitus quoq; more naturalis similia appetat. Quippe actiones omne, quæ coniuncto insunt, & organo corporeo operantur, non possunt, nisi

pro

A pro dispositione corporei instrumenti operari. Sic appetitua potentia tales appetitiones profert, quales est ventriculi temperamentum quoad prædictam actionem; quo fit, ut similia appetant femina humoribus superuacuis ori ventriculi factis iam connaturalibus. Sic quæ exusto humore abundant, carbones appetunt, & prosequuntur: quæ melancholico succo terram ingerunt: quæ saluginoso, sal edunt insatiabili quodam appetitu: & simili ratione quæ humoribus crassis abundant, gypsum ardentem expetunt. Quæ sanè omnia non nisi ob similitudinem humoris deprauantis appetitum exquiruntur. Nec deest quoque ratio, qua aliquando liceat probare huiusmodi feminas contrarium sui affectus appetere: nimirum dum temperamentum oris ventriculi mutatur, ceterum intemperies non fit connaturalis: quo tempore potentia naturalis, quæ nondum peruersa est, sibi simile appetit, & propter sui conseruationem affectui contrarium: quo fit, ut aliquando appetant, quod sibi futurum subsidium agnosceret si primo accessu videatur dissimile. Dignoscet autem id esse simile, aut dissimile, non solum à re appetita, licet videatur à natura aliena, sed ex eo, quod appetitus harum rerum similium, quæ præter naturam sunt, insatiabilis est, & nondum quiescit re appetita consecuta. At uerò alter appetitus, quin subsidium affectionis, contrarium causæ, aut intemperamento exequitur, tantum abest, ut insatiabilis sit, quod potius habita re appetita, cum ea morbo sit contraria, & ob id morbus ipse subsideat, cessat protinus appetitio, quia cessat necessitas. In altera uerò crescit causa, quia crescent humores ob similium appetitum, & ingestionem. Quibus facile cognoscet, & affectionem, & causam, causæ naturam, quæ utroque gerentes malè afficiunt, ad tertium, & plerumque ad quartum usque mensem. Cessant autem eo tempore partum, quod uomitione vitati humores expurgantur, partum eo quod coquantur natura minimè in cibis distracta: nam plerumque femine sic affectæ exiguum cibi ingerunt ob fastidium: partum etià quod multum indies magis minuitur, quia primis duobus mensibus fœtus parum ad se sanguinis trahit, plurimum uerò, cum magis augetur.

Longè quidem aliter hæc accidentia curare oportebit in feminis utero gerentibus, quam in reliquis corporibus: nam neque purgationibus, neque alijs, quæ uehementer abstergant pharmacis utendum esse censo, ob periculum abortus, maxime primis mensibus, ubi hæc accidentia viget. Triplex igitur erit medendi ratio: una quidem, qua alimentis tantum studeat attemperare, & moderari deterriam humorum conditionem: ob id iura gallinarum, & caponum, & carniū optimæ substantiæ adhibenda sunt; sicut extremitates porcellorum: confert, & succus cotoneorum vel malorum puniceorum cum pane: prodest, & abstinencia a dulcibus: & ijs, quæ terram appetunt, nil commodius adhibebis, quam amyllum recens: reliquis uerò confert oliuas albas ante cibum muria conditas, cum pane molli exhibere: post cibum uerò uis passulis, auellanis, & ciceribus tostis cum sale, & sinapi cum obsonijs, ac ultimo malis puniceis utantur. Vinum etiam ex usu illis est, uel si aduersentur, aqua cinnamomi. Confert mali punici cremor cum puluere menthæ: portulaca comesta, uel eius aqua, & syrupus: prodest in summa sic affectis polipodium exsiccatum, quod efficacissimum est præsidium. Secunda autem curandi ratio docet humores abstergere leuissimis tamen medicamentis, & non nisi urgente maxima necessitate: ut ubi

Contradi-
ratio.

com-

cōpertū fūerit ab acido, acrive, aut falso humore morderi, si leniter vomuerit, id excitare aqua tepida cum modico oximelite oportebit. Nihil enim cominodius est vtero gerentibus, maximè in primis mensibus: nam & vniuersum corpus expurgat, & fœtum ab humorum spurcitiis liberat, vegetioremq; reddit, verum si difficulter vomuerit, abstinendum est. Prodest & purgationis loco mel rosaceum adhibere, ac si plurimum necessitas postulauerit, aliquid ex ijs, quæ leniter purgant adhibeto, dum periculum est, deprauatum appetitum in aliud grauius malum commigrare, cui vsui proficuum est rhabarbari modicum cū conserua rosarum. Tertia verò methodus consulit, exterius ventriculo adhibere, quæ roborent, & conterant humores ibidem contentos, ob id palmularū carnes vino decoctæ cum rosis & fœniculo ventri adhibemus, vel malum cotoneū vino rosaceo, & nardino oleo exceptum, & ventriculo appositum. Confert & vinum cum oleo rosaceo, & modico aceto, ac mica panis tosta, aut oleū nardinum cum vino. Item cataplasma, quod recipit corticū citri, melissæ, calami odorati, & olei nardini, ac maltichini quantum sit satis, vt cum pane tosto, & vino rubro cataplasma possit efformari, & ventriculo adhiberi.

De pregnantium inappetentia.

Cap. 11.



MOX quidem à mensium suppressione, & in grauidis, & in reliquis experimento comperimus, fœminas cibos fastidire, & abominari, iuxta illud Hippocra. 5. aphor. 49. Si mulieri cessent purgationes, neque horror, neque febris superueniat, & fastidia incidant, iudica ipsam in vtero habere. Atque licet non sit certum, ac proprium grauidationis indicium, cibus fastidire, si quidem plerunque virginibus ex mensium suppressione accidere cōspicimus, cum hoc tamen in ijs, quæ vtero gerunt, certum est ea occasione provenire.

Causa.

Verum, vt ex autorum decretis de promere potui, ex duarum causarum occasione id malum provenire certum est: prima, quia plerique obseruarunt in plenilunio, & fœtu capillum germinante, fœminas fastidire magis, & tedio fastiscere, quia per ea tempora pueros etiam in lucē editos deterius se habere norunt, & cum id quoque in vtero contingat, fœminæ tediosæ existunt, & nil gustare appetunt. Altera verò causa ad sanguinem menstruum referenda est; quippe scimus grauidis ex suppresso menstruo tria accidere: primum quidem, operationem seminis in sanguine: secundum, separatiorem dulcioris partis pro alendo fœtu: tertium verò, effusionem reliquæ partis prorsus excrementitiæ in vteri cavitatem: vnde vapores ascendentes appetentiam omnino deiciunt, & hæc est huius mali immediata, & potissima causa.

*Cura
ratio*

Licet dictum sit ab omnibus peritis in re practica, qualiter cibi fastidium, liceat curare, in ijs verò fœminis, quæ vtero gerunt, secus agendum est. Quippe expurgantibus medicamentis id efficere non datur, licet vomitibus id malum

curare

A carare frequentissime alluescat naturā, quam Medicus imitari tenetur, p̄sertim si femina sua sponte leuiter vomuerit. Præter quæ ijs etiam aptissima sunt, quæ austera, quæ acida, quæ etiam admixto modico sale existunt. Confert ad alimoniau omnis, quæ ex venatu capitur, præsertim si assa adhibeatur: tandē caro omnis macra potius q̄ pinguis: vinum etiam generosum, & aromatis cōditū sed quam parcissimum, & per interualla exhibitum, & ieiuno ventre.

Item profunt pyrum, cotoneū, palmulæ, nuclei pini, oleæ albæ ex muria, & aceto, vel nigræ, quæ in arbore optimè præmaturuerint. Ex vsu etiam sunt, vel frigida, vel feruentes potiones iuxta ventriculi intemperamentum persentitum.

Cui cōsimilem curationem adhibebis, si ventriculus aqua inundauerit, cui præter dicta, malagma porriges ex folijs vitis, cinnamomo, cotoneis, dactylis immaturis, calamo odorato, spica, & absinthio pontico. Exterius item ea medicamenta adhibebis, quæ ventriculū roborent, veluti sunt inunctiones ex oleo absinthij, menthæ, & cidoniorum cum pulueribus diarrhodonis, aut coralli, & rosarum. Confert & mica panis tosta vino albo irrorata supersparso puluere cinnamomi, vel aliquo ex prædictis. Cui vsu proficuum est aliquod ex emplastris, quæ pro ventriculo passim adhibentur. Cauendum tamen est in hac curatione à copiosioribus medicamentis, & validioribus, quòd hæc omnia accidentia sua sponte, & crescentē fœtu cessare soleant.

De prægnantibus, quæ cibum euomunt.

Cap. supra lib. 12.

X prædicta mensuum suppressione, dum vitiosus fœculentusque sanguis in vtero redundat, idem quoque vapor ad vniuersam ventriculi cavitatem peruenit, ibidemque uitia excitat ætioribus ipsius partis respondentia. Est enim illius partis munus cibos ad coctionem continere, & prædicto halitu in eam partem conscendente euenit, ut frequentissime cibis, aut mox ab assumptione, vel multo post reijciatur, aut nauseam implacabilem excitet. Item nonnunquam alimentum ipsum vitiat, ac in nidorosam naturam commutat, vel in acidam cruditatem. Ea tamen parit mala partim acrimonia lacessita expellente ventriculi facultate, quæ si lenis fuerit, nauseam: si verò intensius mordeat, & velliçet, vomitum excitabit. Verum si vapor ventrem ascendens, calidus exustusque fuerit, credibile est alimenta in nidorem commutanda fore, sicut si frigidus, aut calore diminutus, in acidam cruditatem. Ob id quidem iuxta naturam elenati halitus præsidia adhibere oportet, idq; cautè, ne grauius malum eo præsidio succrescat.

Cum in hac curatione vacationibus, & vniuersali prouidentia vtendū non sit: ad particularia primo accessū deueniendū esse consulit rei natura: præmisso hoc fundamento: topica auxilia huic vsui necessaria discutientia, & roborantia esse debere: sic enim confert seminis apii aridi drachmas tres, coralli rubei ꝑ. j. spica

Cur. 11.
ratio.

Spica nardi, myrrha, piperis longi, singulorum g. ij. mellis quantum sit satis, vt **A**
 coquendo fiat electarium; cuius 3. s. aut. drachi. j. ieiun præbeto: post prandium
 verò conferunt cidonia in musto decocti ad mellis spissitudinem, vel mala pu-
 nica cum sorbis. Item confectio hæc in tabellis facta, incredibili efficacia pro-
 desse fertur, quæ recipit anisi, cinnamomi, corticum citri ana 3. j. & s. pulueris
 rosarum rubearum, coralli, & margaritarum preparatarum, & electarij de gé-
 mis ana 3. j. sacchari quantum sit satis, ut fiant tabellæ cum aqua ferrata. Exte-
 rius tamen non erit ab re ventrem inungere oleo absinthij, nardini, abietis, &
 naptæ cum modico puluere coralli vel diarrhodonis. Prodest, & mica panis to-
 sti succo cotoneorum vino, & aliquo ex prædictis pulueribus irrorata, vel suc-
 co menthæ madefacta. Confert etiam sacculus ex puluere diarrhodonis, rosa-
 rum, santalorum, cornu cerui, absinthij, cinnamomi, & spica. Ex vsu quoque
 est, micam panis leuiter torrefacti vino odorato madidam ante prædium sume-
 re cum modico puluere cinnamomi, vel modicum vini aromatici, Hip. appel-
 lati. Quod si ad nidorofam naturam vergat ingestum alimentum, nullum aliud
 præstantius reperies auxilium, quàm prima mensa parum aquæ frigida præbe-
 re, & paulo crassioribus vt alimentis, fugiens pingua, iurulenta, & reliqua, quæ
 facilis sunt corruptionis. Si tamen corrupti cibarij, vel humoris aliquid ibidè
 esse persenseris, nullo alio auxilio citius huic malo medeberis, quàm exhibito
 bolo armeno vel terra sigillata cum saccharo rosaceo: item prodest puluis diar-
 rhodonis vel electarij de gemmis cum eodè saccharo, aut in tabellis formatus.
 Si crudum autem acidumve supersit alimentum: calidis & quæ robur addere
 possunt, adhibenda sunt; qualia existunt, quæ præcedenti c. retulimus. Præter q̃
 prodesse quoq; ferunt potus vini uel aquæ corticum citri uel cinnamomi; sicut
 frequenter masticare, ac deuorare parum cinnamomi uel radicis angelicæ. At
 si fortè accidat uomitum fieri ex humore aliquo ad os ventriculi confluyente cū
 dolore graui, & cardiacis accidentibus, aut citra ipsa, ut in primiparis (quæ pra-
 uis alimentis uti consueuerunt, uel uitam egerunt laboribus, & curis plenam)
 non raro accidere conspiciamus, iecore aut uniuerso corpore in uentrem referre,
 re, quod illi est molestum post uteri gestationē, maximè si foemina ante uel post
 tps menstruationis, uomitus uel dolores pati erat assueta. Primo etenim morbi
 accessu coniectandum est an urgentior sit uomitus uel doloris indicatio, ea quā
 præstat humoris affluxus. Nam eo tempore dubium non est, quin frequentiori
 bus aquæ feruentissimæ potibus subueniendum sit, aut uini, si pituitam subesse
 cōperiamus, uel aliquo ex medicamentis quæ nuper retulimus. Quo facto, ven-
 tri imponens cataplasma, quod recipit pulueris rosarū, & absinthij pontici ana
 3. ij. pulueris coralli 3. ij. & s. pulueris lignialoes, & diarrhodonis ana 3. j. fursu-
 ris quantum sit satis, vt fiat cataplasma cum vino rubro, ter quaterve calidū die
 appositum. Cuius efficaciam aliud efficies, quod recipit micæ panis tosti 5. iij. ma-
 de fiat uino rubro, & succo citoniorum; uel, si astus fuerit uehemens, succo plā-
 taginis; aut aqua ferrata cum succo granatorum acrium, pulueris coralli, diar-
 rhodonis, rosarum, absinthij pontici, lignialoes, & terræ sigillatæ ana 3. j. olei ab-
 sinthij, & rosacei omphancini ana 3. j. pistentur, & fiat cataplasma. Confert etiā
 inunctio ex eisdem oleis superasperis prædictis pulueribus. Qd si uomitū im-
 moderantia poposcerit, non erit ab re emplastrum de crusta panis apponere.

Qui

A Quibus factis, & ventriculo iam quieto rhabarbari siue masticati, siue infusi, siue pillularum forma adhibiti vsus proficuum, & necessarius existit, per aliqua intervalla inter quæ vel syrups pro humoris idea, vel pulvisculis, aut bolis ex conferva rosarum cum prædictis pulveribus utendum est. Qua in re umbilico ponam assum pulveribus dictis sparsum cum modico vino apponere oportet, & quæ dicta sunt reicere, donec tertius crescat, aut affectus subideat, ni propter urgentiam maiora postulaveris, quæ eide vomitibus sistendis lib. 1. indica. & li. 2. c. de purgatione particulari reperies. Quod si illa non profuerint, huic vsui maxime proficuum experieris, saluatellam dextræ manus tundere: quod auxilium securissimum abortus esse scio, & iccori, alioqui affectionis origini incredibile subsidium.

De ventris dolore in pregnantibus. anno Cap. 13.

B



A spiritu flatuoso tam immanes, & acerbi excitantur in ventre dolores, & cruciatus, ut ferè ad pulsus abolitionem res tēdat. Nam cum ex genitura tum intestinorum, tum reliquarum vteri, & ventris cavitatum vias coarctari sit necessum, eleuatis ex indebito vitæ instituto, vel ex eodem sanguine menstruo flatibus, facile cum inclusi existant, & crassi, qui difficulter excutiantur prædicta accidenia circa umbilicum moliuntur: quæ vel abortum minantur, vel tormina efficiunt tam graua, quod periculum minari videantur, quæ sanè vitia in vtero gerentibus vitare summopere oportet, ne inopinatò aliquid ex ijs, quæ nuper diximus, superexcreseat.

Cui affectioni medeberis præmissio loco vniuersalis providentia, in cibo, & potu moderamine, siccis fomentis superiori ventris parti adhibitis ex semine feniculi, cimini, anisi, anethi, & reliquis huius nature in pulverem reductis, ac vino, vel aqua irroratis. Cataplasmate etiam vteris ex ouis, oleo de baccis lauri frixis cum pulveribus supra dictis: calida item inunctione ex oleo liliorum, & anethinos ex quibus cum decocto prædictorum seminum clystere in parua quantitate inijcere poteris. Profunt quoque aquæ calidissimæ potus, aut vini aromatici, vel denubus frangere cinnamomum, & diutius ore agitare: quod etiam præstat anisum, vel cortices citri: quas vino deuoratas, experimènto comperimus plurimam profuisse: sicut, & aquam stillatiam ex cinnamomo, cimino, aut corticibus citri. Fugendum insuper est in hoc affectu a fomentis humidis, & immodicis inunctionibus, utpote faciētibz abortire ob status dilatationē quam antequam resoluantur, moliuntur, ex quibus dubium non est, quin si vterus, & eius vasa dilatentur, semina abortiat. Cui medeberis per assum ponam pulveribus dictis insupersum, & umbilico appositum.

De cordis saltu, ac de syncopi in prægnantibus.

Cap. 14.



QUEMADMODVM graues dolores ex flatu fieri posse dictum est: ita & ob eandem causam saltus cordis in prægnantibus fieri arbitramur. Nam flatulenta illa substantia si per arterias, aut venam cauam ascendentem in cor, sese insinuet, saltus & cordis palpitaciones fieri rationi consonum videtur. Nitens enim cor, quod sibi præter naturam transmittitur, pellere, nisi nihil est, simotum illum extra ordinem, & proprii motus concentum edat. Quod sanè accidens maioris mali præfagium esse solet: nam facilis est ab eo ad cardialgiam, syncopimve, & asphixiâ commeatus: ob id quidem omni arte curandum est, prædictum accidens, quam citissimè mitigare.

Cura
ratio.

Nec paruam hæc affectio prærequirit in cibo, & potu, ac reliquis rebus non naturalibus commodationem, vt quæ citra huiusmodi prouidentiam facile in prædicta mala commigret. Quapropter transactis primis grauidationis mensibus, & tentatis leuissimis auxiliis primò: audacter ad rhabarbari vsum, vel cōfectionis amech sine scamnoneo, & colocinthide confugiendum erit, maxime si corpus prauo aliquo succo abundare cognoueris, quo tempore rhabarbari modicum cum conserua rosarum porrigito, vel prædictæ confectionis amech tantundem cum eodem rhabarbaro. Quo factò huic affectiōi medeberis calidissima aqua epota: sic & aceris radix cum vino tussa. Sed inter oīa conseruā de hiacintho vino, vel aqua naphthæ sumpta, electarium de gemmis, lapis bezoar, & reliqua, quæ cordi opitulantur, ipsūmq; tuentur à venenosorum halituū cōtactu prodesse, experimento didicimus. Sic scordij aqua, vel scorchiōnera, aut carlinæ incredibili efficacia profunt. Sed efficacior multo est cardiaca herba per instillationem extracta, aut aqua cinnamomi, vel gariophyllorum arte chimica extracta. Exterius quoq; adhibere oportet, quæ eandem vsum præstent, halitusq; vel dissipent, vel ad extimas partes euocent. Ob id quidem mungere cordis regionem opus est vnguento, vel oleo naphthæ, aut iasminorum admixto modico rosaceo, quibus si addideris theriacæ modicum, probè factum existima, maxime si admiscueris aquæ cinnamomi, vel olei eiusdem modicum, quæ quoque vsum præstat oleum de Mathiolo experimento nobis comprobatum. Conferunt sacculi ex pulueribus coralli, cornu cerui, carlinæ, fanthalorum, diambrae, diamusci, seminis angelicæ, & florum cordialium: item corium cerui, aut capreoli, ambaro, & moschu præparatum eidem parti appositum. Eiusdē utilitatis sunt epithemata, quæ sunt ex mica panis tostī, & aqua vitæ, aut vino, aliquo ex prædictis pulueribus superparso, vel facta ex succo pomorum redo lentium, & vino, & eisdem pulueribus. Tandem omni arte curandum est flatu cordis irruentes discutere, & odoramentis gratissimis spiritus reficere, donec suspiria, & anxietatem mitigaueris. Vèrum si ex copia tetri sanguinis malū fiat, sanguinem semel mittere opus est.

De

De pregnantium tussi. Cap. 15.



Necquidem pregnantium partus equè accelerat, ac vt rectius loquar, abortum excitat, vires prostermit, & vniuersum corpus conterit, perinde ac tussis: siquidem capitis dolorè accersit p̄r cōmōtione, vigilias infert, difficilem respirationē mouet, ac febrem aliquā accendit. In qua sanè affectionē musculos plures laborare est opus: & ea ratione curandum est id malū lenire, & quā citissime mitigare, ne abortum promoueat, qui sanè certior, erit in masculis, quā in foemellis, maiores. n. h̄c sustinent labores citra abortum, idq; maximè post primos menses: nam foemellæ initio pragnationis periclitantur magis, sicut mares, cum auctiores sunt, & moueri incipiunt.

Scimus quidem id malum plerumq; grauidis succrescere ex halitu aliquo, t̄rio & mordaci à sanguine menstruo elato asperā arteriam, & reliqua respirationis instrumenta p̄tudentē, irritantēq; facultatem ad tussendum. Præterea fit etiam ex albis, aut vitiosis mensibus, qui ante grauidationem fluere solebant retentis, vt testatur Hip. li. i. de mor. mul. dicens. Contingit. n. ipsi fluxū aquosum fieri, aut purgationem occultari, & ad ventrē cōnueniri, & ad crura; aut ad pectus, aut ad aliquam harum partium. Item suboritur pragnantibus hæc affectio ex peculiari aliquo capitis defluxu, tenui, vel nimis crasso, cuius etiam, ne idem malum accidat, ediscere prouidentiam conueniet.

Licet affectus ad sui cognitionem signis non indigeat, eis tamen opus habemus ad causas dignoscendas. Sic etenim dignoscēs à statu proficisci, q̄ foemina, quantumuis tussiat, nihil excernit, neq; leuatur vllō medicamentum genere præterquam statu p̄r suctum excreto, & ijs medicamentis, quæ vel status discutiant, vel leniores reddant. Dignoscēs ex albis mensibus suppressis malum proficisci, ex relatione, & ex foeminae prauo colore, totius corporis lussitudine, & grauitate, & ex nimio oris madore, ac spuitione crebra. Insuper causam huic malo caput præstare discēs, q̄ foemina multa tussiendo expuat, & crebra excretionē à tussi liberetur, & etiam quod à somno deterius se habeat.

Etia si in hoc affectu, p̄ficua sit vniuersalis prouidentia quatenus pertinet ad expurgationē corporis: id minime p̄fert grauidationis status, & ob id moderatione victus & potus, tē agere est opus maximè si halitus malo causam p̄stiterit. In qua re purgandum nullo mō est, sed eo præsidio vtendū, quod leniendi solū vires h̄eat, in quo genere nil magis prodesse cōperies, q̄ potus calidissima, aque ante cibū, & somnum ingestus. Cui consimilē vsum præstat potus vini, aque cinnamomi, vel floris eiusdē cinnamomi, seminis angelicę, aut ipsum cinnamomū frequenter masticatū, vt ascendens halitus vi horū medicamentorū digeratur. Labendo quoq; si fortē aliqd asperæ arteriæ adhaerit, porriges, potissimū cinnamomi decoctū, & gariophyllorū cū saccharo & melle. Ex vsu itē sunt tragacatha, amyli, & mucilagines psyllij, ac seminis citoniorū, vel ex eis cōfectū serapium.

rapium. Si tamen affectio prodeat ex suppresso albo menstruo, vel nullam admittit curationem peculiarem (nisi rhubarbari modicum aliquando exhibere placuerit) vel ei similem, quod capitis affectio expostulat. Sic etenim cum ex peculiari aliquo capitis defluxu prodire comperimus, proficuum est alimenta siccioris naturæ, & boni succi porrigere, velut anium, maxime venationis, assatarum: quod si elixas porrigere placuerit, earum iuscula non adhibeas. Prodest amylo, vel pulres ex farina hordei, & potus quam parcissimus. Docet quidem huic malo Hippo. lib. 7. popu. tex. 7. in historiam sororis Harpalidi subuenire, maxime cum ex aquoso humore cum sanguine redundante principium traxeris fabarum farinæ, quam Gal. 7. supplicium excrationi facilitandæ esse proficuum fatetur, cum melle, quæ uti poteris, forma pillularum, aut in bolis, vel linctus modo cum dispumato melle, quod etiam cumini genus omne cum vino præstat. Sed huic vsui utile erit, præter exhibitionem bechlehorum pharmacorum, ac reliquorum, quæ leniendi vires habent, ad purgationem eius, quod à capite instillat, epocare mastiche ore masticata, vel quous alio masticatorio ex ficibus, pipere, mastiche, & reliquis. Nec fortui nocebit ex mastiche, & rhubarbaro pillulas conficere, quarum quinto quoque die. 3. ij. sumat femina. Cui etiam affectioni profunt brachiorum frictiones, vel ligaturæ, ac potissimum cucurbitulæ: & si femina ex timidioribus non sit, cum scarificatione. Sed noctu, ut somnum concilies feminis papaueris, & sacchari puluerizati modicum porriges, vel serapij ex papauere, & violis, an. 3. f. Item ouum sorbile cum amylo, vel tragacantho, terra sigillata, aut pulueribus feminis papaueris albi, uel alia, quæ tuta, & proficua expertus fueris.

De aluo suppressa, aut nimis citata in prægnantibus.

Cap. 16.



EMINIS quoque prægnantibus, & magno sæpe cum abortus periculo aluus suppressitur: quippe sex indurata, magno, ut pelli possit, indiget emixu: quo frequentissime dirumpitur ex vinculis aliquod, ac sanguis profilit, abortus quidem præludium. Ob id in ijs, quæ iecore sunt sicco, & squalente, & meseracas habent voraces, maxime gravidationis tempore, omni diligentia curandum est, lubricam reddere alui prunis, saccharo, & aqua hordei, vel maluarum decoctis: ite prodest aqua maluarum, & saccharum, aut syrupus ex mucilagine psyllij, & feminis citoniorum cum aqua maluarum, aut portulacæ, & saccharo confectus. Pro sunt clysteria ex iure anium, & butyro recenti, oleo amygdalarum dulcium, & saccharo rubro. Confert & prima mensa ante omnem cibum parum aquæ ingerere. Nec diutius licet protrahere alui purgamenta, etiam si femina ad excrétionem minime excitetur, ne deinceps difficilior excernantur, & maius periculum subeat foetus.

Præterea, si defectu alimenti, eo quod multum in summat foetus, excrementa hæc nimium à iecore, & meseracis exsuecentur, nullo alio præsidio citius huic malo subuenies, quam copiosioribus cibis, maxime virulentis, & decoctis.

Citatam quidem aluum mox cohibere curandum est: nam ipsa fluere, & ligamen-

A gamenta fœtus laxiora fiunt, & ipse imbecillior factus ocysimè eiicitur, & mater alimento fœtui commodo destituitur, præsertim si lyentericæ specimen fluxio retulerit: qua profectò neq; matri, neque fœtui alimentum, quod superest, sufficere valet. In qua equidem curatione, verendum plurimum est, indistinctè & quemuis fluxum sistere, ei tantum sistendo niteris, qui aut disentericus, aut lientericus fuerit: nam si ex prauorum humorum colluie granidationis tēpore aggregata fiat, cauendum est ab adstringentibus, & his quæ sistendi potentiam habent. Quippe hæc excrementa primis mensibus collecta, si fluant periculum est, abortus ob mordicationem, aut laxitatē partiū vtero vicinarum. Si verò cohibeantur certius adhuc apparet abortus periculū, ob prauī succi abundantiam; quo fit, vt cautè agendum sit cibus, & his q̄ in melius habitum mutet, ne fœminæ accadat, quod Stymargi uxori euenisse Hip. retulit lib. 2. popu. p. 2. tex. 4. quæ ex ventris perturbatione cum multum cepisset sistere, fœtum quadri mestrem corruptit. Sic, his medeberis iuxta fluxus naturā, & conditionē; etenim dysenteria (ut paulò inferius referā) rhabarbaro cū saccharo rosaceo bis terve exhibito cōpescitur, quatenus ad humoris fluentis copiam attinet, quē temperabis ante id syrupis ex portulaca, ex uiolis, ex rosis, borragine, & buglosso: aut si nimis acer fuerit, ex succo acetosæ cum aqua hordei, aut ferrata: cauens, ne nimium clysteribus utaris, quibus non parum fœtus oblaeditur. Verū si opus fuerit, eis utitur, q̄ abluendi, ac sedandi dolores vires habeant: quippe dolorum vehementia non tardius fœmina abortit. Quapropter adhibenda sunt q̄ oleū violarum, rosarum, amygdalarum dulcium, & butyrum recipiunt, additis vitellis ouorum cum pinguibus iusculi, & decoctis et anodynīs. Cæterū si uitio ventriculi aliquid crudum, aut semiconfectū uel fœtidū excernatur, eadē prorsus medendi rōne curari desiderat, ac uomitum exposcere antea dictū est: adhibitis ventri, quæ eadem parte retulimus, & affixis et umbilico, quæ robur fœtui, & ventri quodammodo præstent, uelut est pōmum odoriferum assūm cū theriaca, cinnamomo, gariophyllis, mastiche, & pulueribus myrtillorum, rosarū, coralli, & diarrhodonis appositum: item frustum semiasæ carnis cum prædictis pulueribus. Nec omnino si diutius affectionem duraturam speraueris, posthabedus est rhabarbari masticati vsus, uel pulueris eius cū saccharo rosaceo: quo facto, summopere conferre scimus mastichis. gr. iij. aut. v. cum eodē saccharo rosaceo. Quod item beneficium præstat idem saccharū cum bolo armeno, aut terra sigillata exhibitum. Sic languidioribus matri, & fœtui benefacit electariū de gemmis in tabellis confectum, & de margaritis præparatis maximè cū modico myrtillorum puluere, coralli & rosarum. Item his confert aqua, in qua aurum ignitum pluries extinguatur, uinum aliquando tenue, & aquosum, aliquñ nigrum aqua chalybeata dilutum: cibaria item optimæ substantiæ, & facilis cōfectionis, quæ maiori ex parte assa exhibeantur. Si autem uelis exquisitiore methodum, & curandi rationem legere, lib. 2. nostro indicationum c. de sistendis fluxionibus, adamussim reperiēs.

Supersedeo: consultò hac in parte à disputatione, de vrinæ difficultate, qua instante iam iam partu frequentissimè corripiuntur utero gerentes: siquidē ex vesicæ compressione fœtu iam prolabente potius fit, quàm morbosa aliqua causa, quæ auxilium expostulet.

Dd

De

De inflatis praegnantium cruribus. Cap. 17.



In quibus mulieribus vberima menſtruorum copia fluere ante grauidationem ſolebat, poſt conceptum quidem, ipſo nequeunte tantum ſanguinis contereſcere, & in proprium alimentum eommutare, recrudescit ſanguis ille, & qui denuo in iecore cōficiſcitur, aquoſior exiſtit, facultate iecoris ſanguifica ob immodicam copiam nequeunte probè ipſum parare, haud ſecus quàm in hydropē. Quo fit, ut tanquam inutilis matri, & foetui delabi ad crura natura patiatur: quæ ſanè adematofa fieri eo tempore neceſſum eſt. Ac ſi corrupti aliquid obtinuerit, uel tenuioris, & calidioris bilis admixtum, inflammari quoque contingit, & non raro exulcerari, præſertim ſi ſcēmina antea uel obſtructiones, aut vitioſi ſucci redundantiam perpeſſa fuerit. Alijs quidem id malum prodiſcitur, q̄ in grauidatione fluxus aliquis aquoſus ſuppreſſus fuerit: quòd Hip. inſinuare videtur lib. 1. de mor. mul. dicens; Contingit ipſi fluxum aquoſum fieri, aut purgationem occultari, & ad uentrem conuerti, & ad crura. Qua propter verendum eſt, ne hæc affectio in cacoethica ulcera commigret, aut in quid grauius. Nanque nouem menſib. tm̄ mali partes ſuaſe natura frigidas ſaltem à fonte caloris diſſitas perferre, haud tutum eſt. Cum hoc tamen experimento cōperimus, à partus purgatione citra auxiliares Medici manus, mulieres ſic affectas in priſtinum reduci ſtatim. Ratio procul dubio eſt, quia aquoſus ille ſanguis nondum ſalſuginem, aut corruptionem adipiſcitur: & ob id uel ſolo leuiculi calori uel partus purgationi cedit. Verum in ijs, in quibus immodicus fit tumor, & noctu crura non detumescunt pertimeſcendum eſt, nequid mali eueniat. Expendendum tamen hæc in parte, hoe malum plerumque accidere, à 4. menſe vltra, uel quod alij affectus quos accerſuit grauidatio ceſſent, & in hunc mutentur, uel quod ex nimia vbertate ſanguinis iecur refrigeretur, uel quod ſanguinis frigiditas ipſum iecur in conſenſum accerſat, & uitioſum ſanguinem gignere cogat, qui in hos tumores commigret, ad quæ omnia opus eſt 4. menſium ſpatio: quod probat hiſtoria ſororis Harpenlidæ, lib. 7. popu. text. 7. ab Hippo. adducta.

Cura
ratio.

Præmiſſa ea niſtus inſtitutione, ut facillimè conſici poſſit, & optimi, ac pauciſſimi, & ſiccantis ſit nutrimenti: opportuniſſimum eſt præſidium, Actio præcipiente, citrinorum malorum decocto pedes leniter abluere, perfricatis ipſorum plantis ex aceto roſaceo, & ſale, uel alumine cum uino. Prodeſt etiam non parum emplaſtrum ex caulibus uino, & aceto incoctis, & piſtatis: uel chimolia terra cum aqua chalybeata, uel ea, quæ in officiis ferrariorum reperiuntur, diſſoluta modico aceto admixto. Confert, & oleum roſaceum, & chimolia, uel ſolum ipſum roſaceum cum aceto: aut (quod experimento probatum eſt) papyrum aceto inſuſam, & parti impoſitam diu ibidem affigito: item fomentum ex uino ex aceto decoctionis raſu: & cornu cerui. Quod ſi in ruborem alterati partem comperiamus, præcauendum eſt, ne in corruptionem uel exulcerationem degeneret, adhibitis braſſicæ folijs cum modico roſaceo, & chimolia

A molia terra. Cui vsui confert cataplasma ex cicerum, & fabarum, & orobi fari-
nis, succo caulium confectum. Vltimo (sperandum est) ne maximam præsidio-
rum siluam inutiliter profundamus) à partu fœminam liberam euasuram. Sed
interim, vt Hip. lib. 7. pop. tex. 7. docet in historia sororis Harpalidæ, cui crura
etiam tumore afficiebantur, & difficultas aderat spirandi, vtendum est eo, quod
ipse consulit eadem parte, dicens in fine textus. Fabis autem melle admixto va-
sa, & eclegmate ex melle, & cum ex vino bibisset Aethiopicum cuminum, me-
lius habuit, postea tussiens excreabit multa cocta pituitosa alba spiratio cessa-
bat, peperit verò fœmellam. Quæ sanè mala in grauidationibus fœmellarum fre-
quentius fieri arbitramur.

Cum hoc
tamen se-
res urge-
ntissima
nō sit ne-
cēssaria
mittenda
est, ne
ad prin-
cipalibus
mēbris
affectio
attendant.

De sanguinis profusione ex prægnantium vteris. Cap. 18.

B **Q**U M frequentissimè vtero gerentibus menses, aut serosum aquosū-
ve aliquid erumpere comperiamus, idq; vulgatum sit abortus esse
prælium expendere hac in parte in animo est ex quibus partibus
& qua de causa, & qualis substantiæ in grauidis profiliat, vt innore-
scat mediātibz signis, qñ auxiliares manus adhibere oporteat, & quando se-
cus, ac rursus quando vtendum sit non solum, tanquam inutile, sed tanquam
pernitiosum aliquod adhibere præsidium.

Ex Gal. euidenter constare arbitror, maximè 5. apho. § 8. ad vterum duplices
venarum propagines excurrere: quasdam ad corpus, & cauitatem ipsius, alias
quidem ad collum, os, & ceruicem, ac scimus per vtrasque diuersimodè menses
vterive purgamenta profluere. Per eas, quæ in collo sunt, proculdubio virgi-
nibus maiori ex parte menses prodeunt, in quibus hymen obstare poterat san-
guinis euacuationi. Per eas vero, quæ in vtero ipso sunt, in reliquis, vel in gran-
dioribus etiam virginibus, aut sanguine inundantibus, & in cæteris, quæ aut
pepererunt, aut de uirginatæ sunt: per quas alimentum fœtui impartitur natura
& per vtrasque sese expurgare assuescit.

C Quibus sic statutis, cōstat trib. è partibus in grauidis posse sanguinē ex vtero
psilire. Quippe in nonnullis grauidarū ordinatim & feliciter cōperimus mēses
fluere, quod nulla alia ratione posse fieri arbitror, q̃ eo q̃ plus sanguinis in cor-
pore præsit, q̃ fœtus dispendere possit: & per ea vasa, q̃ in vteri collum degene-
rant, irruat. In alijs et per interualla inordinata (quod frequentius est) vel statu-
ta, sanguinē pfluxisse cōperimus: cuius sanè profusionis occasione fœminę mo-
lestius se habet, & fœtus debiliores existūt, iuxta illud Hip. 5. aph. § 8. Si mulie-
ri vtero gerētī purgationes eent impossibile est fētū esse sanū. Quam snām licet
Gal. ad fluorē ex venis colli factum referat: mihi quodammodo vī perdifficiei:
nam purgationes copiosiores, quales ea parte intelligit Hippo. per vteri collum
fieri à ratione dissonum videur. Quinimmo censet idem autor ore vteri con-
cluso, & complicato cessare menses, & eo existimo dictum fuisse ab eodem li-
bro de natura mulierum. Si complicatum fuerit os vterorum, menses non pro-
deunt si verò prodeant, pauci & parui sunt. Et eadem refert verba lib. de morb.

Primus
locus.

Dd 2 mul.

mul. Cum hoc tamen adhuc videtur idem dubium superesse, licet ab vtero pro
deat: siquidem os vteri clausum non minus impedit sanguinis ab vtero exitu,
quàm si ex proprio collo fluat. Verum huic dubitationi respondendum est: dū
collum complicatur, eius vasa ita ob compressionem coarctari, vt fluere ab eis
nihil, vel quàm parcissimum possit, vt Hip. mens est. Nihilominus tamen collū
vteri libentius admittere fluxionem ab vtero prodeuntem, eo quòd caritas non
possit tantum coarctari, quantum vasa ipsius colli.

*Secundus
locus.*

Quibus rationibus persuasus arbitror (vt ad secundum locum fluxionis ac-
cedam) non raro in grauidis ex venis vteri internis posse sanguinem profluere:
argumento est fœtus imbecillitas, qui per easdem venas suscepat alimentum.
Sed existimabit aliquis, & meritò perdifficile esse credere, ab vteri venis sangui-
nem, fœtu superstitē, profluere: siquidem venæ adhærent fœtū, ita vt conceptus
fieri minimè possit, nisi vbi semen affigitur acetabulis, quæ sunt ora vasorū in-
teriora vteri penetrantium: quod Gale. dixisse lib. de vuluæ dissectione per hæc
verba constat. Corion vuluæ inhærescit, hoc modo, vasorum vuluæ, quæ inte-
riorem partem penetrant, ex quibus etiam menses expurgantur, cū femina con-
ceptura est, ora aperiuntur: conceptionis verò tempus est, vel incipientibus, vel
cessantibus mensibus. Itaq; nisi hæc vasa dirumpantur, videtur non posse san-
guinem profluere. Cui dubitationi respondemus, verum esse vasa hæc ad vteri
earum permeare, & corio inhærescere: verum cum hoc, duob. modis citra abor-
sus periculum arbitror sanguinem profluere ab his posse. Vno, quòd aliquot
vasa supersunt libera à fœtus alimonia: alio verò, quòd sanguinis profusio fiat
per anastomosim. Quippe noo est credendum omnia vasa corio ad hærescere,
sed quædam ex ijs, quæ ad vterū pertingunt, vt euidenter probari potest: equi-
dem fœminas non paucas superfectare conspiciamus, quòd proculdubio fieri
non posset, ni aliqua in vtero superessent vasa, per quæ natura nouo fœtui im-
partiretur alimentum. Qua sola ratione constat, vasa intra vterum existentia
posse innoxie sanguinem fundere, quamuis mulier grauida sit: siquidem non
omnia vasa, per quæ menses fluebant, ad fœtum sanguinem producant, sed quæ-
dam etiam supersunt, per quæ menses innoxie descendere possint. Quo fit, vt li-
cet fœtus ob id imbecillior existat, cum hoc tamen abortu non periclitatur fœ-
mina, maximè si in corpore, aut vtero subsit plenitudo, quam fœtus coterere ne-
queat. Secundo autem modo sanguis innoxie prodit, dum non perruptione eo-
rum vasorum, quæ fœtui adhærent, neque aliorum, sed per anastomosim san-
guis profluit. Nam aut ita laxæ existere possunt venarum tunicae, aut sanguis
nimio potu adeò dilutus, vel ex aliqua alia occasione tenuis, vt faciliè existi-
bus poris adhuc secundum naturam sanguis instillet: velut in pinguib. femi-
nis, & ijs, quæ molles sunt carne accidere non rarò conspiciamus: quamobrem
credendum protinus non est abortus esse præludium. Cuius etiam causa Hip.
meminisse constat lib. 1. de mor. mul. per hæc verba: Si quidem igitur præ pleni-
tudine fluat sinere ipsam optimum est: si verò vterus latus fiat, diæta sit alica, ca-
ro, suilla, aut palumbis, & vinum nigrum: potiones verò, quæ ad fluxum descri-
buntur, & subdit. Pronuntiato autem de muliere in ventre habente, duos, aut
tres menses, & ultra, si menses statim prodeant, singulis mensibus necesse est te-
nuem ipsam fieri, ac debilem.

Quam

A Quandoque etiam febris ipsam corripit his diebus, quando menses prodierint, & dum prodeunt, & postquam prodierint, pallida fit, sed & pauci prodeunt. His vteri magis, quam opportunum est, hiant, augmentum foetus diminuunt. Descendit enim mulier in ventrem habet sanguis paulatim in utero à toto corpore, & in orbem circa id, quod in utero est, circumstans illud auget, si verò hiat, ut vteri magis quam oportet, sanguinem singulis mensibus velut procedere solet, dimittant, & quod in utero est tenue, ac debile fit. Si verò curetur mulier, melior & foetus, & mulier euadat, si verò non curetur, foetus corrumpitur, sed & ipsa periclitatur, ne diuturnam habeat morbum, si purgatio plus quam oporteat perdat. Placuit quidem ad verbum hanc sententiam scribere, quia euidenter constat de affluxu earum venarum, quæ ad vtericatum perueniunt, loquutū fuisse earum præsertim, quæ foetus non attingunt si quidem refert superstitem, eade re foetum. Quod si de reliquis foetus alimentibus velis audire sententiam, iterum legas prima verba huius loci, quippe de vteri laxitate mentionem fecisse repeties, quibus verbis anastomosis includitur, quod ex modo fluendi, & sanguinis paucitate, ita esse intelligendum discas.

B Tercio verò & ultimo sanguis, perdit in gravidis, ex utero, vinctis ipsis, & uasculis, per quæ foetus alimentum & beneficium susceperat, disruptis, & utcumque dilaceratus, ex quo quidem fieri abortus necessario censemus. Natura enim in ijs, quæ utero non gerunt, sanguinem non colligit intra uterum toto mensis spatio, sed in venis ipsis ad tempus adseruat, ac post paulatim profundit. In gravidis verò semper in puerum per innolucra affundit, quod monstrat in puerperio sanguinis adseruari copia. Quo fit, ut si uasa hæc, casu aliquo dirumpantur, & abortus occurrat, & reliqua ligamenta laxiora facta dirumpantur, & abortus occurrat, & ferre inuitabiliter sequantur. Quibus constat per quæ loca, & quibus de causis sanguis in gravidis ab utero profluat. Quod sane dānatum reperimus apud Hippocratem in locis nam & foetum significare imbecillum in aphorismis scripsit, & abortus esse præludium, aut grauis, & molesti partus, & qui ad decimum mensem prorogabitur. Si foetus viribus constet, & rursus octimestribus laboribus, plerumque assimilatur, ut euidenter Hippocrates docet li. 2. po. par. 3. tex. 34, docens. Quapropter menses quales octimestrium, qui sunt ad decimum tendentibus malum.

*Tertius
locus.*

C Experimento in quibusdam feminarum nobis etiam compertum est, per maius grauidationis tempus purgantia quædam ab utero instillare, quædam alba alia pallida, sanguinolenta alia, nonnunquam fetida, aliquando crassa, sed plerumque tenuia. Quæ vitia eis feminis succrescere existimo, quæ vitam agunt sedentariam, cum hoc tamen robusta constant natura, & eis etiam, quibus sanguinolenta aliqua purgatio suppressa, est maxime per hemorrhoides vteri, aut ani, in quibus purgantia hæc ob defectum exercitii abundare necessum est, grauidationis tamen tempore, boni consulens natura per venas, quæ vacuæ sunt per sunt à foetus alimonia, excernit, partim cum doloribus, maxime si hæc purgantia detineantur, partim citra ipsos, plerumque tamen per vteri hemorrhoides transmittit maximo cum foetus, & matris beneficio; iuuant tamen huiusmodi excrementa ad faciliorem partum.

Dd 3 Di

Signa.

Distingues autem, ac nosces à quibus ex prædictis venis sanguis fluat, primò ex relatione: quippe si exitu, casu, percussione, subita etiã animi perturbatio-
ne, denegata re ardentè expectata sanguis denudò inopinatò, & subitò fluat; du-
bium non est, quin ex vasis alicuius disruptione id malum fiat, præsertim si acce-
dat lumborum, & partium circa umbilicū dolor. Quod etiã colliges, si præ-
cessit, aut præest cruciatus aliquis maximus ex flatu, aut morbus aliquis partiũ
spiritualium, velut tussis, aut respirandi difficultas: item fœcum immodica ari-
ditas, tenesmus, alui importunus fluor, & alia deniq; quæ vel animum, vel cor-
pus vehementer turbare possunt: atque etiã immodicus æstus, aut ingens fri-
giditas, & reliqua, quæ naturæ modum excedere videntur; quorum copiam c.
de abortu, reperies.

Verum si sanguis ex vasis colli vteri fluat citra euidentem aliquam occasio-
nem, ordinatimq; prodeat sine dolore, ac molestia, & fœmina boni coloris exi-
stat (quo signo cognoscimus iuxta naturæ leges profundi, præsertim si fœmora
& inguina, veluti dum vtero non gerebat, doluerint) non licet tunc temporis
turbari, neq; abortum vereri; sed fœminam optimo alimento alere, & copioso. B
Quod si ex venis internis, quæ superuacua sunt à fœtu, sanguis prodeat: idem
quoque considerabis: nam si ordinatè p̄odit, sine manifesta causa, citra dolo-
res, & accidentia, quæ prædiximus, ac fœmina fuerit boni coloris, coniectan-
dum est citra abortus periculum profluere, & ob id nec turbari, nec auxiliares
manus porrigere peritum medicum decet. Si tamen sanguis quàm parcissimus
fluat, aquosus, nimis dilutus, citra euidentem occasionem, aut præsens aliquod
dammum: coniectabile est per anastomosim venarum uteri affectum fieri. Quo
fit, ut fœtus imbecillior indies fiat, & diligentiam medici prærequirat, quemad-
modum nuper adducta Hip. sententia euidenter monstrat.

Curatio
§. 110.

Hinc e enim si diligens fueris, facilè discēs cui harum fluxionum auxiliares
manus adhibere tenearis: nam in albis vteri purgamentis, quæ retulimus, nul-
lo indigemus auxilio, nullaq; curandi ratione; siquidem hæc natura transmi-
tit per dicta loca, vt se tueatur à suppressa aliqua vacuatione, vel sese exoneret
ex recrementorum abundantia: quippe ea si suppresseris, dubium nō est, quin
vel fœtum interimant, aut in morbum aliquem grauissimum, vel imbecillita- C
tem deferant, vel saltem matri perniciosum aliquem affectum accersant: & ob
id superledendum est ab omni curatione, vitæ ratione optimè instituta.

Sanguine autem fluente ex venis colli vteri, aut ex internis superuacuis, &
quæ nullum præstant fœtui alimentum: vel ex illis, quæ fœtum quidem alunt,
disruptis tamen, & dilaceratis: nullum quoque auxilium adhibebis; præter
quam optimam victis, & vitæ institutionem, quietem, & animi tranquillitatē;
ac si quid appetierint, id liberaliter porriges, etiã si paulò sit deterius. Umbi-
lico insuper quæ tobur fœtui addant, & calorem, apponenda sunt: non quòd
sit ob id sperandi, abortum præpediri posse, sed quòd viribus, & cum efficacia
vivi exiliat, ne si antea intereat, sancto baptismo careat. Qualia autem huius-
modi auxilia sint, tribus præcedentibus c. abunde diximus. Itaque præsidij nil
aliud eo tempore efficere poteris, quàm sanguinem comprimere, densare, &
cohibere, qui dum semel in vterum à venis disfluxerit, detentus vel concrevit,
vel corrumpitur, vel mille alijs modis vitatur, ita vt in grauissima accidentia
prom-

A promptissime degeneret, factu non ob id superstitie manente. Quamobrem licet non desint qui aliquot auxilia huic vsui scribant, ego tamen subtrahere malui, ne quis imprudenter eis utens, maius malum manu faciat: quod si aliquibus vti velis, iam audies.

Superest sola curanda ea sanguinis profusio, quæ ab internis venis ex occulta aliqua occasione profilit: ex qua vnum duorum vereri oportet iuxta Hip. decretum. 3. apho. 58. vel factum esse imbecillum, qui nequit alimentum sibi commissum commutare; ex quo periculum vitæ impendit, & ob id perniciosi abortus: quippe magis morte periclitatur fetus ex morbo proprio, vel matris (quod fecundo veteri oportet) quàm ex sanguinis defectu: nam cum deest illi alimentum, curat diligenter sagacissima natura defectum supplere, metuens ne morte præueniatur; quod semper ipsa præcauet. In qua sanè curatione primò considerabis, an vitium aliquod sanguis obtinuerit ex tenuitate, acrimonia, ac serositate; quibus lacerata natura eum expellere nitatur, aut continere præ imbellicitate nequeat. Qua in re omne curantis consilium sit sanguinem ab aquoso humore vel seroso acri, & mordaci immunem reddere, rhabarbaro sumpto per se pillularum forma, aut cum modico conseruæ rosarum ea quantitate, quæ expurgare sanguinem, & firmare, ac roborare partes citra corporis turbationem nata sit. Quo facto, alimentis, & medicamentis, quæ vim habeant condensandi, ac solidandi sanguinem vti liberè poteris: sic amylo ex lacte amygdalarum aqua chalybeata extracto, probeq; confecto vtendum est: assis carnibus, mīna citoniorū, & reliquis huius naturæ. Manè aut porriges saccharum rosaceum antiquum solum, vel cum pulueribus boli armeni, terræ sigillatæ, coralli rubei, cornu cerui, electarij de hiacintho, aut margaritarum præparatarum. Huic quoque vsui proficuum est porrigere syrupum de rosis siccis, ex myrro, aut rosarum; vel portulacæ, si acrimonia particeps sanguis fuerit: frictionibus item brachiorum frequentioribus ieiuno ventre vtendum esse consilium diuertendi necessitas. Vmbilico, vt superius dictum est, quæ vim caloremque addere possint, adhibenda sunt: & præter illa, quæ retulimus, prodest quoque mica panis recēter cocti vino odoratissimo, & succo pomorum redolentiū supradictis puluerib. admixta: vel emplastrū ex palmulis vino austero decoctis cū farina volatili, & p̄dictis pulueribus factum; vel citoniorū caro assa vino rubro, & puluerib. rosarū, & coralli admixta. Quo facto, frequenti experimento cōpertū habeo in femina virib. cōstante, iuuenula, multi sanguinis, abortiri assueta, copiā deponere non solū vitæ parsimonia, verū, & sanguine missō ex brachio, si necessitas plurimū videretur: quod canē, & cum p̄meditatione esse faciendū arbitror. Præter q̄ oīa expendenda est Hip. nuper adducta sn̄a, in qua q̄ fluxum sistunt commēdat. Sunt aut hæc, vglut emplastrum ex farina lentum, balanstiorum, glandium, gallarum, Katabe cum farina hordei, & aceto. Præstant trochisci de terra sigillata, de bolo armeno: præterea, emplastrū, qd recipit boli armeni, mastichis, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, thuris ana 3. j. acatæ, hypocistidos, verberis, nucis cupressi ana 3. j. farinæ volatilis 3. j. & scum vino nigro, ac modico succo plantaginis, vel aqua chalybeata fiat emplastrū. Ferunt tñ prodesse cineres corticum vstarum cū vino, admodum linimenti parā appositos. Sic. n. laxitatem comprimere, & exsiccare oportet, maximè si addideris aliquid, quod vires habeat roborandi.

Dd 4 De

De mammais pregnantium gracilibus, aut lacte turgentibus. Cap. 19.



PRÆTER id, quod mammae, vel turgent, vel flacida in prægnantibus, abortus, vel foetus aliquod malum præmonstrant, ipsis quoque graues, & dolorosæ, vel tædiosæ lacte copioso fluente existunt. Quamobrem hac in parte studendum est docere quas ob causas lacte abundantiori turgant, vel post turgorem flaccescant, ut illis quo fieri possit modo, præsidium aliquod præstare possimus. Circa primum docet Gal. 5. apho. com. 50. molles, & laxas mammas fieri ob lactis defectum, solidas vero ob eius abundantiam. Quod sanè dogma cum multa ex mammais prædicere doceat, non vtiacet, & à Gal. scribitur, intelligendum puto: res quidem ita se habet.

Mulier, cum concipit, statim mammae fiunt paulò duriores, & tumēt paululum, deinde manente magnitudine indies fiunt solidiores. Cum verò durities ad extremum pervenerit, tunc crescunt manente duritie, ferè ad finē octavi mensis: deinde incipiunt laxari, donec partus tempore mediocrem habeant duritiem, magnitudinem verò eximiam.

Quæ proculdubio res ita venit expendenda, ut rectum iudicium de turgentibus, aut gracilibus mammais proferre possimus, aut ipsis proficuum auxilium. Magnitudo & paruitas mammarum fit ex multa, aut pauca factis materia, id est sanguinis, qui in lac mutari debet. Præterea mollietates in eisdem fit ex lactis substantia: lac. n. cum molle sit & humidum, mollem facit tumorem in mammais. Si verò mamillæ sint ab omni substantia vacuæ, neque antea fuerint repletæ, parvæ sunt, & mediæ inter laxas, & solidas, molles, & duras (inter quas non levis viget differentia, quam qui rectè curaturus est, aut verum studerit proferre iudicium, adamussim expendere tenetur) ac si antea repletæ fuerint, & postmodum exinabiantur, remanent magnæ, molles, & laxæ. Sed ut ad institutum redeam, cum plenæ mamillæ extiterint crudo humore, sanguine nimirum non concocto, tunc sanè duræ sunt phlegmonum instar, qui ante suppurationem duri fiunt, ac solidi, suppuratione verò facta molles redduntur & laxi: Quod pari prorsus modo mammais accidere cernimus: quibus sanguine crudo repletis turgentur glandosæ carnes, sed non extenduntur, quia calor extensionis est autor materia verò duritiem affert.

Ego mammae, antequam calor & coctio prævaleant, duræ sunt, & solidæ, si materia adsit, gracilitas verò, seu tenuitas tria in mammais comprehendit, parvitatem nimirum mollietatem, & laxitatem.

Quibus sic constitutis docet Hip. sententia ex mammais laxis, ac mollibus, è quibus multum lac fluit, venari foetum esse imbecillum, & non probè a ligamentis contineri: ex soliditate verò, & duritie saniores esse. Sed mox ex hac sententia sic intellecta, & ijs, quas nuper diximus, succrescit dubitandi ratio, nam cum dictum sit laxas, & molles mammas coctionem maiorem significare, duras verò cruditatem, admiratione dignum est, cur Hip. duras & crudas saniores laxis existimaverit. Sed rei ratio in hunc modum se habet. Multum. n. lac è mammais fluere, signum est foetum esse imbecillum: ratio est, quia monstrat, ut Gale. cæset, multum

A multum sanguinis mammas suscipere, ac tantum fœtui deficere, & ob id necessario proprii alimenti defectu imbecillum esse. Cum verò mamme duræ sint, ut § 3. sententiæ eiusdem lib. 5. docuit, tantum quoque sanguinis redundare, & tantundem fœtui deficere est credendum: siquidem ex redundantia quasdam corporis partes dolere dixerat. Cum hoc tamen censemus eam sanguinis redundantiam, quæ duritiem efficit, ea ratione, qua cruditate arguit, sanum esse fœtum ostendit. Cuius rei ratio est, commixtus calor ab utero ad mammas: arguit enim mammarum cruditas maiorem caloris copiam in fœtu, & ob id credendum est, redundantiam illam sanguinis, in mammas confluere, crudumq; superesse, quia fœtus calore viget: argumento est mammarum calor secundo, aut tertio die à partu. Mammas verò graciles malum ostendere docet, sed ut clarius constet, præmittendum est, quod omne id, quod rumpitur secundum naturam, prius laxatur: omne autem, quod laxatur, ut exinde abruptatur quandam vim corruptionis persentiscat. Tunc sic, cum fœtus laxari incipit, siue partus, siue abortus tempore, gignitur quidam calor in illis vinculis, similis putrido, quem natus semper refugit, & calor ille naturalis confugit cum sanguine illo ad mammas, quæ tunc incallescunt, & uterus calore nativo destituitur: ac fœtus si propè debitum tempus sit, nascitur, deficienti optimo, & sufficienti alimento. Calor autem ille naturalis, qui se ad mammas contulit, sanguinem in lac (quod antea nequiterat) melius convertit, facta coctione ob novi caloris aduentum, & tunc lac effluit laxatis carnibus mollioribus. Ob id quidem lactis defluxus significat, non quidem sanguinis abundantiam ex se, ut solidæ mamme, sed corruptione vinculorum fœtum continentium. Quia profectò ratione dictum est ab Hip. huiusmodi mammas fœtum non esse sanum monstrare. Causa igitur est caloris naturalis, transitus ex utero ad mammas. Quas duras fœtum esse sanum monstrare probauerat ex professo Hip. 5. apho. 53. dicens: Quæcunq; fœtus corrupturæ sunt, his mamme gracilescent. Quod si rursus duræ fiant, dolor aderit in mammis, vel in coxis, vel in genibus, vel in oculis, & non corrumpitur. Quia scilicet vult monstrare duritiæ mammarum non degenerare in abortum, sed in coxarum, vel oculorum, vel genuum dolores, ut confirmavit. 2. pop. tex. 6. & lib. 6. par. 5.

C Fiunt insuper mamme solito minores, ut Hip. recenset 5. apho. 36. deficiente fœtui alimento, ut n. fœtui deest: ita & māmīs, maxime si de repente parvæ fiant. Nam potissima ratio, propter quam mamme crescunt, & duritiem contrahunt in gravidis, ea quidem est, quæ Hip. recenset lib. de nat. fœt. dicens: Lac autem ob huiusmodi necessitatem sit, cum utero tumidi præ puero sunt, ventrem mulieris comprimunt: eius autem pleni, ubi compressio contingerit, pinguiusculum de cibis, ac potibus foras profluit (ac subdit) Et à pingui parte calfacta, & alba, quod edulzatū est à calore, qui ab utero accedit, expressum venit in mammas, & in uteros quoque partum venit per easdem venas: tendunt. n. in mammas, & in uteros venule hæ, & consimiles aliæ, & ubi peruenit in uteros de lacte paululum, ipso fruitur puer: mamme verò suscepto lacte impletæ attolluntur. Ex qua scilicet liquet, quod dum fœtus est in utero, trahit ad se sanguinem, cuius potissimam partem absumit: aliam verò præpinguem comprimendo pellit, ad māmās: ex quo constabit, si fœtus non allicit sanguinem, neq; mammas posse ipsum obtinere, ideoq; graciles fiunt, & ob id ostendunt fœtum esse imbecillum. Evidens igitur est, ex extracto sanguine

sanguine duas fieri partes: vnā, fœtui alendo idoneā; alterā, si Hip. sententia standum est, virtute seminis in lac commutat natura, ipsam ad mamas trāsmittens, qm̄ substantia earum similis est illi: non obuenarum solum, quē mulier censent, consensum, sed vt Hip. intelligendus venit loco adducto, ob consensū substantiæ, licet vt lib. seq. referam, per oscula venarum aliqua reperiatur consensus, quippe marmæ ab axillaribus sanguinem recipiunt, vteri ceruix à feminariis vasis, fundum verò, & ab his, & a caudice venæ cauæ, vt Vesalio placuit li. 5. c. 12. Quod vero is consensus verissimus sit, constat et ex Hip. qui li. de nat. fœ. ex lacte, quod sibi principium suscipit in vtero, quodāmodo aliquid fœtum sumere profert. Trahit. n. a sanguine ad se, id quod est dulcissimū, & simul et lactis parre aliqua fruitur, labiis nimirum clausis, vt expresse faretur idem autor loco citato, & lib. de carn. ib. quod vi nature vī asserere potius fieri, q̄ per euidentes vasorum ductus, præter eos, quos iam retulimus. Ratio quidē huius Hippocratici dogmatis est, quia si lac in mammis fieret tpe grauidationis ex solo sanguine per venas axillares illis tributo, quo imbecillior esset fœtus, minus sanguinis alliceret, & eo magis redundaret in patribus supremis, & maiores fierent marmæ, cuius contrarium euidenter apparet, nam quo minus se habet fœtus, eo magis trahit, & cum hoc maiores, & duriores apparent marmæ. Quod et constat, quia fœtu octimestri, vel nouimestri existente marmæ longe maiores sunt, q̄ reliquo grauidationis tempore, & tunc fœtus magis attrahit, q̄ pluribus indiget, quo vī minores debere esse. Ex his itaque euidenter constat, quo magis fœtus attrahit, maiores fieri marmas, & quo minus minores. Quod profecto certissimum abortus, seu imbecillitatis fœtus existit signum. Cum hoc tñ quantumuis turgidæ sint marmæ, si lac effluit, vt probatum est, certum quoq; erit imbecillitatis, seu abortus indicium. Si igitur quod ex sanguine delabente ad vterum redundare solet, deficiat ad lactis materiam, deficiet quoq; ad fœtus alimoniam, & sic præsagium erit certum. His omnibus sic constitutus, considerabis marmæ turgentes ne sint, aut lac instillantes adeo, vt affectum generent, tunc. n. id mitigare studebis iuxta naturam causæ, a qua id prouenire cōperies, reuocans in memoriam ea, quæ nuper diximus, expendensq; modum generationis lactis, quem ex Hip. retulimus, materiam, aut causas copiosioris, aut diminuti, vt lib. seq. latius sum monstraturus.

*Curatio
ratio.*

In huius affectus curatione turgorem immodicum miticabis, paruitatē emēdabis, & laxitati, ac lactis fluori prouidebis, fœtui adhibitis omnibus præsidiiis per eam victus rationem, & peculiarem prouidentiam, quam reperies præcedētibz quatuor cap. nil enim prodest aliquid mammis adhibere, nisi in maximā duritiem creuerint. Quo tempore adhibenda sunt, quæ emolliendi, ac digerendi vires habeant, ne forsan in grauissimos dolores incidunt, in quo degenerare dixit Hip. lib. 5. apho. 53. aut tumorem aliquem præter naturam, qui in suppurationem ocysime commigret, qualia reperies lib. seq. cap. de lactis abundantia. Nam mihi non fuit in animo hac in parte, accidentia hæc recensere, vt aliquod illis præstemus auxilium, nam & leuissima sunt, & pauca admittunt, sed potissimum, vt horum omnium innotescat causa, & ratio, quæ sanè res scitu ad præsagationem summo opere erat necessaria.

De

De pregnantibus quibus aqua ab utero profluit. Cap. 20.



ON est profectò ita faciliè docere ex qua parte, vel qua ratione ab utero, grauidationis tpe aqua profluit. Si quidem a venis siue colli vteri, siue cavitatis eius posse fluere, perdifficile est credere, aut periculosum, si ita fiat. Quippe vel vteri hydro pem, vel falsam esse grauidatione aperte ostendit. Nam in venis huiusmodi substantiã vagari, aut generari, timore plenum existit, ne vel febris succendatur ipsis putridis factis, vel sanguinem vniuersum conspurcent, aut ob id, si verè grauidationi is affectus coniungatur, fœtui desit conueniens & opportunum alimentum. Non quidem loquor hac in parte de mucoribus, aut pure, quæ aliqñ ab vteri ceruice instillare, in quibusdã scimus, sed de aqua, quæ partum præire solet, q̃ aliqñ multo ante id tempus fluere contingit. Præterea, si a fœturæ inuolucris excernatur, non minus periculũ infert, nam probabile vñ, vel fœtũ periclitari suffocatione, vel abortu inuolucris quodammodo solutis. Sed qua in parte hæc aqua generetur, expendendum est. Dũ fœtus quidem crescere cœperit, membrana illa, quæ amnios appellatur, ipsi adhæret ad vsus, quos in i. huius lib. capite subinde diximus. Hanc circumdat corion, membrana neruea, crassã, dura valde, multis vasis, ac vinculis intertexta, & exterius carnea substantia tota obducta, vt firmior esset, atque inter hanc, & amnion vrina fœtus continetur, præter hanc est carnea placentula, stratũ quod dã suppositum vasis crassum, carneum firmum, quod iungitur vtero. Quibus ita constitutis in partu naturali primo frangitur à puero amnios mēbrana, ac vrina mox fœtum tangit, & tanta molestia afficit, vt cogatur et corion lacerare, quo fit vt aqua hæc, siue vrina copiosè perfundantur. At in grauidis nondum aduētante partus tempore, non capit intellectus, qui possit fœtu superstite manēte, aqua profluere. Cum hoc tamen haud rarò conspiciamus prædictam aquam instillare, & nihilominus fœtum superstite euadere.

Quod sanè opus, vt optime intelligamus, expendisse oportet hanc effluere aquã, vel ruptis casu aliquo mēbranis, quod est abortus pluriũ, vel eodẽ casu, aut animi p̃turbatione (p̃sertim in delicatiorib. fœminis) venis plus iusto tēsis, ita vt aqua p̃seruationē pororum, hoc est per anatomosim effluere possit, illud quidẽ, vt dictũ est, semp̃ abortum p̃cedit: hoc verò minimè: illud itẽ dignosces faciliè, quod subito, cōfertim, & copiosè profluat, hoc vtero, q̃ sensim, & paulatim. Fluit quoq; nō raro valetudinarijs quibusdã fœminis, dũ vtero gerunt, humiditas q̃dã, ex superfluis albisq; purgamentis, quorum occasione plerunq; septimestres edunt partus. Sunt p̃ter hæc saniose, vel sanguinolente humiditates aliqñ profluentes, q̃ lienis vitio, aut malo corporis habitu laborant, accidere conspiciamus, vt Hip. scripsit li. 2. de mor. mul. dicens: Si verò mulier in vtero habēs lienosa sit, a relatis actionibus in hoc morbo menses hydropi similes, & pituitosos dimittit, & partus purgamenta procedunt hydropi similia, & prodibunt modo multa, modo pauca, & fiunt quemadmodum aqua a carnibus, velut si quis carnes cruentes abluat. Aliquando verò crassiora, & non congelantur.

Et

Causa.

Et patietur eadem omnia etiam ea, cui menses aquosi prodeunt.

*Curadi
ratio.*

Potissima in hoc affectu providentia habenda est circa victus, & vitæ institutione. Sic etenim plurimum prodesse comperimus, in victus ratione assas carnes præbere, amygdalas tostas in prima mensa, passulas, aut mittam citoniorum cinnamomo aromatizaram. Potus sit aqua auro ignito sapius extincto præparata, aut chalybeata, vel mastiche suffumigata, vel radice china decocta, quod tanquam peculiare præsidium laudo. Quam in re scio prodesse plurimum syrupum ex radice china confectum, quo solo præsidio plures hoc morbo affectas liberari posse arbitror: maximè si hac forma conficiatur, excipe radice china 3. ss. sparte parellæ 3. j. decoquantur in libris octo aquæ lupulorum, & horraginis ad consumptionem medietatis. Cui adde in ligatura pulueris coralli rosarum, & granæ ana 3. j. & facta colatura, adde sacchari quantum sis satis, ut fiat syrupus. Exterius verò ea adhibenda sunt, quæ roborandi, & astringendi moderatè vires habent, qualia sunt, pomum vel malum cidonium assum mastiche, gariophyllis, cinnamomo, rosas, & corallo inspersum, & umbilico appositum. Prodest & inunctio olei omphancini, si in eo incoxeris cinnamomum, rosas siccas, myrtillum, & gariophyllos. Confert & frustum carnis cum eisdem pulueribus. Sed præstat non parum temperatæ alicuius feminae manus prædicto oleo, vel de styrace, aut balsamo inuncta durissimè super umbilicum apposita. Quam quoque usum præstat sacculus ex mastiche, angelica, cinnamomo, gariophyllis, rosas, & corallo. Vtilissimum quoque censetur emplastrum confectum ex prædictis pulueribus cum ladano, & oleo styracis, ac balsamo electissimo. Quod si ferrosi aliquid in sanguine redundare sit compertum, cuius ratione plus prædictæ aquæ in ea parte colligatur, quam par sit, non erit ab re. 3. j. rhabarbari mastificandum præbere, aut deuorandum cum modico saccharo, cuius loco tabellæ diarrhodonis duplicato rhabarbaro, confectus adhibere poteris, idque cum præmeditatione faciendum, & cum periculum est ne præ nimio madore fœtus ligamenta dirumpantur, & abortus fiat. Verum si ex suppressa aliqua vacatione malum oriatur, innitendum plurimum est cibis mollioribus corpus reficere, & præexistentes humores corrigere, & attemperare.

De prægnantium moderamine, & custodia.

Cap. 21.



COGNIT O igitur ante dictis signis vteri conceptu, curandum est, ut quæ minimè laboret femina, ne fœtum imbecillū, & vultudinariū efformet, ac sibi aliquod vitium in posterum accersat. At ne ex errato, vel imprudenti vitæ instituto in abortum, aut in mancū ac defectuosum partū vteri gestatio commigret, ita ut steriles, vel morbosæ supersint feminae, huic operi innitendum plurimum est. Est igitur vteri gestatio naturalis, sed grauissima affectio, quæ coctione, seu (ut rectius loquar) maturitate natura perfecit, à quo quidem opere si aliqua occasione, intercipiatur, in mille vitia prolabitur. Quamobrem vterro gerentes, maximè quæ primiparæ, delicatiores natura, aut vitæ instituto sunt cautè, & prudenter tractare oportet, ne quid mali inopinato accadat. Cum hoc tamen plurimum non est medicamentis, aut exquisito viuendi generi innitendum

A dum sed quantū sat sit, vt neq; fœtui alimentū desit, neq; p̄ter naturæ modū vi-
tiatū sublit. Sed in hoc opere studendū plurimū est, ne qd vel inopinato accidat
aut p̄ter modū & necessitudinē à medico assistentib. aut grauida fiat, ea vi & ef-
ficacia, q̄ fœtus vincula dirūpere, aut vtcunq; aliter vitare possit. Simile. n. vtero
gerenub. accidit, ac ijs, q̄ graue aliquod onus filis tenuissimis appēsū manib.
asportant, quod si lentē, cautē, & moderatē cōmouerint, ad statutū terminū in-
noxie adducunt: sin aliter motu aliquo violento inordinatove agitent, facile &
ponderis grauitate, & ligamentorū tenuitate, vel procidit, vel malē afficitur. Sic
profectō in ijs, q̄ vtero gerunt, rē se habere credimus: nā si vehementer mouēā-
tur, si violenter agitent currū, lectica, aut quouis alio equitationis genere, vel si
animi subitos affectus patiat, vel cibis vtatur prauis, aut graueolentia, & sonit⁹
graues p̄sentiscat, intueaturq; res aspectu horrendas, & immundas, ob motus,
quos, fœtus his oībus alteratus in ligamenta infert, vel procidit, vel eadē malē
affecta relinquit, vt sanguis ocyssimē, prosiliat, signum alioqui futuri abortus,
vel causa imbecillitas fœtus, aut matris. Sic & medicamēta vehementer purgan-
tia, aut vtcunq; corpus mouētia, aut victus parsimonia, vel nimia vbertas, aut de-
pranata qualitas, vel ingens alicuius rei vetitæ appetitus: itē parentū labes. Qd
& alia plurima expressis verbis retulerat ēt Hip. li. i. de mor. mu. dicens: Pronū-
tio autē de muliere in ventre habente duos, aut tres menses, & vltra, si mēses sta-
tim prodeant singulis mētib. necesse est tenuē ipsam fieri, ac debilē. Idē accidēs
haud paucis ex ijs, q̄ grauida fiunt, accidisse cōspicimus. Et subdit recēscens alia
mala, q̄ p̄gnanti euenientia ipsam, & fœtum perdunt. Qn̄ ēt febris ipsam cor-
ripit ijs diebus, qn̄ menses prodierint, & dū prodeunt, & postq̄ prodierint, pal-
lida fit. Hec quidē & plura alia, q̄ breuitati consulens prætérmitto, eadem parte
recenset, quæ præcauere oportet ob pericula à me superius relata. Nā eam arbi-
tratur Hip. lib. 2. pop. par. 3. tex. 25. non abortiendi potissimam rationem, nimi-
rum nihil intra constitutum tempus prætér rationem accidere, inquit. n. Quib.
nihil intra constitutum tempus, singuli partus vitales fiunt, quæ autem accidere
possint, iam retulimus. Sunt tamen inter fœminas non pauca, quæ licet concip-
iant, parere tñ debito tempore nequeunt, quas Hipp. lib. de Sterilibus, steriles
C etiam nūcupat, quarum suo loco cap. de abortu, latius meminero.

Sed anteq̄ vltra pergā, expendere hæc in parte mihi visum est, cur quædā
ex p̄gnantib. melius se habeant grauida, quæ dā verō deterius. Cuius dubita-
tionis occasione, in memoriā reuocare oportet, oībus ferē grauidis cōe pathe-
ma esse, ut menses supprimantur, ex quo vtrunq; p̄gnantibus accidere certū
est. Qn̄. n. corpus sua sponte ante grauidationis tēpus vitiosis succis oppletū fue-
rit, quia eosdē fœtus ad sui alitiōnem excurrit, & matrem ab eorum spurcitia
liberat, sit facilē, vt toto grauidationis tpe melius se habeat. Alius verō contra
accidit, nam si per menses expurgari à vitiosis recrementis assuescunt, & ob id
vitā degunt salubrem & incolumē: grauida verō factæ agrius longe se habeāt.
Quippe mulieres, quæ otiosam, ac sedentariam, & inordinatam vitam degunt,
excrementa haud pauca sibi congerunt: quibus deinceps vtero gerētes, tristius
degunt: argumento sunt agricola, quibus facile est vtero gerere, quippe eis la-
bor excrementa absūmit. Sed maximam horum causam esse censeo, q̄ mulieri
sic affectæ vitiosa, vel plurima purgatio eueniebat, q̄ cū vteri gestatione desie-
rit,

rit, appropinquat, atque magnopere interturbat. Cuius rei rationem reddens Hip. lib. A
de mor. mu. & cur et grauidae mulieres palleant, inquit: Cum mulier in ventre
habuerit, tota fit cum virore pallida, quam purus ipsius sanguis semper quotidie ex
corpore distillat, & in fetum descendit, & augmentum ipsi accedit, & cum paucior
sanguis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam. Cui et rationi alia non minoris
momenti adiungit ex Hip. dictis desumpta, nimirum, bono sanguine laudabilique;
a fetu attracto, deteriore, qui antea expurgabat, superesse, atque mirum ob id non es-
se, si praedicta mala praegnantibus frequentius accendant: maxime cum primis mensibus. neque;
boni, neque; deterioris sanguinis multum insumat fetus, quo fit, ut necessum sit utri-
usque; plus iusto redundare, & in praedictos affectus prorumpere. Scitum tamen dignum arbi-
tror, infantes ab his feminis productos, vegetiores esse robustos, & saniores, quam
puriori, & crassiori sanguine utantur: alij vero, qui ex feminis prodeunt, quam grauida-
tionis tempore melius se habent, valetudinarij, imbecilles, & macilenti nascuntur, quam
deteriore, & minore sanguinis parte in alimentum alliciant, & maiore, ac pingui-
oriorem matres. Atqui cum varia praedictis feminis succrescere possint accidentia, meri-
to dixit Hip. li. nup. citato, multa opus est custodia, ut in utero gestent puerum, & B
emittant, & ut euadant ab ipso in partum. Sic proculdubio praegnantium cibaria eius
naturae adhibenda sunt (maxime earum, qui deterius se habent in grauidatione) quam
copiosior, & facilis sint nutrimenti, ac laudabilis substantiae. Ut non solum debitum
fetus alimentum suppeditent, verum & attemperamento sint vitiosis, qui supersunt
succis. Copia vero semel exhibita potissimum in principiis parca sit oportet; tum ne
plurimum ab utero calor distrahat: tum vero, quia eo tempore sanguine abundare,
& fetum, quam parcissimum contere scimus. Sanius enim esset, si femina pluribus sit as-
sueta, per vices ipsum partiri: praeterquam quod plurimam in ventre excrementorum co-
pia congerere, suspicione non caret, comprimatur his praeter modum uterus. Prae-
terea, edulia, neque; acrida; neque; flatuosa, neque; diuretica, neque; menses prouocantia,
ut sunt capparidis, cepae, cicuta, phaeoli, oliuae immaturae, allia, crocus, & vinum ma-
raciuseculum, vlla lege adhibere oportet, neque; acrida, aut acuta clysteria. Potus qui-
dem sit parcissimus, ne ligamenta laxiora fiant, isque; calfaciens, & roborans ex vi-
no, vel aniso, & similibus. qui minimè euocent menses, nisi ex usu ante id tempus fue-
rit, ut plerumque; ex magnatibus de more habent, quam cinnamomi, vel alterius aro-
matis aqua gustui, vel valetudinis gratia bibere assuescunt. A tenebris et a solitu-
dine, & tristitiam auditu praecavebis. Linteis mundis utatur caput & thorax custodiatur
a frigore: caput more solito, abluatur: ceterum a rubificantibus abstineat.

At primo mense non exerceri oportet, sed corpus quieti mandare, secundo tamen
raro, & leuiter, tertio expeditius, quarto, quinto, & sexto audacius, sed moderato
exercitio, & per planum, septimo, & octauo, & usque; ad dimidium noni mensis detra-
here de exercitio oportet, deinceps vero exercitium intendere; circa octauum men-
sem, qui omnium molestissimus est, alimentum contrahere oportet, & motus vehe-
mentiores interdicere. Ceterum mense nono, relaxandi corporis gratia, exercitiis
frequentioribus, & balneo utendum est, ut paritura futurus partus dolores forti-
ter ferre possit, & ipsi minores existant. Reliquis vero mensibus exercitium sit leue,
moderatum ante cibum: saltum, iectum, maxime coxendicium, & uteri, omnino fu-
giant, ueneno & gestatione in curru: praeter id graue onus minimè eleuerit, neque;
in duro solio, vel sede quiescant. Quae sane omnia geniturae vincula ita premunt,
ut

A vt facillimè sanguis profiliat, ac ex cōsequenti fetus aborsu periclitetur. Coitus itē primis mensib. vitandus est, potissimum si fœmina ex salacibus fuerit, superfœtationis p̄cauendæ gratiā: nā cōperimus haud raro, vel molas hinc generari, vel fœtum, quī aborsus, vel laboriosus, ac periculosi partus sit causa. Vitimis verò mensib. copiosiori vtatur coitu, dum vir suis inuitatur brachijs, ita vt ventrem nō grauet: sanguinis itē fluxio, siue ē naribus, siue ex hemorrhoidibus, aut alio quo cūq; loco in pręgnantibus prodierit, periculum ipsi accersit. Animi quoque p̄themata vitanda oīno sunt: nā hæc subito & inopinato casu sanguinē intro pellunt, à quo fœtus suffocari periclitatur, vel vasa distenta rumpunt, quod plerūq; in ira, vel grandi mœrore contingit. Somno vtantur largiori, à quo lentè, & paulatim, aut sua sponte excitentur. Pręmunire itē grauidas à ventorū vehementia, tonitu, & ab alijs, q̄ terrorem incutiunt, oportet: & in ijs, quę vitari non possunt, hilari animo, & bona spe alere, distrahere, & consolari opus est: p̄sertim eas fœminas, quę delicatiores sunt, & facile expauescunt, vt nec subito terrore corripiantur, nec sine pręstantioris, vel dilecti viri patrocinijs sint.

B Quod si mox à cōceptu cōquerat, maleq; se habeat, impatiensq; laboris extiterit, ventriculo prouidendū est ijs, quę ipsum roborēt, & modicè calfaciāt: nā cū vterus ad se maiore caloris copiā trahat, facilè reliquę partes calore, & spiritu inopes existūt: quo fit, vt cruditates, flatus, & acidi ructus plerūq; succrescāt. Verum in hoc opere nec plurimū calfaciendū est, ne immodicè astringendum, sed vtrūq; moderatè pręstandū: qualia verò huic vsui proficua sint, superius abundè diximus. Et p̄uidebis vētriculo inunctione olei absinthij, nardini, masticeis, aut citoniorū, sparsis pulueribus diarrhodonis, corticis thuris, ligni aloes & gariophyllorū. Ore autē sumat conseruā rosarum cum modico puluere ligni aloes, & gariophyllorū, vel tabellas ex puluerib. macis, gariophylli, & coriandrī pręparati, cinnamomo, & saccharo. Pręstat itē ventri adhibere cerotū, quod recipit mastichis 3. ij. rosarū, coralli, coriandrorū p̄p̄a. balaustiarū, bistorte, corticū granatorū, an. 3. ij. nucum cupressi. 3. iij. pulueris sanguinis draconis, serici, & boli armenij, an. 3. j. olei masticeis, & citoniorū lotorū aqua acetosa, & plā taginis ana parū, cum modico picis, & ladani fiat cerotum. Sed oībus proficiuū est ex Aui. decreto mel rosaceū, tertio quoq; die ingestū, & exterius absinthij, & menthæ oleū cum pulueribus coralli, rosarū, diarrhodonis, & similia. Sic cordi prouidendum est siccis epithematis ex florib. & puluerib. diambre, diamusci cū oleo naphæ, iasminorū, & similia, vel sacculū cōficiēs, ex infrascriptis puluerib. vel vnguento vteris naphæ porriges, & tabellas ex electuario de gēmis, aut aliquo ex lactificantibus, vel confectionē Gentilis, quę recipit margaritarū 3. j. f. hiacinti. 3. f. cinnamomi, gariophyllorū, macis, ana 3. ij. limaturæ auri & argenti, an. 3. j. sacchari albi lib. i. dissoluatur in 3. iij. aquæ rosarum, & fiat tabellæ. Cuius census esse creditur alia, q̄ recipit succi pomorum dulciū, & bu glossæ despumatorū an. 3. v. doronici, corticū citri, florum boraginis, rosarū rubearū, been albi, & rubri, coralli, limaturæ eboris, ana 3. iij. spodii, nucis, galliæ muscatæ, charabe, ossis de corde cerui, santalorū ru. an. 3. iij. seminis basiliconis florū myrti, melissæ, coriandri, cinnamomi, galangæ, cedoarie, spice nardi, ligni aloes, serici minutim incisi an. 3. ij. mirobalanorū 3. iij. smaragdorum, hyacinto rū, zaphirorū, granatorū pręparatorū ana 3. j. margaritarū p̄p̄a. 3. iij. limatu-

ra auri, & argenti ana 3. ij. sambra g. x. moschi 3. j. fiat secundum artē confectio, quæ gustui grata sit. Ex hoc autem puluere, addito puluere rosarū, seminis angelicæ, & sanguinis draconis cum bolo Armeno, lodano, therebenthina, & cera, emplastrum mirè corroborans fœtum, vterum, & partes vicinas, cōficere poteris. Cuius etiam efficaciam aliud conficies; quod recipit tonsuræ ex panno cocineo 3. iij. zinziberis, galangæ, cinnamomi, cubearum ana 3. ij. sanguinis draconis 3. j. mastice 3. f. moschi g. vj. mellis, aut therebinthinæ q. s. vt fiat emplastrum. Ac si fœtus lentè ægrèq; moueatur, vmbilico adhibenda sunt quæ robur illi præstent, vel ut est pomum odoriferum assum cum gariophyllis, puluerib. rosarum, coralli, & cinnamomi: vel carnis frustrum cum eisdem puluerib. vel philtrum sericum cum oleo iasminorum, naphæ, & pulueribus supradictis, ac modico vino odorifero: quod et præsidium cordi adhiberi potest. Imbecilles autem formine sacculum vmbilico adhibeant, ex lana, aut serica tela, ex ambra, moscho, corallo, rosis, gariophyllis, margaritis, semine angelicæ, & mastiche: his etiam præbebis vinū ex fœniculo, zinzibere, gariophyllis, & cinnamomo. Si tamen aluus suppressa fuerit, ob intestini recti angustiam ab vtero illatā, quod vltimis grauidationis mensibus accidere solet, edulia exhibeantur subduccendo ventri apta, vel ut est hordei succus cum cinnamomo, malua, lactucave cocta, & reliqua, quæ antea diximus: Et tandem ea prudentia res omnes moderaberis, qua securius forma ad partus portum peruenire possit. Asuetas vero abortire, anteq; grauidæ fiant, curare studebis, ut dictum est c. de abortu humidas per sudorē cacochimias, expurgatione, & tandem eas quibus, sanguis abūdat sanguine misso. Postea vero vtendum est his, quæ viscera roborant, ut aurea alexandrina, theriaca, mithridato, & alijs naturę huius, iuxta cuiusq; indigentiā.

De pregnantibus morbo acuto correptis.

Cap. 22.

ABET inter pleraq; difficilia ars medica vnum hoc tanq̃ grauissimū ac difficillimum onus, vt neq; rerum abditissimarū in ea cognitio, neque recta medendi ratio, neq; particularium notitia, & in eisdem sufficiens experimentum, & vsus (quæ sanè solet ad morbos omnes propellendos idonea esse) sufficere in aliquibus affectionibus possint. Nō quidem quod hæc oīa eisdem proprijs viribus non sufficiant, sed q̃ corpori ita disposito adiungatur, vt neq; adhibere possint, neq; adhibita citra periculū operentur. Quod proculdubio (ne dicam de pueris, & senibus) peculiari quodā periculo vtero gerētibus accidere frequentissimè cōperimus. Nam cum morbo aliquo acuto corripiuntur, omni ferè auxilio destitui vident. Hinc quidē periculi magnitudo, id anxie expetit, corporis status mille rōnibus tenuit, ita, vt non magis contingat vi morbi periclitari, q̃ ex auxilijs vel perperā, vel importunè adhibitis. Quamobrè multa in pregnantium acutis affectionibus expendere oportet, vt in re dubia, & anxia. Sed primo scire oportet, nō semper equali periculo grauidas ex morbo acuto abortire. Nam qua rōne à 4. d. 7. tutius q̃ cæteris temporibus medicari sic affectas præcepit Hip. pari prorsus censendum est, non esse par periculum. Quod ipse monstraerat lib. 1. popu. p. 3. in historia mulieris quæ decumbebat in litore, quæ cum trimestris esset, 14. die sudauit, & liberata est: & lib. pop. par. 2. tex. 4. in Stymargi vxore, quæ quadrimestrem corripit fœtum, & liberata est.

Cum

A Cum hoc tamen factum abortum, eum iudicatus matri salubriorem, qui in-
 pore proiecit infantem, ut ipse testatur lib. 2. pop. p. 2. tex. 14. inquit enim, Sexa-
 ginta dierum masculi corruptio in detentioribus partus salubris. Quo etiam lo-
 co subaudire oportet, femellas non pari securitate eisdem diebus corrumpi,
 quia in totum, & partus, & corruptiones habent grauiore, licet securiores: nā
 quæ femellas conceperunt, morbis ex retentione, excrementorum (quæ multa
 in his sunt) obnoxia magis existunt, & ob hanc familiaritatem, securius tran-
 seunt hos affectus, quàm quæ mares conceperunt, quia his non sunt hi affectus
 equæ familiares: quare filias patiunt in letales morbo magis incidunt, sed ab
 æqualibus magis liberantur.

Primò quidem ex omnium ferè antiquorum decreto constat vtero gerentem
 ab omni auxilio medico maximè abhorrere: quo probato, constabit quantum
 periculi inferat, vtero gerentes acutis affectionibus corripì. Quippe purgatio-
 nem interdicit Hip. in vtero gerentibus, nisi materia turgat 4. aphor. 1. Venæ
 sectionem vero 5. aphor. 30. dicens, Mulier vtero gerens sanguine misso ex venâ
 abortit. Vehementem quoque inediam, alioqui morbis acutis, proficiam, Gal.
B perhorrescit commento, nuper citatæ sententiæ. Externa item, & leuia medica-
 menta nihil prodesse constat, ut ex Hip. colligitur euidenter 1. aphor. dicente,
 Extremis morbis (quales acuti sunt) extrema exquisitè remedia optima sunt. Itē
 cum duplex sit acutorum morborum natura (nam quidam sine febre existunt:
 quidam sibi comitem eam habent) duplex quoque periculum grauidis hac ra-
 tione ex acutis morbis, succrescit. Primū ex ijs, q. sine febre sunt, qualis attonitus
 est, & epilepsia, ac his persimiles: periclitatur quidem fetus, sed magis, & primò
 mater: cum non solum morbi acuti sint, sed valde acuti, ut Gal. 5. aphor. 29. recē-
 set. Sed clarius ex Hip. elicitur dicente, Soluere morbum, quem apoplexiam vo-
 cant fortē est impossibile, debilem verò non facile. Item de distensione sic lo-
 quitur. Quinque à distensione corripuntur, in quatuor diebus pereunt: &
 5. aphor. 1. & 2. conuulsionem exitialem existimat, idq; ex causæ ratione nimirū
 ex elleboro, ex nimio sanguinis auulnere fluxu, superflua purgatione, ebrieta-
 te, aut febre. Ob reliquos verò affectus, qui cū febre sunt, periclitatur fetus ma-
 gis, & protinus, & femina abortit, idq; vel ob calorem, vel ob humorem putri-
C dum. Vltimò tamen ob necessitatem detrahendi sanguinem, ex qua (ut dictum
 est) abortire femina cogitur. Quibus etiam accedit vtero gerentes ex status il-
 lius natura imbecillas esse, & deterioris habitus: quod probat Hippo. lib. 1. de
 mor. mul. dicens, Cum mulier in ventre habet, tota sit cum virore pallida, quo-
 niam purus ipsius sanguis, semper quotidie ex corpore distillat, & in forum de-
 scendit, & augmentum ipsi accedit. Et cum paucior ipsi sanguis in corpore sit,
 necesse est ipsam, esse pallidam, semperq; alienos cibos appetere, & sanguinea
 in ventrem intrare, & debilior sit, qm sanguis minuitur. Neque obstat Hip. di-
 xisse lib. de nat. fœ. vtero gerentes pinguiore fieri: nam quæ tales sunt, imbecil-
 liores sunt in partibus externis, licet primò accessu videantur, robustiores esse
 factas: in super, & fœtum habent languidissimum. Præterea constat, prægnantē
 morbis acutis premi, multis posse modis, primo, q. ferè omnia auxilia renuat, se-
 cundò, quia obnoxia est abortus periculo, & auxilijs, & vi morbi; tertio, quia
 deterioris fiat habitus, pallida. n. & decolor protinus apparet: & ob id vehemē-
 Ec tius

Purgan
di ratio
in graui
dis
 tius premittitur: quarto verò, quia imbecillibus constat viribus, quam sanè imbecillitatem auget perpetua respirationis magnitudo, ac celeritas. Itaq; & curare, & à curatione abstinere, periculo non vacat in vtero gerentibus. Quocirca cū auxilio destitui non liceat, moderari in his auxilia opus est, sumpta ad id indicatione ab statu foeminae; & ab affectionis natura, & periculo. Quid verò agendum sit in purgatione, & sanguinis missione, iam monstrare aggredior. Caterū in purgatione duo pulchra, & necessaria perpendit, iudicio nostro, Hip. Primū quidem id tempus ad eam, eligendum fore, in quo vinculum cum matre firmū obineat puer: a quarto nimirum grauidationis mense vsq; ad septimum. Nam eo tempore purgandas esse censemus, quæ vtero gerunt, quo maximè fortis heret matri, ne faciliè medicamenti commotione dirumpat vincula, discedatq; ue. Expendendum præterea est, minus esse septimo mense purgandas, q̃ antea, iuxta verbum illud Hip. Et vsq; ad septimum. Primis etenim tribus mensibus, ac duobus vltimis, scilicet octauo, & nono, medicamenta dare non possumus citra euidens, & maximum periculum: septimo quidem minus est inconueniens: magis verò tutum a quarto ad sexum inclinsuè, vt fertur. De primis refert, s. pop. historiam de vxore Anthimachi, cui, cum esset prægnans secundi mensis, exhibito catapotio, mortua est. In octauo verò cū periculosissimus sit abortus, plerumque mater moritur, tum ob foetus magnitudinē, tum verò ob mensis conditionem. Cuius rei exemplum est. 7. pop. vxoris Olimpiadæ, quæ octimestris erat, & cū ex casu abortisset, mortua est: quò fit, vt verenda sit summopere in his mensibus purgatio: nam inter menses purgationi ineptos pessimus est octauus: inter priores aut minimè periculosus est tertius de abortu, sed de vita, primus: medius aut inter vtrosq; quoad abortum, & vitam matris, secundus. Difficultas tamen non parua de nono vrget: nam cū sit mensis partui opportunus, vñ esse securissimus: qua in re considerandum est ex ea parte, qua potest parere vitalem, securissimus esse: verum si nō peperit vitalem, periculosissimum existere propter foetus magnitudinem. Quamobrem cauendum etiam est eo tempore a medicamentis purgantibus: nam si foetus intereat, cauendum quoq; est, ne matrem interimat. Quod si quis dixerit eadem ratione periculosiorem esse quarto sexum: dicemus plus beneficii præstare vinculorum robur, quàm eam foetus magnitudinem: ob id magis minusve prædictis temporibus pharmaco est vtendum, qd̃ citra ipsum grauior fieret affectio: nam semper medicari licet a quarto ad sextū mensem satis tuto, in septimo non adeo tutum, a septimo vltra, & ante quartum maximo cum periculo. Itaq; purgare oportet vtero gerētes, cum foetus maximè adheret matri. Caterum in mensium natura collatione facta ad periculum, nō paruam ingerit dubitationem, q̃ Hip. lib. 1. pop. part. 3. in historia mulieris, quæ & litore habitabat, cum trimestrem foetum gestasset, ipsam a morbo acuto, & prauis accidentibus liberam dixit. In cuius sententiæ comm. Gal. inquit, iam illud quoq; meminisse conuenit, foetum trium vel quatuor mensium præ alijs maximè resistere: q̃ non ignorans Hip. dixisset. Vtero gerentes purgare, si materia turget, quadrimestres, & vsq; ad septimum mensem, minus verò has iuniores, & seniores vitare oportet. Et parum inquit, Ob hæc trimestres, & quadrimestres præ alijs magis seruantur. Cum tamen in aphorism. prædicto tres primos menses excludat, & tres postremos. Tunc sic infero rationem, si trimestres seruantur magis,

A magis, tolerabunt etiam facilius absque abortu purgationem. In qua dubitatione prætermisisti, varijs, & multis, quæ in illius sententiæ expositione auctores asserunt, ego ita sentio, nimirum ex historia, quam Hip. nouit lib. popu. non euerit veritatem, quæ superius adduximus, videlicet, tribus primis grauidationis mensibus, & tribus vltimis non esse tutas purgationes: nam ea parte euidenter constat, non locutum fuisse de purgatione. Emanat tamen maius dubium ex Gale. verbis, qui tertium, & quartum mensem alijs præfert, & ratione euidenti vñ probare, siquidem ad ferendos morbos acutos, eos præferendos esse hac ratione arbitrat. Nam morbi acuti abortum asserunt ob id, quod febres continuas ferre habent adiunctas, à quibus vtero generantes periclitari constat ob auctum calorem, & alimenti defectum, quæ sanè mala trimestres, & quadrimestres facilius ferunt, cum adeò magni non sint fetus, vt calore, & angustia loci suffocetur, aut ob alimenti inopiam deficiant velut magni. Quò fit, vt melius, q̃ maiores seruari possint, & melius, q̃ minores: nam ob tenerrimam eorum substantiam, qui ante tertium mensem sunt, a febris, & alimenti inopia citissime dissoluuntur & pereunt.

Cum hoc tamen licet trimestres minus alijs molestantur a febris, & alimenti inopia, motionibus quidem, & laboribus minus resistunt, quam qui sunt a quarto ad septimum: mollitudo etenim, & substantia fetus in minoribus, & in maioribus grauitas maior, & alimentorum inopia cum febris vehementia abortus causa existunt, vt recenset Hip. 4. apho. 1. Qua ratione, ex illa sententia nititur Gal. suum axioma de trimestribus probare: quippe obdictas causas non ferunt fetus commotionem, q̃ inferunt purgantia medicamenta, quibus trimestres non resistunt, neq; commotionem ferunt: ob tertiam tamen, & quartam causam trimestres magis alijs seruantur, siquidem maiorem in ediam ferunt, quam minores, qui dissoluuntur facilius, sicut & februm vehementiam. Quamobrem cum fetus in primis mensibus ob mollitudinem, & in postremis ob magnitudinem, & grauitatem, non ferunt medicamentorum purgantium commotiones: necessario etiam sequitur trimestres, & quadrimestres, cum minus molles sint, minoribus minus dissolui a febris acutis, & minus suffocari, q̃ maiores, & minus et lædi ab alimenti inopia. Verum quia ex auxiliorum adhibitione in morbis acutis, qui vtero gerentibus accidunt, non solum vereri oportet abortum propter fetum, qui perit, verum etiam propter matrem, quæ periculum non contemnendum subit, si vno mense magis, quam alio abortiat. Ob id ex arte me fecisse arbitror, si exposuero qualis mensis sit abortus fetus periculosior, & qualis matri magis, & rursus qualis vtrique grauis existat. Inter omnes itaque menses minus abortu periclitantur in quinto, & sexti initio: secundo loco sequitur quartus, & sexti finis, tertio verò septimus: mox tertius: deinde secundus: tandem primus: & vltimo nonus, & rursus post ipsum octauus, qui citra comparationem est lethalis. Sic profectò femina si abortiat primo mense, minus periclitatur, magis secundo tertio deinde magis: in quinto pari pensu, & in sexto: in septimo verò, & nono si fetus vitales non exeant, periculosissimum est, alioqui securissimum. Tandem omnium pessimus octauus. Sic generaliter si femina abortiat, sibi, & fetus minus periculosus est simul quartus, deinde quintus, post sextus: & 4. loco primus: & a primo deterior 2. deinceps tertius: &

Ec 2 septu-

*quibusne
libus prægr
les vna ab
hui magis ne
minu obno
rie.*

septimus ab eo, deinde nonus, tandē deterior omnibus est octauus. Quod si ali-
qñ contrarium accidere reperias, non ob id existimandum est, hanc considera-
tionem esse à ratione alienam, sed aliquam aliam causam interfuisse, cuius rōne
aut melis, aut deterius, quàm pronuntiatum est, id euenerit. Interim tamen ad
maiora auxilia prægnañtibus adhibenda, hanc rationem adseruabis.

Secundum, q̃ Hip. proponit circa expurgans medicamentum prægnañtibus
propinandum est, eas esse pharmaco medicandas, quibus materia turget. Nam
triplex ex materia turgenti insurgit in vtero gerentibus ad expurgandum com-
moditas, & indicatio, periculi. s. magnitudo, materia caliditas & facilitas par-
gandi ob humoris motum. Prima quidem harum indicationum cogit medicū
purgatione vti, quantum vis suspectum sit opus: satius. n. est dubium periculū
aggredi exhibito pharmaco, q̃ non exhibito, in certa desperatione versari, q̃ p-
pe promittit expurgans medicamentum, si rectē cesserit, matrē superstitem eua-
suram, & fortasse puerum. Secunda sanē indicatio, & puero, & matri prouidet:
nihil. n. certius, & citius puerum interficere valet, ac ingens calor, acris & mor-
dax, qui materiae subiicitur mobili. Quamobrem licet ex pharmaco ipsum pro-
labi aliqñ conspiciamus, cum certius sit, ni cito praeueniatur, solo calore peri-
re, multo rectius existimamus pharmacum sub dubio periculo propinare, q̃ q̃
non adhibito fetus certō pereat. Tertia verō & ultima indicatio facilitatem pur-
gationis promittit: ex quo prodit mitius medicamentum sufficere, & profutu-
rum esse, quod sanē abortus periculum quodammodo interdicit: motam enim
materiam, vel leuissimo pharmaco adminiculans natura facillimē pellit. At si
eum de materia turgente dictum est, eadem ratione intelligendum venit de ea, q̃
iuxta alium existit, vt in ventriculo mesereo, & intestinis, quippe hac ratione
loci vtero, & foetui vicini ipsum promptissimē perdere nata est, & gratia viarū
cōmuniū iuxta quas huiusmodi materia immorat, vel leuissimo medicamē-
to excernes, quod securiorem efficit purgationem. Ex his oībus, quae hucusque
dicta sunt, & quae Hip. preced. loco profertur, optima ratione elicitur in vtero
gerentibus longē deteriorem esse morbum acutum ex humore quiescente, q̃
ex humore turgente excitatum. Quippe cum auxilio sectionis venae destituatur
vt mox probabo, ac rursus non liceat illi ministrari exquisitum & tenuem vi-
tum, q̃ longior sit eo, qui turget, ac purgari non possit, nisi cocta materia, &
paulo validioribus pharmacis, q̃ materia non ita promptē cedat, vt turgens:
ideo proculdubio lethalior efficitur. Econtrario tamen qui ex materia turgēte
prodit, securior videtur, quia breuior, & quia purgationem protinus admittit.
Cum hoc tamen euidenti ratione constat, & experimentis frequentissimis pro-
bamus, non minus conuenire coctis humoribus, & quietis purgatio, quā tur-
gentibus. Nihil enim vetat in febribus, aut aliis morbis, vbi humor coctus fue-
rit, ipsum medicamento ducere, cum morbus iam minor sit in fine status, aut
in ipsa declinatione, quod his temporibus naturam habeamus adminiculantē,
vt minori etiam pharmaco exhibito, minus turbetur, & magis expellat. Cuius
medicamenti vsum neque ipse denegasset Hippo. humoribus coctis, de quibus
Gal. refert non egere, nisi veluti manu ducente, & perducente ad locum vacua-
tionis: quo fit, vt his tutius, ac facilius vti possimus.

De

*deterior est mor-
bus acutus ex hu-
more quiescente
quod ex humore
turgente excitatur
est.*

A De medicamentis verò quibus id opus fieri liceat, cum legem, & methodū generalem tradere non sit opus: satius duxi, tyrones monere de incumbenti periculo ab eorum exhibitione. Quia in re utilitatem, necessitatem, & noxam perspicere prius necesse est arbitror, quibus constabit euidentius, quale medicamentum adhibere oportet. Prima autem noxa est, quæ agitant vniuersum corpus, & vomitum mouent: quorum motuum occasione abortire feminam non raro contingit. Secunda quæ mouent dolores. Tertia verò, quæ febres succendunt, aut præ-existentes exacerbant, quia purgantia omnia suapte natura calida existunt. Nec defunt qui amara quoque medicamenta velut aloë, & rhabarbarum propinare interdican, quod puerum amare, interfici arbitrentur. Verum nequis prædictis malis perterritus, dum vbi venerit, purgantia pharmaca ex toto renuat diligenter expendat, ea esse in triplici differentia: quædam n. valida sunt, alia debiliora, & vltimò quædam mediocria existunt. Valida quidem sunt, vel ut elleborus, colocintis, turpetum, & reliqua, quorum compositionem hæc eadem ingrediuntur, licet composita simplicibus sint moderatiora: omnium tamen conditio grauidis est aduersissima: nam hæc sunt proculdubio, quibus corpus conturbatus, vomitus, mouentur, & abortus facillimè fiunt. Et plerumque matrem vel disenteria, vel syncope interficiunt, vt Hip. accidisse referat lib. 5. pop. vxori Antimachi, quæ eadem die ab elaterio sumpto, mortua est. Sunt et inter imbecilla pharmaca quædam huic vsui probatiora, velut manna, casia fistula, syrupus ex infusionibus rosarum rubrarum, decoctum foliorum senæ, & epithymi: quibus tutius vti conceditur, vt quæ parum, aut nihil corpus perturbet. Cum hoc tamen vereri oportet, ne, cum pleraque ex his laxiora sint, & molliissima, ob id fetus ligamenti laxioribus factis, licet turbationem non inferant, abortum tamen promoueant. Quibus ratione huius prouidentia admiscere oportet, quæ roborandi, ac firmandi vias, & vires habeant, velut sunt myrobalani omnes, rosa, iuncus odoratus, & reliqua huius naturæ. Mediæ autem sunt efficaciæ, & conditio nis plurima, velut est rhabarbarum, agaricus, catholicon, confectio hamec sine scamoneo, & colocintide, ac reliqua, quæ prædictorum vires non exuperent. Neque credendum est, eò quod ex his aliqua sint amara, protinus amarorem ad forum peruenire: neque si perueniat, posse fetum interimere, cum medicamentum sit ea quantitate exhibitum, quam nobis licet vtero gerentibus porrigere. Præter id quod antequam fetus degustare ipsum possit, mille alijs rebus in corpore admiscetur, & ars ob id consulit semper admiscenda esse prædictis, quæ gustui sint gratissima, & naturæ amica, ac familiaria. Ego tamen in vtero gerentibus, vel nõ grandi morbo affectis, dum purgare vsu uenit, non recuso rhabarbarum porrigere, verum vt securius, & cautiùs fiat, vno è duobus modis ipsum præparo, nam in grauioribus malis vrgentia consulit, rhabarbaro audacter vti (vno quidè facto ex eodem rhabarbaro hac lege cidoniato; excipe cotonea ab omnibus suis interaneis repurgata, & in partes diuisa, sed superstitie pellicula, & cutæ summa quæ valde est odorata) in qua, donec tabuerint, coquiro; postea per linteum collata, ac violenter expressa, excernantur, & cum optimo saccharo coquantur: quod dom fit adijcies ad lib. j. huius conditurae 3. j. rhabarbari, cuius 3. j. aut. j. & si porrigere optimè poteris. Verum cidoniatum aliud, quod absque molestia gratius, & efficacius vacuet, hac forma parare poteris: diuidat cidoniū, & sublati semini-

Ec 3 bus.

bus cū folliculis impleantur partiū cavitates pulvere optimi rhabarbari negligenti triti pondere 3. j. & laut. ij. vel si affectio postulauerit, agarici tantundem, vel foliorum senae, deinde vniantur dictae partes, ac papiro inuoluantur, & ligatae coquantur in elibano vel furnello; & absoluta coctione cidoniam aperiantur, & abiectis medicamentis internis, pulpa manducetur, qđ proculdubio medicamento genus purgabit sine molestia, securē, atq; praeter id viscera omnia roborabit. Cum hoc tamen praegnautes purgare caute aggredidum est, & eas quidem solum, quarum salus in dubio existit, aut, eas quibus licet sana videantur, aliquod impendet periculum. Praeterea, si morbus primum si apte natura lethalis sit, & ex his, qui medicamentis cedere nequeunt, tutius esse existimo eas non purgare, ne nostro errori morbi periculum ascribatur: nisi abortus gratia id fiat, sub certa vitae matris desperatione. Item eas quoq; a purgatione ablegandas esse existimo, quibus salutis spes effulget, ac certa promittitur. Quia rōne Hipp. dixisse censeo. Praegnantibus si nihil praeter naturam accidat, vitales sunt partes. Atqui cū morbi, & pharmaca res sunt praeter naturā adeo, vt et ab infantibus medicamenta arceantur, eisdem aut abortu periclitantur, aut imbecilles superant, ita vt paulo post intereant. Reliquis vero non posthabita omnino infantis noxia, sed aliquid ipsi donando, si periculum vitae matri impendat, propinanda sunt purgantia medicamenta, ne vterq; simul vi morbi pereat: si aliter, uerendum est. Nam ubi morbus si apte natura salubris existit, non licet medico Christiano aliquid moliri opus, quo abortu periclitetur infans. In morituris uero, si qđ licet, id est abortus gratia, ne matre si morbi interempta fetus quoq; citra baptismatis sacramentum sanctum intereat. At in reliquis minus damnum est, dum in dubio res uersatur, pharmacum exhibere, qđ posthabito morbo forum, & matrem mori permittere. Quod si futurum esse mortuum cognouerimus, purgatione audaces praenite oportebit, extrahendi fetus, & humoris peccantibus gratia. Inter reliqua auxilia, quibus tutius, & altius acuto morbo corruptis opitulantur, nullum idq; praecipuum est sanguinis detractio, ut Hipp. dictum esse constat. A quibus morbis sanguinem detrahes. Quia praefecto rōne morbos acutos grandis esse lethales ipse dixerat, quia sanguinis detractionem expostulant: & ob id 4. aphor. facta mentione de expurganti medicamento, nec uerbum ullū sanguinis detractionis protulit, quin potius eam omni expressis uerbis interdixit. 5. aphor. 30. dicens. Mulier utero gerens sanguine misso ex uena abortit, & magis si fetus sit maior. Vtero enim gerentes cum incidunt in morbos acutos a sanguine ortos, missione quidem sanguinis egem, eam tñ ferre citra abortus periculum non possunt, quoniam fetus sanguine detracto priuatur necessario alimento, non solum quia sanguis nimitur, sed quod alio auertatur sanguis, qui in uterum affluere solebat. Quamobrem censeo lib. de nat. fetus Hipp. dixisse fetum impelli ad ortum ex alimenti defectu, siue defectus sit naturalis, qualis nono mense accidit, siue ex aliqua occasione sanguine misso, aut quauis alia uacuatione. Verum licet Hippo. dictum sit, sanguine extracto protinus foetum abortire, non ob id credendum est, id auxilium ex toto interdicare. Sed hac in parte eius sententiam intelligendam esse arbitror eo modo, quo alias, quae ad praesagandi rationem attinent, ipse protulerat. Dixerat enim 5. aphor. 21. Mulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale. Non tñ ob id credendum est oēs protinus morituras, sed magna ex parte id accidere. Pari quo-

De sanguine detractio in gravidis.

A que prorsus ratione existimabimus sanguine misso neq; omnes abortum passuras, sed magna ex parte. In hac tñ re ego proculdubio sentio, prægnantes ad sanguinis detractiōem similem scopū præstare, ei qui ab ætate desumitur: nā ætas non renuit suapte natura sanguinis detractiōem, sed ob certas ipsius cōditiones quantitatem moderatur. Quamobrē in gravidis duplici rōne vñ sanguinis detractiōem moderari oportere. Prima ne vires feminæ fortē ita deficiāt, vt ipsi, fœtui, & morbo sufficere non possint. Secunda, quia periclitatur sanguine detracto abortu: nam si primis mēlibus mittatur, tenerrima admodum sunt fœtus vincula, & quouis leui motu dirumpuntur: præterq̃ quod dissoluntur nō pauci spiritus in ipso opere, quorum defectu deterius se habet infans. Verū si auctior nimis existat fœtus sanguine misso facilius corrumpitur ob alimentū defectum. Quibus sic stantibus, rei ratio consulit, vtriq; esse subueniendum, morbo quidem sanguine misso: fœtui uerō, minori eius copia extracta. Docet iudicio nostro Celsus ueram illius Hip. sententiæ interpretationem li. 2. c. 10. hæc referens verba; Si quidem antiqui primam vltimamq; ætatē sustinere non posse hoc auxiliij genus indicabant: perluaferuntq; sibi mulierem gravidā, q̃ ita curata esset, abortum esse facturā. Postea uerō usus ostēdit nihil ex his esse perpetuū, aliasq; posteriores obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest. n. non quæ ætas sit, neq; quid intus in corpore gerat, sed q̃ vires sint cōsiderare. Ex quo loco infero, quod si mulier vtero gerens acuto magno morbo corripiatur, & vires ipsius constiterint, ac nihil fuerit aliud, qd̃ obstet, sanguinis detractiōem citra euidēs abortus periculū optimē tolerare poterit. Quod tñ intelligendum est, dū vitæ periculū impedit, atq; cū hoc tādō minus ex extrahendum, q̃tō fœtus fuerit auctior, quod eo tpe ad fœtus alimoniam & lactis generatione multo sanguine sit opus. Sed uidetur quodammodo huic sententiæ aduersari Arist. qui 4. de gen. anim. c. 8. hæc refert verba; Sed cum fœtus magis, magisq; perficiatur, plus excrementis superest, minus. n. absūmitur, idq; dulcius est, cū non bene trahatur, qd̃ bene coctum sit: non. n. insuper ad fœtus formationem consumitur, sed ad incrementum mediocri, quasi iam fœtus constet adeptus finem suum. Qua sña minus alimentis assūmere, & conterere fœtum maiorem, & conformatū, q̃ eum, qui conformationem adhuc agit, euidenter constare vñ: ob idq; optimō ducta ratione, iuxta huius autoris mentem, minus nocebit eo tpe sanguinis detractio. Neq; eō sibi erit contrariū Arist. qui lib. eodem. c. 6. reddens rationem, quare utero gerentes ab initio turbationem patiant dicit. Principio potius cū concipiunt, perturbari solent magna ex parte, conceptus. n. purgationem impedit: & præ sua exiguitate absumere copiam excrementi inter initia non pōt: q̃ post, ubi iam plenus absumere cœperit, leuat. Qua parte tñ intelligit fœtus ab initio suis primis mēlibus parum accipere, licet. n. plurimum augeantur q̃tatis suæ ratione id totum, quod in eo augmento absūmit, q̃ paucissimum est: sed c. 6. dixerat parum absumere alimentū fœtus, cum maiores sunt. Quod intelligendum esse censeo, ac si dixeris, sed minus ad portionē corporis, q̃ ubi erant quatuor, quinq; aut sex mēsum: siquidē his mētribus fœtus conficitur, ac partus oēs integrant, licet antea conformationem habeant: cum hoc tamen (ut dictum est) ijs mētribus integrantur, postea uerō conformatus, & confectus minori augmento, & minori alimento ad portionē

Ec 4 indige-

indigebit. Ex quibus verbis prodit difficultatis ratio: nam si verū est, quod Aristot. dixit, minus alimentum ad portionem suae molis capere fetus, quo grandiores sunt, non ita facile corrumpuntur sanguine misso. Cui dubitationi dicendum est Arist. eo loco tñ disquirere eam, quare lac vltimis mensibus generari incipiat, & ipsa reiecit in copiam sanguinis, qui iam ex utero ad mammas regurgitare incipit, copiosius: qđ verum est: sed nō eo qđ minus sanguinis fetus absumat, quod maior existit. Atqui licet aliqui existiment, plus abundare, qm pluribus mensibus sanguis retentus est: ego tñ censeo potissimum rōnem esse, q̄ antea diximus, nimirum quia fetus eo tpe plurimum attrahit alimēti, qđ plurimo egeat, a quo plus partis butyro sa, & pinguo sa ad lactis confectionem separari est æquum. Nam coniectabile vī, ex maiori alimenti copia maiore quoque portionem pinguo sa substantiae suppressa, q̄ ex minori, & ob id vltimis mensibus plus lactis est, quia plus trahit fetus, & plus ob id mammas transmittit. Quod censeo intellexisse Arist. cum dixit: Sed cum fetus magis, magisq; perficiatur, plus excrementi superest: ex quo copiosius lac abundare est æquum: qđ nomine excrementi intellexit Arist. Quod fit, vt dum vsu venerit, & affectus grauis extiterit, non tñ formidare oporteat vltimis mensibus sanguinis detractiōnem, sed eam non nisi plurimum exposcente malo administrare oportet. Constat igitur ob id frequentissime feliciter accidere, si in grauidarum morbis sanguinem detraxeris, parce tñ, & moderate: quā moderationem veteres non obseruarunt. Quod fit, vt mirum non sit, si tantum vetuerint sanguinis detractiōne. Sed nos hāc seruantes moderationem, audaciores tuto erimus, maxime si mox a morbi principio id studeamus efficere, ante quidē quam febrilis affectio sanguinem in vtero adseruatū, vel in secunda retentū, calfaciat putrescat vī: quippe eo tpe, vel grauior efficitur affectus qui praesuerat, vel denuo grauissimus aliter succrescit, vt multis qui timore abortus praeterriti, praetertia principij occasione, misere contingit. Itaque a quarto ad septimum sanguinem detrahes ab ea copia, quam affectus exposcere videatur, tñ remittens, quantum fetus ad sui custodiam postulauerit. Primis verò, ac vltimis mensibus, id opus non aggredieris, nisi maiore, & vrgentiore existente necessitate, idq; moderatius facies, quod fetus tenuior sit, ac facile dissoluatur, & discedat: uel qđ grandior existat, & plurimo quoq; indigeat alimento. Tandem hoc tibi semper in memoria sit, in nullo menses sanguinis missionem periculo vacare. Est tñ in hac re aliud, qđ praetere non decet, nimirum in iuueniculis, & boni habitus feminis citra morbum aliquem, sed eò, quod abortiri frequentissime assuescunt, necessum esse plerumque sanguinem detrahē, vt latius sum probaturus c. de abortu. Nam feminae, quibus plurimum sanguinis abundat, dum vtero gerunt, ob id abortiunt frequentissime, quia a primis foetationis mensibus nequit factus tñ alimenti consumi: ideoq; suffocatur, vel prae nimia copia vincula dirumpuntur. Quamobrem habitum illum quātumuis bonum statim soluere expedit, nedum cum morbo aliquo acuto corripitur: quo tpe duplex insurgit necessitas mittendi sanguine: prima ab affectu: secunda a copioso corporis apparatu, quibus satisfactū erit sanguine misso. Verum in omnib. sanguinis detractiōnibus, qđ grauidis profuturae sunt, eam venā eligere conuenit, qđ maxime ab vteri venis dissideat, ita vt quā minimam cum eis communione habeat, qualis est vena humeraria, vel vrgenti ma-

*Vena quae
eligitur*

Ati malo, cōis à reliquis verd abstinendū, quippe q̄ facile alimentū adimunt. In quo sanè opere id vnū in periculosissimis affectionib. obseruare oportet, vt sanguis nō mittat, nisi in p̄dictis, vel dum experimento disceris, eā mulierē a venæ sectione, dum vtero generet, & fœtus esset tantus, quantus eo tpe est, nihil passā fuisse, adq; et in p̄dictis actionib. adseruabis, ne aduersus, vel p̄stantis alicuius viti suā, vel fidissimi autoris decretū, sanguinē mittas, vel aliquod graue op̄ efficiendum aggrediaris. Graue, p̄fectō est, & timore plenū contra Hipp. mentē in grauidis audacter sanguinē mittere; cum hoc tñ cum matri certū periculum impendet, minus malum est sub dubio abortus sanguinē mittere, q̄ ipso nō extracto, matrē & puerum simul necessario perdere. In quo et opere octimestres cauere oportet: nā rarum est fœminā octimestrem morbo acuto correptā, & superstitem esse, vt et Arist. refert 7. de hist. ani. c. 4. Qua p̄fectō rōne maturo admodum consilio, & accersito aliquo ex p̄stantissimis Medicis id opus tentare optimū semper duxi. Quod si vires non constiterint, aut p̄missa sanguinis detractio, si plenitudini satis factum non sit, frequentioribus vt oportebit cucurbitulis, & aliqñ cum scarificatione: nam à ventre calorem febrilem distrahere natæ sunt, quod grauidis proficuum existit. Poteris quoq; hirudinibus brachijs affixis vt: nam minori sanguinis, & corporis turbatione ipsū educunt citra id quod fœminæ expauescant, aut animi deliquio corripiantur.

Qui plurimum verentur sanguinē mittere in grauidis, vniuersum ferē curationis negotiū victus parsimonie in totum cōmittunt, existimantes minus esse periculū abortus ex tenui victu, q̄ ex venæ sectione, aut purgatione, decepti (iudicio nostro) fucata, & apparenti quadā rōne, quippe existimant plerasq; ex vtero gerentib. facillimē mediam ferre posse, quod cibi fastidium citra noxā diutissimē patiantur, & ob id morbo acuto correptis tenuissimā instituunt victus rōnem, credentes id quoq; posse citra abortus periculum perferre. Ex qua et fallaci ratione inferunt in grauidis minus esse periculosum acutum morbū q̄ diuturnum, q̄ victus exquisitus non ita facile abortum excitet paucis morborū acutorum dieb. Verum rei veritas euidenter monstrat non minus esse periculosū acutum affectum hac ratione, quinimo grauius: nam quantitas cibi nulla lege, vt par est, institui in morbis acutis matri, & infanti proficua pōt: nam si cibum eligas copiosum, matrem interimes, q̄ morbi ratione victum exostulet tenuē, quod si parcum tenuemve exhibeas, qualem morbus acutus exposcit fœtus alimēti defectu peribit. Neq; valet ratio eorum, qui existimant eo quod sana, & fastidiens cibum auerfetur fœmina, ideo in acutis idem perferre innoxie posse. Fert quidem natura non raro simplicem affectum, cui si alium superaddas, citra periculum tolerare nequit. In morbo igitur acuto, ubi tot sumi, q̄ fœtum p̄dere possunt, si victu simul priues, nil mirum si ocysimē interficias. Consulit itaque in re tam dubia medendi ratio vtriq; esse prouidendū tali victus ratione instituta, q̄ nulli eorū manifestē noceat. Quod si fieri nequat, quin aut mater pereat cibi copia, aut fœtus inopiar: satius erit matri prouidere: quippe fortasse infans ea ratione à periculo euadet, quod mortua matre nequibit. In qua re eum victū institues, qui copiose sit alimonie, & substantie, in parvissima tñ copia. Puero etiam prouidendum per ea, quæ umbilico esse apponenda antea diximus. Non quidem quod ea parte puer alatur, sed roborandarum uirum gratia.

Hec

De ui-
tus m-
stitutio-
ne ingra-
uidis.

Hæc quidē sunt, q̄ in cōi omnibus vtero gerentibus morbo acuto correptis, A
proficiunt. At in reliquis auxilijs parum, aut nihil euariat curandi rō ab ijs, q̄
reliquis corporibus sunt proficua, siue angina, siue pleuritis, siue phrenitis, aut
soporosa affectio sit, nam in particularibus nihil habent, quo differre possint, p̄-
terquam q̄ in phrenitide, & reliquis huius naturæ affectionib. neq; acris cly-
steribus, aut suppositorijs vtendum est, nisi dum vsu venerit ex nimia necessita-
te abortum pronocare.

Præterea in quibusdā ex ijs, quæ vtero gerunt, vtendum est expurganti me-
dicamento, si affectio postulerit, ocysimē: in alijs remorandum. Nam quibus
alius fuit, cum id malum, vt Hip. refert 5. aphor. 34. gravidis sit periculosum,
ac periculum proficiatur, non solum (vt Gal. recenset) ex defectu alimēti, sicut
in sanguinis detractione, sed ex alijs causis, quæ eam diligentiam in arifice re-
quirunt: cō cunctandum non est, nam pituita redundans faciet ad vterum de-
missa citius effluere fœtum vinculis laxatis, & bilis amara ipsum occidet nō se-
cus, ac venenum. Significat. n. magnam causam, cum prægnantes plurimo opus
sit abundare alimento. Quibus accedit periculi alia ratio, quæ nos ad properan-
dum cogit, q̄ fluxum ocysimē sequitur tenesmus, promptissima quidem abor-
sus causa, vt Hip. placuit 7. aphor. 27. Quamobrem credendum est lienteriam
defectu alimenti abortum minari, reliquos verò fluxus alijs de causis: in quib.
sanè purgare ocysimē opus est, & in lienteria mox constringere. Inquit. n. Hip.
1. de morb. mul. Concludere autem statim, atque constringere oportet. In reli-
quis verò affectionibus, vt naturam habeamus adminiculantem, & mitiori sit
opus medicamento, coctionem expectandum esse cōsulit rei ratio: qua expe-
ctata, sæpe abijt purgandi necessitas.

Mirum profectò est, quantam requirat diligentiam in sanguine detrahendo
vterus erisypelate affectus: siquidem 5. apho. 41. expresse docet Hip. lethale ef-
fe, quod non v̄ minus mirandum, quā citò præueniendum, etiamsi erisypelas
suapte natura affectio lethalis non sit, neq; vterus membrum princeps. Si quidē
Auic. testatus est. 44. tract. 2. c. 10. se vidisse totum vterum funditus excidere, &
fœminam cum hoc superuixisse: quibus accedit, gravidationem quoq; affectū
esse secundum naturam. Cum hoc tñ hæc tria simul iuncta lethalem efficere af-
fectum experimento, confirmatur, & Hip. decreto li. 1. de mor. mul. vbi sic loq-
tur. Erisypelas si in vtero fiat, mortem necessario adfert. Subdit rationem lib. 2.
de mor. mul. dicens. Si ignis sacer in vteris fiat; tumores fiunt liuidissimi à pedi-
bus exorfi vsq; ad crura tota, & ad lumbos. Quantò verò tempus amplius pro-
gressum fuerit, et pectus percipit, & intumescit, & tota perfrigeratur, & febris
habet magna. Et in vltima parte textus subdit. Hic morbus, si prænantem inua-
ferit, occidit. Cuius causam esse scimus, q̄ abortum facit ob vehemens incēdiū:
ex abortu autem, & erisypelate necesse est mulierem mori. In qua sanè affectio-
ne licet Hip. locis nuper citatis aliam scribat curandi rationem: ego tamen ea-
dem minimè auderem vti, nisi sanguine sufficienter prius misso, & pronuncia-
to abortus, & mortis periculo: tandem verò mollibus, ac refrigerantibus clyste-
ribus rem omnem agerem, adhibitis etiam inunctionibus dorso, & inguinibus
iuxta Hip. curandi rationem loco nuper citato adductam.

Est tamen non minus graue febribus alijs gravidam corripi dum ab his ex-
tenuari

A tenuari contingat. modo lente sint, modo vehementes, vt facillè colliges ex Hippo. 5. aphor. 55. Quæcunq; (inquit) vtero gerentes febribus capiuntur, & valde extenuantur absq; manifesta occasione, difficilè pariunt, & cum periculo, aut abortus facientes, periclitantur. Itaq; duobus modis extenuantur scēminæ, in validis quidem febribus, ob vehementiam, in debilibus uerò, ob durationem: quibus ita scēminas extenuari contingit, vt neque parere, neq; partus, aut à partu labores, & vacuationes ferre citra maximum periculum possint. In qua sanè re expendendum est maturo iudicio, quid agere oporteat: non enim, sicut in acutis, vt possumus sanguinis detractione, aut purgatione, nisi ex vehementib. fuerit febris, in quibus melius est anceps experiri auxilium, quàm ferre citra auxiliares manus præsens interitum, eò qd tempus, & naturam in diuturnis affectionibus curandis præualere nobis constet. Quamobrem proba victus institutione leuissimis medicamentis, & aliis his similibus corpus moderari oportet, donec partus tēpus instet; Nā grauius fiet malum, si abortus ex præsidio sequat corpore febriente, & præ nimio labore, ac febre languido, & extenuato.

B Præterea sunt plerq; scēminæ, quibus ex intemperato habitu, aut ex prauis humoribus ante conceptum, aut post genitis, frequentissimè febribus corripitūtur, à quibus factæ imbecilles, vel abortiuæ, vel malè se habent toto grauidationis tempore, vel septuimēstres frequentius edunt partus. Quod quidem ante conceptum curandum est præcauere purgatione, balneis, sudoribus leuibus & optima victus, & vitæ institutione præmissa, quæ corpus ab huiusmodi spurcitia ante conceptum liberent.

Quæ omnia ob id hac in parte scripsi, vt quisque debita prouidentia cuique harum affectionum consulat, ne si eas à principio neglexerit, postmodum curare non possit.

DE PVERPERARVM ET NUTRICVM AFFECTIONIBVS. LIBER QVARTVS.

De Partu. Cap. I.



B

ON immeritò Hip. dixisse comperimus lib. de genitura: Omnia lege fiut. Est autem lex certa quædam ratio, & modus quò ex natura fieri solent omnia, & naturæ quædam institutio, secundum quam cuncta agit. Quippe licet aliqua est in quavis re efformanda peculiaris, & propria ratio generationi pficiua (nam vna est, quæ chilum generat, sanguinem alia, bilē utrâq; alia, & alia medullam, vrinam ac reliqua, quæ in corpore fiunt: in quibus efformandis eundem generationis modum semper adseruat potentia, cui id munus incumbit) ita profus eam, & vnâ seruare naturam ipsam rationem, & modum in fatus conceptu, in ortu ac partu tempore existimandū proculdubio est. Maxime cum stabilita habeat propria opera ipsa natura, & certus perhiodis ac legibus circumscripserit conceptum, formationem, motum, integritatem, vitam, & in lucem productionem, seu partum, ac post in matris alimentum tita solertia menitur, & perficit, vt sui occasione statutam operandi rationem nunquam enariasse comperiamus: nisi forte quid præter naturam illi accidat, cuius vi & efficacia cogatur a constituta lege deflecti. Quæ sanè duo vitiorum genera id mirum, quod puerperis, & id quod nutricibus accidere potest, quarto hoc volumine complecti fuit in animo, initio sumpto à fetus formatione & partu.

C

Dictum est præcedib. quatuor temporibus partitam esse vniuersam formandi factum perfectionem: quorum primum septem dierum spatio circumscribitur, genituram appellatam effingens: secundum carnis, & ossæ substantiæ molè preparans esse constat, licet integram delineationem ante triginta dies nò adipiscatur: tertium quidem principia viuētis effingit, ac efformat: quartum verò & vltimum perfectionem omnium membrorum præmissa delineatione pstat, præstaturum deinceps infantis nomen. Ex quibus constat decuisse naturæ maiestatem, & ministerium hæc tempora, hos motus & labores mouere, vt operis sui perfectione iuxta institutum consequatur. Nā cum natura re quandam simplicem & homogēneā struit, mirum non est, si vnica motus sorte, vnico tātum tpe vni solū operi innitens ipsius perfectionem adipiscatur citra vllam varietatem. Verum cum rem aliq̃ ex varijs diuersaq; naturæ, ac potissimū perfectionis diuersæ, fabrefacere studet: necessum proculdubio est, tot tempora, tot labores ac mutationes instituire, & mōliri, quot sunt opera, quæ ipsam effecturam speramus. Cum hoc tñ constat non vnicum esse in mare, ac sœmina formationis tempus, de qua re prætermisissis varijs antiquorum opinionibus, mediam inter omnes seligimus, quæ magis Hippocratico dogmati adherere videtur.

Forma-
tionis tē-
pus.

Genitura
Nutritio
Partus
Lactatio

Exurgit

Exurgit quidem puerperij formationis longissimus terminus numero quadraginta quinque dierum constans, quem hac lege auctores partiuntur, Solibus quidem sex spumificationi (vt dictum superius est) tribuentes: quatuor lineationi: octo lineationis repletioni: quatuordecim carnificationi: terdecim efformationi: ex quibus quadraginta quinque dierum numerus constat. Numerus autem minimus triginta dierum spatio adimpletur: quoniam Soles sex spumificationis: duo lineationis: quatuor lineationis repletionis: notem carnificationis: totidemque efformationis proculdubio sunt. Quos sanè terminos de masculo puerperio subaudire tantum oportet, nam de foemella aliter statuendum est, q̃ longioribus (vt inter omnes conuenit) temporum interuallis absoluitur: decem quidē dierum spatium (etiā si maturius plerumque, viginti quinque dierum tractu fabricari illustres auctores obseruauerunt) ultra maris spatia ad sui formationem exigit: cuius figura per id tempus post abortum in humido haudquaquam permanet, sed ocyllimè planè dissoluitur: contra mas si in aquam frigidam diffundat̃, in membranula cogitur, consistitq̃. Neq̃ nos tertere debet, q̃ ex antiquis multis (vt Straton Peripateticus, & Diocles Charystius) concepti corporis fabricā per septenos dies obseruatione dispensant, Platonica septenariorum maiestati alludentes: vt hebdomada primæ genituris intra inchoandi hominis rationē locatis, genituum humori folliculum artifex natura primum circumdet. Secundā crebas extimam conceptabilis superficiem cruoris guttas passim gestare putat. Tertiā hebdomada de foris introrsum verti eas, demergitq̃. Quartā humorem ipsum ita coagulari, vt inter carnem, & sanguinem liquida adhuc soliditate cōcretioneq̃ conueniat. Quinta, partu mense septimo maturaturo, figurā integrā cōfingi. At si nono à conceptu mense absolutio futura sit, siquidem foemina fabricationi accedit, sextā hebdomada membra diuidi: sin masculus septimā proculdubio arbitrantur. Ex quibus constat non longè à nostra veritate deuiare antiquos, siquidem trigesimo quoq̃ Sole hominis efformationem, vel paulò plus fieri censet. Hec itaq̃ est omnes configurationis ratio, quam multis de causis sic natura fabrefecit: primò nanq̃, ædificat sibi domicilium, & firmitudinem, qua subijciatur natura vegetabilis, dirigaturq̃ in actum: in quo velut in arce propria munia perficiens ad altiora progreditur, non solum contenta plantam effinxisse intra uterum, sed sensui carnem, & ceteras partes disponens, & configurationem fabricans sui naturam transgreditur. Quo facto, maiorem in corpore sculo illo apparatus effingens, animæ rationali domum præparat, cuius imperio tot facultates, tot instrumenta mira quidem varietate confecta subijcit. De-
cui autem ea omnia sic fieri: nam cum quædā nostri corporis membra habeant rationem principij, quædam verò rationem organi, & quædam rationem finis, necessum profectò fuit, aliquo ordine naturam se gerere diuidentem, vniuersū formationis tempus in quatuor partes, quibus uteri gestatio perficeretur. Vt quis parturitionis tempus adamussim callere possit, motus & labores infantis in utero expendat satis prius oportet, quod iuxta prædictas mutationes metiri quoque tempus partus opus sit. Expresserat quidem hæc omnia Hip. lib. 6. popu. par. 7. tex. 29. dicens. Dolores per circuitus fiunt, qui autem in septuaginta mouetur, is trinumero perficitur: qui verò in nonaginta, is etiam triplicato numero absoluitur. Qua sententia videtur complexum fuisse duo tantum

Ratio,
et tempus
motus
in utero.

figura

pariendi

A pariendi statuta tpa, nimirum septimum, & nonum mensem: nam qui septuaginta diebus mouentur, septimo mense in lucem produnt: qui verò nonaginta, nono. Eandem quoque sententiam scripsit idem Hipp. ad finem libri de alimento, addens id, quod summopere ad prædictum dogma existimabat necessarium fore: nam postquam de cære varias opiniones recensuisset eosdem terminos statuens, ibi sine inquit. Est, & non est: vt aperte doceret incertum esse tempus gestationis, formationis, & partus etiã, sed illa duo esse potissima plus minusve euariantia, & licet locus sit li. 2. pop. p. 3. tex. 30. huic apparenter contrarius, nimirum labores, circa tertium diem supra quinquaginta, & sextum supra centum, menstruales secundo, & quarto, quæ oportet nosse ad septimestrem. Quo videtur constare, septimestrem indicari partum laboribus mense incipiente tertio aut in fine, secundi quos complent 3. dies, aut quarto mense qui constat 106. diebus, qui sanè termini longè videntur diuersi: ab his quos li. 6. docuerat arbitror quidem non esse integrum, & Hip. dignum locum. 2. li. aut, eo voluisse idè intelligere, de masculis, in quibus mirum non est, aliquot dies ante septuagesimum moueri, & labores præstare: at lib. 6. suspicor generalius præstitisse, præceptum. Quapropter credendum est, eadem parte scripsisse varios labores, & motus ad partum terminos, dicens; In longius autem tps labores. 3. & 5. & 7. & 9. mense. 2. 4. 8. quæ ex parua tabula consideranda, censeo tamen certius loquutū fuisse lib. 6. quam in reliquis locis. Sed duo circa primum oraculum Hip. expèdisse oportet: quales sint terminis motus infantis i vtero, & quid ex illis ad partum prædicere liceat, secundum, an sint tantum hi duo pariendi termini. Ad primum igitur accedendo, existimo Hip. voluisse dicere terminum partus esse indagandum ex principio motus infantis, ita vt qui septuaginta mouetur, uel nonaginta, triplicato numero absoluat, quia potissima ratio pariendi, & tempus ex labore, ac molestia motibus infantis illata perficitur, instat reliquarum naturæ actionum. Nunquam. n. ipsa expulsionem aggreditur eius, quod cōficiat, donec ex toto perfecerit. Præterea minimum subit natura laborem in confectione humorum, donec in perfectione consistat, & sese ad expulsionem præparet: exemplo est crisis in morbis, q̄ antea motus, & labores quidam desinunt. Sic profecto in infantis exortu labores, & dolores per circuitus fiunt, puero ipso, mediante motu, designate sui exitus terminum: nam hi sunt labores, quos licet ex Hip. mente intelligere, & hi sunt motus, nimirum cū infans primò se posse moueri precipit, & facto motu laborem, & dolorem infert, præfagium quidem futuri exortus. Ex quo quidem tpe computationis initium ad partum sumit Hip. quem et doctiores insequitur. Subit aut in examen hac in parte, si statutum tps formationis fœtus contineri Hip. dixit, ad summum quadraginta, & duobus diebus, quorum computationis principium ad partum à septuagesimo in septimestrib. partibus, & à nonagesimo in nouimestribus sumat? si quidem à quadagesimo secundo ad summum fœtus moueri possunt. Non ne statutū hēt natura tps, ac determinatum huic operi, in quo motus motibus correspondere tenentur, & actiones actionibus ita, vt neq; natura, neq; fœtus vsquam ab opere cesent? Quorsū item totum illud tempus à quadagesimo secundo die ad septuagesimum, aut nonagesimum otiose pergit ipsa ita, ut nullam præstet computandi notū, neq; vllum huius operis indicium? Cui sanè dubitationi, quam maximi esse momenti scio.

scio, vnico verbo satis faciam in memoriam reuocans, naturā in morbis triplex A
ad sua munia exequendo obtinere tempus: vnum quidem in quō aliquod indi-
cat aggredi opus; aliud, in quo monstrat perficere inceptum: reliquū vero, quo
vtriusq; operis perfectionem monstrat. Quod pulchrē dixerat Hip. 2. aphor. 24.
Septenorum quartus est index. Qua sententia constat ex temporibus quādam
nil manifestum efficere, licet omnino natura ab opere nō subsistat: quādā indi-
care: quādam verō iudicare. Quod pari fermē ratione in fœtu efformando, ac
propellendo, naturam obseruare comperimus. Nam vitalem esse fœtū quadra-
gesimo secundo die indicat, septuagesimo motum editurum: intermedio autem
tpe fœtum perficit natura, vt motui statuto tempore designato sufficiat. Non n-
mox vt viuit, mouere se ipsum valet, saltem vt dolores, & labores inferre possit.
Præterquā quōd motus in fœtu duplex cognoscitur: alter vitæ manifestatiuus,
qui quadraginta, & duobus diebus effulget; alter verō prælagus, & index par-
tus, qui septuaginta, aut nonaginta diebus euenire refert Hip. prædicta senten-
tia. Quapropter partum consideramus veluti quādam morbum, eumq; longis-
simum, ex sorte nimirum eorum, qui dierum hebdomadarum, & mensium nu-
mero indicantur. Pro cuius rei probatione expressum Hip. testimonium lib. de
sepūmes, partu, quo hæc refert verba: Mulieribus fœtum conceptus, & abor-
tiones, & partus, eodem modo iudicantur, quo & morbi, & sanitas, & mors cun-
ctis hominibus. Sed omnium istorum alia quidem diebus; alia mēibus; alia die-
rum quadragenarijs; alia verō annuo spatio euenire videntur. Cum ergo partus
morbus sit longissimus, certē in eius tempore diffiniendo eandem sequi oportet
bit computandi rationem, q̄ in alijs morbis longis dierum hebdomadarum, &
mensium numero obseruamus. Itaq; quemadmodum quartum diem septimi
indicem esse Hip. testatur, vndecimum decimi, quarti, decimum septimum vi-
gesimi: ita prorsus in partu quadagesimum nonagesimi, centesimum, & vige-
simum centesimi octuagesimi, ducentesimo ducentesimi quinquagesimi in-
dicē in idem esse experimento deprehendimus. Habent. n. inter se hi numeri q̄-
dam similitudinis, analogiam ita, vt quam rationem habet quartus ad septimū,
eādē habeat quadagesimus ad nonagesimum. Quare sicuti dicimus quartus
dies ex duplicato septenario cōsurgis, & dimidium circuitus lunaris explet: ita
centesimus octuagesimus dies ex duplicato nonagesimo cōsurgit, eumq; cen-
tesimus, & vigesimus ita indicat, vt vndecimus decimum quartum. Deniq; vt vi-
gesimus, dies finem ferē facit trium partum lunaris circuitus, eumq; indicat de-
cimus septimus: ita ducentesimus, quadagesimus, qui terminus est partus na-
turalis, q̄ legitimus, finisq; est, & terminus trium partium anni, eum proculdu-
bio indicat ducentesimus. Qui sanē termini sunt omnes, quibus fœtū designantē
sui ex ortus ipsi in vtero moueri cōperimus; & fœmina ipsa apertissimē eos ob-
seruant edocē laboribus, & doloribus, quos per certos quosdam circuitus sibi
signatos persentiunt. Sic apud ipsas vulgariter ferunt dolores illos fieri, quia est
principium mensis: nos autem colligimus esse motus partuum designatores. Ex
quibus euidenter constat naturam in fœtus formatione, motu, & partu propor-
tionem, & mensuram semper seruare (dummodo aliunde non impediatur) plus
minuere, q̄ insinuauerat dictum illud Hipp. Est, & non est. Sed licet dictum sit
duos esse solum legitimi partus terminos, septimum videlicet, & nonū mēsem
do-

A doctissimorum virorum decreta, quæ aliter sentire videntur, nos cogunt id diligenter expendere, & cuiusque rationes examinare, ut constet (per ingenii mei viribus) de partus tempore veritas: initium autem sumam à partu naturali.

Partus igitur est actio partim quidem vteri, partim verò ipsius fetus, vteri quidem, quoniam ille offensus gravitate fetus iam multum adducti, & excrementorum redundantia, vi propria expultrice, fetus in lucem edit: fetus verò, tunc quod auctior satis alimentum à matre non capiat, tum quod partionis tempore plus calidi natum habens, magis quoque refrigerari postulat. Quamobrem cum non sufficiat aer, quem illa per arterias subministrat, ad exitum concitatur: idque non certo statoque tempore, ut paulò inferius latius monstrabo, contingere scimus. Fit itaque partus tum maximè cum puero alimentum inopia, & loci angustia oppressio motus validus accedit, quo manibus pedibusque calcitrante pelliculam quandam inter nam rumpi contingit: rupta autem una, alia ob id debiliorem vim habent, & rumpuntur: primū quidem illæ contiguæ, & cohærentes, postea externæ. Cum autem ruptæ fuerint pelliculæ, tunc fetus à vinculis exsoluitur, & agitur foras prodit. Atque hæc sunt Hipp. verba lib. de nat. pueri. Constat igitur naturalis partus triplices esse causas: unam cum calor cordis adeò crevit, ut amplius siue ventilatione & refrigerio inspirato aere infans vivere non possit: alteram, quoniam alimentum, quod à matre sumit, non ei satisfacit, sed cogitur quod deest, aliunde disquirere, & autore Hipp. loco nuper citato, calcitrare & acetabula diripit, & matri pariendi initium affert: tertia verò causa est, quoniam vterus ipsū iam grandiore factum non capit. Quas sanè causas in pullorum inuolucris euidenter conspicias: nam ubi ova inania videntur, volucer rostro putamen ferit, olfaciens quidem desiderium fetus ad exitum, ubi deficit alimentum, inquit enim Hipp. loco citato. Pullus non habens sufficienter unde viuat, fortiter, motetur in ovo vberius alimentum querens, & pelliculæ circundi rumpuntur, ac ubi mater sentit pullum vehementer motum putamen scalpens ipsum excidit. Id quod pulchris verbis constat Aetium dixisse tetra. 4. ser. 4. c. 21. mutuata oratione ab Hipp. li. de superfætatione, inquit enim. Talibus vteri puero augescere, & bimestri, aut trimestri, aut quantumcunque tempus transgredienti, si quando aliàs augescit in maiorem amplitudinem non porriguntur, ita ut non amplius sufficiant capiendo fetus, sed propterea proditur eodem tempore. Atque hæc de partu naturali dixisse sit satis, quæ necessaria mihi erant ad veram computandi rationem in partu. Reliqua verò, quæ de partu naturali videntur esse necessaria, reperies 3. cap. seq. de partu naturali, & laborioso.

De hominis partu, eiusque tempore, tam est difficile proferre iudicium, quàm de his omnibus, quorum variæ & inconstantes autorum reperientur sententiæ. Quippe Hipp. medicæ artis princeps, & dux non docet, ut arbitror, huiusmodi difficultatem de partu tam multiplicem, tamque ambiguam, & multis tenebris submersam, utcunque diffinire. Quamobrem studendum nunc est ex bona philosophia, & probatissimorum autorum scriptis aliquid utile haurire, quod huic rei lucem afferre possit. In qua sanè re primò, quid astrologi sentiant, expendendum est: secundò, quid arimhetici: & vltimò, quid in bona philosophia, & Hippo. doctrina tenendum sit, clarius constet, quot sint legitimi partus termini.

Ff

Itaque

De partu naturali.

Plin. 7. nat. hist. referi ex seminis, quod; diuersa natura pro dire. c. scribitur. Vestiliæ ex diuersis maritis facit alium 7. alium 8. alium 10. peperisse

De partus temporibus.


De par-
tu astro-
logorum
dogma.

Itaq; (vt ab Astrologis incipiā) conuenit inter ipsos corpora inferiora a supe-
rioribus affici, & septem planetas in hominis exortu, & dum in vtero est impe-
rium obtinere: idq; ordinatim, & serie quadam. Sic Saturnus (vt apud ipsos fer-
tur) primus cum genitura connexionem, & conuenientiam habet, illiq; ex sua
natura dominatur: nam cū genitura humida sit, & liquida, inspissari necesse est,
vt hominem gignat, quod proculdubio beneficium facillimè illi Saturnus præ-
stat: planeta alioqui frigidus, & siccus, cui ob id inest siccandi, inspissandiq; atq;
cogendi potentia. Verū cum semen increfcere teneatur, impleriq;, Ioui subi-
citur: quippe is augmentum præbet, & calorem, vt qui calidus sit, & humidus:
ob idq; Iouem incremento maximè præesse dicunt. Sed cū auctum iam pue-
rum moueri oporteat, cui actioni calore, & siccitate erat opus, post Iouem Mars
puerum suscipit, qui cū calidus sit, & siccus, fetui motū concedit. Quamobrē
tertio mense infantes moueri assolent. Succedit quarto loco Sol, qui ex cauā-
dis ossibus proficius existit, cuius ē beneficium meatus corporis euadūt amplo-
res, & singula membra suam perfectionem adipiscuntur: est enim huius atri
calor viuificus, & maximè efficax. Cæterum, quia periclitabatur calore, & sicci-
tate fetus ex vi præcedentium planetarum, subuenit quinto mense Venus fri-
gida, & humida respectu præcedentium caloris, cuius beneficio siccitatem ca-
loremq; à prædictis impressum natura corrigit, & attemperat. Mercurius verò,
qui operi ab alijs inchoato colophonem addere dicitur, absoluit motus perfe-
ctionem, & instrumenta expolita, ac firmiora reddit. Vltimò tamen accedit Lu-
na, cuius efficacia multa succrescūt infanti beneficia: nam quā frigida est, & hu-
mida, adipe munit, & vterum humiditate, ac mollitie ad faciliorem partum præ-
parat. Quibus beneficijs præmunitus in lucē vitalis prodit septimo mense pue-
rulus: & hæc est cā quare septimestres partus vitales, & maximè genuini apud
astrologos existant. Verum si aliter contingat, & cogatur vsq; ad octauum men-
sem remorari, iterum reuertentem ad se Saturnum sensurus est, sed non ita mi-
tem, & placidum, ac primo mense conceptus degustabit. Quippe sua frigidita-
te puerilem calorem minuet, & internam vteri partem cōstringet, cōprimeiq;
præter modum siccitate nimia, ita vt accedente externa causa protinus parien-
di occasio subsequatur, & ob id partus, & mater magno in discrimine versant
ex inclementia huius planetæ, adeò, vt partus saltem viuere minimè possit, ac si
eius malignitatē superet, viram deget ærumnosam, & laboribus, ac morbis ple-
nam. At si nihil eo mense præter naturam ipsi accadat, Iupiter, qui iterum redit,
nonum mensem saluberrimum efficit, & omnia Saturni maleficia protinus de-
let, q; suo calore, & humore, quibus potissimum viuatur, puero vitam instaurat
atq; conseruat. Verū quia is, qui Ioui succedit ex beneficiis est, & suo calore fa-
cilè cum vita nostra conspirat, ideo si quis ē decimo mēse nascatur, vitalis plu-
rima ex parte euadet. Hæc proculdubio sunt de partu, astrologorū sententiæ: cū-
ius factionis ē Proclus inter philosophos præstātilimus (fuisse) creditur: siqui-
dem scripsit non modo infantibus dum gestantur vtero prodesse planetarum
adhæsus, & vultus, sed ē ex ortis. Nam per vniuersum vitæ curriculum refert ab
eisdē affici, & foueri: quippe Luna (inquit) iam natum infantē ab vtero non re-
linquit, sed primā eius ætatem moderatur, præstans suam gratiam humiditate
media nutritiua, & augmentatiua potentiæ. Adulto tñ tam puero literarum, ci-
tha-

Atharæ, & consimilitum studium præstat Mercurius, qui cum indifferens sit, puerilem ætatem talem efficit, qualis fuerit is planeta, cui adhæserit. Sic Venus tertie ætati dominatur: Sol quarta: Mars quinta: Iupiter sexta: ac postrema Saturnus, qui frigidi- tate siccitateq; nimium pollet. Atque hæc sunt, quæ breuitati cõsalens ex astrologorum libris inter alia multa quæ inutilia reperiuntur, mihi magis placuit scribere, vt non desit studiosis occasio disputandi: neq; quidquã eorum quæ huic operi vtilia esse possint.

Placuit etiam hac in parte quid arithmetici de partus tempore sentiant, breuissimè ostendere, supponunt quidem pro hypothese numerum imparẽ, perfectum, & mari similem esse, parem verò imperfectum, & fœminæ congenue: sic profecto alibi patrem imparẽ, & parem matrem appellant. Ex quo inferunt septimum mensem, & nonum vitales partus addere posse, octauum verò minimè ferentes eum hoc de mense decimo, qui par etiam est in eo sæpe vitales nasci fœtus, quod perfectioribus numeris sit absolutus: & ob id existimant ipsum numerorum omnium esse perfectissimum, & completum, ac perfectionem reliquorum, atq; eum ex paribus solum esse perfectum, quia antecedentes numeri denario maiorem perficere nequent, & subsequentes ex decem, & præcedentium aliquo perficiuntur. Continet enim omnia numerandi genera, vt par, impar, quadratum, longum, compositum, & si quæ alia sunt: præterquam quod ex quatuor cubalibus numeris (ex quibus Pythagorici vniuersum constare referunt) constituitur. Sunt autem dogmata hæc difficilia, & quæ probari difficulter possunt, cum octonarius numerus par quoque sit, & de eo malè sentiant, & loquantur, etiam si solidum ex eo corpus, & verè perfectum componatur: nam de eis est, qui nec generantur, nec generant, ex monade, & septem constitutus: aut ex eo, qui cum generatur, tum generat, nempe quaternario duplicato. Octonarium quidem Pythagorici iustitiam vocauerunt, quod primus omnium solvatur in numeros pariter pares, hoc est, in bis quaterna.

Quamobrem cum, & contextio ipsius pari æqualitate procedat, & resolutio æqualiter recedat vsque ad monadem, merito propter æqualem diuisionem iustitiæ nonem meretur: cum hoc tamẽ fœtui summo opere inconuenit. Hęc diximus vt quisq; intelligat parem numerum non esse semper imperfectum. Verum, vt ex Pythagoricorum sententiâ colligere potuit, & septimum, & nonum mensem vitales esse, octauum verò minimè, non solum ob adductam rōnem credendum censeo: sed ob aliam longè, præstantiorem. Est autem ea hmoi, vt optime Gorreus vir doctissimus aduertit, q̃ hac in parte ad verbum trāscribere placuit ne doctis & ingeniosis desit materia speculationis: quippe hæc prodesse, & delectari aliqui solent. Constitue igitur triangulũ scaloneum, hoc est, tribus lineis inæqualibus constitutũ. A. B. C. cuius latus, B. C. sit vnitatis quatuor, latus autem. A. B. sit vnitatum. 5. perspicuum est, ex disciplina Pythagoreorum. 3. & 5. esse masculos, vt impares, sed 4. fœminam, parem. Multiplicentur igitur 4. per 5. fient 20. sed 5. per se multiplicentur, consurgēt 25. simul iuncti numeri fient, vt euidenter constat. 45. C



De partu arithmetico-
rũ dogma.

Hæc rursus per medium spatium trianguli, id est per 6. multiplices fient. 270. A
 quæ nouem menses constituunt. Rursus multiplices quatuor per 5. fient 20. &
 similiter 3. per 5. fient 15. simul iuncta erunt 35. Hæc per medium spatii trigoni
 multiplices, hoc est per 6. fient 210. quæ septem menses complent. Iterum du-
 cas 3. in 5. fient 15. ducito in sese, emergunt 25. si simul composueris, erunt qua-
 draginta. Hæc multiplicata per modum spatium, hoc est per 6. fient 240. q̄ pro-
 culdubio tempus octo mensium complent. Quamobrem in nouem, & septem
 mensibus duntaxat per naturalem coniunctionem masculi, & fœminæ, quæ 5.
 & 4. & 3. numeris significantur, numeri dierum proueniunt, qui nouē septēq;
 mensibus continentur: merito, qui istis mensibus educuntur fœtus vitales sunt.
 In mense autem octauo non est vlla masculi cum fœmina coniunctio, neque. n.
 5. neque 3. ducuntur per 4. quod fœminam repræsentat. Atqui cum huiusmodi
 copulatio præter naturam sit, merito partus isti vitales non existunt. Verum cū
 ex his numeris nulla demonstratio haberi possit quæ scientifica sit, quod pla-
 cita hæc incerta proculdubio videantur: fit subinde, vt numeris tantum tribue-
 re, neque viris doctis, neque mihi rationi consonum visum sit. Sed ea quidem B.
 diximus, vt quantum fieri possit, opus hoc absolutum euadat, & vt constet quā-
 tum vtilitatis arithmetorum dogma obtineat.

*Quid in
 uera phi-
 losophia
 & Hip.
 mēse de
 partus tē-
 poribus
 fœtus edū-
 sit.*

Iuxta optimam rationē addubitabit aliquis, cur Hip. non statuerit, nisi duos
 tantum partus naturalis terminos, septimum quidem mensem, & nonum, si qui-
 dem experimento comperimus aliis temporibus vitales partus fœminas edere.
 Præterquam quod ipse Hip. (forsitan sui oblitus) decimo mense frequenter fie-
 ri partus dixerit. Sed & alii quoque autores alius non paucos pariendi statue-
 runt terminos. Cuius sanè rei tanta est varietas, vt non vno statōq; ac certo tem-
 pore partus contingere videatur: cum tamen in aliis animalibus statuta sint pa-
 riendi tempora, homo autem solus non vno, & incerto gignitur spatio. Quam
 etenim varietatem nonnulli ad imaginatiuam, quæ homini perquam varia est,
 referunt, alii ad motum fœtus primum, qui fit in utero: alii verò ad formationē,
 quæ infantibus quibusdam celerius, quibusdam tardius perficitur. Ad cuius
 formationis pensum motus fit, & exitus, ac demum tempore bis tanto acceden- C
 te a quo moueri cœpit, vt autor est Auic. in lucem venit. Ac de his quidem tri-
 bus mensibus, septimo nimirum, & nono, aut decimo faciliè inter medicos, &
 philosophos conuenit. An uerò aliis etiam mensibus nasci vitales possint, ma-
 gna est controuersia. Cuius rei gratia ex doctissimorum scriptis referam, quæ
 experimento, & ratione vera esse constat. Nam occasione sumpta ab Hip. li. de
 alimento, qui loquens de termino partus profert, est, & non est, licet cuique
 philosophari, vt sua mens fuerit. Recensebo tamen primo, quæ de vnoquoque
 mense, seu partus tempore autores scripserunt, vt facilius rei huius abdita, &
 obscuræ varietatem venari possimus.

Arist. quidē partum, qui maturius, quam septimo mense prodeat, vitale nul-
 la ratione esse arbitrantur. Sunt et qui quintō mense: sunt qui citius vitales fœ-
 tus editos esse scripserunt. Fertur quoq; haud paucas fuisse fœminas, quas ultra
 nonum & decimum mensem peperisse verum fuit. Refert quoq; Plin. li. 7. nat.
 histo-

A hist. c. 3. Vestilliam Caij Herdici coniugem Suillum Rufum vndecimo peperisse mense. Item Aulus Gellius ex Varronis decreto scribit, vndecimo mense aliquando nasci hominem posse. Fertur etiam mulieris cuiusdam, quæ vndecimo mense peperit, causa ad diuum Adrianum delata, qua cognita decreuisse, in vndecimo mense partum edi posse, ex requisitis veterum Philosophorum, & medicorum sententijs. Scribunt item ex Homeri decreto duodecimo mense ex Neptuni complexu puellam fetum edidisse. Quid etiam q. Plinius secundus scripto manda Licij Papiri prætoris edicte bonorum possessionem infanti datâ esse contra secundum hæredem, cum tamen mater partum se terdecim mensibus dicere tulisse. Sed licet hæc ab aliquibus tanq. vera habeantur: multi tñ ab omni naturæ ratione aliena censent. Nam Vlpianus iuris cōsultus in l. Intestato, post decem menses ff. de suis, & l. hæ. post decem menses natum ad legitimam hæreditatem non admittit. Cui simile decretum protulit Imperator Iustinianus, q. epistola quadam, quæ in nouis ipsis constitutionibus habetur, scribit idẽ suis accidisse temporibus. De quo cum apud eum esset quæstio instituta, pronunciauit partum illum non esse legitimum. Itaq. vt inter autores non cōstat vnica de partus tempore sententia; ita quoq. neq. vnicam reperies apud nostrum Hip. Nam lib. de nat. pue. refert, in decem mensibus nasci, quod longissimũ est: quippe eas, quæ longius, quàm decem mensium spatium vterum gestare visæ sunt, deceptas esse testatur. Quam etiam sententiam eadẽ parte probat, quod alimentum, quod a matre foetui suggeritur, non amplius puero sufficiens sit, vbi decem præterierint menses. Refert tamen cum hoc idem autor lib. de septimest. & octimest. par. in vndecimum vsq. mensem proferri partum posse. Porro (inquit in vtraque parte) mulieribus, & partibus fidem derogare non oportet: dicunt. n. omnia, & semper dicunt, & semper proferunt; neq. enim aut opere aut sermone perfrasa sunt, sed ex eo, quod cognouerunt accidisse in corporibus suis. Quæ verò iudicio prædictæ sunt, & victoriam de hac sententia pronuntiant, semper dicunt, ac testatur nasci septimestres, & octimestres, & nonimestres, & decimestres, & undecimestres: ac subit lib. de octimestri partu. Ceterũ decimestres, & vndecimestres partus ex septem quadragenarijs eo modo fiunt. Et paulò inferius inquit; Ex his igitur omnibus necessarium est plerasq. mulieres circa plenilunium, & vltra in ventre concipere, vt ducenti, & octuaginta dies sæpe vndecimum mensem comprehendere videantur: tot. n. dies septem quadragenarios constituunt. Cui etiam dogmati astipulari Arist. sententia vñ lib. 7. de hist. ani. c. 4. qui admiratus humani partus varietatem, in hunc modum habet. Cum vteri animalia omnia singulari, & simplici modo partum suum perficiant, vnũ enim patiendi tempus statum omnibus est, homini vñ multiplex datum est: nã & septimo mense, & octauo, & nono parere potest, & q. plurimum, decimo, nõ nullæ etiam vndecimum attingunt. Quibus procul dubio sententijs iuriconsulti, & reliqui percelebres viri innitentes, mirum non est, si aliquando decreuerint vndecimum legitimum esse partum, aliquando verò fecus.

Antè tamen quam ad veriorem sententiam accedam, ab Hip. dictis pugnantiam tollam, quæ videtur maximum scrupulum inferre. Ex doctissimorum igitur decreto iudico, iustum, & maximè secundum naturam grauidationis limitè decimum mensem esse, neq. vltra illud tempus ob alimentũ penuriam, & loci

Ff 3 angu-

angustiam consistere fœtus in vtero posse, nisi fortè ad duos, vel tres dies vltra **A**
decimū mensem partus se extendat: nā totos vndecim menses consistere in vtero
fœtū, naturæ rō non admittit. Et hoc est, q̄ intelligunt Hipp. li. de octimes. pat.
& Arist. 7. de hist. anim. c. 4. quasdā nimirū mulieres vndecimū attingere, hoc
est, vndecimi mensis paucos dies insumere, idq; esse q̄ rarissimum. Id qđ Gel. li.
3. noctium Attic. c. 13. ex Varronis decreto retulit: has quasi monstrōsas rarita-
tes non recepisse, sed nono mense, aut decimo, neq; præter hos alias partiones
mulieris secundum naturam fieri existimasse. Hac viā intellecta Hipp. & Arist.
sententia, superest, rationem huius varietatis in partu hominis docere.

Non. n. huiusmodi varietas prodit, q̄ homini desit pariendi certa lex & rō,
sed q̄ eā anteuertat, aut remoretur, quodam modo natura ipsa iuxta varietatē co-
piæ, aut defectus alimenti, vel roboris, aut imbecillitatis fœtus. Verum hæc cā,
iudicio nostro non valet partū protrahere per plures dies, sed vt Hipp. visum est
non per multō plures, neq; pauciores. Quæ tñ varietas non duceret partum ad
vndecimū mensem, ni alia accidisset causa, quæ maiorem in computatione
varietatem efficeret: quam mox recensere aggredior. **B**

Hanc sanè varietatē in partib. cōputandis suboriri ego arbitror ex varia prin-
cipij grauidationis cōputatione: nā difficile quidem est nosse, nunquid a men-
struis faciendā sit grauidationis cōputatio, an potius ab ipso conceptu. Cuius
dubii principium præstitit Hipp. 2. pop. par. 4. quod quidē citra enodationē re-
linquit, cui cū satisfacere studuisset Steue Valentinus, respondet ab vtroq; tpe
esse faciendā. At cū ille minimè explicuerit, vtrū esse potius, aut saltē qñ ab al-
terutro, siue distinctione de re controuersa discernit. Cū tñ notum sit apud phi-
losophos, tempus, durationis rerum esse mensurā: constat ab eo tpe subducēdū
esse calculū, a quo res ipsa consistere incipit, q̄ cum a die cōceptionis illud verè
obtineat, ex eo proculdubio cōputatio grauidationis extat nobis ineunda, a mē-
struis verò non, nisi cū nentiquā constiterit de die cōceptionis, cui fidē attri-
buere possimus. Itaq; prodi huius rei difficultas, & ex alimento, & ex fœtus ro-
bore, & ex vario cōputationis principio, & tandem ex Hipp. qui lib. de alimētō
refert fieri parius dieb. plurib. aut pauciorib. quasi non vnicū statuens temp⁹
formationis. Quæ proculdubio omnia coegerunt priscos illos sapientissimos **C**
varia, diuersaq; partus tempora præfinire. Referam tantum hac in parte, cui ma-
gis innitendum sit ad veram computationem eliciendam: vt si fieri possit, vna tā-
tum ex Hipp. & aliorum mente subsit computandi ratio.

Et cōi itaq; oīum philosophorum Inīa constare arbitror, cunctas, q̄ hic cōtin-
gunt mutationes, a cœlestibus pendere, vt q̄ maiores longè, & efficaciores in
agendo vires obtineant. Quas tñ proficisci maxime a Solis, & Lunæ vi experi-
mur. Solis nanq; accessu, vel recessu diuersas Luna patitur mutationes, & ob id
varia in his inferioribus operatur, eaq; p̄cipuè iuxta congressum, aut discessum
Solis, quibus Luna quatuor mutationib. afficitur: plenilunio, coniunctione, &
duabus intermedijs, nimirū, cum media est ad augmentum septem dieb. cōstās,
& media ad decrementum alijs dieb. septem finitura. Apparet igitur quatuor
esse Lunæ mutationis momenta, & ea septimo quoq; die euenire: nā & post se-
ptē a prima apparitionis die p̄ mediū secta, & septē postea dieb. orbe pleno vi-
situr, quod die cōtingit 14. Ambo igitur, & Sol, & Luna pp vim, q̄ a Sole ipsa su-
sceptat,

Aſceptat, magnas vires proculdubio habent. De quorum viribus & efficacia exiſtimarunt Hip. & Gal. in illis mutationibus, quæ breues ſunt, & paucis diebus finiſi ſolent, negotium omne ad Lunam referendū eſſe: in alijs verò, quæ non niſi longo tempore iudicari poſſunt, & perfici, ad ſolis curſum maximè attendendū fore. Quamobrem acutos morbos quatuordecim diebus iudiciū ſubire ſtatuunt: quartanas verò febres non diebus, ſed menſibus ſex iudicari: dicūt. n. circuitus qui diebus aliquot concludi poſſunt ſeptimani ſunt, & Lunæ modo circumuagantur: ſed qui menſibus, ad Solem referuntur, eandemq; quam ſeptimani, rationem ſortiuntur. Cum enim à menſis principio ad pleniluniū vſq; quatuordecim prope dies ſint, dimidium nimirum lunaris circuitus: ſic profecto à hyeme ad æſtatem, quæ ſunt duæ totius anni extremæ mutationes, ſex meſes ſunt, anni dimidium. Eodem prorsus modo à plenilunio ad occultationis tēpus ſex alij meſes reſpondent, ab æſtate quidem ad hyemem. Quippe ſi Lunæ quidem curſum per ſeptimanas diuidas, quatuor reperiēs mutationes, quas diximus per quatuor ſeptimanas: Solis quoq; iter in quatuor anni tempora ſecās, ſingulis etiam Lunæ ſeptimanis proportionē reſpondebunt. Quo quidem modo, ſicut dies ſeptima, quæ pars quarta eſt totius menſis lunaris, morbos acutos iudicat: ſic anni temporis mutatio diuturnos affectus diſcutit aded, vt hyeme genitum ver ſoluat, in vere excitatum æſtas: in æſtate autumnus: in autumno vero ortum hyems. Quibus definitis, partus proculdubio erit criſis quædam, vt ſuperius dictum eſt, vt Hip. protulit, qui Mulieribus, inquit, & fœtum conceptus, & abortiones, & partus eodem tempore iudicantur, quo & morbi, & ſanctas, & mors cunctis mortalibus. Sed omnium iſtorum alia quidem diebus, alia menſibus, alia dierum quadragenarijs, alia verò annuo ſpatio euenire videntur. Ex quibus conſpicuū ſit in tpe partus definiendo Solis, & Lunæ ſimul curſum maximè obſeruandum eſſe, ſed Solis præcipuè. Quod quidem vt optimè fieri poſſit, per dies numerationem efficere opus eſt: ſi quidem vniuerſam errandi occaſionem habitam eſſe apud antiquos arbitror ex diuerſa menſium, & annorū cōputatione, vt paulo inferius monſtrabo. Conſtat igitur ex Hip. partum legitimū eſſe, qui ducentis, & octuaginta diebus integratur ad ſummū: vel ducētis, & decem: ac, vt Hip. ipſe cenſet, paulò plus, aut minus. Ex quib. proculdubio primus ſeptenarius diſcernendi vim habet, cui meſes anni tres reſpondent: non quòd meſes tres vitales partus edere poſſint: nam ad id non ſolum prærequiritur legitimum tps, ſed et fœtus ipſius firmitas atq; robur, q̄ ſanè eo tpe fœtui ineſſe nequeunt. Præterea quemadmodū alij à ſeptimo ad decimo quartū diē nullā habent, aut leniſſimam ad iudicandos morbo autoritatē: ſic quartus quintuſq; meſis ſunt ad fœtum promouendum inepti. Quamobrem ſi qua occaſione illis meſibus prodeat, violenta proculdubio cenſenda eſt fœtus emiſſio: haud ſecus q̄ diebus non decretorijs vacuationes ſymptomaticæ: etiam niſi quinto meſe robustus exiſtat fœtus, & aliquñ prodixiſſe cōſtet, ac vixiſſe: qđ magis rōne proprii roboris, q̄ legitimi tps fuiſſe arbitror. Quinimmo credendum eſt, ſi extra debitum tps exierit fœtus futurū valetudinarium, & maximè morboſum, ac debilem. Sed quānam rōne ſingulis menſibus, quos iudiciarios ad partū eſſe ſcimus, res ſe habeat, atq; celeſtis vis cuiq; adſcribēda ſit, facta ſigillatim de vnoquoq; mentione iam audies: quæ. n. huc uſq; dicta ſunt tanquam præludium quoddā

De septi
mestri
partu.

ad ea, quæ scribere studui æstimabilis, vt locus clariori doctrinæ citra varietatē, **A**
& confusionem eorum, quæ diximus, superfit. Septimestres edi partus duabus
de causis accidere rationē, & experimento comperimus. Prima ex occasione, q̄
debitum tempus anteuertat fētū existente robusto: secunda verò ex naturæ in-
stituto, & decreto. Quo fit, vt ex septimestribus quidam vitales existant, multi
vero fētus pereant ex ijs maximè, qui ex causa externa aut præter naturam pro-
deūt. Ex quibus dum robusti sunt, viuere aliquos comperimus, valetudinarios
tamen, & pumiliones. Verùm ij, qui natura agente sola prodeunt, validi sæpè,
& robusti existunt. Quod dixerat lib. de carnibus per hæc verba; Septimestris
puer ratione fit vt viuat, rationemq; habet, & numerum integrum ad hebdoma-
dam. Cuius rei rationem reddit Hip. lib. 1. de octimest. par. computationem scri-
bens ad vitæ rationem aptam, dicens. Septimestres dimidia anni parte nascun-
tur centesimo octuagesimo secundo die, & reliqua in super particula. Sed ratio,
quare sic nati viuant, est quia habet tunc proculdubio fētus perfectionem, tan-
tumq; roboris, quantum expedit ad tolerandas partus molestias, & vitam po-
stea salubriter degendam, præsertim si robustorum patrum femine progenitus **B**
fit, & in plenilunij die concepti nati sunt. Docet enim Plinius li. 7. c. 5. septimo
mense non nisi pridie posteroꝝve plenilunij die, aut interlunio conceptus nasci
vitales, aut ex valentiori parentum bene habitorum, & ætate media consisten-
tium femine sunt procreati. Nam tales quanquam septimestres sint, vitam tamē
postea salubriter degunt. Tales fortasse fuisse quis existimabit septimestres il-
los ambos Cossos Corbulones Vestillæ filios, quam semper septimo mēse par-
tus esse enixam, loco nuper citato refert idem Plinius. Constat id etiam vltius
ex occasione, quam natura accipit, vt hos partus producat. Nam æquiparantur
septimestres nonimestribus quatenus attinet ad rationem, & tempus. In tempo-
re quidem, vt inferius probabo: in ratione verò, quia robustissimos, & vegeto-
calore præditos esse septimestres pueros naturaliter in lucem editos, certū est.
Qui sanè ob eandem causam sanguinem oculus exhaustientes, ac deuorantes, pe-
nuria alimenti coguntur, carceres abrumperè, & externum auxilium petere. Se-
cundò, quia crassiores facti capi ab angustia vteri nō possunt: quibus simul iun-
ctis cogitur natura partum emittere salubrem, & robustum. Sed rōne temporis **C**
constat septimestres vitales, & robustos quoq; euadere, siquidem hebdomadū
decade trina septimestres absoluntur, sicut alij quaternis, seu septenis quadra-
genarijs. Cuius computationis, vt vim, & efficaciam discas expendere oportet
varias sententias quas Hip. & Gal. proferunt de hac re. Hip. quidem inquit lib.
de sept. p. Septimestres centum octuaginta diebus cum dimidio, & octaua parte
sunt. Quod vt planum faceret, exemplo de mense conceptionis accipiēdos esse
quindecim dies, quinq; mensium intercedentium centum quadraginta septem
cum semisse, qui oēs centum sexaginta duos cum dimidio faciunt. Quare re-
ctè colligit ad numerum constitutum, nempe centum octuaginta duos cum se-
mis: in quo septimestres partus fieri affirmauit, superesseq; non plures, q̄ vi-
ginti; centum quippe sexagintaq; duob. dieb. cum semisse, si addantur viginti,
p̄dictus numerus resultabit. Cum hoc tñ li. de carn. ad finem, ducentos, ac decē
septimestrē fētū obtinere pronuntiauit, dicens; Septimestris partus tres cōiunct
septimanarum decadas, quarum vnaquæq; septuaginta dies cum hēat, ducenti
decemq;

A decemq; dies erunt vniuersi. Præterea circa finem lib. de sept. par. taxauit quadragenarium sextum, qui circa octauum mensem voluitur, ea (vt cenſeo) de cā, qua in ſeptimo, & quinto quadragenarijs genitos fœtus approbaſſe vñ. Quamobrem cum ſextus quadragenarius damnetur, ſeu tyrāni regis æmulus, & malignitate donatus, quintum ſeptimumq; ſicut, & dies illis reſpondentes cōmendauit ingenue Gal. quorum quintus ſeptimeſtribus, ſeptimus verò nonimeſtribus pariter, ac decimeſtrib. quos eſſe vitales arbitramur. Sed quinq; quadragenarij li. quidō ducentos dies conſiciunt, qui neq; præſtituto numero ab Hip. li. de ſept. par. correſpondet, neq; tribus decadibus hebdomadarum, quarum meminit li. de carn. Turbat etiam veritatem huius rei, & iuſtam computandi rōnē, qđ dimidium anni lunaris, quem menſes lunares metiuntur, de quibus Hip. agere paulō inferius monſtrabo, ex centum ſeptuaginta ſeptem conſtat diebus: & idem ſolarem eſt amplexus, qui quinq; dierum ſpatio, & quadrante maior exiſtit. Quæ dubia, vt ex actē abſoluamus, & Galeni commentaria intelligantur, coherereq; cum Hip. diſciplinis poſſint, præmittere oportet Gal. lib. de ſeptimeſt. par. aſſeueratſe ſeptimeſtres partus centum octuaginta duobus diebus cum ſemiſſe, quod minimum eſt, iuxta primam Hip. ſniani terminari, ac perfici: quod vero maximum eſt, nunquam vltra ducētos, & quatuor dies vtero fœtum geſtari. At in medio temporis ſpatio celerius, aut tardius maximam ſeptimeſtriū edipartem, prout calida conſtitutione tēp. is, vteri calido temperamēto, & victus rōne calida citius matur ſcit, aut à contrarijs cauſis tardius ſuam adipiſcitur maturitatem. Rurſus (vt ſoluas reliqua dubia) in eadē obſeruatione perſeuerans Gal. neq; minori ſpatio, qđ in dimidio anno ſolari gigni poſſe ſeptimeſtres partus aſſeruit. Neq; in minori, qđ in dimidij menſis ſeptimi ſpatio, ſi perfectus eſt oriturus: quippe in dimidio anno lunari fieri nequit perfectus ſeptimeſtris, qđ intra ſex menſes ea rōne gigneretur, ac vitalis non eſſet, conſtat igitur in dimidio anno ſolari, qui ſeptem menſes lunares (vt Hip. decreto, qui de menſib. lunaribus loquitur, reſpondeamus) cōtinet quadantenus. Rurſus, tres decadas ſeptimana rum, vt de Hip. aſſente li. de carn. retulimus (qđ erat aliud dubiū) ducentos decēque dies habent, in eiſq; quatenus ſextū quadragenarij minimum capiunt, abſolui poterit ſeptimeſtris partus, quare ducentos, & quatuor dies attinget circiter (qđ experimenta Gal. atteſtantur) nil amplius, aut rariffimē. Quintis præterea quadragenarij ducētos ſane dies amplectit, ac plures, qđ ab Hip. li. de ſeptimeſt. par. proponuntur: cum hoc tñ minimē ea aſſertione conſicit amplius, ac ſi ſpatioſam partus ſeptimeſtris latitudinē inſinuaret duobus terminis cōcluſam, intra quos feriū, ac citius liceat ſeptimeſtri fœtui vitalem prodire. Sed, vt cōputatio optimē fiat, expendendum eſt ex Hip. & Gal. decreto in ſeptimeſtris partus ſupputatione primi menſis, & ſeptimi plus dimidio fore cōputandū, vt illorū vis queat eluceſcere, & in tā breui tpe fœtū conſumere. Quæ proſectō de cā in ea cōputatione ſufficerent, ſi dies primi ſeptimi mēſis, ſi dimidiū anni ſolaris, aut ſeptimi mēſis, vt dictū eſt attingeret. Sed quia minimē attingūt ſeptē mēſes, ſed intra ſex mēſiſſe intelligunt, oportuit aut primi, aut ſeptimi plures qđ i ſ. acciperet: aut ſi primis i ſ. duntaxat dies numerari fuerint, viginti ſint capiendi ipſius ſeptimi, qđ minimū eſt, vt dinumeratio ipſa de ſeptimo mēſe aliquot dies, quin qđ accipiat. Quā porro cōputadi rōnē alijs partib. minimē eſſe neceſſariā cēſet Hip.

Hip. vt lib. de octimest. par. ad finem ostendit. Nam cum nonum, aut decimum **A**
 fœtus attingere debeat, & maturaciones eius in his multo tempore efficiantur,
 sufficit, si aliquantulum temporis ex primo postremoq; mensibus desumatur.
 Sic genitos post plenilunium (vt loco nuper citato inquit Hipp.) necessario ad
 mensem vndecimum durare est opus: quod quidem neququam fieri posse, nisi
 per paucissimos dies, etiam si de primo mense paucissimos quoq; sumpseris. At
 in computatione septimestrium quindecim cœpti fuerunt dies de primo mēse,
 quinque; vero, sequentium, centum quadraginta septem cum semisse supersunt:
 ex quibus constat desiderari ad propositum numerum viginti, non plures, & re
 sulrant, ex omnibus centum octuaginta duo cum semisse; dimidium nimirū an
 ni solaris. Quod sanè tempus vehementem obtinuit in decernendo facultatē:
 quippe est diei decimo quarto as similis, quorum vt is est mensibus lunaris di
 midium, ita illud totius anni, quod maximam habere vim, & absolutissimam
 dictum est paulo superius, de viribus Lunæ, & Solis loquentes. Quod aut Arist.
 7. de histo. ani. dicat mares magis quam fœminas fieri septimestres, & has quidē
 decimestres, non omnino improbandum est, quia rōne non caret, licet contra- **B**
 rium contingisse constet. Octauo mense natos mille rationibus non esse vitales
 oēs ferè autores probant: ob idq; Hip. dixisse autumant. Ad partum ducenti qua
 draginta dies, est, & non est. Quibus verbis tam obscuris præcisq; indicat eum
 qui natus est mense octauo, nam ducenti, & quadraginta dies menses octo con
 ficiunt) aliquid modo esse, atq; natum videri, sed re vera nō esse, qm paulò post
 morti accedet. Libris et de septimes. & octimes. par. millies proferat, & stabilitū
 relinquit, nullum hmōi fœtum vixisse, & probat etiam suum dogma testimo
 nijs ab ipsis mulieribus petitis: Quibus studet octimestres partus prorsus vitu
 perare. Sed, & nostra tempestate vix reperias imperitissimam quamq; fœminā,
 quæ non detestetur partus octauo mense editos. His etiam accedit, quod li. de
 carni. ab iis, quæ experimento didicit, & ab alijs accepit, in hunc modum pro
 ferat. Septimestris puer ratione fit, & viuit: rōnemq; habet, & numerū integrū
 ad hebdomadam: octimestris verò generatus nulla ratione viuit. Cuius et sen
 tentiæ fuit Gal. 6. pop. p. 7. tex. 27. De octauo. n. inquit, certum est non edi in ip
 so vitales partus, sed inter cæteras causas, quibus id accidere credimus, non mi
 noris est momenti, plurium causarum subitus occurfus, & insueta consuetudo **C**
 quod intra vterum sexti quadragenarij, vt mox probabo, & violentam, ac parū
 propitiam mutationem experiantur. Verum octimestres partus cur ita in vni
 uersum mortales pronuntient, aut quæ sit tanti discriminis ratio, haud facili in
 ueniens: Cum Auic. & Arist. 7. de histo. ani. c. 44. Aegyptios octauo mense natos
 vitales esse proferant. Sed cur illi vitales, alij verò minimè, nascantur, iā audies.
 Primo quidem constat ex tempore octimestres vitales non esse: ac relictis rōni
 bus arithmetcorum, & astrologorum, comperimus de hac re Hip. lib. de septi
 mest. p. hæc verba scripsisse; Aliter quadragenarius est, in quo quidem fœtus in
 vtero existens circa octauum mensem ægrotat. Qua sententiā quadragenarium
 embrionibus morbosum esse ostendit: quod subaudire oportet de duobus tem
 poribus, nempe de primo quadragenario, qui post conceptionem computatur
 & de secundo, qui sextus est ab ipsa computatione, quinque; mensem octauum
 ambit, aut circiter cōstituit: de quo millies Hip. protulerat eos, qui in eo nascū
 tur mor-

A tur morti fore proximos, quod illis tunc agrotare contingit. Confimile porrò iudiciū faciunt scriptores de sexto quadragenario, quia sextum diem tyranni regis æmulum efficiunt, omnino infidelem, & omnium malorum conciliatorē prædicantes. Sic. n. Hip. inquit lib. de octimest. par. Quod si in huiusmodi quadraginta diebus natus sit, impossibile eum euadere, propterea quod ipsi in vtero adhuc agrotanti transmutationem, & afflictiones post partum superueniāt. Patitura aut in vtero gestus arumnas, quas per sextum quadragenarium infestare grauidas dixit, & ipsarum met testimonijs egregiè comprobauit. Succedunt etiam, & aliæ ipso partus tempore, vt est ipsa fœtus incommoda versio ob id imbecillitatem, siue in caput, siue in aliam figuram commutetur, & peregrinæ alię quas ab aere, uictus noua specie, & vestimentis insolitis mutuatur improuidēs: ob quas omnes difficillimum est viuere. Similis nanque est huiusmodi partus morbo cuius, in quo cum octonarius neq; index sit, neque decretorius, sit, vt si quando accidat, difficulter, aut perniciosè iudicet. Sic, & in octauo mense res omnino se habet. Omnes enim, qui numerorum rationem calculo adipiscuntur

B octonarium imperfectum, & materiam appellant, ac fœminam; & ob id vterus partus edere innoxie minimè poterit. Ex quibus constare arbitror neq; ex uī; & efficacia temporis, neque ex propria natura, quia tunc minimè sint perfecti, tales fœtus vitales existere. Quod licet alicui regioni ob ipsius, & corporum temperaturam, ac mulierum robur id accidat: in vniuersum tamen uerum non est octimestres vitales esse: quid vltimò probauerat Hip. argumento sumpto à noni mēstribus partibus, qui frequentissimè graciles eduntur ex perpellis ab octauo mense laboribus. Inquit enim; Manifestant autem de morbis, & passionibus in octimestribus contingētibus, & nonimestres partus, qui graciles eduntur, pro temporis multitudines corporis magnitudinem educentes: prægressi quidem post afflictionem morbificam neuiquā, vel vt septimestres carnosī. Quib. verbis quæ dicta sunt, probari euidenter arbitror. Ac si quando contigisse constet octimestrem viuere, id quidem censeo potius fieri, quod matrem deceperit computationis principium, quàm quod verum sit.

C Non est leuis controuersia apud peritissimos scriptores, an mulieribus (vt antea dictum est) statutum, & præfinitum sit pariendi tempus. Retulerat quidem Marcus Varro lib. 2. de re rustica, quæ tempora cuique animantium speciei statuta sint. Quod sanè dogma Hippocraticum est, & Galenicum: id quod Aristot. lib. 4. de gen. ani. c. 10. magna ex parte pro vitæ spatio cuiq; animalium concessio contingere docet. Sed dimissis in hac re autorum decretis, firmissimo experimento innitendum est, licet quarto, quinto, septimo, nono, decimo & undecimo mense mulieres parere multi scripserint. Constant nanque his omnibus temporibus iuxta eorum decretum, vitales posse partus edi: sed quantum id veritatis obineat, disputandum aggredior. Cuius difficultatis gratia præmittendum est, actiones naturales determinatas esse, iuxta vires passī, & agentius: verum quia hæ vires variæ in omnibus reperiuntur, & in singulis: ob id suis cuique ad actionem consuitur agendi terminus: quia inter se agens, & passum pro vtriusque natura certa quadam proportionē dissident: atque cum hæc sit varia in variis, ob id mirum non est, si varia in eodem actionis genere statuta sint actionum tempora. Id quidem probat euidenter morborum ratio: nam licet

*De noni
mēstri
partu.*

omnes

omnes habeant vnā communemq; terminandi rōnem, nimirum per actionē naturā, & victoriam supra causā morificā, aut è contra, cum hoc tñ pro varia hac proportione, aut disproportione varios dies criticos reperimus, ita vt iuxta cuiusq; morbi naturā vnus constituendus est iudicationis dies, ac terminus, pro humoris maturitate, & vitium potentia, & pro diei fortitudine, & natura. Sic pari prorsus rōne, hanc varietatem in mulierum quoq; partibus acciderè considerandum est, non tñ in reliquis animalibus. Cuius sanè rei potissima ratio est varia, & inordinata in mulieribus viuendi ratio, & forma, ita vt naturā adeo turbet, q̃ fētus maturitatem, & vitium robur eadem diuersitate parat. Quo fit vt partus diuersis temporibus iuxta primi axiomatis rationem varij quoq; fiant. Quod proculdubio in brutis nunquam conspiciamus, ob vniformem viuendi modum, & alimentorum vnitatem. Itaq; ex hac vitæ varietate duo in partibus mulierum acciderè scimus: vnum quidem, q̃ varijs temporibus iuxta varium robur ab alimenti varietate acquisitum, variè et fœtus ad maturitatem perueniant: aliud autem q̃ licet diuersis temporibus, & prædicta varietate id accidat, sunt tamen aliqua statuta, & certa, in quibus iuste possint, & innoxie fœtus in lucem prodire: quod si in cæteris accidat, periculosum, & abortiuum est. Legitimum igitur tēpus experimentum frequentissimum probauit in communi hominum natura esse nonum mensem, vel ad summum decimum, vt paulò inferius probabo, ac vltimò septimum: qui sanè menses sunt ex natura, & iudicandi ratione efficacissimi, & maximè potentes. Denique possunt partus edi in diuersis tēpibus ob naturarū diuersitatē: cæterū in diuersis, q̃ vim habeant iudicandi, ac roborandi actionem illam. In reliquis verò mensibus quantumuis ad iudicandum videantur idonei, fœtus perpetuò valetudinarij nascuntur, quòd tantum vnā causā partus legitimi nanciscantur, nimirum mensem iudicatorium, integram verò maturitatem nondum. Sed experimento quoque eodem comperimus in nono, & decimo, viuidiore, & maximè salubres esse partus ipis, & naturæ perfectione, ac rōne maturitatis: nouem. n. menses cū primo constet septenario, quod perfectissimè iudicat, perfectissimos edunt partus. Sed vt vera computatio nouem, aut decem mensium magis elucescat, expendendum est constare ex Hip. lib. de alimento, & lib. de carni. dies grauidationis non excedere quatuor decadas, quæ constant ex ducentis, & octuaginta diebus ad summum, licet non raro ante id tēps partus in lucem edi contingat: constituit. hic dierum numerus nouem mensem solares, & decem dies; & ex cōi fere omnium sententia hoc est frequentius pariendi tēps, q̃ in ipso fœtus maturiores existant, & numerus perfectior. Quod Macrobius lib. i. in somnum, apertissimis verbis protulerat. Humano partui (inquit) frequentiore vsum nouem mensium certo numerorum modulamine natura constituit. At refert puerum vinculis solutum contestim foras prodire mense, vt longissimum, decimo, vt comprehenderet partus, quos ducentesimo, & octuagesimo die fieri refert Hipp. qui nouem menses, & decem dies complectuntur. Cuius sententiæ confirmationem adduxit Hip. lib. de carni. per hæc verba; Editur verò in lucē partus mense nono, diebusq; decem, qui & uitalis est, ut qui legitimum hebdomadarum numerū (quatuor scilicet decadas hebdomadarū) consecutus. Qui sanè dierum numerus non prærequiritur ad legitimū partū exquisitus: quippe is pōt fieri, aut in pluribus, aut

Aut in paucioribus: sed nec multò pluribus, nec multo paucioribus, vt Hipp. refert: nec huic sententiæ videtur contrarius lib. 2. pop. par. 3. tex. 31. qui docens a quò principium computationis in partu debeat fieri, inquit. At a mēstruis numerandi sunt nouem menses, aut à conceptione, & in 270. dies Græci menses fiunt, & siquid insuper, aut fœminas, aut maribus hæc fiunt, aut contraria. Nam vltima contextus verba videntur cōcedere plures dies, quod alibi dixerat paulo plus, aut minus. Sed quo die sit hæc compositionis ratio ineunda superius diximus lib. 3. c. de conceptu.

Sed, vt res clariùs constet, habebis quatuor decadas hebdomadarum, si quatuor in decem, quadraginta, septies quadraginta computaueris, ex quibus sic computatis reperies ducentos, & octuaginta: numerum quidem quatuor decadam hebdomadarum. Hebdomadarum autem singulæ diebus septem, aut (exactiori calculo) diebus sex, & horis viginti constant: qualibet autem decas diebus septuaginta. Efficaciam insuper partus nouimestris ostendit, fœtum nullo alio tempore commodius posse vel exire, vel solidiore cibo uti, quàm præhabito: cui sanè neque alimentum satisfacit, neque aer ventriculationi dicatus, neque vteri angustia. Atque cum tres necessariò concurrant causæ ad legitimum partum, tempus scilicet statutum vterus, & fœtus ipse: nullo profectò in partu, æquè omnia cencurrere comperimus, quàm in nouimestri. Vterus quidem mole ponderèque grauat, vi sua expultrice ad propellendum fœtum eo tempore insurgit. Fœtus ob loci angustiam, & aeris atq; alimenti defectum, exitu affectans, valde sese agitat, & faciliùs, membranas dirumpit. Tèpus etià, vt ex Hipp. lib. de nat. pue. antea probaueram, præscribi certò potest a formationis tempore facta computatione: inquit enim. Fœminam quidem conformationem primum duobus, & quadraginta diebus, quod longissimum: masculum verò in triginta diebus est, quod lōgissimum est, eam adipisci. Ex quo etenim ratio partus nouimestris, & legitimi formatur: vt ex Auic. aliqui referūt, quod ego hucusq; non legi, nimirum tempus partus id esse legitimum, quod bis tot additis ad tps motus, diebus constat. Secundum quam rationem masculus, qui efformationē habet die trigesimo, mouebitur die nonagesimo, & nascetur ducentesimo septuagesimo die, hoc est, nono mense. Fœmella item, quæ die efformatur quadragesimo secundo, mouebitur die centesimo vigesimo sexto, hoc est, quarto mense, & diebus paucis superabundantibus: nascetur autem ducentesimo septuagesimo octauo, hoc est, nono mense cum diebus aliquot. Qualiter verò Auic. computandi ratio in fœmella verum obtineat, alij disputabunt. Constat igitur veram computandi rationem pendere ex diebus illis, quos ex Hipp. mente partum legitimum continere diximus.

Quibus sic constitutis, expendendum est, partum initio noni mensis editum in lucē, id est, a decem vltimis diebus octauæ ad decimum vsq; noni vix vitalem esse, aut si vitalis existat vāsanus est, & morbidus. At verò a decimo die noni ad decimū vsq; decimi mensis vitalis est, & bene valens: eoq; magis quò proprius ad decimum decimi mensis diem accesserit. Dictum superius est in partu septimestri primi mensis, & septimi plus dimidio fore computandum, vt illorū vis queat elucescere, vt in tā breui tpe fœtus consummari possit. At in reliquis mensibus non opus est de primo, & postremo plus dimidio accipere, cum constet

aper-

De par-
tu deci-
meftri,
et reli-
quis ma-
toribus.

apertiffimè de primo fore capièdos per quam paucos, fi ad decimum, & magis A
fi ad vndecimum peruenire debeat fortus. Quo fit. vt Hip. dixerit li. de octimef. par
genitus post plenilunium neceffario ad mensem vndecimum durare. Legi-
timum effe partum ad decimū vsq; decimi mensis diem, abunde nunc probaffe
arbitror, sed egor ob Hip. obscura decreta in partibus annumerandis disputa-
re, an vltra decimum decimi mensis diem partus in lucem edi possunt. Prestitur
huic dubitationi ansam Hip. qui lib. de octimef. par. ad vndecimum mēsem par-
tum prorogari affirmat, at lib. de alimento, & septimef. par. per dies facta cōpu-
tatione, vt dictum est, ad decimum decimi mensis diem extendi posse partus af-
feuerat. Verū, vt breui me ab hoc nodo expediam, tria in doctrina Hip. confi-
deranda sunt. Primum dies partus ad summum non effe plures, q̄ ducentos, &
octuaginta. Secundum ex hismet diebus aliquñ computasse partus tps per mēses
solares: mensis. n. solaris dī spatium illud temporis, quo Sol in vnoquoq; signo
zodiaci fertur, quæ qm sunt duodecim, mēses quoq; totidē in anno numeran-
tur, & sic constituit decimum diem decimi mensis tanq̄ vltimum partus tēpus.
Et li. de nat. pue. multis ē rōnib. probare nititur, vterum plusq̄ decē mēses fer-
re non posse, & id tps posse attingere, probat ē li. 5. pop. in historia mulieris La-
risæ, cui cum pragnans esset, decimo mēse sanguis multus fluit, & fētum pro-
iecit mortuum. Aliquñ verò considerasse mēses lunares: in qua computatione
non solum mirum non est ad vndecimum mensem peruenisse, meum consti-
tuisse terminum ē partus, verum eodem calculo facillime ad duodecimū men-
sem, & vltra (vt ex antiquis autoribus aliqui censuerunt) peruenire posse con-
stat. Probari optimè hoc assumptum potest, si mēses tres esse, iuxta antiquorū
computationem, intellexeris, differentes tñ oēs temporis duratione, inter quos
ille maximus est, qui latinis dī ciuilis, constat ex diebus viginti nouem, & ho-
ris terdecim propemodum: tot. n. dies sunt inter vnum, & alterum Lunæ cū Sole
congressum. Ex quo sanè mēse, & similibus si annum constituas, centum, &
octuaginta dies in septimum mensem incident, nanq; centum, & septuaginta
septem dies sex hmōi mēses integrant, & quinq; qui supersunt reliqui cum
aliquot horis, iam septi mensis erunt. Componesq; nouum, & decimum men-
sem eadem ferè calculatione facta. Si tamen mensem proprie lunarem dictum
consideres, longè aliter computationem efformare tenebis. Is aut diffinitur Lu-
næ zodiaci puncto idem punctum profectio, & reditu, in q̄ viam Luna vi-
ginti, & septem dies cum horis octo insumit. Quibus equidem mensibus si par-
tum nouimestrem constituas, continebit ducentos, & quadraginta, ac sex dies:
constatigitur ad integritatem ducentorum, & octoginta dierum, quos Hip. cē-
set esse legitimi partus dies, deesse dies triginta, & quatuor, qui decimum men-
sem integrum, & principium vndecimi constituunt. Quod si tertiam mensis lu-
naris dīam (q̄ fit a primò exemptis trib. dieb. coniunctionis lune) accipias, repe-
ries continere sex, & viginti dies, & horas duodecim: ex quibus sanè nouē mē-
ses continebunt dies ducentos, & triginta, & octo, & horas quasdam: quibus
deesse constat ad integritatē dierū, quos legitimū partū constituere refert Hip.
quadraginto, & duos, qui ē ex solaribus ferè vndecimū mensem constituunt.
Ex quibus iā constare arbitror, qua nam rōne dixerint Hip. & Plinius, & Ari. ad
vndecimū mensem partus posse peruenire. Ac si mireris, et rōne q̄ras, cur mē-
sum

Asum lunarium potius, q̄ solarium definita sit apud antiquos pariēdi rō, defines protinus mirari, si aduertas, antiquos (græcos maxime) annum totum ad rōnem lunę subduxisse, & alios menses non habuisse, quā lunares, nondum reducto in eam formam, anno, quæ nūc vsui nobis est. Atq; hæc de nono, decimo, & vñ decimo mense dicta sufficiant. De alijs verò, quæ sequuntur, pleriq; dubitant, vtrum ad eos vsq; differri possint partus. De qua sanè re sentiēdum, puto, aliquñ vel ex alimenti vbertate, quo fetus gaudet ad integram perfectionem adipiscēdam, vel ex matris labore, aut impotentia in plures dies posse partum extendi: verum id quidem rarissimum est, & monstrosū. Quin, & Hip. lib. de nat. pue. negat, vtrum plusq̄ decem menses ferri posse, his verbis. Quod si q̄dam mulieres arbitrata sint, se vtrum plusq̄ decem menses tulisse (id. n. iam sæpe audiui) id sanè est, q̄ vteri sæpe spiritum capiant in se ipsos à vtre flatum exhibere, eleuato tñ atque intumescēte vtero, videntur sanè sibi tunc mulieres concepisse. Quin etiam mensibus non prodeuntibus atq; in vtero congregatis, aut calescentibus, aut flatibus mixtis, falsam q̄dam grauidationis speciem non rarò mulieribus præbent, vt sibi in vtero habere videantur, nimirum menstruis non prodeuntibus, & vteris eleuatis. Quæ sanè feminae sic affectæ, si postea cōcipiāt, putant se plus q̄ decem menses vtrum gessisse, dum falsò suppurationē ineunt ab eo tpe, absq; vtrum intumescere vel flatu, vel mensium suppressione senserunt, non aut ab eo, quo re vera conceperunt. Quamobrem credendum est potius eas deceptas esse, si rigidè re iudicare velimus, vt Hip. q̄ malè cōsulens mulierū pudicitia aliquot argumentis loco citato probat, vtrum plusq̄ decem menses ferri nō posse. Verum ne ex toto corruere videatur feminarū vis, eo, quo dictū est mō, supputationē undecimi mensis instituere oportet, & pari supputatione poteris 12. vsq; ptingere, qđ verò Aui. de 14. mēse scribit, id arbitror aliorū mēte scripisse.

De Abortu.

Cap. 2.

Aboriunt quidem adeò frequenter mulieres, vt, si quis id diligēter examinet, facillè inueniat plures esse vteri deperditiones seu abortus, q̄ legitimos partus. Quo sanè multi filijs orbat, miserè vitam degerunt: quamobrem, vt huic malo prouidere possimus, quid abortus sit, primò expendendum est: quas cās habeat: & qua lege præcauebimus quominus femina abortiat. Est igitur abortus, vt Gal. placet. 6. pop. p. 1. cōm. 2. imperfecta fetuum emissio, seu immatura, & violenta fetus excretio. Fetus (inquit Aris.) duobus modis corrūpitur, effluxione nimirū, & abortu. Effluxiones quidē iudicāte, q̄ intra septimū diem corruptiones incidunt: abortiones aut, q̄ intra quadragessimū: sed non hæc solum, verum oēs ēr, q̄ ante legitimū pariendi tps adueniunt abortus dici merent. Est igitur abortus vteri offensio primò, & principaliter ad vtrum pertinet quatenus illi inest concipiēdi officiū. Sic abortus symptoma est vteri consistens in noxa functionum naturalium, & maxime retentricis, q̄ debitum tps antevertit: ac nonnūq̄ expultricis, q̄ ex aliqua cā laceſsita pariendi tps accelerat. Sed reuocare hac in parte in memoriā oportet, gratia p̄sagiendi de futuro abortu, fetus quibusdā mensib. eidē esse prōptiores, q̄ alijs: nam quintus, & sexti initium minus ab ortui sunt obnoxij, postea verò 4. & sexti finis; post septimus,

Abortus finis

*Abortus
causa.*

*Abortus
causa
externa.*

mus, deinde tertius, mox secundus, & ab hoc primus, & mox nonus, & post octa
uus, vltimò verò decimus, vt latè probatum est lib. huius operis tertio. Quæ om
nia adamussim considerare oportet, vt pro cuiusque efficacia prouidentiam in
stituas. Affectum quidem vterum, nuper retulimus, primam potissimam quæ
abortus esse causam. At vero ipsum vterum lædunt, & ad id opus ineundum ex
citant tres potissimum internæ causæ: siquidem vterus vel humorum pondere,
quos supra vires obtinet, oppressus, vel morsus humore in eum effuso rupis ijs
in quibus fœtus continebatur membranæ, vel propter fœtum putrem, & sanio
sum irritatus. Cui etiam causæ accedit pueri, inutilis, & vitiosa moles, quæ ani
pius, quàm par est, distendi vterum cogit, & ob id irritatus expellit, aut vteri
coarctata nimis capacitas, vt in fœminis quæ minuto sunt cupore, vel teneris an
nis concipiunt. Item si aliquid præter naturam in vtero creuerit, quod ipsum di
stendi, quantum par sit, non permittat, velut mola, aut scirrhus tumor vtero
adnascens, quæ sanguinis nimio fluore fœtum præter id etiam perdunt. Atque
hæ sunt omnes causæ internæ, quas diligentius expendisse oportet, si prius di
xero, maiori ex parte abortus vitio causarum externarum fieri, vt febre vehe
mente, alui profluvio, sanguinis immodica vacuatione, expurganti vel quouis
alio acri, & efficaciori pharmaco, saltu, ictu, clamore, ira, tristitia, timore, victu
partiore, re ardentè appetita, & denegata, vel subito aliquo casu, aut alijs, quæ
suapte natura abortum prouocare nata sunt sicut quædam anni temporis dispo
sitiō, & innumera medicamenta, ac cætera, quæ certum quendam spirant odo
rem: quorum pertimesco mentionem facere. Sed ne quis inopinato, & inscien
ter in turpem, & rusticum errorem incidat, quæ huic vsui sufficere videntur, re
feram. Si prius dixerò abortus plerumq; ab interno vitio fieri eo tempore, quo
ante grauidationem fluere assolebant, vt accidisse vxori fratris Apemanti, fert
Hip. lib. 4. pop. tex. 50. nam eisdem diebus videtur partus posse perire. Ante ta
men, quam harum causarum naturam, & signa expendam, iuxta optimam ra
tionem me facturum arbitror, si affectus quosdam vtero, & aliquibus fœminis
connaturales, quibus ipsas (præsertim valetudinarias) abortire conspiciamus, re
censuero. Inquit itaque Hipp. lib. 3. aphor. 12. Si verò hyemis australis, & plu
uiosa fuerit, ver autem siccum, & aquilonium, mulieres, quibus partus ad ver
ineat, ex quacunque occasione abortiunt. Constatque id fieri necessario, quia
imbecillitas prægnantium illius temporis inclementiam perferre nequit, ne
que tanto labore ad illud vsque tempus perdurare, sed mox à quibusvis causis
abortit. Nam tria sunt, quæ non sinunt expectare, donec tempus mutetur: ma
gna nimirum mutatio in qualitatibus: peregrina, & aliena temporum constitu
tio: & imbecillitas, ac præparatio passurorum corporum. Ex quibus fit faciliè, vt
instillationibus concitatis, & in vterum prolabantibus, eo prædicta temporum
inclementia abortum promoueat: non quidem (vt Gal. existimat) ex repenti
no frigore, quod fœtus perferre nequit: nunquam enim vterus ex ambientis fri
gore adeo refrigeratur in communi vitæ more, vt fœtum interimat. Præterquã
quod si id esset verum, citius morerentur nuper nati infantes in frigidis regio
nibus, ac temporibus, ob subitam illam mutationem, quàm qui in vtero sunt.
Quo fit, vt verior mihi videatur prima ratio. Refert quoque Hippocr. tan
quam abortus causam, grauidam esse gracilem, & extenuatam nimis: inquit
enim

A enim lib. 5 aphor. 41. Quicunque præter naturam tenues vtero gerunt, secundum mensem abortiunt prius, quam crassescant. Quam sanè causam præstat uel alimenti penuria, vel humorum prauitas, aut vteri imbecillitas, quæ nec trahere potest, nec vnde trahat, habet. Quibus proculdubio fit, quod fœtus duorum mensium spatio uiuat quidem, ut qui paucis fœtibus eget, deficiente tamen ad augmentum alimento, ocysimè corrumpatur. Inquit. n. Hip. de nat. mul. ut has causas insinuet. Quum in ventre habens fœtum mestruium, aut bimestrem corruerit, & ad perfectionem gestare non potuerit, & tenuis præter naturam fiat: huius vteros purgare oportet, ac corpus pingue facere: non enim prius fœtum perferre poterit, quam vteri ipsius crassi fiant, & robusti euadant. Sunt item inter mulieres quæ os vteri minus claudunt, & constringunt, & ob nimiam humiditatem fœtus prolabantur. Cõstat præterea mulieres abortire ex alijs quamplurimis causis, qualis est immodicus aeris estus, ciborum parsimonia, flatus in utero coactus, uel in ipso vulcus, aut tumor præter naturam. Tandem ualitudinaria fœminæ plerumque, si debiles sint, abortiunt: si vero robustæ, salubrius degunt. Itè ex ijs, quæ præhumidos habent uteros, & ipse pingues sunt, molli carne operæse, plures abortiunt, & aliæ septimestres pariunt, quas suapte naturæ abortiuas esse arbitror, quo malo eo usque præmuntur, donec ætatis mutatione in meliorem habitum fiat commutatus. Præterea fœtus imbecillioris causa abortus fieri, haud raro cõspicimus: nam dum genitura, vel pauci est calor, vel pusilla in ea adest virtus, ligamēta, & inuolucra tenuia, & leuia adeo generantur, ut crescente partum fœtu, ipsum sustinere nequeant, vel ipse, ualitudinarius est, abortus quoque moueat. Id quod docuerat Hipp. lib. de octimes. par. dicens. Quare multi pueri principium morbi intus nati prodire, & consequenter alij petierunt, alij morbose uixerunt. Verum si ob maiorem corpulentiam fœtus pereat, ab prædicto abortu distingues, quia illi primis mensibus prædeunt: ij uero, qui grandiores sunt, non nisi prope septimum, aut prope nonum, idque vel alimenti defectu, vel uinculis præ grauitate disruptis. Nocet et uinculis, & inuolucris fœtum coitus immodicus, quod eadem uincula præ nimio madore laxentur: quo fit, ut non raro hac cã abortiant mulieres, præsertim quæ delicatiores sunt. Idem quoque malum proficiscitur, cum ex aliquo uteri, uel totius corporis uitio, uel suppressione hæmorrhoidarum, aliquid virulentum, saniosum uel putridum per os vteri instillat, siue ex mola prodeat, siue ex imbecillo fœtu, siue ex prædictis causis, quibus necessum est fœtum irritari, ac uincula laxari, & subinde abortum sequi. Sequitur insuper abortus, quibus fœtus ita debiliter alligatur, & affigitur vtero, ut facile possit a quouis causa moueri: quo motu prædit multa humiditas, qua uincula laxantur, & os vteri nimis aperitur: quo fit, ut fœtus facillimè procidat, cum neque uinculorum robore, neque vteri compressione id interdici possit. Futurum abortum, si possibile fuerit, multò ante cognoscere opus est, ut vel prouideas, quominus fiat, vel saltem matri opportunè opem ferre possis. Sic profectò si utero gerentibus lac multum è mammis fluat, fœtum imbecillū significat, & abortus periculum: fastidit. n. fœtus alimoniam oblatam. Quod si papule prauo aliquo colore fœdentur, vterum imbecillum, & laborantē significatur, ut ex Hip. constat li. 6. pop. p. 5. tex. 17. dicente, Si mammae propule, & rubrum chlorum sit, ægrotat vas, hoc est. uterus: ob cõsensum, siue ex uenis musculorum ab dominis quæ ali-

*fœtus imbecillus
causa
abortus*

*coitus nimis
abortus causa*

*Signa
causarum
abortus*

Gg

qui

qui arbitratur has partes obtinere, siue eo modo quem nos antea ex aliorum A
sententia exposuimus, id quod etiam docuit li. 2. pop. p. 6. tex. 23. dicens; si mul-
tum fluat lac, necesse est, ut langueat quod in ventre est. Maxima etiam, si graui-
lescant, idem periculum praesagiant ob alimenti fetus defectum: sanguine igitur
deficiente, aut alioqui modico gracilescent vbera, ac nonnunquam perimuntur
fetus, quandoque vero ad excretionem excitatur. Siquidem infans corporis
constitutionem: mediocrem consecutus plus alimenti requirens, quam exhan-
stae matris tenellum corpus suppeditare possit, calcitrat, ut Hipp. recenset lib. de
nat. foet. ac membranas dirumpit, initiumque parturitionis affert. Hinc quoque, si
ut mulieri utero gerenti si altera mamma gracilis fiat, geminos habenti, alteram
abortiat: si dextra, mariem: si vero sinistra, foeminam. Procedit autem futurum
aborsum aquosior primum euacuatio, deinde saniosa, & cruenta velut carni-
lota, vero plane ex solutio venerit, purus sanguis, deinde grumi si ac demum
fetus ipse formatus, aut in formis egreditur. Plurisque etiam amborum, & coxa-
rum grauitas adest, & superioris ventris capitisque dolorem, stomachi
morsus, extremarum partium frigiditatis, animi deliquium, horror febrilis: B
quibusdam etiam conuulsiones retrorsum idque ijs potissimum, quae medica-
mentorum violentia aborsum procurarunt. Sed nosse Hippo. lib. de nat. mul.
aborsum ex uteri hydropè his verbis docere. Si vero non circa initia, sed diu
iam mouetur, fetus ipsi corrumpatur, ac suffocet, tunc, & veterimus intumescit,
ad contactum dolet, velut vlceris praesenti, & febris ipsam, ac dentium stremitus
corripit, & dolorem habet acutum, & vehementem circa partem, & inum
ventrem, & lumbos, & latera in molliudinem, ac exendices. Quae porro signa
eodem prorsus modo comperies cum ex febre, vel morbo aliquo acuto mater
vel foetus corripitur, praesertim si vi morbi foetus intereat, ut et de foetu mortuo
de cebo. Verum si ex casu vel plaga, aut alia simili causa doluerit venter, ut
ut aborsum minetur, id intra tres dies sese ostendet, ut Hipp. visum est lib. 7. pop.
tex. 7. & ceteris. Quibus praegnantibus ex casu, aut conuulsione, aut plaga dolo-
res moderare sunt, in tribus diebus manifeste constat, an foetus corruerit;
quod de moderatis doloribus subaudire oportet. Nam immoderati dolores
certum est, aborsum citius moliri, aut intra hos dies, quippe vulnera, ut Hipp.
visum est lib. de fracturis, tertio aut quarto die recrudescunt: quum igitur his
diebus cessauerit dolor, signum est, nil esse disruptum, aut vulneratum: & foetus
superstitem fore. C
In omni igitur aborsus causa praecauenda, hoc tibi primum expendendum
arbitror nimium, praecauendi rationem, variam fore ob variam foetus aetatem,
quippe, grandiores foetus aliter praecavebis, his nimium quae minus turbent
magisque roborant, ac parum euacuent, reliquas vero, roborantibus quidem,
sed euacuantibus, etiam audacius, si copiam sanguinis causam praestare com-
periamus. Fuit igitur prima aborsus causa, humorum nimia moles, quibus fetus velut
suffocari videtur, & uterus pondere nimio premi. Contingit itaque, iuuenulis, & bo-
ni, ac densi habitus foetibus tanto sanguine abundare, ut suppressa semel men-
strua purgationis, neque menstruis, neque himestris, aut trimestris fetus eam co-
piam conterere possit, subindeque corruptis vitculis ob plenitudinem aborsus
ocysime

oculissime fiat. Quod sanè malum præcipue ijs feminis accidere conspiciamus, quibus aliqua sanguinis euacuatio vel per nares, vel per hæmorrhoides gravidationis tempore supprimitur: præsertim si accesserit cibus, à quo largior, & mucosus succus prodeat acetabula vulvæ opplens, & ligamenta laxans. Præterea ex hac causa abortus fieri cognoscet, quia citrà manifestam occasionem evenit: venæ etiam totius corporis plurimum in ea turgent, & veluti varices in cruribus aliquando sunt: respiratio difficilis primis mensibus accidit, capitis dolor, & oculorum, & per gravitatem dorsum & inguina dolent: mammae plurimum turgent: profiliit sanguis in naribus, vel per os, tussis aut vomitu rejicitur: ac nonnunquam per colla videntur venas ordinatè vel citrà ordinem profluit.

Quibus proculdubio in debetis sanguine nullò bis, aut ter ante conceptum vel statim, nimirum secundo, tercio, quartove ad summum mense: nam grandiores fructus cœvere, oportet, ut Hip. consulit quippe, præceptum aliud quo refert à 4. ad 7. subaudiendum censo de purgatione, idq; si morbi alicuius necessitas urgeat cæterum parcius, & per intervalla. Fiet etiam id victu partiori, & modico exercitio, dixerim, diutius facto, sed lente, & sensim. Hac quippe causa præsentè, nulla alià commodior existit præcauendi abortum ratio, & via, quam vena scissa, ex brachio, ut dictum est: ac si mulier multum sanguinis rejicere per menstrua consueverit plus, & audacius ob id sanguinem deirahere oportebit, dummodo neque subito, neque semel extrahas: sed interpositis decem, aut viginti diebus, aut mense vno vel duobus: idque potissimum ad quartum mensem, usque gravidationis tempus, nisi post id tempus abortire assueverit, nam tunc non erit ab re hac necessitate viginti quinto, & sexto sanguinem mittere, sed prudenter, & cum prælagio. Tandem partum ante id tempus facies in quo femina abortire assuescit. Quo sanè præsidio, feminas, quæ frequenter abortiunt, plures ad statutum patiendi tempus incolumes deduximus. Nos tamen experimento comperimus, non solum ad retentionem fœtus, sed etiam in ijs, quæ difficilè pariunt, sanguinem mittere, summè utilissimum fuisse. Nam cum fœtus abundat multo alimento, cum eo non indigeat vel suffocatur, vel non conficit, & corrumpitur, vel in magnam molem crescit si ipsum commutare prosit, maxime si femina vterum, habeat ampliore, ex quo postea ob magnitudinè exire non possit: quo casu, plurimis mensibus feminam quiescere, iubere est opus, ne nimio pondere fœtus vincula distumpat, & abortum molietur. Neque erit ab re renum regionem oleo vel vnguento aliquo inungere, quod sanguis feruorem compescere possit.

Quod si ex laxitate ligamentorum, ob mucosores, vel quamvis aliam humiditatem redundantem femina fœtum retinere non possit: id cognoscet sumptu principio à signis, quæ Hip. refert lib. 2. de mor. mul. per hæc verba; Si acetabula piquita plena fuerint, menses sunt pauciores, & si in ventre habuerit, corrumpit, ubi fœtus validior factus fuerit: non enim corroboratur, sed defluit. Cognovitis autem hinc: humida sit, & quod defluit, mucosum, & tenax velut a ventris defertur, & non mordet, & in mensibus postquam sanguine purgari desiderit per duos, aut tres dies, mucci ex uteris prodeunt, & horron tenet, & calor non acutus, verum non deficit.

*preservatio
abortus a mul-
titudine.*

urgere.

Quæ verba lib. de natu. mul. ad verbum scribit addens, hanc affectionem secun-
do vel tertio mense certius euenire. Quas autem partes per acetabula seu cory-
lides liceat intelligere, non satis constat apud autores: ego tamen omnia vte-
ri vasa, & cavitates intellexisse Hippicenso: Quibus medebitis facta ante con-
ceptum frequenter purgationa pilulis de hiera Gal. mastichinis cum aromatis
addito zingibere, & sale gemmeo, item pilulis ex rhabarbaro cum agarico, &
mastiche, aut pilulis ex agarico. Pessarijs etiam vtendum est, maxime pituitam
trahentibus, & post menstruam purgationem. Suffumigia quoq; & emplastra
adhibebis, qualia ad vterum humidum superius scripta sunt. Sed inter omnia
auxilia vtiliores mihi vitæ sunt semper sudationes ex decoctione radicis chi-
næ, quas magni momenti in hac re scio, vel sulphurea balnea.

Verum si mulier vterum habeat paruum, ac densum, & constrictum, ita vt
non facile dilatari possit ad fetus incrementum, & ob id ipsum expellat: cogno-
fces quidem ex priuatione signorum aliarum causatum. Cui vtilissimum erit
ante conceptum balnea laxantia adhibere, foris & linimenta, quæ vtero sicco
prodesse quoque diximus. Ceterum gravidam factam huiusmodi muliere, cau-
te ijs erit vtendum, ne abortus facilius subsequatur: verum octavo die a defectu
menstruorum fortibus vtendum est, oleis & vnguentis, quæ emolliendi effi-
cacia habent, qualia abunde dicta sunt de vtero sicco. Quæ sanè proficua
erunt, si addideris ex roborantibus aliquid.

*ab abortu prece-
natio ab acri-
bus humoribus*

At si abortus fiat ab ijs, quæ vel in vtero continentur, vel alicunde in ipsum
defluunt vitiosa, acris, & mordaces, sine medicamento purgatis sit, sine humor
acris, & erodens, aut vitiosum aliquod alimentum: aliter prouidendum est, &
maxima cum diligentia. Nam de his causis loquens Hip. lib. de mor. mul. hæc
necesse verba. Eadem verò sunt affectiones ex puerperis purgamentis, & ei, quæ
corruptum fœtum, & ei, quæ peperit: si menstruum corruptum fuerit, & quæ
corruptum, magis periclitantur. Corruptiones n. grauioribus sunt, quam par-
tus: non n. fieri potest, vt circa violentiam fœtus corruptatur, aut pharmaco, aut
potu, aut subditis medicamentis, aut aliqua alia re: violentia verò malum. In
huiusmodi enim periculum est, ne vteri exulcerentur, aut inflammantur: hoc
autem periculum est. Quod sanè non minus suboritur ex quavis alia re, quæ
grauare, aut irritare uterum possit ita, vt ipsum excitet, & ante tempus lacessat,
vt de mola, & duris tumoribus dictum est. Medicamentum sanè cognosces ex
relatione, cuius damnum ab assumpto inceptum præcauebis ijs, quæ cuiusq;
vim, & acrimoniam retundat, velut est amyllum, aqua calida potui sumpta, syru-
pus violarum, de portulaca, aqua hordei, vel sacchari, & census pleraq;.
Humores porro acres, & mordaces, quos ex doloribus lumborum, inguinum,
& pudendi cum erosionis vel exulcerationis sensu discies ex reliquis signis, quæ
prædominium humoris monstrare habent. Hos quidem ante conceptum pur-
gabis, & cibis boni succi reficies. Reperies aut inter feminas non paucas, quæ cū
sanæ ante gravidationem degerint, ipso tamen gestationis momento, ocysimè
valetudinariæ, & morbosæ viuunt: ratio quidè est, quia cum habitum habeant
biliosum, aut vtunque morbidum statim a conceptu, ex menstrua suppresso,
& ex ea humoris portione, quæ in vterum fœtus gratia confluit, prae in vtero
se ha-

A se habent, & mille symptomatum generibus corripiuntur, a quibus, nisi per vacuationem alibi sponte, aut medicamento factam non liberabis. Quibus ante grauidationis tempus peruenies, prauum habitum, in meliorem commutando facta aliqua sanguinis detractione, & purgatione iuxta humoris redundantis ideam. Quo quidem facto, precautionis, & purgationis in his, & reliquis vsus census, modus erit per epierallim, ex habito rhabarbari diluto singulis diebus, aut tertio die: quod si humores adusti fuerint, id facies decocto foliorum senæ exhibito vel confectione simplici Ameech cum rhabarbaro. Postquam verò cōpertum fuerit mulierem factam esse grauidam, ab expurgationibus abstinendum est. Verum si prædictos succos plurimum abundare sit certum: vt fœtum perdere constet, rhabarbari modicum cum saccharo rosaceo porriges, aut mastitatum, vt sanguinem q̄b spurcitia liberes, ac partes internæ viscera roborentur: tamen quies omnino imperanda.

Atqui si tumor durus abortui causam præstiterit, antè quam grauida fiat mulier, curanda est ijsq̄z c. de vteri scirrho dicta sunt. Si autem molam id efficere visum sit: pari lege id præcauebis eo modo, quo dictum est c. de mola. Prius tñ nosse curabis, tumor ne sit, an hydrops, vel mola: nam tumores ex dolore, & tactu facile percipies: molā verò, eò quod ferè toto prægnationis tpe vel sanguis, vel virulentum aliquid per vterum instillat: impedit. n. hæc, quominus optimè os vteri claudi possit. Præterquam q̄ cum venas non habeat mola, quibus a vasis vteri capere alimentum commodè possit: facile ob id ipsum prolabi contingit, quia solum alimoniai suscepat per adhæsum, & continguitatem, q̄ cum osculis venarum obtinet, quo fit, vt frequentissimè sanguis in vterum instillet, qui vel ocysimè procidat, vel ibidem detentus vitieat, & postmodum purgamentorum forma exeat, aut fœtum perdat. Vter hydropem causam huic malo præstare cognosces ex signis, quæ Hip. scribit lib. de natu. mul. per hæc verba. Si aqua in vteris gignatur, menses pauciores fiunt, & deteriores, & per longius tempus, prægnans est semper per duos menses, aut paulò amplius. Quum autè hoc tempus aduenerit, & corrumpit, & aqua multa in ipsa gignitur. Et paulò inferius eodem loco subdit. Plerunq; verò ante hoc corrumpitur, & per abortum extruditur, & vteri sanguinem manant. Hæc autem patitur nihilo magis ex labore, quam aliter: hoc autem cognosces ex digiti cōtactu. Comperies. n. osculum ipsorum gracile, & obscuratum, ac plenum humiditate. Si verò non circa initia, sed dum iam mouetur, fœtus ipsi corrumpat, ac suffocetur: tūc & venter imus intumescit, & ad contactum dolet velut vlcere præsentī, & febris ipsam, & dentiuni fœmitus corripit. Et dolorem habet acutum, & vehementem circa pudenda, & imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, ac coxendices. Qua etiam parte curandi rationem scribit plerunq; mitigatoriam. Ceterū artificiosius lib. i. de mor. mul. Nos etiam c. de vteri hydropē, curationis methodum, & medicamenta huic affectioni apta, abundè docuimus.

Quod frequentissimè abortum promouere conspiciamus, proculdubio est, externarum causarum vis, & efficacia: quod sanè malum vt varium est, ita difficulter præcaueri potest. Ceterum Auic. latissimè causarum omnium externarū meminisse constat Fen. 21. 3. tract. 1. cap. 8. sed hæc studiosis legenda relinquo. Quippe siue casus aliquis sit, siue subita alteratio, habent hoc propriū oēs cau-

G g 3 fa ex-

*Mola quomodo
Abatur.*

*Hydrops vteri
causa abortus.*

Cap. xv. Car.

262

se externa si abortum facturæ sunt, ut prius vincula, & inuolucra fœtus abrum-
pant: quo facto instillatocyssimè sanguis, quem suppressere deinceps minimè
potes, nec licet: cuius sanè ratione abortus protinus sequitur. Dixerat quidem
Hip. lib. de natu. pue. nonnunquam accidere, ut ante præfinitum tempus ruptis
pelliculis ob aliquam violentiam, pueri nascantur: perinde, ac morbis, & aliis
vnde cumq; illatis noxis corripì solent. Sic, 1. pop. par. 2. Abortiunt mulieres (in-
quit Gal.) cum vehementius salierint, ut subito horrendum suspicatur timue-
rint: & cum ex dolore, vel ex insigni cruditate, vel ex medicato quopiam cibo,
vel puti portione, aut medicamenti, in quo insit aliquid abortiuum. Iam etiam
propter sanguinis missionem, & sanguis ex vulnere profluuium; aut ex nimia
hæmorrhoidè quædam abortiunt. Noui profectò quasdam, quæ ex vulnè cer-
uicis profuso sanguine, prægnantes iam diu partum eiecerunt. Pari quoq; ratio-
ne, 5. aphor. ex nimio alui fluxu scribitur plurimas abortum fecisse. In quibus
præcauendi ratio duplex in genere est: quas sigillatim distinguere est in animo.
Vna quidem est, quæ causis internis debetur, pugnans aduersus vnāquāq;
ut superius diximus: quibus adicere oportet quæ cor, & viscera roborare, ac fir-
mare habent, velut sunt pulueres cordiales, & ea, quæ spiritus reficere possunt.
Aliæ a verò, quæ causis externis sita, ut plurimum in optima moderatione, & tu-
tela, præcauens diligenter vtero gerentem ab iis, quæ subito, & inopinato oc-
currere possunt, velut sunt omnia, quæ vrinam, & menses mouent, & alia, quæ
c. de fœtu mortuo recensabo.

*Apertio prægn-
tis*

*exemplū .
q. r. ion-
sua ex
panno
coccine .
3. iiij. zī
giberis .
galaga .
cinna mo
m, cube
barū an .
3. ij. san
guinis
draco-
nis 3. i .
mosci g .
4. masti-
chis 3. s .
mellis
q. s. fiat
emplas-
trum .*

Verum si ex causa aliqua prægressa aliquod malum fœti vel matris illatum
cognouerimus: eruperint sanguis, vel quoduis aliud malum conspicuum sub
sequutum sit, prouidendum est. Nam si sanguis profluxerit, nullo alio auxilio,
quam quiete, & optima victus ratione, eamque quodam modo comprimente,
& roborante vtendum est, ne si sanguinem profusum compresseris, corruptio-
nem subeat ipse vel fœtum suffocet, aut si liberè fluere permiseris, maior fiat
profusio eius, quàm par sit. Ceterum si fœtum diuulsū non esse, neque liga-
menta disrupta cognoueris, eò quòd sanguis nullus, aut quàm parcissimus in-
stillauerit, sed solum imbecillum, & deiectum aut aliter præter propriam na-
turam commotum, quòd mater sit perterrita, defessa, dolens, percussa, vulnera-
ta, aut alio quouis damno affecta: prouidendum est fœtui per corroborantia au-
xilia vmbilico, & dorso affixa (qualia diximus lib. præcedenti cap. de vteri ge-
statione) alimentis, quiete, animi tranquillitate, & omnibus, quæ vires roborare,
ac spiritus reficere habeant: velut est confectio alchermes, electuarium de
hiacinto, de gemmis, diamargariton, cardiaca herba saccharo condita, terra si-
gillata, bolus armenus, amyllum & reliqua huius nature. Sed plerisque proba-
tum reperio puluerem qui recipit granæ insectorum ʒ. j. pulueris . g. x. in ouo
sorbili cui, & coralli, & margaritarum nonnihil commisceri potest. Sed ali-
menta pauca pauci, nutrimenti & assa, præsertim columbarum carnes assæ
præbeantur. Venterculum etiam roborare oportet, ac flatu ab eo, & vtero di-
scutere, qui non raro abortus solent præstare causam, idq; facies oleo de spica,
cironiorum de mastiche, cum puluerib. diarrhodonis, aromatici rosati, coralli
rubei, rosarum, & calami aromatici cū g. iij. musci. Vteri verò flatu antea discu-
tere docuimus lib. nimirum huius operis secundo. Appones aut vmbilico mē-
cam

Aeam panis leuiter torrefacti vino irroratam, superparis pulueribus rosarum, granorum tinctorum, coralli, cinnamomi, & aliorum, quæ superius rerulimus. Prestat pomum odoriferum aſſum eodem vino, & pulueribus inſperſum, ſicut & carnis ſemiſſæ fruſtrum cum prædictis puluiſculis. Sic proſunt inunctio- nes, cerata, emplaſtra, velut eſt illud, quod ſcribitur a Montagnana de corticib. caſtanæ. Vel aliud à Varignana probatum, Comitiffæ appellatum: item alia, quæ conſciuntur ex prædictis, & oleis odoriferis cum vino, & aqua cinnamomi, & aliis, quæ ſectui calorem, robur, & ſpiritum quodammodo addere videantur, qualis eſt inſtillatio arte chimica in vitreo alembico facta ex pane recentè co- cto imbuto melle, vino, aqua roſacea, confectione alchermes, electario de gem- mis ſine ſpeciebus, & pulueribus rosarum ſiccarum madefactis aqua chalybea- ta. Sed non eſt mihi in animo hac in parte huiusmodi topica auxilia ſpeciati- m recenſere, quia prædictis cap. ea abundè docuimus. Sat enim eſt ea, ſicut prædi- ctos affectus, exempli cauſa adduxiſſe, vt ad penſum eorum, ſic in ſimilib. pro- uidentia vtaris ſimili.

B

De partu naturali, ac de difficili, & laborioſo.

Cap.

3.

PER difficile quidē eſt ea, quæ a natura aliena exiſtunt, noſſe, & rimari, quin prius ea, quæ ſecundum naturam ſunt, cognoſceri- mus: rectum enim (vt ferunt omnes) iudex eſt ſui, & obliqui. Ob id licet cap. 1. de partu naturali, quæ portiora ſunt, ſcripſe- rim: placuit tamen in hunc locum quædam adſeruare, quæ ijs, quæ dixero, maiorem lucem aſſerre poſſint: & ſic prima huius cap. parte in ani- mo eſt ea diſſerere.

Sicut in fructibus ac reliquis, quæ ope naturæ in perfectionem veniunt, ſe gerere ipſam conſpicimus, quæ primo ad integritatem & maturitatem perdu- cit, quam in lucem producatita prorsus in hominis, & aliorum animalium pro- ductione peragit. Quippe puero efformato, ad perfectionemque diducto, & vbe- rius alimentum expoſcente, ipſum ad calciſtrandum, & membranas dirumpen- das ſtimulat, donec ab inuolucro liber exitum quærere nitatur. Dictum quidē antea eſt ex Hippocr. mente lib. de natu. pue. membranas dirumpi; prima qui- dem ac extrema, quod fasciæ modo puerum inuoluat: non equidem vndequa- que, ſed per mediam regionem ab ilium elatiſſima ſede ad enſiformis oſſis mu- tronatam cartilaginem, ſpleni ipſi ſimillimam, quantum attinet ad nigredi- nem, friabilem ſubſtantiam fungoſamque, & quatenus frequentiſſima vaſorū ſerie implicatur.

Hæc verò ſolas venas & arterias recipit innumeras ab hyſtero deriuatas, co- riſo, vel ſecūdina appellata. Secunda verò mēbrana ſectū circunquaq; tegēs, nul- liſi vtero adhæreſcit, præterq̃ ea parte, qua iam prædictæ conſui circūſpicitur per venulas illas a primo in vmbilicum penetrantes. Tertia, tenuiſſima pelle conſtans, ſectum inuoluit. Exemplo itaque ſpicarum comprobauit Hipp. hanc

Gg 4 vio-

violentam velamentorum diruptionē. Nam sicut ille similiter, & mala granata, amygdalaq; dehiscunt sapius ligneo illo cortice rubro ob molis intus incrementis violentum impetum: sic quoq; quæ cooperire fœtum dicta sunt inuolucra. Ex quibus euidenter constabit, quos cruciatus, quosve dolores mulieres perferant parturitionis tempore: atq; non solū in separatione fœtus ab utero, & diruptione velamentorū, verū in exito fœtus per tam angustas vias, & meatus, quantum Hip. & Gal. ac reliqui auctores depixerunt. Aperitur itaq; in hoc opere os uteri tantum, quantum sufficiat embrii facile præbere exitum: qualiter autem hoc fiat nescimus, neq; aliud, vt refert Gal. quā admirari possumus. Sed natura hæc alia oīa circa parturitionem animalis machinatur eximia sophismata, & commenta. Item qualiter fœtus in decenti figura ipsi collo uteri propinquet, & equaliter exeat non vulnerata aliqua particula, non paruam monstrat protuberantiam. Inquit etenim Auic. lib. 3. Fen. 2. tract. 1. c. 2. Et quando separatur, aperitur maris apertura tali, cuius similem efficere non valet in suo simili, & necessarium est, vt separentur quadam iuncturæ, & sustententur adiutorio Dei excelsi, post illum, & propter illum redeunt in proximo ad continuationē naturalem, & est operatio illa de operationibus fortibus naturalibus. Quibus Auic. verbis modum parturitionis, & doloris acerbitem euidenter monstrat. Atque licet Gal. asserat, non vulnerata aliqua particula fœtum educi. Auic. contrarium videatur asserere: arbitrantur cum hoc anho iuncturas laxari, nec tamen ex articulari solui quidem iure dici possunt, q̄ summa illa distensio, species quædam solutæ continuitatis esse videatur, & ob id dolores acervi, & cruciatus prope os pubis, & sacrum proculdubio percipiuntur. Sed huic & operi non exiguam opē præstare ab dominis mulculos, retulerat Gal. lib. 3. de facult. nat. c. 13. Ob idq; censeo ipsum dixisse, aphro. 3. ad bonum partum duorum corporum vigore esse opus grauidæ mulieris nimirum, & infantis. Erit igitur, his præmissis, partus naturalis quando ex naturæ modo huiusmodi actio perficitur: id autem fieri contingit, cum eorundem fœtum consumatorem, ac perfectorem naturalem emulsionem molitur: natura idq; debitis, ac statutis modis. Quibus euidenter constat differentia inter naturalem, ac legittimum partum, & abortum: ille quidem est naturæ actus: hic verò violenter fit, & præter naturæ institutum. Cui operi necessaria hæc sunt, fœtus perfectio, tempus statutum, matris & ipsius fœtus conatus & enixus, & vltimò certa debitaq; in exeundo positura. Quam sanè antequam exponam partus instantis signa breuiter referam, ne in cauta & improvida obstetrix, ante tempus opportunum partui mulierem exponat: antea etenim quam occasio instet, irritus labor est, qui à nixuriente suscipitur, & ipsa parturiens vano labore contabescit, vt cum postea laborandum sit, labori non sufficiat, vel rursus, occasio prætereat, ac fœtum subinde inopinato prolapsum perdat, aut matri, vt par est, non prouideat.

Signa
partus

Si igitur ingestabile fiat fœtus onus, ac sub vmbilico grauitas appareat, & in lūbis, inguinibusq; cōtinuus cruciatus sentiatur, si ventris caliditas, si genitalis natura tumeat, si locelli humectentur, si vrinæ sit incōtinentia, si vterus solui atq; laxari sentiatur, parturiginis indubitata signa existunt. Grauidas aut si tormina vexant, ocysimè parere certum est: id facilliter, cum lumbi dolent. At cum instat iam parturitionis tempus, superiores partes graciliores fiunt, & extenduntur loca

Aca super pectinem & inguina, immissoq; digito ad magnitudinem oui quid in orificio inuenitur. Humor verò, qui effertur, primò lentus, & postmodum plurimus, ac demum sanguis, ilq; aquosus, si femina nascitura est, aut ruber & purus si masculus. Quæ etenim signa puerum se iam ad uterum vertisse comonstrant: apparet et eo tempore in prægnantibus plerisq; stomachus uteri, & propior efficitur, ut ex Gal. euidenter constat lib. de fetus formatione. Incipiunt tunc dolores vexare confertim femora, lumbos, ventremq; ipsum: cum hoc tamq; neq; prius in sella patiendo idonea locanda est utero gerens, q̄ uteri osculū hians digitis occurrerit, & preminuerit, ac prædictarum humiditatum effluxus compauerit, ut Arist. 7. de hist. ani. c. 9. & Aetius de partu difficili consulunt. Sed si Gal. credas. 14. de usu par. & 3. de facul. nat. os uteri perpetuo directum, instante partu apparet, sicut & in conceptu: quare quo tempore sedere festinat grauida, rectum apparere os uteri oportet: appropinquantis etenim partus euident. existit signum. Cognito his partus instanti, eum esse naturalem, ac soli naturæ, & ipsi parturientis diligentia, ac viribus committendum est, quem naturalem esse, inter dictas hæc una ratio monstrat: si in caput infantem nasci. Cuius rei optimā causam vñ Hip. dixisse, partium quidem quæ sunt supra umbilicum, grauitatem: q̄ tamen non oportet tantam esse putare, ut satis ea per se sit, ad inuertendū fetum: nam toto, quo utero geritur tempore, fetum in caput propendere oportet, nisi insuper infantis matrisq; motus accessisset. Sic enim natura prouidit, Deo Opt. Max. adiuuante, ut capite primū infans prodiret, quo magnis molestis, periculisq; puerperas subleuaret, quæ vitari proculdubio non possent, & vñ ali-quo infans aliter, puta in ventrem, in latus, inq; pedes exitum affectaret. Quia fieri profectò non potest, ut infans pedes, manusq; ita coniungat, & reliquo corpori applicet, ut nusquam vel in hanc, vel in illam partem diducatur: eā ob causam qui sic prædeunt, difficillimum efficiunt partum, & matri ingentes cruciatibus excitant, ac se ipsos in maxima pericula conficiunt, licet non omnino, pedibus antea emissis, difficilem moueant partum. Quamobrè sic natos Latini Agrippas appellauit, licet alii a difficili partu nomen inditum esse fateantur. His verò omnibus periculis vacat, qui naturali modo nascitur, in quo caput primo se exerens, minore cum dolore os matricis, totumq; ipsis collum aperit, ac dilatat

C& iam reliquo corpori parat faciliorem. Laboriosum quidem & difficilem partum eum esse existimo, qui cum fetus, vel matris periculo, & grauissimis accidentibus sit. Estq; symptoma sub genere conterorum immodicè comprehensum: siquidē fetus non sunt utero gerentium partes, sed proportionē respondet ijs, quæ adnascuntur, familiarium inquam. Quemadmodum oua & fructus à natura ad generis propagationem creati, ut ex Gal. testimonio elicitur. 11. simpl. sic & partus: ob id dum prætet modum, & naturæ institutum detinentur, symptoma hoc efficitur: nō solum ea ratione, sed quia cum grauissimis accidentibus excernitur, longè grauiora, & diuersa ab ijs, quæ suo pre motu natura mouere solet. Vnum tamen habet peculiare signū difficilis partus, quod diebus aliquot ante partum copiosè profluat ab utero aqua nam partus tempore, cum nihil profluat, eo quod iam profluxerit, ob siccitatem prolabi nequit fetus: itaque nihil instillare tempore partus, ipsum difficilem reddit.

De partu difficili.

Fit

Fit proculdubio difficilis partus vna potissimum quatuor causarum, vel duab. A
aut omnibus simul: nam vel accidit ab extrinseca aliqua occasione vel ex femi-
nae vitio, & impotentia, vel ex ligamentorum, aut tunicarum, quibus fetus inuol-
nitur ratione, aut ultimo ex parte nascentis fetus. Partum igitur efficit laborio-
sum (vt à prima causa initium summam) aeris praesens constitutio: si quidè aequi-
lonia difficilem parit, austrina facilem: sicca fetum, & mulieris corpus exsiccan-
do, difficilem; sicut & nimis calida, vires exsoluendo; ac frigida, partes contrahē-
do humida verò ad partum faciliorem omnium aptissima est, & quae modicè
calida existit, ob id profecto videndum est. ne in cubili existat aer frigidus, aut
plus aequo calidus. Dixerat. n. Hip. li. de loc. aqua & aere, eas feminas difficulter
parere, quae regiones habitant frigidas, ob id quod virtus expultrix his in locis
labefactatur à crudis aquis, & aere frigido: pueri etiam debiles sunt, & os vteri,
ac pudendum muliebri adstrictum: quae omnia impedimento sunt partus faci-
litati. Difficile quoque partum efficit ita, vbi in parturiente plurimum creuerit,
ita Zelotypia, aut si femina primariola fuerit, timor, & verecundia, aut quæuis
aliam animi passio, si adeo creuerit, vt potentias distrahere ab incepto possit. Sic B
vehemens dolor partus difficiles reddet, & gratio odores qui sursum vteru evo-
cant. Simili quoque ratione, & experimento didicimus, multum conferre quo situ
loceatur paritur: nam si sedeat, impeditur dilatio: cauda si recta stet, in longum
extenditur vterus, & vtraque positura difficulter, ac laboriose pariet: monstrabo
aut paulò inferius qualis positura partui sit commodior. Ex parte verò ipsius par-
turientis plures comperimus succrescere posse difficiles partus causas. Quippe,
aut imbecillis admodum est mulier ita, vt enixu se ipsam iuuare non possit ex
morbo contracta impotentia, vel ex natua sorte, iuuenili atate, vel ex labore
aliquo precedente, aut difficulter spirat, & anhelosa est ita, vt non valeat spiritum
cohibere, opus aliòqui summopere ad partum necessarium: quoniam homini expulsio
fit retentio spiritus; quod anhelosa citra suffocationem efficere nequeunt, vel si ni-
mis dormiat, affectu aliquo caput grauante, vel ob vigilandi impotentiam. Itè ob
dolorum priuationem, vel inassuetudinem, aut insensibilitatem, quae sanè omnia graue pe-
riculum minantur. Accedit et his tanquam causa, si ipsa puerpera crassa, obesaque sit,
& vteri exiguis doloribus impedita, aut umiscula, vel nimis extenuata, in quibus C
musculosa, & ligamentosa partes, durae extensaque existunt, nihilque partui ce-
dunt. Præterea id malum quoque affert mulieris vteri, aut mala vicinarum partium
constitutio, vel est vteri magna distensio, & oris structura, & colli ipsius longi-
tudo: quibus fit, vt ab vtero difficulter egrediatur fetus: nam in collo plurimum im-
morabitur, & per angustum oris foramen non libere exibat. Idem malum efficiet ni-
mia omenti, & vicinarum partium obesitas: nam quare conceptum impedit, quod
os vteri comprimat, eadem partium efficiet laboriosum, sic & tumentes hemorrhoi-
des. Cui et malo alui excrementa dura, & vrina diu retenta plurimum addunt:
sicut dum ante tempus partus mulier inflammationem aliquam perpessa est in locis ge-
nitalibus, aut parte aliqua eis vicina. Potest & difficultas pariendi contingere,
si ossa pubis nimium conserta fuerint, vt fertur: ego tamen existimo ossa illa pa-
rum, aut nihil dilatari (et si Anic. id asserat) sed totam illam dilatationem perti-
nere ad caudam ipsam siue ad os sacrum, aut (vt rectius loquar) ad ossis sacri cum
cauda articulationem: nam cum os sacrum in caudam desinat, ita cum eo articulan-
tur

Ex parte
matris

Atur sua ipsius ossa inter se, vt reflecti possit cauda in partem exteriorem, quo si
 vt foramen reddatur latius multo. Facta est aut cauda potissimum ad sustentan-
 dum rectum intestinum, & musculos ani firmandos, quibus vtimur ad alui du-
 ra excrementa vi expellenda. Hæc itaque cauda in partu, ita erigitur in extero-
 ra, vt facile id opus conspicuū videri possit, & vulua hac rōne potius in partem
 posteriorem extenditur, & amplior efficitur, eo quod cauda cedat, q̄ in partē an-
 teriorem, in qua os pubis minimè cedere pōt, licet aliquibus, tanq̄ verū, & vul-
 gatū habeatur. Difficilis quoq; sit partus, si secunda vel pp cōfessionem non ab-
 rumpatur, aut pp tenuitatem, ante q̄ oporteat, diuellatur simul cum aliis mem-
 branis fœtum ambiētibz: quippe hac occasione humore euacuato partus ob
 siccitatem difficilior redditur, q̄ per collum vteri fœtus difficulter elabatur. Re-
 fert quidem Gal. lib. 1. §. de vsu par. c. 5. huiusmodi humorem summo opere pro-
 desse viis omnibz lubricandis, ac facilioribus ad dilatationem efficiendis, a p-
 dicto nanq; humore collum humectatum mollius redditur, dilataturq̄ facili-
 us. Ob id quæ multis ante diebus muccorem, vel aquam sensim expurgāt, dif-
 ficulter pariunt: dilabitur. n. ocys per madidas, & lubricas partes fœtus, q̄ per
 fœccas. Contingit et partum fieri laboriosum, cum amnion membrana ante frā-
 gitur, q̄ puer in vtero voluatur, ita vt in maximo versetur periculo ob lotij mo-
 lestiam, qua totus afficitur, & ne aliquid eius per eos ingrediat, nam a suffoca-
 tione illum tuetur respiratio per arteriam, quæ in vmbilico est. Et ob id labo-
 res in partu, & innumera alia incommoda, quæ lib. de octimest. par. annume-
 rat Hip. debilitant fœtum adeo, vt nonnunq̄ ante exitum, multi in exitu, multo
 plures pauld post, & maxime intra diem, alii intra septem dies, tandē intra qua
 dragessimū intereant. Cui et causarum generi reducere oportet vteri imbecil-
 lam facultatem excreticem, aut vehementem retentricem, nam vt superius di-
 ctum est, mater abdominis musculis, puer propriis viribus, & vterus otante re-
 tentrice, & expultrice irritata, ac operante, partum facile parant. Idem quoque
 accidere cōspicimus, & longè difficilior, si vel mortuus, vel sideratus puer fue-
 rit, vt refert Hip. lib. de mor. mul. Fœtus si maior sit, quam pro fœminæ constitu-
 tione, & parium figura opus est, difficillimū & periculosum sibi, & matri pa-
 rat partum. Pari prorsus ratione, si monstruosus sit, vel magni capitis, vel nimis
 paruus, aut parui ponderis, tum quia seipsum non præstat adminiculantē, tum
 vero, quia ipsi non aptè adequatur vterus. Itē si vel numerosus sit fœtus, vel infor-
 mē aliq̄ carnē secum afferat. Præterea, si imbecillus existat, ita vt neque vincula
 dirumpere possit, neq; ad exitum vehementer inniti, difficilē quoq; inferi partu-
 tum. Sed longè difficiliorē, cum deprauata aliqua figura exire nititur. Nascūtur
 quippe pueri, aut in caput, aut in pedes, aut penitus obliqui, & cōorti, vel mil-
 le aliis deprauatis figuris affecti. Sic enim lib. de nat. pñe. Hip. scriptum reliquit.
 Porro diruptis pelliculis si pueri momentum in caput inclinauerit, mulier faci-
 le parit, si aut obliquus, aut in pedes processerit (contingit enim hoc sepe, si pau-
 lulū huc inclinauerit, siue præ vterorum spatiositate, siue si mater in laboris
 partus primum non quieuerit) & si sic processerit, mulier difficulter pariet. Mul-
 tæ autem ipsæ perierunt, vel puer, vel simul ambo: de quibus rursus libro de
 morb. mulie. Hippocra. scripsit in hunc modum. Si vero mulieri in uentre ha-
 bentū tempus partus iam affuerit, & dolor partus tenuerit, & ad multū tempus

Ex parte
 membræ
 MATHE.

Ex parte
 fœtus.

mul-

mulier puerum edere non potuerit, omnino obliquus, aut in pedes procedit; A
 vtile autem est in caput procedere, & si obliquus iter capefferit, difficilis est affe-
 ctio. Sicut. n. si quis in vas olearium angustioris nucleum immiserit, non procli-
 ue difficile est ipsum extrahere. Sic et mulieri grauis affectio est, vbi foetus fue-
 rit obliquus: graue item est, si in pedes inclinauerit, & saepe aut matres pereunt,
 aut pueri, aut ambo. Est autem magna causa, vt non facile exeat, si mortuus, aut
 sideratus, aut duplicatus fuerit. Paulo autem inferius eodem lib. sic scribit. Qui
 cumq; vero duplicati complicantur, & in osculo vterorum incumbunt, eos siue
 viui fuerint, siue mortui rursus retrò prostruosos vertere oportet, q; secundum
 naturam in caput exeant manibus ad vtrumq; femur extentis. Cui proxima fi-
 gura est, si in pedes procedat, cetera vero omnes (neque hæc admodum tuta
 est) præter naturam, & periculose existunt: vel dum caput in dextram vteri par-
 tem vel sinistram inclinat, aut altera, aut vtraq; manus (vt Aetius aduertit) exer-
 tur, aut erura intus inter sese diducunt. Foetus verò, q; altero pede prorupit, al-
 tero intus detento, aut duplicati alicui parti vuluæ innituntur, periculosissimū B
 efficiunt partū, sicut ij, qui manus expansas habent. Qui uerò obliqui prodeunt:
 tripliciter id faciunt; aut enim in alterutrum latus, aut in ventrem prodeunt:
 sed tutius est in latus progredi: ita. n. obstetricis, manibus locus superest, vt in ca-
 put, aut in pedes nascentem dirigat. Tripliciter aut, inquit Aetius, duplicari so-
 lent foetus: nam vel capite, & cruribus vel ventre, vel coxarum vertebis vterò
 incumbunt. Atq; hæc sunt omnes deprauatæ figuræ, quas in temporis præssura,
 q; citissime cognoscere oportet, & intare, ne vel suffocetur, vel morbosus sup-
 sit foetus, aut mater pereat. Præter quas omnes causas reperi, apud Hip. varijs epi-
 demiorum locis, eos partus esse difficiliores, quæ folias ferunt, & maxime quæ
 plures. Quod mille historijs testatum reperies, in quibus raro prospere solent
 fluere purgationes, ex quo mille accidunt mala, nam & venter in tumorem at-
 tollitur, & cruor ab ulcere erupit, & difficiles respirationes, & alia vt expresse
 retulit Hipp. lib. de affect. sed clarius lib. 2. pop. p. 2. tex. 21. adducens historiam
 eius quæ filias gemellas pepereat. Varia quidem sunt, & omnino necessaria, quæ
 partum facilitare possunt. Cui sanè operi præmittenda quædam sunt, q; oibus C
 difficulter parientibus proficua esse comperimus: deinceps pro cuiusq; cæna
 tura, & varietate auxilia quoq; adscribam. Principio etenim mulier admonen-
 da est, vt ædificio perlucido aerem calidiusculum habente habitet, lætamq; &
 placidam vitam antea degat, ac somnus vigilia longior sit. Pinguibus et carnib.
 & thollientib. iuseulis, ac oleribus vtatur: vina neq; generosa admodum, neq;
 dilutiora, alba, prædulcia potui dentur. Sese item mulier deambulatione, & le-
 ni cursu exerceat: ceterum hanc exercitationem faciet recta magis, q; flexuosa,
 & sub vmbra, non qui de intra parietes, aut in pratis, & viridarijs: finis sit cum
 modica lassitudine, q; defatigatione non attingat. Præterea enixuras eo tpe, quo
 partus instat, non esse multa alimentorum copia grauandas consulit ratio: neq;
 per id tempus varia alimenta, & crebra sunt adhibenda: distrahetur. n. calor ad
 confectionem alimenti, & minus intendet operi parturitionis. Item parturien-
 tes non protinus in sella locandæ sunt, sed obstetrices prius os vteri tangere de-
 bent, & cum paulò apertum non inueniunt, mox expectandum est, an tunc, vt
 surgat mulier iubere deant, moueaturq; parū, ac iterum in loco sibi apto sedeat.

Fa-

*De labo-
rio par-
tu facili-
tando.*

A Facilior item reddetur partus ex optimo parturientis situ: quinimo maxime id parturitioni conferre experimento comprobatum est, nam est ut iam diximus ad partum faciliorem necesse est, ut vulua dilateatur, id quod a parte anteriore, quam paucissimum fieri possit, superest ut caudæ os ad posticam partem extēdatur. Quo fit, ut si sedeat, eius dilatio omnino impediatur. Itaque si natibus innitatur, cum non possit retrocedere cauda, partus impeditur, si vero stent, non satis ad huius viribus pollent, quā in situs conuenientior sit, modo in anteriora se flectat. Quare manibus contra lectum, aut mensam, aut aliud quod vis innitatur oportet, ita ut sit sufficiens spatium pro obstetrice susceptura puerum, parturiens uero sustineatur a uiris fortioribus, sin minus decumbat, sed dorso tantum, ac cruribus innitatur in parte quidem paulo sublimiore positus, & apertis, ita ut manibus, pedibus, & dorso uehementer innitatur. Cui sane renixui quod plurimum prodest respirationis cohibitio, dummodo non retineatur in partibus superioribus, sed propulsio, & renixus fiat ad anum & uterum, velut ij faciunt, qui aluum exonerare nituntur, aut calamos inflant, & hæc est communis difficilis partus positura, alia necessariae sunt pro infantia nascentis situ.

B Alia est eois facilitandi partum ratio, quæ medicamentis, & perita, ac diligenter obstetrice perficitur, in cuius officio haudquaquam permittendum est, ut uolenter parturientium uterum dilanient, sed leniter placideque ipsius partes tractare consulito, quo facilius grandiori fœtui cedere possit, ac magis citra dolo-rem, dilatari, inuncta parte oleo dulci, sesamino, amygdalarum dulcium, vel liliorum, ac pinguedine anatis, & gallinæ cum mucilagine seminis lini, ex quibus hoc modum linimentum conficies, adipis anatis, olei liliorum alborum, & sesamini, an. ʒ. j. mucilaginis seminis citoniorum, seminis lini, summitatum althææ, & seminis fœnugræci ʒ. j. & fiat linimentum. His quidem præuida obstetrix, uteri ostium, quod iam dehisceat pertingat, sensumque premendo minimum digitum immittat, subinde iam paulatim tamen magis os dilatet, quod fatiscere perpendens, linimento de mucilagibus dicto uteri ceruicem, ut lubrica reddatur, quo facilius partus exiliat, uberrime illinia, necnon & os ipsum sacrum, & totam caudæ regionem, quo facilius exeunti puero cedere possit. Quibus factis iterum gravidam in sede commodius locare oportet, atque ut prompte infantem pelleret, eidem blandis uerbis persuadere, ut Galienus lib. 3. de facul. natu. c. 3. Ipsa autem obstetrix sedeat in humiliori loco, ut ite facillime manus immittere possit, ac ex superioribus partibus infantem adducere. Quod si hæc prodesse non videant, fortibus easdem partes lenire oportet, ut & calore modico, & lenitate maiori partes promptius aperiantur. Hoc sane præsidium conficies ex floribus chamæmali, & meliloti, ex floribus maluarum, bismaluarum, & uiolarum, ex semine cotoneorum, lini, & fœnugræci, ac radicibus liliorum alborum, quæ omnia cum ex aqua ad tertias deferbuerint, suscepto uapore, exinde abdominis imam partem, & caudam uti liter ea aqua spongia fovebis. Sed in iis, quæ difficulter parere assuescunt, tutum, & utilissimum mihi uidetur Hip. consilium, quo iubet sanguinem mittere prope partum, inquit enim lib. 1. de mor. mul. Si uero prægnans multo tempore cohibeatur, & parere non possit, sed diebus pluribus ea partus doloribus laboret sit autem iuuenis, in vigore, & multo sanguine referta, secare oportet uenas in malleolis, & sanguinem detrahare uirium respectu habito, & postea calida lau-

ri corticibus coctis lauato. Viticis aut semen, & dictarum creticum, vtrūq; pa-
 ri portione in vno albo, aut aqua bibendum dato. Quo facto, per aliquot ante
 partum dies, opus est etiam ex catinsate vti, quod recipiat bis malua cum radi-
 cibus m. iij. malua, chamomilla, meliloti, apij ana m. ij. foliorum lauri, m. f. se-
 minis lini, & citoniorum ana. lib. f. fiat decoctum, in quo femina ante prandiu
 infideat. Verum in harum infessionum vsu, cenfeo satius esse per dies aliquos
 ante partum, quam in ipso parturitionis tempore, ne deiecte calore vires minus
 partui sufficiat, ni plurimum necessitas urgeat. Partus quoq; difficultatem mul-
 cet eclegma, quod habet dactylorum 3. iij. mucilaginis psyllij, & seminis cito-
 niorum ana. 3. f. seminis pconia, cinnamomi ana 3. j. casia lignea, croci ana. 3. f.
 pulveris peucedani obolum, ossis de corde cervi g. vj. his contritis, sacchari al-
 bissimi ex aqua sabinæ dissoluti, quantum satis est ad ea mollienda atq; cogen-
 da adiciatur. Ego autem in horum trium auxiliorum adhibitione (nam balnea
 quæ plerique autores præcipiunt, non probo) semper obseruo, vt diebus singu-
 lis ad partus vsq; diem vnum adhibeatur, ne omnibus modis puerum turbe-
 mus, ac totius feminae humores exagitentur. In omni etiam partu citra causæ re-
 spectum si difficulter fiat, vtilissimum experimur dextro cruri alligare corallū, B
 lapidem aquilæ, styracem, coriandrum viride, seu polygoni radicem. Referunt
 quoque non contemnendi autores prodesse accipitris seu falconis stercoris. j.
 cum vino albo, aut aqua capillorum veneris: uel tātundē cinnamomi seu casia.
 Proficius item maximè censetur pulvis, qui recipit fini accipitris, 3. j. cinnamo-
 mi, casia ana. g. vj. croci g. iij. misceantur, & cum paucio vino albo, vel aqua ci-
 trangulorum, aut adianti exhibito. Interim tamen si difficilior fiat partus, casto-
 rei 3. j. cinnamomi. g. iij. propinabis. Prodest, & phaseolorum vel cicerum ru-
 brorum decoctum, vel decoctum fenugraci cum croco, & oleo amygdalarū
 dulcium, addita 3. j. trochiscorum de myrrha. Confert quoque decoctum galli
 veteris cum modico casia lignea, croci, & vini: vel succus pori cum aqua tepi-
 da haustus, vel mentha decoctum, aut succus, vel thymi, vel leucoyi sicci deco-
 ctum, aut decoctum malua. Sic & inunctio pubis, vel sub vmbilico facta cum
 oleo liliorum, mucaginæ seminis altheæ ana 3. j. & f. medullæ cervi. 3. j. Appen-
 sus item iaspis, radix aristolochia, cyclaminis pudendi orificio, aut femori allig-
 ata. Valet etiam hoc medicamento, quod recipit radicis graminis, petroselini S
 ana 3. j. artemisia, nepetæ ana. p. f. seminis anisi, & feniculi, ana. 3. j. fiat decoctum,
 cuius accipe 3. iij. & adde cinnamomi 3. j. casia lignea. 3. ij. sacchari. 3. j. Verum
 si hæc omnia adhuc prodesse non videantur, vereri eo tempore oportet, ne cau-
 sa alicuius ex ijs, quas retulimus interuentu, & efficacia difficultas suboritur.
 Quippe tunc temporis aduersus ipsam pugnandum primò esse consulit reitra-
 tio. In qua curandi ratione aduertisse oportet, ea omnia auxilia, quæ hucusque
 retulimus, communiter omnibus partibus esse proficua, quæ verò propria cui-
 que sunt iam referā, initio sumpto à frigore, si malo causam præstiterit. Multis
 compertum esse legimus, grauidas mulieres, quæ saluiam manducarunt, pro-
 sperè peperisse: sic tradunt lænas eam quærere, & manducare ad partus facili-
 tatē. Sed vteri ore constricto, crasso frigidoq; prodesse scimus totus, qui confi-
 ciuntur hac forma: excipe malua, bis malua. an. m. j. seminis lini 3. iij. aristolochie
 lib. j. fiat decoctio in aqua, & oleo violarū, & camæmali, quibus fiat forus cum
 spon-

De par-
 te facili-
 tando in
 xia cau-
 sa ratio-
 nem.

Si ex fri-
 gore.

A spongia, aut filtro. Post verò prædictas partes in ungiro linimeto, quod recipit mucilaginis fenugraci, & seminis lini, ana ʒ. j. extrahatur cū vino albo, & eadē aristolochiæ longæ & rotundæ, & clematis puluerizati, an. ʒ. j. styracis myrrhæ, styracis liquidæ, an. ʒ. f. propoleos. ʒ. ij. olei amygdalarum dulcium, & liliorum alborum, an. ʒ. ij. reducantur ad formam linimenti. Quibus etenim calidiæ actus & aliis, quæ superius retulimus, hydræleo & aliquo ex oleis calidis, aquas artemisiæ, fenugraci, & similib. partes dilatare, atq; calfacere opus est. Quod si speretur fetus emissio, abstineat oīno à cibo femina, sin aliter, assumat parū vini dulci aqua artemisiæ, vel aristolochiæ rotundæ, vel modicum panis intincti in vino hippocras appellato: incredibili ē efficacia iuuat aqua cinnamomi cū modica aqua angelicæ, vel cardiacæ, itē & oleū cinnamomi eiusdem cū modico vino, ad oleū macis injectis tribus guttulis in coleari iuris, benefacit et oleum gariophyllorū. Sed cum iterum dolores creuerint, ac puer apparere inceperit, tunc retento spiritu nouetur expellere, ac innitatur capite, & manibus, donec infans oriatur. Et si hæc prodesse non videantur, inungere iterum pudēdas partes pectinenti, & os factum oportebit oleo sambucino, vel iasminorū, & summat eo tpe decoctum, quod recipiat corticum vtriusq; cassiæ, ana ʒ. f. cinnamomi ʒ. j. croci. ʒ. ij. aquæ artemisiæ. ʒ. iij. & fiat potio tepida. Præstat et eundē vsum pessarium, quod recipit Hyssopi, radicis lilii, origani, calamenti, ana ʒ. j. terebinthi n. ʒ. f. si conqassentur, & fiat cum lana pessarium. Simile beneficiū præstat suffumigium ex stipite caulium, myrrha, & felle tauri.

B Verum si ob immodicum calorem, qui vires exsoluat, pariedi difficultas oriatur, curandum est omni arte vires reficere, & spiritus præcauere quominus dissolutione pereant. Ob id quidem cibis & potionibus optimi, & facili nutrimēti vires reficere oportebit (sed maxime odoramentis, quæ ex alimentis spirant: nam alia vterum sursum euocant) dum eorum omnium quantitas modica sit: admixtis semper quæ vires habeant roborandi, & astringēdi, vt cidonii, malis punicis, & reliquis, quæ firmare vires possint, & quodammodo frigida sint, & dicta cinnamomi aqua vel eiusdem cinnamomi oleum vino sumptum, aut oleū gariophilorum. Arcet insuper animi deliquium panis vino, aut succo granatorum imbutus; Præterea quæ sic afficiuntur, in aere parū frigidiori degant, quarum facies spargenda est aqua rosacea frigida, & eadē aqua, & flabellatione aer temperandus est. Timidis, autem ac puellis mentis robur addendum; quem admodum eis, quæ dolorum in expertes sunt: rursus exhortandæ, vt ualidissime spiritum comprimant, & ad inguina pellant. Quod si imbecilles ex morbo sint, cibis boni succi, ac potibus reficiendæ sunt, & alendæ bona partus spe, semotis animi affectionibus, quæ vires ab incepto munere distrahere nata sunt.

S Inflammatōe, vlcus, tumorē laxū, ac durū, vel aliud vteri vitium, si causam difficilis parturitionis præstare cōperias, curandum omni arte est, patres ita leniter, & blandē tractare, vt citra maximam dolorum exacerbationē partui cedāt: quod facies vnguētis, fotibus, & pinguedinib. quæ id nata sunt efficere, quæ superius diximus. Verum si ob lumborum causā ad interiora luxationē, auiam pinguedinē pariendi difficultas cōtigerit: potissima facilitandi partus, stat in cōgruo parturientis situ. Ob id puerpera in sella prona flexis genibus collocetur, seu in lecto, ut uterus delabens cervicem rectam extendat, atq; idē

quod si
vires
reficere
oportebit
(sed maxime
odoramentis,
quæ ex alimentis
spirant: nam
alia vterum
sursum euocant)

quod si
vires
reficere
oportebit
(sed maxime
odoramentis,
quæ ex alimentis
spirant: nam
alia vterum
sursum euocant)

Si ex calore, aut imbecillitate.

Si ex pinguedine, & alijs corpulentis causis.

ē dire-

è directo ostioli habeatur. Deinde ceratis oleis, ac pinguedine lenire oportet, & sensim digitis aperire: tandem mixtus procurandus est flexis genibus, & pro na existente quæ parit. Cui consimilem curatione adhibebis si os uteri, vel cernix stricta admodum fuerint, tunc enim alui excrementa primitus mollienda pellendaq; sunt blandis clysteribus ex oleo amygdalarum dulciũ, & iurẽ. Caudam item inungere oportet prædictis vnguentis, & linimentis, quo facilius forui cedere possit.

*Si nitio
membra
partum
fiat.*

Si causa membranarum difficulter scemina pariat, considerabis, an ob crassitiem & soliditatem secunda, quæ rumpi nequit, difficultas suboriat. Tunc etenim Aetii consilio abrumperè ipsa oportet, aut obstetricis unguib. aut scalpello, quæ sanè res cautè agenda est, ne fœtui, aut matri graue aliquod malũ subsequatur. Verum si tunicarum tenuitate nimia (in quibus humor continetur) difficilis fiat partus, quod humor in membranis contentus, ante debitum tẽpus effluerit, ita vt uteri supersint resiccati, eis albumina ouorum cum malua, aut fœnugraci decocto excolato, vel cum ptisanæ cremore tegido infundant eiusdem Aetii decreto, vel pudendum, & uteri cerutcem, inunges oleis, aut lini mentis prædictis, quo mollior, & humectior fiat locus.

*Si ex
praua
fœtus fi-
gura.*

Fit cunctis partibus difficilioris, in quo fœtus praua aliqua affectus figura prurumpere tentat. In quo sanè casu multa fieri, & considerare docet Hip. li. de nat. pue. dicens. Quicumque uerò duplicati complicantur, & in osculo uerorũ incumbunt, eos siue uiui fuerint, siue mortui, rursus retrò protrusos uertere oportet, quo secundum naturam in caput exeant. Cum aut retrudere uoles, aut uertere supinæ ipsæ reclinatę molle quoddã sub coxas sustinere uoles, sed & coxæ altiores capite sint, & ut nullũ ceruical sub capite, si prouideto. Cũ uerò retursus fuerit fœtus, & hinc atq; hinc euoluitur, & secundum naturã constituitur, quicquid sub lecti pedes supposuisti, ac lapides, & quod sub coxas subdidisti, subtrahito. Quicũq; uerò fœtus uiui manũ, sicut crus foras præmittunt, aut et ambo eas oportet q̃ celerrimè, ubi exitum significauerint, prædicto modo intro retrudere, & in caput uertere, & ad viã reducere: quicumque fœtus complicantur ad lateris mollitudinem, aut coxam in partu prolapsi, eos diligere oportet ac uertere, & in aquã calidã desidere facere, donec mulier refocilletur. Hæc quidem uolui ad hunc locum adducere, vt admonuisse videar tum medicos ipsos, quorum iure est maximè obstetricum imperitiã, quantum datur, aperire, & eas disciplina corrigere, ac vt moneã et quanta diligentia opus sit, vt difficilem partũ prædicamus, si ex deprauata fœtus figura fiat. Quamobrem considerandum est, qua diligentia opus sit ad extractionem fœtus, & quibus medicamentis, ac ingeniis id fieri expediat. Primum igitur, si propter deprauatam figuram partus difficilis fiat: tribus omnino modis ipsum præcauere oportet, situ nimirum parturientis, & infantis: secundo quæ medicamentis, quæ fœtum, utcunq; sit, expellunt: tertio uerò & ultimo facta aliqua continui solutione, vel operatione manuali, ne uterq; pereat. Itaque si prædictis signis partum esse difficilem compertiamus, parturiens competenter in lecto locanda est, vt altũ habeat corpus, ac si in priorem partem ab orificio uteri fœtus infixus est, supina est collocanda: si in suistrũ, in dextrum cubet. Si uerò matris positura infantis situm corrigere non possit:

A possit tunc diligenter vnguib. in scissis, & oleo inunctis, ac in vnum cōductis digitis, sinistra manus in orificium vteri immitti debet, introq; paulatim, ac sensim fetum pellere opus est, & si caput proximum est, ipsum componat, & adducat. Si verò ambæ manus apparuerint, duob. humeris eius manus suas ex vtraq; parte infigens, retrosum eum reuocet, vel superius dictum est, manibus ad latera compositis, & apprehenso capite, adductoq; foras paulatim, & leuiter. Verū si infans caput interius habuerit, utiq; duas manus eiecerit, oportet obstetricē prius immittā manu caput ad orificium allicere, & comprehensis manibus infantis coronari oportet, ne caput eius orificiū vteri obtureet: sed inunctio vteri osculo, quò facilius quā manus exhibant, totum corpus prorumpat. Quod si ne his quidem sum acceperit convenientem, tunc pedibus mulieris comprehensis, ipsam concutito vehementer, & paulatim, hypochondria composito, donec aliam representare figuram competias. Idem quoq; præceptum obseruandum est, si altera manus exierit. Verū si supinus prodeat puer, manibus super collū extensis, tunc quidem manibus oportet puerum euoluere paulatim, quo facto, vel iterum infante propulso, respiratione cohibita, & vtero p̄dictis inuncto, ipsam inniti plurimum iube. Obseruandū in super iū p̄dictis reductionib. est, ne manus, aut brachia pueri plurimū tractemus, ne fortē exarticulāri cōtingat: sed innitentes super humeros pueri, intro pellere ipsum oportet. Sic quidē si alterū aut vtrūq; pedē immiserit, manib. obstetricis inguinib. pueri affixis, ipsum intro reducere opus est. At si coxas vsq; foras misisse cōperiamus, sternutamentū mouere cōuenit, & ipsam verbis exortari, vt plurimū innitatus: sin aliter (ut dictū est) intro pellere, & vteri osculū inungere, ac fomētis emollire, & pessariū ex myrrha apponere quo facto, compressa respiratione, & manibus cōpresso et ventre, ipsam inniti plurimū, iubeto. Cui cōsimilē diligentia adhibebis, si sup genua, latus aut quāvis aliā partē procubuerit, vel cōplicatus exierit pedibus capiti adiunctis. Ois itaq; cura habenda est, vt Hip. consiliū li. i. de mor. mu. de reducendo fetu ad partem internā: nā proprio, & nativo exeundi conatu contingit non rarō, sua sponte optimā nācisci figurā. Quod si hæc satis esse nō videantur, medicamentis curandum est partū iuuare: sunt autē hæc varia, nam qdā ex vi propria partus propellunt, qdā verò ex ocula proprietate. Sic emollitis primò partibus pudendis, & ventre dum res in periculo est, & alijs auxilijs partū facilitate nequimus, exhibere oportet cinnamomi ʒ. sabinæ ʒ. j. cōficiat cū melle, & cū vino parturienti p̄beat. Eiusdem vsus est potus hōc forma confectus: excipe aristolochiæ, myrrhæ, piperis. ana ʒ. s. cū vino aromatis condito, bibat. Præstat, et peucedani puluis cum ouo forbili exhibitus: item betonicæ, scobes cum aqua mulsa: cinnamomi et castorei, myrrhæ, styracis, sabinæ, singulorū g. x. ex melle vtiliter lingitur, absorta in super aqua cinnamomi. Prodest, & singulis horis abforbere croci. g. x. cum modico vino albo: itē anguium senecta lūbis alligata: decoctum adiantū in hydromelite cū oleo sambuci: nidus hirū dinis ablutus aqua calida, & ipsa aqua exhibita q̄ritate. iij. ʒ. suffumigiū itē ex ungula muli. Cōferunt quoq; pilule q̄ recipiūt cinnamomi, castorei lignæ, cinini, aristolochiæ, myrrhæ, costi, ana ʒ. iij. styracis, rubæ ana ʒ. ij. sabinæ ʒ. ij. & s. opij. g. viij. fiant pilule, cuius q̄ritas sit ʒ. s. Idē proculdubio p̄stat beneficiū medicamentū, qd cōficit ex myrrha, opoanace galbano, sinapi. ā. ʒ. j. itē ex assa. cōfice bolos cū aqua rutæ, &

Hh

por-

porrigere. ʒ. j. cū aqua decoctionis dactylorum, idē valet decoctū dactylorū cū
croco & fenugraco, sic & cortex castæ, antraſura eboris cū vino. Sic pſta non
parū illud medicamentū, quod recipit fabinæ. ʒ. iij. ruta. ʒ. ij. cicuta ʒ. j. hyſſopi,
cinnamomi, ruber tinctorū, ana ʒ. iij. ſiant pilulæ, quorū porrigere poteris ʒ. j.
aut ʒ. ſicū decocto fabinæ. Valet itē ſuſſumigium ex ſtercore vaccæ, & peſſariū,
quod recipit myrrhæ, ellebori nigri, opopanacis, fellis tauri, ana partes equales
terantur, & ſiant peſſaria longiuſcula. Plura aut̃ alia reperies c. de fetu mortuo,
& de ſecunda reliſta: inter quæ non ſunt minoris momenti emplaſtra & cera-
ta, & cucurbita oſſi ſacro adhibita. In oī tñ partu, cauendum eſt ab his, q̃ vel ma-
ximā inferūt violentiā, vel vterum nimis propellere poſſunt, maximē ſi mulier
talis ſit, q̃ leuī ocaſione vterus extra laxari, aut prominere poſſit. Cui quidem,
conſulendum eſt, vt pariat decumbens in lecto, ac ſupina, quod infortunium
præcauebis, ad anū imposito panno, in modū pillæ oblongæ, quæ forūter in quo-
libet conatu obſtetrix cōprimat. Sed ferunt a proprietate prodeſſe, ſi acetice à
brachio ad femur transferat: itē hioſquiām radicē, ſi femori ſiniſtro alligēs. Pu-
legiū quoq; & artemiſiā tritā, & ſuper ventrē poſitā: ſic iaspide ſiniſtro cruri al-
ligatū, ſinaragdū, corallū, radicē ocymi, polipodiū cōtritū pedū plantis alligatū
radices etariſtolochiæ vtriuſq; pſertim longe, multis prodeſſe credit, & anagy-
ris et femori adhibita, ſed oībus prodeſſe cōperio hauitū olei amygdalarū dul-
ciū. Pulpā itē colocintidis cū ſucco rutæ emplaſtri modo in vniuerſa vētris re-
gione partū accelerare fert. Auic. cuius ſanē cēſus alia reperies c. de fetu mortuo.

Verū licet hæc oīa prodeſſe nō uideantur, ad crudele illud, & inhumanū chi-
rurgiæ opus, quo viuus diſſecat puer, dictū proſecto horrendū, cōfugiendum
nunq̃ eſt: etiam ſi ex Auic. Aetii, & Moſchionis cōſilio, fieri poſſe cōſtet, quod nō
liceat Chriſtiano vnū interficere, vitæ alterius gratia. Præter q̃ quod multi ci-
tra oēm expectationē, ſaluantur. Sed implorata Dñi noſtri Ieſu Chriſti miſeri-
cordia, interceſſione Beatiff. Virg. Mariæ, & oīum ſanctorū, dictiſq; Euāgeliis,
& poſitis ſanctorū reliquiis, & Agnus Dei, iterum ad tutiora fetū, & matri au-
xilia, redeundū eſſe arbitror, & iterū tentanda, q̃ antea diximus, vel alia denuo
experiri: cuius cēſus eſt, quod recipit corricū caſſiæ fiſtulæ ʒ. iij. bulliant in
uino albo tenui, ad medietatē, cuſus citatum unum cū iure cicērum, & ʒ. j. cin-
namomi porriges. Præſtat & ʒ. ſopobalſami in uino tepido ſumpta, licet nō de-
ſint, qui ſterilitatē in poſterum ex hoc medicamento uereantur. Quibus factis,
bibat parturiens lactis mulieribus hauitū, gratia cōpeſcendi acrimoniā prædi-
ctorū medicamentorum, interim tñ in uterum, ut conſulit Auic. lubricantia,
& cerotaria ſubtilia, & mucilagines infundes, & adipēs liquefactos, & albumē
obi, & uitellū eius. Vtemur et ſequenti clyſmate, per ſyringam, aut cannā infu-
ſo. Excipe lactis vaccæ ʒ. iij. pinguedinis porcina ʒ. ſ. mucaginis lini, & radi-
cis altheæ, ana ʒ. ij. miſce. Quibus factis, tentet iterum diligens obſtetrix, aut pe-
ritus chirurgus dexteritate, & vī illata, puerum euellere, nitens & omni arte ſtu-
dens puerum extrahere niuum, licet ſit cū periculo aliquo deformitatis, vel
q̃ mancus ſuperſit, imbecillus, aut utcuq; læſus, cauens diligenter ne uoluta-
riē ipſum interficiat, nā ſi malum aliquod illi hac ratione ſuccreſcat, leuius eſt.
Curandū tñ primo, ut ſacri baptiſmatis, q̃ puerulus recipiat, & poſtea, citra
vitæ euidens periculum, ipſum extrahere tentabis, rum manibus, tū verō me-
dica-

Adicamentis, & aliis auxiliis. Interim aut vires parturientis omni arte reficere oportet, & pueri umbilicum non resecare, donec uel mingat, uel ploret, aut aliquomodo ex labore partus reficiatur, quod Hip. docuerat lib. de superfeta. Si forte cōtingerit matrē in partu periclitari fetu intus uiuo superstitē, quod ex motib. & subfultationib. infantis conijcies, tunc demū posthabita matris cura, eius tantū habenda est. Principio igitur conuenit morientis os & genitalia patentia adseruare, ut p ea uitale spiritū & anhelitū recipere possit. Deinde hypochondriū sinistrū sectione in trāuersum facta incidimus, dextrū quidē latus nō ita liberū, pp subiectū hepar, ingressum incidenti praeber. Ceterū leuiter tantū nec profundē inciso hae ducēda est, ita ut peritonaeū non penetret, ne ab intestinis actio praepediatur. Sed facto primo foramine, peritonaeū leui foramine aperire oportet, ac missis sinistrae manus digitis, sensim totū manū immitteremus ad uterū, & in testina paulatim attolentes, tunc leui scalpello, & leuiori scissura uterū abrumperē opus erit: nā aliter periculū esset, ne penetratis uteri tunicis, infans scalpelli cuspidē laederetur. Porro ubi iā eximendi tempus prospexerimus, ita excipiemus, ut eius spina toti palmae nostrae incubat; cauendū tamen est, ne aut pedib. aut brachiis, aut thorace, aut capite, aut ventre cōprehendam: id enim sine periculo vix fieri potest. Quod si geminos portet eadē diligentia utendū est, ac si alter mortuum esset, primo uiuum extrahet, mortuus in ostio lo, & ad manū fuerit. Sic nati Caesares dicuntur, ut Publius Scipio.

*De secunda rel. lta.**Cap.**4.*

Studens natura fetum in lucem edere, minori, quo possit labore ipsū ante partum a vestimentis illis, seu inuolucris, quae ipsam illi praestitisse melioris gratia antea diximus, maxima diligentia exuere curat, ut solus, & oīno nudus in lucē prodeat, nisi aliqñ tunicula quadam coopertum emittas, ut suo loco dictum est. Excusso igitur inuolucro, id intus manere necessum est, quod sanē non minores labores, ac dolores, & pericula inferre habet, q̄ fetus ipse, nisi conatu, & diligentia praeueniatur, ne diutius in utero maneat. Fetu porro excusso, frequenter accidit, ut secunda in utero firmiter adhærescat, pendensq; ab ea puer per umbilicare vas: quod ubi euenit, tunc interdum os uteri apertum, interdum clausum reperitur, secundaq; ipsa nō nunquam uteri fundo adhuc coniuncta, nōnunquam seiuncta existit. Est itaq; secunda mēbrana quaedā ex ijs, quae fetū inuoluunt, quae ueluti radicatione multorum uasorū est, q̄ radicationem prisci autores corion nuncuparant. Quod sanē nil aliud est, q̄ uasorum multitudo membrana tenui connexorū, quae haud facile numerare queas Gal. autore 15. de usu par. c. 5. Quod et aliis nominibus insignitum reperies, ut liquet cōm. apho. 49. lib. 5. & ex Paulo quoq; lib. 6. c. 75. Latini quidē secundā, & secundas nominare solent, q̄ uelut secundum domicilium, ac receptaculum sit, & fortis indumentum, ut Aetius inquit. Quae mēbrana quoniam ex umbilico pueri pender, & umbilicus postremus ab uteris exit (quippe si prior exiret, non accederet per ipsum puerō nuttimentū) propterea fetū excusso, foras prodire necesse est, in naturali partu. Sed quoniam cōtingit interdum fetu in lucem edito, ipsam praeter naturam detineri, sit ut in eius retentione uteris quodammodo afficiatur morbo in numero. ab ea succrescente. Vt

Hh 2 rum

rum cum detinetur, vel fundo vteri adhuc conexas est, aut liser seiuncta fuerit, **A**
 tñ circa aliq̃ vteri partem, instar pilæ, conuoluta existit, atq; si os vteri diductū
 fuerit, & secunda, quæ inibi relicta, est alicui parti vteri orbiculatim conuolu-
 ta inhæserit, facile educitur manu sinistra, calida, pinguiq; aliqua illita substan-
 tia infunduntq; immissa. Si aut fundo vteri sit cōnexa, demissa simili mō manu
 trahenda est: non tñ in rectum, ne vterus procidat, neq; violenter admodū, sed
 leniter ac placide, primum in vmbilicum diducemus huc atq; illuc circū agen-
 tes, deinde paulò validiùs attrahemus: hoc n. pacto solvuntur, & a connexo tra-
 heatur. Quod si vulua osculum clausum fuerit, perfusionibus vtendum est, & fo-
 mentis ætu calidis: postmodū digitis sinistra manus leniter aperire, ac paula-
 tim dilatare est conandū. Cæterū si, ne his quidē prolabi cōtingerit, & rē: maius
 periculum pueri, & matrimonii cōperiamus, minimè vmbilicū, resecare oportet,
 ne postea difficilius fiat secunda exitus: sed tunc retentionis cā inquirenda
 est. Verū si quis rē hanc diligentius pensitet, p̃ter has oēs secunda retentiones,
Causa. reperiet potissimum cum huic malo præstare, qđ Hip. li. 1. de mor. mul. per hæc
 verba dixerat. Si mulieri secunda in vteris relicta fuerit, hoc si contingit, si per
 vim ruptus fuerit vmbilicus, aut ab obstetrice vmbilico seca, per imperitiam re-
 sectus: quæ videlicet vmbilicū pueri prius incidit, anteq̃ secunda ex vtero existi-
 set, & vteri sursum retrahunt secunda, vt potē lubricā, & diffusā, & in se ipsis
 detinēt. Præter hanc cām, alias nō paucas reperies, inter quas, potissimū obtrūct
 locū aīæ pathemata: itē odoramenta narib. admota: vel si vterus ocysimè à partu
 claudatur: potus aquę frigide, ac deniq; oīa, q̃ subito casu puerpere acciderint.

Quā verò grane & periculosū sit, sedam nō. p̃tinus exire Hip. ipse retulit li. j.
 de mor. mul. dicens: Si mulieri secula relicta fuerit, si non ampli fuerint vteri, pur-
 gatio ipsa minus q̃ oportet p̃cedit, & venter durus fit, ac magnus, & febris acu-
 ta, & dolor p̃ totū corpus & ventris, maxime partē eā, q̃ est infra vmbilicu n., &
 grauitas fit in vteris, & tormen velut fœtus insit, & corata, secunda breui eijcit
 putrefactā, & sana euadit. Præter q̃ p̃fectō mala nō raro accidit fœminis ipsis
 suffocatio, & ex putrefactione, vel febris, vel graue aliqd̃ malū ocysimè succre-
 sci. Cuius ēt mali memineral quoq; Hip. li. 2. pop. tex. 18. de coriarii uxore uer-
 ba faciens, cui secundinæ pars in utero relicta fuit, q̃ stranguriā p̃moberet. Verū
 q̃a frequentissimā retētionis huius cām, vmbilici intēpestiuā resectione esse
 protulit Hip. ob id pauca quædam hoc in loco de vmbilici sectione referam. **C**

*De um-
bilici se-
ctione.*

Est quidē, ut ferūt, apud germanas fœminas mos, statim vmbilicū resecare, &
 medicamentis secundas conari educere: edoctæ fortasse a medicis, quos decepe-
 rat Arist. lib. 7. de hist. ani. c. 10. dicens: Cum aut inuolucra non fuerint simul e-
 gressa, sed intus permanferint, puero foris existente, ligato vmbilico resecanda
 sunt. Sed meliori multò prouidentia nos vfos esse censebimus, si sedulo p̃cura-
 uerimus, quo modo sine inuolucris fœtus neuq̃ emerferit: quod ut fiat cōmo-
 dius, non sunt ab umbilico secanda, interea dū intus perseuerant, sed potius co-
 nandum est quemadmodū perpetua sint, & fœtui maneant cōiuncta. Quā sanè
 doctrinam adduxerat Hip. lib. de superfetatione dicens. Cæterum si secundinæ
 haud facili exciderint, sinendæ sunt, maxime ad fœtum appendere: curandū est
 potius, ut absq; violentia vlla trahantur paulatim, tum alijs modis, tū maxime
 si in sella ventri exonerando destinata, sede iubeatur, quo pendens fœtus graui-
 tate

A rate sua secundas secum afferat. Atq; ut hoc fiat, sensim ventrem subijci liquore parum calido plenū imperat, superq; foetū locat: deinceps verò punctus venter mucrone tenuissimo, cunctanter admodum concidit in seipsum, ac vnā foetum, & q̄ ab eo pendeant inuolucra deorsum trahit. Quam quoq; fuisse Hip. sententiam li. i. de mor. mul. demonstratur hisce verbis; Si mulieri secundae relictae fuerint, hoc fit, aut per vim rupto vmbilico, aut per imperitiam ab obstetrice resecto, quae prius incidit vmbilicum, q̄ secundae ex utero exierint. Haudquaquam igitur arbitror expedire, ut vmbilicus dissecetur à secundis, antequam illa prodierint: quin potius utcumq; factam resectionem, potissimā censeat causam permāfioni secundarum in utero. Quamobrem praedictis auxilijs conandum est, secundas extrahere, qd si profuisse non videantur, ad maiora perueniendum est, de quo rum sorte, ut ex Hip. constat, sternutamentum est. Cuius naturam, & efficaciam simul, ac tussis in propellendis secundis, nonnulla hic scribere æquum esse dixi; si prius dixerō q̄to tpe ad summum immorandum est ante, q̄ vmbilicum resecemus: nam si diutius differamus, puer periclitabitur, aut morbosus euadet, ac rursus si citò abscindimus, praedictum periculum matri aduenire sperandū.

B Ob id quidem tentatis remedijs si nihil competiamus profuisse, vmbilicum resecare opus erit, & ipsius caudicē femori parturientis vehementer alligare, quo minus fugere, ac in fundum commeare possint secundae: spatiū autē ad summū sit quatuor aut quinque horarū. Verū si vmbilici vasa mucore plena apparuerint (praeter q̄ q̄ puerum fortasse periclitari, aut morbosum fore monstrat) citius resecare vmbilicum oportebit, & sicciōra medicamenta apponere, quae ocysissime resiccent quod pituitosum, & frigidum in illis partib. supererit. Primo considerandum est, an incuria obstetricis, vel alia occasione secunda intro se receperit, & an ab utero separata sit, aut alicui parti affixa. Tunc quidē ante aliud auxiliū, sinistra manū oleo liliorum alborū, aut dialtheae illatē, in profundū uteri obstetrix immittat, & caput secundae, leuiter alliciat, q̄ si in eius extractione, plurimū sanguinis fluat, laudatur Karabe puluerizati. 3. j. in vino q̄ vrinas, moueat, secundas pellat, & sanguinē fluentē sistat. Praeterea de numero eorū auxiliorū, q̄ ad secundarū propulsione plurimū valere cōperimus, vnū porro sternutatio est, ut millies experimēto facillimo cōfirmari cōstat. Est sanē sternutatio instituta ad propellendā cām molestia, q̄ pcipitur in ventriculis anteriorib. cerebri, vnde cūq; molestia illa prodeat, seu ex naribus, seu palato, seu capite ipso, q̄q̄ & ab oculis quoq; contingat: vnde Solē inspiciendo, sternutamentū excitamus. Eodem ēt omnino mō, tussis ad eijciendā cām, q̄ in pulmone praeter naturā inest, cōducit. Conueniunt autē in hoc ambae actiones, q̄ prius extenduntur cerebri ventriculi ante sternutamentum, pulmo verò ante tussim: itē qd in vtraq; membra aerem ad se trahunt: quo fit, ut neq; tussis, neq; sternutamentum fieri possint, nisi post inspirationē; Praeterea conueniunt, q̄ in vtriusq; post aeris attractionē, mēbrum celeriter, ac vehementer constringitur: itē q̄ eijciatur ex ea contractio ne aer per canalē, & quicqd intermediū est, profilit, & cū sono. Quib. etenim praemissis: videndum est, qua rōne relictis secundis, sternutatio, & tussis prodesse possint: sed videndū prius erit, in quo hi duo motus differāt. Differunt maximē tussis, & sternutatio, q̄ in hac aer trahatur bisariam ad cerebrū, exterius nimirū ab ambiente per nares, & intus per palatū ex pulmone: tussis autem ex sola af-

Cura dū
ratio.

Hh 3 pera

per a arteria aerem haurit. Pariter in extrudendo idem est discrimen: per tussim enim solum per asperam arteriam spiritus effertur, & materia: at in sternutatione materia solum per nares, spiritus autem, & per palatū, & per nares: licet multa, quæ in oris partibus sunt, ratione vicini motus, per eam partem quoq; impetu pellat. Causa huius est, quod qui deferitur per palatum, minore cum impetu exit, quia locus apertior est, nec retinetur: at per nares eliditur vehementer ob angustiam meatuum, unde et ingens ille sonus exauditur. Differt à tussi, quod in sternutatione nares concutiuntur, maximè, pectus valde parum: in tussi autè pectus, nares autem minimum, aut nihil. Hactenus de modo, quo hi duo motus fiunt, nunc verò, quò quæ in vtero sunt, propellant, videndum. Primò quidem præmittendum est, quod in sternutatione mediæ partes corporis comprimuntur, & extremæ exprimuntur. Sic. n. in sternutameto ex medio cpe spiritus affatim fertur, & mediæ corporis pars affatim cõprimitur: hinc evenit profectò, ut ea, quæ in infimis partibus insident, aut supernis, vtraq; vehementer exprimantur, etiã ea, quæ minutissima sunt, sic expurgantur, ob id ergo mirandum non est, quòd ad secundas expellendas vehementer conducatur. Compendio autem id faciet, si quis prius nares, & os constringat, nam quò spiritus diutius, & angustius concluditur eo vehementius erumpit. Quæ etiam de causa pueri experientia docti, si quid oculis infederit id ipsum protinus excernunt, nares, & os quoq; prius comprehendentes. Palam. n. est, ore & naribus apprehensis, protrudi totū aerē per palatum, qui ex palato deferri potest ad gulam, & intestina per ventriculū, quò etiam intestina, & vterum comprimere, certum est summopere iuvare. At dum truditur aer in sternutatione ad pulmones, & eius per eorum bronchia, & septum transversum allidit, contrahuntur interni, ut quisq; experitur in se, musculi longi ventris, & septum transversum collidit intestina compressa, iã facto brevior ventris: illa verò cum sint super vtero, è regione illum cõcutiunt fitq; non solum propulsio hoc modo, quòd parum esset, sed tremulus ille motus, quò et ex arboribus fructus decidunt, atq; ita laxantur vincula secundarū à placentula, & fœtus descendit quasi in lubrico. Aer præterea, qui sub septo transverso est, concutit etiam vterum, atq; ex hoc tremulo ictu contingit etiam, ut materiæ, quæ in aspera arteria sunt, melius quàm per tussim euellantur ab illa: ita ut nonnulli, cū nō possunt plenè euellere infarta, sternutatione cum tussi cõcitata, compotes voti facti sint: licet id ex accidenti strenutationi accadat, ut nup̄ dixeram. Quamobrem in præsentī affectu experimentum sæpe docuit id remedium esse præstantissimum, maximè cum opus sit breviter remedijs uti, ne mulieres interim putrefactis secundis febres, deliria, capitis dolores, tremiores, & animi deliquia patiantur, ut Hip. scripsit.

Principium itaq; curationis auspicaueris ab odoribus fœtidis naribus, & ore inspiratis, qui & vterum deorsum fungant, & sternutamenta mouent. Sic confestim spiritus detineatur, ac nares, & os obturentur, maximè si imbecillæ mulieres non fuerint: & cum circa pectinem dolores, & pondus persentiuntur, exclamare fœminam iube, aliquñ spiritum cohibere inferius comprimendo, ac sternutando: & super ventrem manu vehementer posita, vterum inferius ducito. Si tñ umbilicum refecare ob ingētem necessitatem, & ne fœtus pereat, cogaris: ab excisione semper vno pede retrò saliendo incedat fœmina oportet. Verum si his ad huc

A huc factis, secundæ non cedant, verendū est, ne vterō alligatæ supersint, id sanè deprehendes, qđ ante tempus puer emissus fuerit, idq; citra magnos dolores. Nā cruciatus & labores, qui præcedunt partum, sunt proculdubio, dū rum puniunt venæ & arteriæ cotylidonibus vteri alligatæ, ob id quidē si dolor non præcesserit, coniectandum est fractam tantum fuisse secundam, & vterō adhærescentem remanere. Quo tpe manu comprehendenda est, aut vinculo & leuiter in oblicum hac, & illac abertentes trahenda, ne in partes dissecetur, maximè quidem cum diuini retenta fuerit. Quod si ita tenaciter adhæreat, quod vnguentibus extrahi non possit, immitte medicamenta suppurantia autores iubent, vt eis dem putrefacta sensim expellatur a natura. Fieri. n. potest, vt in ea parte putrescat, & sensim excernatur, quod magis esse tutum arbitror. Verum si id fors tulerit, cautè facies, & subinde necesse erit per intervalla iniicere ea, quæ vim habeant detergendi, quod putrefactum est. Cui malo ex vsu erit vnguentum basilicon in multo oleo liliorum, vel amygdalarum dulcium dissolutum, vel in decocto, quod recipit radicum maluarum, & violarum, ana ꝑ. ij. radice aristolochiæ longæ, & rotundæ ꝑ. j. seminis lini, & fenugreci, ana ꝑ. l. florū chamemali, & centaury minoris, ana ꝑ. ij. fiat decoctum ex aqua, & oleo, & in eo dissolue vnguentum basilicon, vel modicum vnguenti ægyptiaci.

B Oportet insuper si strenuamentis res nō cesserit, vterius remediis progredi tanq̃ in re, q̃ maximam prærequirit diligentiam, qua in re sic loquitur H. p. li. j. de mor. mul. Quum mulier peperit, & a secundā non fuerit liberata, præstat dare ea, a quibus maximè purgantur puerperii purgamenta: allia cocta, aut assata vino, & oleo cum polypis, & sepiolis super prunas tostis. Castoreum verò, aut nardum bibat: bibat etrutam in vino nigro dulci ieiuna, aut sine vino: si vero vinum non fuerit dulce, melius est vel admiscere. Edat et brassicam coctam cum ruta, & mercuriali, & semen aliquod utero commodum bibat. Ac subdit idem autor eodē lib. Et sambuci foliorū decocto prius fomentum adhibeto, & id, qđ ex cantharide fit, apponito. Sed placent magis, qđ ad puerperium ea parte recenset, quippe cantharides partē exulcerant, ac erodunt. Anguis refert senectā præstare tribus obolis vino exhibitam, itē myrti baccas decoctas, & ꝑ dies quatuor decoctū ingestū, vel fœniculi radicē vino, oleo, & melle feruefactā, & epotā.

C Item paulō inferius ad secundam frigore emortuam, hæc refert. Quam a frigore mortificata computruerit, vbi ventris frigus fuerit, crocum leuiter tritum ꝑ. j. pondere cum adipe anserino infundito, & plurimum tempus finito. Ad idem etiam & sanguinem retentum eodem loco, suffumigium ex foliis salicis ꝑbat. Præterea lib. de nat. mu. sic ad eandem affectionem refert. Si secundæ decedere non possint, conyzam tritā lana exceptam ponito. Sed plura alia adducit ad pelendas secundas, & fœtum mortuū eodē loco, dicens: Violæ, & portulacæ semē contundito, & admisceto, & vino albo veteri exhibeto: pterea leucoyi nigri radicem in vino eodem modo sumat. Anchusæ foliorum ꝑ. ij. in vino albo equali aqua admixta, potui dato. Brassicæ & portii succū ad vtrunq; succi sylphii obolis tribus admixtis ex vino albo cum pari aqua bibendum dato. Fragini granā decem in vino bibenda dato. Mercurialis folia, & semen in vino bibenda præbeto. Quo equidem loco pleraq; alia reperies auxilia non solum potu sumenda, sed per subductionem: quale est illud, quod conficitur ex folijs mercurialis

Hh 4 lis

lis pessarij forma adhibitis item artemisia trita, & vnguento rosaceo admixta. A
 Salvia præterea hortensis bibita vel supposita, vterum purgat, & secundas à par-
 tu remorantes reducit, necnon cunctantes fetus excludit. Idem beneficiū præ-
 stat succus borraginis, porrorum, & petroselini cum vino vel oleo amygdala-
 rum dulcium, maxime si addideris suffitum ex cornibus, & vnguibus capræ. Itē
 decoctum seminis thymi, vel pessus ex lauendula: vel semen lilij hortensis tri-
 tum ebibitum cum vino albo. Fetus insuper ex decocto foliorum, & radicum
 eiusdem lilij: præterea iris pessus, aut emplastro admota. Sed facilius parabis al-
 bam radicē vnguento albo subactam ex Hip. decreto, & pœonia radicem cū eo
 dē vnguento. Præter hæc autem Hip. p̄sidia, ego etiam referam, quæ mihi vsui
 vtiliora, & multis probata videntur: cuius census est potio, quæ recipit, artemi-
 siæ p. j. sabinae 3. j. fiat decoctio in aqua, & lib. s. decoctionis adde vini albi 3. iij.
 cinnamomi. 3. j. & si citra febrem sit laborans, modicum sumat: itē in prædicta
 decoctione dissoluantur 3. ij. trochiscorum de myrrha. Valet et decoctum, vel
 aqua fabarum infusa, vel aqua florū croci, quam credimus esse maximi vsus. B
 Item panacis semen vino epotum, appositumq; cū melle: sic & eius radices ap-
 positæ secundas extrahunt. Polemonia ex vino epota: cœturi maioris radix der-
 rasa, & epota: cui quoq; operi præcipua vis inest dictamo, vt mortuos, & trans-
 uersos et partus, ac secundas deiiciat: bibitur ex aqua foliorum obolus, nec po-
 tu tm̄, sed illitu, & suffitu prodest. Aristolochiæ et longæ radix cruri apposita,
 vel epota: artemisiæ radix, radix eringii, leporis coagulum, illitum quoq; cum
 porri succo, & croco. Præstat & succus artemisiæ bibitus, vel succus politrici,
 marrubij, & pulegij: puluis quoq; lumbricorum terrestrium: tandem conferūt
 oīa, q̄ mēses mouent, nisi maximus fuerit sanguinis fluxus. Arabes aut antiquio-
 res probarunt plurimum præsidium, q̄ recipit sabina, aristolochiæ, acori par-
 tes æquales, fricata melle excipito, q̄ntas esto 3. j. ex lupinorum, & mēastri de-
 cocto. Aliud item parabis, q̄ recipit opopanacis, galbani, fellis bouis ana 3. j. ca-
 storei 3. s. detur cum prædicto decocto, si maximo in periculo exstiterit femina.
 Item prodest lupinorum, sabinae ana 3. j. myrrhæ, opopanacis ana 3. s. castorei,
 g. x. in minutissimum puluerem redacta potui dato 3. i. cum brassicæ, & pulegii
 decocto. Conferunt quoq; huic vsui suffumigia ex fimo equi arido, columbo-
 rum, aut aquilæ, vel ex semine porri, vrticæ minoris, alio pini resina, elleboro C
 albo, aristolochiæ, nigella, aut ex prædictis sic suffumigium conficito: recipe ru-
 tam, prassium, & abrotanum simul conquassata cum oleo liliorum, quæ bul-
 liant parum simul, ac postea super ignem posita, suffumigiū excipe. Ex vsu quo-
 que est suffitus aromatum, velut est casia, nardus, flos iunci odorati, artemisia,
 subina, dictamū, pulegium, & hmōi alia; ex quibus fumum parturiens vndiq;
 cooperta susceperet, & obstetrix manu contendat secundas eo tpe educere. Quod
 si non profuerit, pessos concinnato ex allio, asphalto, lasere, balsamo, stercore
 accipitis, galbano, gēuiana, sagapeno, scāmoneo, briona, nitro, dictamo, quæ ex-
 cipienda sunt succo artemisiæ. Vel sic pessarium confice: excipe aristolochiæ
 vtriusq; sabinae, nasturcij partes æquas, trita in pollinem felle bouis excipe in
 pessos. Si verò neq; sic educta fuerit, eadē dilaceranda non est, neq; purbari
 oportet, intra paucos. n. dies putrefacta, & insaniem dissoluta excidet: p̄cauere
 tm̄ periculum, qd ex suppuratione impendat, vt antea dictū est, oportet. Si tamē
 his

A his non cesserit malū, enchatismatis vtendū est ex decocto artemisiæ, iridis, sabinae, pulegii, calaminthæ, & similiū, ut uteri osculo, ac partibus et vicinis mollioribus factis, reliquis auxiliis, & secundis ipsis facilius cedat vterus. Gratia autē præcauendi caput, ventriculū & reliqua viscera, quæ ex putredine secundarum non rarè afficiuntur, suffiubus utendum est ex cardamomo, & ficu pingui (vt Paulus consulit) vel ex bdellio, styrace, thure, lapide gagates, ungue odorato, & reliquis, quæ cum hoc odorata sunt, & prædictis malis aduersantur, secundam quoq; subducunt. Quod si res eo desperationis deuenierit, ut suffocari laborante uideamus, ad pessaria deueniendum est, quæ efficaciora sunt, & cōficiuntur ex decocto cucumeris siluestris cum oleo irino, aut succo eiusdē cucumeris, & puluere aristolochiæ, staphideagria, elleboro nigro, & colocintide æquis portionibus, addito fellis tauri modico.

B Secundis extractis antequam umbilicus reficetur, puero prædictis laboribus labefactato prouidendum est: curandumq; primo quominus spiritus eius exhalatur tractato infantis umbilico calidis digitis, modicumq; compressis, & omni calorifico beneficio. Atqui non solum si hac forte nascatur, sed utcunq; imbecillius, & sine ploratu, & cum leui spiritu exeat. Quippe eo tempore seruefacere secundum nam uino calido oportet, antequam umbilicus abscindatur, donec calorem, & spiritum suscipiat: postea uiuidiori facto puero, ipsam secato. Itē eandē secundinam cineribus, aut calidis pannis calfacere oportet, uel in peluim calidum imponere, donec sufficienter puerulus incalascet. Sed præcipuè inter pares recenter coctos calidissimo uino albo, & aqua nāphæ irroratos apponere infantem opus est, atque spiritu, & halitu calido fouere eius famina, quæ cumminum, cinnamomum, anisum, aut uinum ore detinuerit.

Pueri laborantis ex partu prouidentia.

De fetu mortuo.

Cap. 5.

C Vmana frigilitas & miseria eo deuenire solita est, ut & in utero matris labores quoq; experiamur, & mortē, quod si acciderit, non solū fatui calamitas succrescit, sed & matri. Quāobrem cognoscere protinus id malum oportet, ne corrupto fetu matri quoq; irreparabile fiat damnum. Docuit quidē antiquitas fetum ab uteris educere ante tempus multis de causis: nā cum puella, aut adulta, sed parua concipiebat, eminente ex fetus magnitudine periculo mortis, gestationis, & partus tempus anticipabant remediis abortum mouentibus, quod sanè ueritum est in sancta religione nostra.

Mortuum uero fetum conadum est arte, quam celerrimè educere. Sed moritur fetus in utero ob alimenti defectum, aut eius malitiam, vel plethoriam, ob quā sanguine impletur fetus, & suffocatur, aut solutis acetabulis salui, id est, tussis, aut sternutamento, uel humiditate nimia laxatis. Item ex bibito medicamento, quod ualidè menses prouocet, uel ex potu amarorum, aut nimia inedia præcedente sanguinis missione, aut purgatione: etiam ex morbo aliquo acutissimo, æstuosissimo, & magno, ac ultimo ob partus difficultatem, q̄ optimè aduertit Auic. fen. 2. 2. 3. tract. 2. cap. 12.

Causa

Fetus quidē mortui signa sunt priuatio, & defectus motus ipsius infantis, cū *Signa* alioqui

alioqui moueri assueuisset. Item decumbente femina in latus, id deuoluitur; ac decidit puer: grauat etiam plus quam ante mortem, & mamma extenuatur: aut altera, si è duobus alter mortuus sit, atq; eandem abortiet. Humiditates in super ab utero manant, corpus pragnantis laeuat, albicat, ac mollescit, & ipsa segnis efficitur. Caput etiam dolet, oris fetor sequitur, palpebrarum inflatio, visus tenebrositas, ciborum inappetentia, & iam putrescente fetu ichores emanant ab utero, tempora pulsant, mala rubent, febres excitantur, & horrores, sitis, atq; turbulenta insomnia. Ventris tum demum frigiditas adest, dolorq; iuxta umbilicum: tandem omnia succrescunt, quae ex secunda relicta feminis accidere diximus. Docet id quoq; cognoscere Hip. lib. 1. de mor. mul. dicens: Si verò fetus in ipsa non circa initia, sed iam bimeltris corrumpitur, aut suffocatur, tunc, & venter imus intumescit, & ad contactum dolet, velut vlcere praesente, & febris magna ipsam, ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus, & vehemens pudenda, & inum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, & coxas.

Curandi
ratio.

In hoc sanè malo qua fieri possit breuitate curandum est fetum mortuū pellere, ne mala, quae mox retulimus accidere permittamus. Quippe, ut experimento confirmatum habeo, etiamsi ocysimè extrahatur, tanta superest vterus labe infectus, ut vix ad antiquum statum multo tpe reduci possit. Cum. n. fetus moritur, intensam, & grandem frigiditatem vterus contrahit, quae mille deinceps, accidentia concitat. Si vero diu moretur, ut putredinem subeat, mala, quae retulimus proculdiao succrescunt. Quamobrem medendi ratio in hoc malo quadruplex erit: vna, quae vterum dilaret fortibus, & suffumigis: alia, quae fetum euocet ijs, quae vires habent irritandi vterum: tertia verò per ea fit, quae ore sumpta fetum expellere nata existunt: quarta per ea, quae exterius adhibita eundem vsū praestant. Implent quidem huiusmodi indicationes, quae praecedenti c. diximus vterum posse dilatare, fomenta, & infusiones, ac reliqua. Sed fetum expellunt omnia, quae abortum mouent, siue acia sint, siue id possint alijs viribus efficere, vel in vterum missa, aut suffita. Cancris igitur ad mortuos fetus cum lapati radicibus, ruta, ac fuligine tritis, & in mulso potui datis Hip. uti proditum est: Verbenacae item radix ex aqua: betonicae drach. j. in vino cinnamomum cum rubea aqua sabinae exhibitum: aristolochiae decoctum, gentianae, baccarum lauri, costicae lignae, myrrhae, succus aut decoctum absinthii vel artemisiae. Thymi etiam & ditami cretensis vsus in hac re magni est momenti, siue potui detur, siue subiciantur, siue suffitu adhibeantur: galbanum etiam rosaceo, & myrrha admixtum potui datum efficacissimum est. Idem quoq; galbanum oleo cedrino admixtum, subditum mire prodest. Verum si frigoris externi vi fetus perierit, ferunt prodesse remedium quod recipit croci triti 3. j. quam adipe anserino exceptum in vterum immittes, vel aliud quod fit ex coniza, mentha, melle & resina simul tritis, maxime si odoratum vinum superbiberit. Quod si fetus mortuus iam intumuerit praestat medicamentum quod recipit succi marrubij, & apijana 3. ij. linteolo polentur, quibus adde rosacei 3. viij. adipis anserinae 3. iij. refinę 3. s. quorum medietatem in sinum mulieris infunde. Praestat idē beneficiū parietaria ex vino trita; itē aliud qd recipit aluminis scissilis 3. j. veratri nigri 3. s. q. simul trita vino nigro excipienda sunt intra vterum, fit etiam cataplasma acceptis calamo odorato, & interiori cucumeris siluestris, & anserino adipe, ac umbilico appositis. Iridis et radix

A radix epota in puluerē, vel in vterū immissa, vel medicamentū emagogū Nicolai. Ex vsu quoq; est id medicamentū, qđ recipit cinnamomi, aristolochiæ, sabinæ ana 3. j. myrrhæ 3. j. & cū aqua sabinæ, vel cinnamomi porrige 3. j. Idē quoq; beneficiū pstat theriacæ diateslaron 3. j. aquæ rutæ 5. iij. aquæ scængræci 5. iij. ficus aridæ num. iij. origani 3. ij. coquant, & colaturæ fume 5. ij. Prodest, & aqua decoct. da&ylorū. Qđ si hæc prodesse non videantur, purgantib. pharmacis vtēdū est, maximē si sequenti die laborans sumpserit hoc præsidium, quod recipit spicæ nardi, cinnamomi, rutæ, singulorum 3. j. myrrhæ 3. fl. cū modicissimo sabinæ pecto, aut in largiori copia ex decocto rubæ p̄beto 3. j. Prodest pulvis, q̄ recipit sabinæ, asari, myrrhæ singulorū 3. fl. cuius porrige 3. j. cū decocto gentianæ. Præstant quoq; suffumigia ex vngula asini, succida lana vtero immissa, vel suffitis cum capite sardinæ salitæ, aut lapide gagates. Si tñ efficacius efficere voles, excipe myrrhæ 5. fl. cinnamomi, galbani, castorei singulorū 3. fl. veratri 3. j. ex vacino felle cōfice, & suffumiga. Os ē vteri inungere oportet oleo fusino, anethino, rutæ, aristolochiæ, & colocintidis. Præterea galbani, & belzoini vtri- usq; 3. j. in oleo irino liquent, in quo pessus madescat. Conficies aut aliū ex suc- co cucumeris asinini, & melle cum lana succida. Aliū ē facies efficaciorē, q̄ recipit elleborum nigrum, staphisagriā, aristolochiam, pulpam colocintidis, & ammoniacum. Præstat & aliud ex lana succida, ammoniaco, & felle taurino.

B Verū sine hæc quidem oīa prodesse videantur, ad manus operationem de- ueniendū esse cōsultat vrgens necessitas, quas adhibere uetuit Aetius, & merito quidē, si femina deiecta, aut languens extiterit. Medicū (inquit li. 4. Ser. 4. c. 23.) ante extractionis aggressionem spectare oportet, resoluta sit ne mulier an non, & an seruari possit, vel sit deplorata, & seruari quidem potentem aggredietur deploratam verō relinquet. Nam prouidendū est ne lethalis affectionis pericu- lum errori, aut nostræ audaciæ imputetur. Docetq; eodem loco, quæ sit lethali- ter affecta, dicens: Quæ igitur lethali ter affectæ sunt, lethargico sopore p̄mūtur, & resolutæ sunt, ac difficulter reuocari possunt, & ad maximas inelationes reuocatæ, debilitat respondentes, rursus deferuntur in soporem. Quædam ē p- conuulsionem contrahuntur, aut nervis tremulæ fiunt, & pulsus fortiter tumi- dus, verum obscurus, ac debilis deprehenditur, at vero quæ euasuræ sunt, nihil tale patiuntur. Itaque colligitur ex eius verbis eam perituram, quæ inter pa- riēdū aīo sæpe linquat, & obliuiosa sit, vixq; somno excitari possit, cū pulso par- uo, languido, & inordinato, vel langueat, aut lassā mēbra ægrè attollat, & mo- ueat, ac frequenter conuellatur, vel aliis, quæ retulimus, correpta sit malis. Si autem nil horum adsit, bono esto animo, pulso enim partu, saluam illam fore spes est, cum hoc tamen difficillima res existit, & quam aggredi citra maximā considerationem & consilium non licet. Sed quid Hippocra. in hac re velit, audiendum quoque est: inquit enim libro primo de morb. mulierum. Quicun- que vero fœtus mortui, aut crus, aut manus foras protendunt, eos optimū qui- dem fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas partes in caput uertere, si uero hoc fieri non poterit, uterum intumescit, secare hoc modo. Dissectum per scalpellum caput cum contusorio instrumento, vt ne in ramenta fundatur, con- tundito, & ossa per osium bol sellam, aut tractorium instrumentum: iuxta cla- uiculam immissum, prout habuerit, extrahito, non multis simul, sed paulatim
exemptis

exemptis, ac rursus ablatis, curandum tamen integrum caput si fieri possit extra
 here, finaliter findere. Cum verò hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris fueris. **A**
 ambas manus in articulis cum ipsis humeris secato, & ubi hac extraxeris, si qui
 dem fieri poterit, ut exeant, et facile reliqua extrahito, si vero non obediant, to-
 tum pectus usque ad iugulum findito. Verum caueto ne in ventrem seces, & ali-
 quid de intestino denudes, exit enim venter, & intestina, & stercus, si vero horum
 quid excidat, maioris negotii res iam fit: contundito autem costas, & scapulas
 contrahito, & facile postea reliquum fetus procedet, nisi iam ventrem tumidum
 habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est ventrem fetus leniter perforare: fla-
 tus enim solum a ventre exit, & sic facile prodibit. Hæc proculdubio sunt, quæ
 Hip. in hac re præcepisse constat: qualiter autem fieri oporteat, expendendum
 nunc est. Conuenit. n. ante omnia, ut Aetius consulit, resupinam mulierem trans-
 uerso lecto sic locare, ut feminibus eius, ipsius ilia comprimantur, quod fit,
 ut & intus venter in conspectu chirurgi, & obstetricis sit, & infans ad os vteri
 compellatur. Hæc igitur usus occasione artifex: manum oleo sesamino, aut lilia-
 ceo, vel mucagine inunget, ac inunctæ manus digitum indicem primum immit-
 tet, deinde sensum alios, donec tota esse intus manus possit: utrinque aut stare de-
 bent peritæ, ac robustæ feminae, quæ illam manibus fortiter retineant, ne vi il-
 lata in fetus extractione commoueatur. **B**
 Ac parturienti tres bucellæ panis in vi-
 no imbutæ offerantur ad arcendum animi deliquium, & in ipso opere eius fa-
 cies assiduo vino aspergatur. Manus igitur in vterum immissa, emortuum puerum
 venetur, qui si capite vteri os contingat, vno instrumento apprehendus est,
 atque attrahendus instrumento cavitatibus oculorum, aut aurium affixo, neque in
 directum tantum huc ducenda manus est, sed et huc atque illuc agitata in obli-
 quum. Quod si caput extendatur aquoso aliquo humore, talis apertione scalpel-
 lo facta minuendus est, ac si ipsum mole grande sit, confringere forcipe, aut ma-
 nibus oportet. Sic reliquæ corporis particule, si maiores sint, quam ut commodè edu-
 ci possint, auellendæ abscindendæque sunt. Si verò clunibus, aut altero pede, aut
 brachio vuluæ immineat, ante educationem eadem hic faciendæ, quæ in labo-
 rioso partu præcepimus. Trahere igitur dextra manus vncum instrumentum,
 sinistra aut intus infantem, simulque ipsum dirigere debet, donec ex toto euella-
 tur: is aut postquam protractus est, vni assistantibus tradatur, isque eum supinis ma-
 nibus sustineat: chirurgus deinde sinistra manu leuiter umbilicum trahat, ita ut
 minimè abrumpat dextramque manu eum sequatur usque ad secundas: hisque omnibus
 apprehensis venulas: membranasque omnes eadem ratione manu ducat ab vte-
 ro. Quod si fortè secundæ subsequi recusent, hic ut in aliis partibus laboriosis,
 secundis relictis, filum promptè habebis, arreptumque subito umbilicum deliga-
 re, femoribusque annexere opus est. Postquam autem secunda, siue statim ab e-
 ducto fetu, siue postea educta fuerit, neque quicquam superuacuum in vtero re-
 lictum, crura componantur, ut partes distractæ conueniant.

Quo facto quoniam valde deiectæ virib. & prostratæ mulieres remanere solent, ex
 ratione mihi videtur, ut potionibus & iusculis, ac vino odorato & potente reficiantur:
 tum verò, ut locos fouere, ac roborare fotib. & vnguentis congruis prouideas sem-
 per frigus præcauendo, quo nihil nocentius in eo casu puerperæ accidere potest.

Quam.

A Quamobrem post eductū infantem, mox lincis panis calidis fovere loco oportet, & si hæmorrhagia subsequatur, quod frequenter accidit decocto rosarum absinthij, foliorum myrti, & artemisæ, in coctis vino omnibus locis fouēdi sunt postea verò vnguento comitissæ inscripto inunges. Potionem item parare conuenit ex puluere diamargaritonis frigidi, vel electarij de gemmis, ex aqua buglossæ, & vino albo deuorandam. Quod si vlcuscula, aut rhagadia ex vi illata cooriantur, ex vino decoctionis equiseti, & centinodiarum cum paucis melle rosato ablui iubero, ac mox vnguento e pompholige illito. Sic superuenientia mala curabis iuxta cuiusq; naturam, & conditionem. Quippe frequentius contingere comperimus vrinam, & aluum post eductum infantem inuoluntarie fluere. Quos affectus curabis, velut paruum illarum paralytis curari desiderat, demissa laborante post puerperij purgationem integram, in oleum calens, in quo folia lauri, betonica, saluia, libanodidis, origani, pulegij cum floribus chamæmali, roris marini, & stachados deferbuerint, moxque ab infussionibus ex oleo lumbricorum, liliaceo, & vulpino in quo catellus pinguis ad dissolutionem carnis ab ossibus deferbuerint, expressione facta vnguentum parabis, addita sty racis calamitidis, belzoini, opopanacis olibani, macis singulorum ʒ. j. aquæ vitæ modico, adipis anserini atq; cere quantum sit satis, vt fiat vnguentum.

De mola post partum in vtero relicta. Cap. 6.



ACCIDIT non raro, vt post infantis editum, & secunda etiā proiecta, adhuc super sit in vtero mola vel ipsi vtero, adherescēs, vel separata, & vagans: quæ postea (si parua fuerit) simul cum ex purgatione ex cernitur, aut si forte ibidem immoretur grandioris mali causa existit. In quo quidem affectu mox ab eius cognitione (quam iam referam) expēdere oportet, an molæ plures sint, parue, & non adherentes, vel vna grandis adherens, aut ab vtero separata. Quod si plures sint, & parue, periculi nihil afferunt, præsertim cum adherescentes non existunt, vt quæ cum sanguine menstruo citatim maximatur bationem paulatim, & innoxie cernantur. Verum cum grandis est, periculum non leue affert, vt ex Hip. euidenter constat lib. de sterilibus: in cuius eductione, sicut in fœtu mortuo, vel secunda plurimum insudare oportet, ante quā, aut caro illa informis viūo aliquo conspuretur, aut aliud malum efficiat.

Sic nosse oportet, quando a partu superest informis aliqua superfoetatio, vt quam citissimè eius excretionem curemus. Id quidem cognosces ex toto grauidationis tempore: quippe grauioribus solito existunt eo tempore semina, dolet vteri regio vniuersa, & inguina dolent, & omnia denique signa, quæ c. de mola adduximus apparent. Quod si sic affectis partus tempus accesserit, difficulter pariunt, & a partu nihil aut parum leuantur, dolores circa vmbilicum superiunt, & in dorso ab inguinibus; grumosus item profluit sanguis multus, carnosus, niger cum torminibus, & anxietate, & ab excretionem nullum sequitur leuamen; nausea, vomitus, & inquietudo, & anxitas subsequuntur, venter in tumorem per intervalla eleuatur, quasi nitēte natura facta contractione expellere: do-

re: dolores per intervalla succrescunt. Ac si mola grandis sit, postquam semel ad
 inas partes descenderit, sursum iterum reuertetur, quod natura nequeat tam
 grandem molem expellere, nec utri collum capere. Item pulsus fit parvus, fre-
 quens debilis, & febris subsequitur: vrina quibusdam non redditur, alijs gutta-
 tim excernitur: tandem omnia ferè subsequuntur symptomata, quæ foetus existẽ-
 te mortuo accidere diximus. At si mola plures sint, & parvæ, per intervalla
 post partum excernuntur succrescentibus excretionis tempore solum dolori-
 bus: Quæ sanè femine (vt ex Hip. decreto constat) citissimè in pristinam sanita-
 tem restituuntur: sicut illa, quibus grandior est mola, ocysimè pereunt. Inquit
 enim Hip. lib. de sterilibus. Mola porro conceptus causa hæc est. Quum multi
 menses modicum, & morbosum semen conceperint, neque foetus rectus fit, &
 venter plenus est velut pregnantis, nihil autem in ventre mouetur, neque lac
 in mammas generatur. Maxime autem turgida sunt, hæc itaque, & ad duos an-
 nos, sæpe etiam tres sic habet. Quam sententiã subintelligere proculdubio opor-
 tet de mola conceptu, quæ fit citra foetus generationem, dum videlicet solum
 mola generatur: quam postea citra graue periculum natura nequit expellere.
 Et subdit (vt pensum redeam) Et si quidem vna caro fiat, mulier perit, neq; enim
 fieri potest, vt superstes maneat: si verò plures, erumpit ipsi per pudendum san-
 guis multus, ac carnosus, & si hoc moderatè fiat, seruatur, sin minus, affluxu cor-
 repta perit. Quæ omnia expendisse oportebit, vt prædicere, & præcauere quæ
 futura sunt, possimus.

*Curadi-
 valio.*

Curacionem huic affectui non temerè, & vtcunq; aggrediendum esse arbi-
 tror: nam vt ex Hip. constat lib. nuper citato, non licet statim mola cognita, eius
 curacione tentare: quippe de grandiori hæc retulisse legimus. Hanc igitur ma-
 ximè quidem ne curato, aut certè cum prædictione. Quam finiam ego de mola,
 quæ citra foetus commercium generatur, intelligerem: nam credibile non est,
 ipsum velle locui de mola, quæ superest in utero post infantis exortum: hæc n.
 nisi ocysimè excernatur (ne cum hoc quidem) graue mortis discrimen impen-
 det. Quamobrem illam curare raro studebis, hanc vero protinus. In cuius cura-
 tione tria obseruasse Hippo. legitimus: primum quidem, utri & pudendarum
 partium emolliuionem, & apertionem: secundum, ventris inferioris purgatio-
 nem: tertium verò, & vltimum, in vterum infundit, quæ ipsum irritant, & ad
 excretionem lacessunt. Cui operi per cucurbitas principium motus quoq; præ-
 stat: inquit enim loco citato. Et primum quidem totum corpus fomento, deinde
 per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat (existimat quidẽ
 simul cū copioso sanguine comodius posse educi) fortassis enim quod compa-
 ctum est, commoueris, id quod foetus esse putatur, muliere à pharmaco concal-
 facta. Sed & uteros colluito, quo sanguinem educas, sin minus, subdititijs uta-
 tur è buprestis, & dictamum creticum in vino bibat, sin minus castoris testem,
 & retrò cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito, & plurimum san-
 guinem detrahit, atq; hoc maximè coniectura uirium ipsius facta. Quæ senten-
 tia videtur expressisse vniuersam extrahendi molam rationem. At mihi in hoc
 c. nulla alia medicamenta recensere est in animo, quàm ea, quæ c. præcedenti
 retulimus: nam, & foetus mortuus, & mola, quæ a partu superest, consimilem
 habent eductionis rationem, & eisdem pharmacis perficiuntur.

De

A De enixa & providentia. Cap. 7.

VT quotidiano euentu comperimus, licet à partus ærumnis, & laborib. infante in lucem iam edito, & secundis projectis, enixa immunis videatur, cura hoc tñ alios non minores, neq; minus graues, ac periculosos experiri frequenillimè conspicimus, quibus infantis in lucem editi gaudiū interdicitur. Accidunt sanè hi labores, & pericula hæc tribus occasionib. nimirum, ratione ipsius partus, aut uteri, & menstrui etiam sanguinis, qui expurgandus super est, aut alterius causæ interuentu, quæ affectum aliquem euocat, maxime cum menstruam purgationem interturbat.

Sic quidè ex partu multa super sunt vitia, quæ emendare oportet: nā vel rugæ in ventre remanēt, uterorū osculi laxitas, exulceratio, hæmorrhoides, uteri ipsius procidentia, aut fluxus sanguinis, uteri strangulatio, nam uterus eo tēpore tā quā feta siluestis propter subitam euacuationem, quasi uagando hūc, & illuc declinat: unde & suffocationes, & dolores grauissimi non solū in utero succrescunt, & dorso, ac reliquis vicinis partibus, uerum & in capite iecore, vētriculo & aliis partib. Prodit quoq; ob constructionem, quod sanguis supprimatur, & grauior efficiat cradatus, ac periculosi accidentia. Verū ex parte sanguinis, qui aliqn grumosis factus, aut alio ita ductus, mox a partu, & tormina, & alia penè innumera mala concitare habet. Ex iis aut, quæ aliis occasionibus succrescunt, non minus perfelitantur enixæ, q̄ ex vitio partus, uteri, aut sanguinis, nā & alui fluxus, & suppressio, & pedū tumor, malus corporis habitus difficultas respirandi, pleuritis, angina, febris ardens, & reliqui morbi acuti, acutiores & grauior enixis sunt, quā ex teris. Præterea sunt inter enixas aliquæ, quibus plerunq; profluit puerperium ita fetidum, & sordidum, ut deterius videat quouis alio morbo. Quod sanè enixis accidere constat multis de causis, præter humorum ex febre corruptorum abundantiam. Prima est putrefactio alicuius substantiæ intus relicte, ut mola, aut tunicata aliqua, vel sanguis, qui in inuolucris reperitur: altera causa est purgamentorum suppressio ob lac iam incipiens, & fiens: quo sit, ut detentus putrescat: vltima verò si in infantis exitu aliquid est diuulsum, & ob id suppuratum. Quorum omniū meminisse oportebit, & cuiq;

C providentiam, & curationem iuxta eius naturam, & feminae statum, adhibere. Grane quidem, & molestū est, feminas, quibus curæ est enixā moderari, perferre. Nisi. n. expulis, & vino liberaliter indulgeant, se nihil boni, & vtile enixæ præstare existimant. Habent insuper nescio quas leges, quæve statuta misericulis ita nocua, ut maiori ex parte grauiora, & maiora mala inde oriri conspiciamus, q̄ ex ipsis partus laboribus. Quamobrem posthabitis prudens, & generosus medicus eam aggredi providentiam teneatur, q̄ enixæ fore vtilem iuxta cuiusq; indigentiam cognouerit. Itaq; post partum ne pūdenda nimio madore, & humorum corruptione exulcerentur, ipsa extergere linteis mundis, aut spongia opus est: mox repōnenda est in lecto, obscuro existenti cubiculo, & ex aere, ac frigore præmunito. Stet insuper modicè patētib. pedibus, ut quicquid ex ea foras exire cepit non impediatur: pannis loca ipsa contegantur, ac mutantur eo tpe, quo minimè contrahant fetorem. Expēdit et oleo communi cum modico vino calido ventrem inungere: si verò partus laboriosus præfuerit, oleo amygdalarū dul-

dulcium calisto latera, & ventrem fouebis, quietemq; imperabis: ne vocib. turbulenti, & nimia loquela humores ad partes supernas efferantur, praepediaturque ob id necessaria purgatio. Victum his instituere oportet tenuem, & optimi nutrimenti, qualis est qui ex gallinis, & capis paratur, & eorum iusculis cum croco, & ciceribus, cauentes ab eorum cibis ex toto apium hortense. Verum ex carnibus parum primis diebus ministrabis: sequentibus vero plus. Aqua sit ex cinnamomo decocta vel ex corticibus citri, aut ex adianto: vel vinum porrigere, si ei femina assueta fuerit. Utatur etiam conferuis, quae vires habeant menses mouere, ni sufficienter profluxerint. Et item somnus imperetur, & omni animi tranquillitate fruatur; ne turbatione, aut animi pathemate aliquo, ad cor, & reliqua viscera sanguis confugiat. Profecto scitum dignum iudicari, quod Athenis olim brasea in cibo parabatur puerperis, amuleti cuiusdam vice, ut auctor est Athenaeus. Praeterea vestitum illi immutabis ad minus transactis a partu quinque diebus cauens vsque ad vndecimum diem enixam eodem modo, ac dictum est, studens purgatione euocare donec vigesima dies transacta sit: quod si ad quadragesimum vsque se extenderit purgatio, dum sua sponte sit, vtilius fore cense, sin aliter sat est ad vigesimum vsque diem praesidijs ipsam excitare. Si autem his res optime se gesserit, nil aliud agendum est, sin aliter, iuxta superuenientis mali conditionem praesidium adhibebis.

De torminibus à partu. Cap. 8.



TORMINA seu ventris inferioris dolorem ferunt primiparis non accidere: quod tanquam fabulosum aut non omnino verum ab legandum censeo: nam, & primiparis, & reliquis, dummodo causa eadem praesit, idem quoque malum accidere necessum est. Sunt igitur tormina dolores, qui post partum in ventre inferiore, & a renibus in laterum mollitudine, & inguinibus puerperis succrescunt, duorum aut trium dierum spatio per intervalla exacerbati.

Causa.

Fiunt igitur tormina post partum ob sanguinis, qui expurgatur concretione, & crassitate, nam cum venae, per quas natura ipsum expurgare nititur, assueta huic operi non sint, & sanguis ut pote diu retentus, concretus crassus quae, ac feculentus existat, necesse proculdubio est dolores, & cruciatus maximos fieri, dum eum natura per angusta loca trudere studet. Quod euidenter probari potest, quia per intervalla dolores, & cruciatus fiunt, parum uidelicet, ante sanguinis excretionem, & ipso excreto statim cessant, donec iterum natura plus expellere nitatur. Proficiscitur aliquando idem malum ex acriori, & mordace sanguine, quod comperies extenuitate eius, qui excernitur. Quibus accedit flatuosa substantia, quae, facta plus in utero tensione, grauissimos plerumque excitat dolores: quod fieri censemus commota crassa materia ad motum, quae ex se huiusmodi flatus effundit.

Plerisque etiam tormina succrescunt, quod uterus ex laborioso partu in aliquam ventris partem irruat: vel etiam ex suscepto a partu frigore in cautela exi-

- A** ta existente enixa, aut obstetricis negligentia. Cuius affectionis meminisse Hip. constat lib. de nat. mul. per hæc verba; Si puerperæ uteri in coxam incubuerint, aut ad lateris mollitudinem, ad sanam coxam oleum ægyptium album, aut bac carim vnguentum apponere oportet, & in sanam coxam decumbat. Qua sententia, & affectum, & præsidium retulisse constat. Quibus cognitis curandi rō tria profectō consilii: primum, sanguis attenuationem: secundum, eiusdem temperamentum, cui reducenda est flatuum dissipatio: tertium verò, viarum apertionem, & laxitatem, quo facilius fluat quod crassum est. Sic iuxta primam indicationem consultissimum est, si feminam cognouerimus biliosam esse, tenuibusq; & acris humoribus abundare, duas vel tres vncias olei amygdalarum dulcium recenter facti, cum saccharo, vel syrupo violarum ei præbere. Præstat quoque syrupus factus ex mucilagine citoniorum extracta decocto violarum: quibus innitendum plurimum non est, sed bis terve die ea tantum exhibebis: interim tamen haustum aquæ schorchioneræ, vel buglossæ porriges. Sunt etiā inter feminas quædam adedō audaces, ut mox à partu potum frigidæ porrigere audeant, & aliquando non citra felicem euentum. Quod sanè præsidium ijs, quibus acrimonia, & calore tormina fiunt, proficuum esse experimento comperimus; ob id quidem non omnibus, sed prædictis tantum abhibendum, idq; cū præmeditatione. Sed studendum magis est sanguinem extenuare, quo facilius fluere possit: cui etenim operi proficuum experimur decoctum, vel serapium adiantū, aut cinnamomi: sed efficacius existit quod recipit corticis vtriusq; cassiæ, cinnamomi, capillorum veneris, seminis anisi ana 3. ij. passularum sine granis 3. iij. fiant boli, aut citra passulas fiat puluis, qui exhibitus vino albo efficacissimus est. Præstant, & pulueris diacimini 3. f. sacchari 3. v. simul cum vino, vel aqua cinnamomi sumptæ: ex vsu quoque est seminis dauci 3. j. cum aqua adiantū. Hip. in super lib. 1. de mor. mul. huic malo sic subuenit. Si verò puerperij purgamenta in grumos fuerint coacta, & dolor in imo ventre fiat, porrum coctū, & quæcunq; siluestria, & hortensia olera dato, verū omnia pingua facito. Cæterum si cum animi deliquio tormina eueniāt, prædictis auxilijs cordialia phar maca admiscebis, quale est qd recipit diamargaritonis frigidi, aromatici rosati, & diacimini ana 3. j. sacchari 3. v. cum aqua adiantū fiat boli, quorum aliquæ cum vino sumat laborans. Sed ut partes patentiores fiant, mox a partu feminæ peritæ haustum olei præbere solent, quod ego probarem magis ex amygdalis dulcibus, vel loco eius aquam calidam cum cinnamomo, adianto, aut coricib. citri decoctam: ac si femina pituitosa fuerit, & sanguis crassus ex pituita, haustū aquæ naphæ cum semine occimi, vtilius est. Verum hanc, & præcedentem intē tionem implent inunctiones ex oleo anethino calido cū lana succida, vel oleo liliorum, sed quod vtilius existit, oleum de semine lini cum modico croco est, vel oleum ipsum de croco cum oleo naphæ, aut per se solum. Valet item vngnē tum hoc, quod recipit adipis anatis, butyri recētis an. 3. j. succi sampsuchi 3. j. & f. myrrhæ 3. f. medullæ ceruinæ, terebinthinæ, & mellis an. 3. f. corticis cassiæ, & aloges ana 3. iij. ceræ q̄tum sit satis, ut post succi consumptionē fiat vnguentum. Confert et cataplasma, qd recipit farinæ florum chamemali, fenu greci, seminis lini, fabarum, cimini an. 3. j. butyri recentis, adipis gallinæ ana 3. ij. cū oleo sambucino fiat cataplasma. Præstat quoq; aliud, qd recipit lutea ouorū cocta, & du-

ra numero vj. cumini puluerizati ʒ. iij. cum oleo liliorum, & anethino pista, & adhibe. Confert etiam plurimum multorum decreto, si cepa in vino vel aqua parum coquatur, deinde exprimatur, & in oleo communi frigidatur, ac vtero imponatur. Atq; hæc sunt, quæ inter alia pleraq; vsui probatoria reperio.

De immodico sanguinis fluxu post partum.

Cap. 9.



QUANTITATEM certam, ac legitimam purgationis à partu metiri, & rimari, tam difficile, quam esse medicum: nam coniecturam qua id venari autores student, difficilem omnino esse constat. Re-ferunt quidem purgationis tēpus in masculo puerperio finiri triginta diebus, in fœmina autem quadraginta. Verum vt res ita acci-dat fœminæ habitum, alimentum, vitæ studium, & reliqua in vnum coire tenen-tur, si cedere ex voto computationem velis. Et cum hæc omnia raro sic iuncta reperire liceat, ob id difficile est ex fœctu tempus metiri, & purgationis quan-titatem: licet à posteriori non leui ratione certiores fieri possimus. Hipp. autem lib. de natu. fœtus, volens ostendere purgationis tempus sic scribit. Puer moue-tur triginta, & duobus fœmina in quadraginta, & duobus, igitur puer perfici-tur in totidem diebus, & fœmina in totidem: sed quanto magis fœtus est maior, tanto magis trahit de sanguine, quanto minor, minus hoc. n. principium est na-turale, sicut primum sumptum ab experimento, ergo quanto magis processerint dies fœtus, tanto plus trahitur de sanguine, ergo tanto magis superest: & in principio cum minimum trahitur de sanguine, plurimū supererit: igitur in pur-gatione à principio magna quantitas sanguinis, & præseruabit in masculo ad dies triginta, in fœmina ad quadraginta dies perpetuo minuendo. Cæterū hæc demonstratio solum docet durationem purgationis, non quidem q̄tatem: nā-que non ostendit eōpiosam diminutamve esse: sed q̄tum durare possit. Quapp-alia opus est coniectura, quæ doceat q̄tum sit purgandum, & quid tanq̄ immo-dicum, & præter naturam habendum. Quod si Hip. mensurā sequi velimus lib. de nat. fœ. non minus errare nobis continget, q̄ ex præcedente dogmate. Inquit enim in puella ad triginta lebras q̄tatem fermè accedere, in masculo verò ad viginti, & duas: qui sanè sanguis concretus erit, & in frustra prorumpit. Atq; cū (vt dictum iam est) oēs vno mō, vnave viuendi rōne instituere vitam nequeant, sit facile, vt certa lex, & regulā in omnibus haberi nō possit. Scribit aut̄ Moschio certam q̄dam coniecturam, qua ipse nititur iustā q̄tatem, ac debitū purgatio-nis tps venari: inquit. n. Eo cognosces, q̄ sanguis vberimus fuit primus, secūdo feculentus, & paucus, nouissimè purulentus. Ex qua quoq; snā non minus ad q̄tatem metienda, q̄ ex reliquis deceptionē prodire credimus. Sed iterū Hipp. lib. i. mor. mul. rursus ad primam coniecturā, sed clariū redit dicens. Prodeunt aut̄ puerperij purgamenta sanæ mulieri sufficienter: primū sesquiheminæ men-sura, aut paulò plura, postea adhuc pauciora iuxta hanc rōnem, donec cessent. Prodeunt aut̄ velut sanguis a victima, si sana, velut dixi, mulier fuerit, & sana fu-tura est, & cito congelantur, ac purgantur, & post partum plerunq; sanæ mulie-ri contingit: vt post puellæ partum in quadraginta, & duob. dieb. diuturnissime purgatio fiat. Extra periculum aut̄ est, et si viginti quinq; diebus purgetur: post masculū

A masculi vero partum purgatio diuturnior fit in triginta diebus: extra periculū est ēt, quæ in viginti diebus contingit. Et in ijs, quæ fetus corrumpunt, secundū horum dierum rationem purgatio contingit, & in iunioribus, quæ corruperūt, paucioribus diebus: in senioribus autem pluribus. Quia in re ego cōem illam Hip. de conferentia, & tolerantia coniecturam, certiorē esse arbitror, adhibito in considerationem feminæ habitu, vitæ instituto, & reliquis, quæ his similia existunt. Quia facta coniectura, cum vacationem feminæ vires excedere cōpersiamus: tria imprimis animo conijcere oportet: primum equidem quantitatem fluentis purgationis posse esse vel copiosam, vel immodicam, vel immodicissimam. Primam naturalem existimamus iuxta Moschonis decretum, q̄ sit ex suppressi sanguinis ratione facta: reliquas uero præter naturam. Quarum priorē immoderatam censemus, quod vires prosternat resolutis spiritibus, ac imminuto calore: cuius signum est pulsus debilis, & frequens, impotentia, & cibi fastidium visus tenebrositas, aut imminutio, vel grauis auditus, aut tinnitus aurium. Alteram, q̄ immodicissimam esse diximus, compescere quidem protinus oportet, quia interitum ocyssimè minatur: id quod animi deliquium, & conuulsio euidenter docent, vt ex Hip. constat 5. apho. 54. dicente. In fluxu muliebri si conuulsio, & animi defectus aduenerit, malum. Quod uero conuulsio, & animi defectus, per se malum, sint, nemo ignorat: sed cum dixit, malū, aliquid amplius significare voluit: hoc est, citra hæc accidentia inopinato non raro ex immodico fluxu mortem aduenire, femina somnum simulante; quod medicum cauere magna diligentia decet, quia sæpe id euenisse certum est. Præterea, idem Hipp. lib. 1. de mor. mul. signa, & rationem huius affectionis adducens inquit. Si fluxus in utero abortus fuerit, sanguis multus fluit, & grumi compacti excidunt, & dolor occupat lumbos, & laterum mollitudinem, ac inum ventrem, & durus est venter, & ad contactum dolet, & rigor, ac febris acuta corripit, & debilitas oboritur, & omnia, præter humeros, ac scapulas, dolet, & calor inuadit, & rubescit, & venæ duræ fiunt, ac renitentes, morbus hic maximè fit ex abortu. Quia sententia quantum mali afferat huiusmodi affectio, euidenter constat. Ob ea, q̄ diximus, mala, mox a partu puerperij purgationem considerare oportet, conferentiā, & tolerantia quoq; Quæ sanè ex pulsibus, & reliquis vitæ actionib. intueri poteris. Quod si immodicam esse vacationem constet, non cōpescas vt in reliquis corporibus, neq; protinus, neq; eiusdem auxilijs, sed moderati opus est victu, potus & ijs, quæ quodammodo firmare habent laxas vteri, partes. Cuius census est, transacto fluxionis impetu, si vires labi comperiamus, syrupus de rosis siccis cū aqua, in qua sæpius aurum sit extinctū, leuis ēt brachiorū frictio, cibibus ex carnibus assis, ex amylo, & reliquis, quæ moderata esse lib. huius operis primo retulimus ita, vt non ex toto cohibeatur fluxus, q̄ secundū naturā sit, & immoderatiā tū peccet. Quippe eum ex toto cohibere, erisypelas, tumores, vel alia præter naturā vtero succrescere efficit, & laboranti ēt difficilē accersit respirationem, suffocationē, ac non raro mortē. Qd ēt veritus fuit Aui. fen. 2. 1. 3. trac. 2. c. 33. Cæterū in his expendisse oportet, an mox a partu sanguinis profusio acciderit, nā euidentē sit argm̄, ex vasorū apertione maiori principium sortiri: vel ex impetu, qui inceptu semel fluxu cohiberi nescit. Quia rōne censeo Aui. li. citato 6. 34. dixisse, ex vsu esse manus ligare, & supnas partes, quasi studēs natura im-

*Cura de
ratio.*

petum frenare dolore & frictiōibus ipsa alio enocata. Sic ob viarum laxitatē A
 consult acetum super ventrem ponere: quod ego non nisi formidanter adhibe
 rem. Docuit ēt (quod securus est) ventrem ipsum inungere oleo myrtillorum,
 sparsis desuper pulueribus succini, balauustiarum, & thuris: vel hæc eadē cū vi
 no auctero. Quorum omniū nos lib. j. maximam adduximus copiā. Quod si vltē
 rius fluxus subsequatur, vitium sanguinis cām præstitisse coniectandum est, &
 optima vitæ rōne in cibo, & potu instituta, tē moderari oportet, vt citatō c. dixi
 mus. Verū si immodicissima fuerit sanguinis profusio, ad quāq; auxilia q̄tū
 uis grauiā deueniendum est, satius quidem existimo, malum aliquod vtero, aut
 toti corpori inferre sanguine suppresso, q̄ in vitæ desperatione dubium pericu
 lum vereri, præsentī, & grauiori posthabito. Quamobrem scito nil huiusmodi
 profusionibus citius subuenire, q̄ viriliter comedere, vt & calor renocetur, &
 natura distrahatur, alliciaturq; ad confectionem alimenti. Ex quo inter alia bo
 na vires ēt refici contingit, & partes faciliē restanrari. Quod si id prodesse non vi
 deatur, ad prædicti c. auxilia confugiendum est. Quatenus verō ad somnum at
 tinet, puerperio immodicissimē fluente, scito somnū nulla lege conuenire, ne B
 partes internæ calidiores factæ vberius sanguinē fundant. Quod si aliquis is con
 ueniens videatur, id profectō est, cum aliq̄tūlū auxilijs fluxum restitisse cōpe
 riamus. Interim tñ, si diutius duret fluxio, somnus conciliandus est, maximē ijs,
 q̄ frigida, & astringentia existant, parcissimus tñ, & a quo repente, & cum leui
 animi turbatione excitetur. Nec sola permittatur femina dormire, sed præsentē
 aliquo, qui respirationē, & pulsū intueatur, ne vitam in somno deficere con
 tingat. In quo sanē casu exusu fore arbitror, præter alia auxilia, quæ c. sapius ci
 tato diximus, ijs vti, quæ Hip. consult lib. de nat. mul. dicens. Si fluxus oboriat
 tur, cancrōs fluuiatiles in vino suffocato, & vinum bibendum dato, & quæ sic
 cant, suffito, & apponito. Item eodem loco inquit. Si fluxus suboritur, muli
 stercus combustum, tusumq; ac cribatum vino dilutum bibat. Et subdit; Si flu
 xus suboritur, & iam diuturnus fuerit, spongiā combustā, ac tritam vino
 dilutam bibendā dato, & per suffitus resicca, & quæ astringunt appone: & for
 tasse nullo alio in casu licebit, quæ astringunt, in puerperis adhibere. Sic lib. i.
 de mor. mul. commendat ad immodicā puerperij purgationem præsidia non C
 pauca his simillima.

De diminuto sanguinis fluxu post partum. Cap. 10.



DICTVM præcedenti c. est, naturalem in partu purgationē ne
 cessario copiosā fore: ex quo euidenter constat in medio sitam
 esse diminute, aut ex toto suppressē ex vna parte, vel immodicē,
 ac immodicissimē profusionis ex altera. Sic etenim, cum copiosē
 natura fundere sanguinem nequit, diminutam, si ex toto cohi
 beat, suppressā efficit necessariā hanc, & proficiuā vacuationē. Quod equi
 dem siue in abortu, siue in partu legitimo, aut laborioso fiat, grande minatur pe
 riculum. Quippe vel febres, vel difficiles respirationes, anginas pleuritides, pa
 raplexias, maniam, melancholiam, ac non rarō phrenitidem fieri cōspicimus:
 vel in vtero graue aliquod malū, vt optime animaduertit Auic. 2. 1. 3. tra. 2. c. 35.
 Quod

A Quod intelligere oportet, nisi sudor aliquis copiosus erumpat, quē millies feminas ab his periculis eripuisse experimento didicimus. Eadem quoque mala refert Hip. succrescere li. 1. de mor. mul. dicens. Quum mulieri, aut partus purgamenta, aut menses non prodierint, aut etiam uterus durus fuerit, dolor hēt lumbos, & lateris mollitudinem, & inguina, & femora, & pedes amare dolet, & uenter attollitur, & horrores per corpus discurrunt. Ex talibus aut febres fiūt acutæ. Quæ quidem sententia constant, & signa, & accidentia, quæ in hoc affectu reperiuntur, quæ maioris mali præfagia sæpe existunt. Rō quidē in prōptu est, quia licet mensium suppressio omnis, quæ fit ex aliqua causa præter naturā mala omnino sit, ea tamen deterior est, quæ fit in puerperis, a partu, ut docet Gal. li. 3. epi. par. 3. com. 7 3. quod sanē fit, & ratione multitudinis, tum ē uitii, & prauitatis, quia ut idem autor lib. de atra uile refert, si quid boni in mēstruo sanguine est, id in vniuersum absumitur in alimentum fetus, quidquid autem vitiosum, & mali in venis detinetur, & ad tempus vsq; partus adseruatur, quod postea per multos dies excernitur, quo fit ut atrebilis plerunq; naturā referat: immo ut idē refert eodem 3. pop. vrina quoq; idem referunt, nam fuliginosum qd præ se ferunt, itaq; ut ipse dicat. i. pop. par. 3. com. 21. virulentia & mille alia vitia præ se ferre necessum esse. Ex quo sequitur puerperas in quib. purgationes a partu supprimunt, grauissimis morbis semp corripī. Nā si in vtero præsit is sanguis inflāmationes, & alia uitia excitare habet, sin aut in uniuerso corpore ut 2. prori. com. 48. testatus est Gal. varios morbus, & pericula adfert, pro uaria natura partium in quibus sanguis ille colligitur, atq; his item accidit, præsertim morbo aliquo affectis, album pro utero fluere, q̄ profectō difficilis iudicationis non rarō causa existit, quod non sit conueniens illa uacuatio neque regio, cuius etiam prouidentiam obtinere oportet. Quamobrem cunctandum nō est ocysimē præsidium adhibere: nam si semel aliquod ex prædictis acciderit, difficulter, dum inueteratur, præsidium admittit.

C Sunt quidem huius affectionis plures causæ, externæ non pauca, & internæ reliquæ: siquidem uociferatio, splendor, risus, subita perturbatio, vel quoduis aliud animæ pathema (præsertim si subito fiat) aut aeris frigidi accessus, vel aquæ intempestiuus potus, aut immoderatus alimenti vsus, & reliqua huius celsus id malum frequentissimē accersunt. Sic quoque sanguinis, crassities, abundantia quæ obstruat, viarum structura, alicuius partis dolor, labor, aut imbecillitas, vel omnino puerperii purgationem supprimunt, vel imminuunt. Adducit etiam Hip. lib. 1. de mor. mul. alias causas, nimirum dnm uterus reddit a partu angustior, ut mox clarius monstrabo.

Sed præter signa, quæ lib. 1. c. de suppressione mensium adduximus, placuit hic scribere quædam huic affectui peculiaria, quæ morbi naturā, causam, & hinc rurum euentū cōmostrant. Inquit. n. Hip. lib. de nat. mu. Si ex partu non fuerit purgata, tumet uenter, & crura, & rigor, ac dolor imum uentrē, ac lumbos tenet, qñq; ēt ad uiscera ascendit, & animo linquitur Atq; hæc patitur incipiente morbo, progressu uero temporis cauæ faciei partes rubescunt. Præterea sic scribit li. 1. de mor. mu. Si uero ex partu non fuerit purgata, uenter intumescit, & splen, & crura, & febris habet, & rigor corripit, & dolores profiliunt ad lumbos aliquando, etiā ad uiscera, & perfrigeratur, & febris habet: pulsus debiles sunt,

Pag. 289.

Causa.

Signa.

Pag. 284

sunt, & aliquando acuti, & alias attolluntur, aliàs deficiunt. Lib. etiam eodē in-
quit. Si verò paulò pauciora, quàm oportet prodierint mulieri puerperii purga-
 mēta velut vteris angusto ore præditis, ac distortis, aut aliqua pudendi pars val-
 dè fuerit conclusa ab inflammatione. Mulier acutè febrit, & stomachi dolore
 vexatur, & dolet totum corpus, molestè fert, & ad articulos manuum, ac crurū
 & lumborum dolor procedit, & locum circa collum, & spinam, & inguina do-
 lebit, & quædam corporis partes impotentes fiunt: postea calor quietus erit, &
 valde manifestus. Idem etiam, refert lib. i. de morb. mul. aliam causam scribēs:
 inquit enim; Si vteri angusti oris ipsi fuerint, & puerperii purgationem non
 emiserint, inflammantur; & si non curentur breui, omnia magis ipsi affligent,
 & dolor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammati fuerint vteri, sua
 sponte exit malum graueolens, & liuidum aut nigrum grumosum, & mulieri
 puerperii purgamenta purgantur. Quandoq; verò non exit, sed mulier mortē
 portendit, nisi quis breui venam secet, aut ventrem emolliat: præstat autem etiā
 clysterem adhibere: si verò ad vomitum facilis fuerit, etiam vomitum induce-
 re. Melius autem est lorium ciere, & exsudare (à quo loco Auic. suum dogma su-
 perius scriptum desumpsisse arbitror) verum in his occasio optima est, cū opus
 his fuerit. Quibus sententiis constant causæ, & cuiusq; signa, & accidentia, ac
 periculum huius affectionis, necnon & veram curandi rationem.

*Curā di-
 uisio.*

Quibus sic breuiter consideratis, medendi ratio duplex erit, altera quidem,
 quæ causam respiciat, reliqua verò, quæ imminens periculum ob audactam ple-
 nitudinem ex diminuta purgatione contractam demat. Antè tamen quam hinc
 discedam aduertisse oportet, quod si sanguinis purgatio supprimatur, quod ad
 mammas sanguis recurat, considerandum tunc est, an mulier nutrix futura sit
 necne. Si primum non protinus sanguinis detrahes, sed primum naturæ impe-
 tum spectabis, & postea sanguine ex talo misso, aut aliter, vel cucurbitis femori-
 bus affixis purgationem euocabis. Quod si plenitudo in morbum de generaue-
 rit, tertia alia succrescit indicatio, quæ morbo prouideat iuxta cuiusque naturā,
 ut c. sequenti docebo. In hac etenim curatione tanquam peculiare præceptum
 expende, præferendam esse (nisi quid aliud obstiterit, ut alui fluxus) indicatio-
 nem futuri, & imminētis mali cæteris omnibus: quod facies proculdubio si
 plenitudine ocysimè demperis vena scissa. Id quidem hac præmeditatione fa-
 cies: si puerperii purgatio ex toto suppressa sit, id tibi sit obseruatissimum præce-
 ptum, & quod primò fieri debet si verò solum diminuta sit, non est extra ratio-
 nem optimi consilii (posthabita plenitudine, quæ principium futuri, & immi-
 nētis mali est) aduersus causam, quæ plenitudinem ipsam congregauit, primò
 aliquid agere: ac si non, ut par est, profuerit, ad plenitudinem demendam dein-
 ceptis confugito. Sed viuendum est primò quo modo causis internis prouiden-
 dum sit. Si comperiamus quidem alio sanguinem confugere ob dolorem, labo-
 rem, vel quamuis aliam cūm, protinus iis, quæ ad vterum sanguinem euocent,
 utendū est frictionibus, ligaturis cucurbitulis suris, & femorib. affixis cū copio-
 sa scarificatione, sed primò citra ipsam. Quod si malum vrgeat, in his immoran-
 dū nō est: sed, p̄tinus ad inferas partes sanguinē euocabis vena tali semel, aut bis
 scissa, nimirū q̄tū sat sit, ut uel retrocessus fiat, uel copia minuat. Quo facto, mē-
 bri recipientis cura habenda est iuxta eā, quā obtinuerit, naturā, aut affectionē.

vt se-

A ut seq. c. docebo. Verum si sanguine sufficienter misso quantum vires permiscerint, cognitum sit, suppressionem inuare ipsius crassitiem (ut ex ipso sanguine facile erit rimari) quæ attenuandi vim obtineant, sunt adhibenda: quem usum præstat oleum de croco, de cinnamomo, de liliis albis, de spica nardi, de napha, de angelica, quibus si theriacæ modicum addideris, multum profuisse comperies. In quem sanè usum adduci possunt Hip. auxilia lib. de natu. mul. scripta his verbis. Si uteri conclusi fuerint, & menses non apparuerint, colocintidem siluestrem, & sulphur semen, cuminum æthyopicum, nitrum, salem thebaicum, adipem renalem, farinam, myrrham, & resinam, omnia hæc feruefacito, simulque mixta, ac trita in glandulam efformato, ac apponito. Profunt quoque forus ex decocto rerum calidarum, & tenium partium, maximè in oleo facti, & ex omnibus, quæ superius diximus, inunctiones posse fieri. Conferunt & infusiones in prædicto oleo calido, vel suffumigium ex bdellio, sinapi, & mirtha, vel cum oculis, aut capite piscis saliti, vel cum vngula equi, aut asini. Post modum uerò si hæc non profuerint (uiribus non plurimum habentibus) ad sanguinis ex talo effusionem venire consulit Auic. quam lato foramine efficere opus est, ut crassioris sanguinis aliquid educi euacuariq; possit, si prius, quæ per superna sanguinem extenuare posse diximus, exhibueris. Inter quæ primo porriges succum borraginis, porrorum, & petroselinum cum uino, uel oleo amygdalarum dulcium, maximè si utaris suffitu ex vnguibus, & cornibus capræ. Quo facto adhibebis decoctum grauinis, cinnamomi, adianti, pimpinellæ, casia, satureiæ, & similitum cum croco, quorum magnam copiam capit. de suppressione mensium lib. 1. reperies.

At si ab osculorum venarum structura id malum proficiatur, quæ molliendi, & laxandi uentrem, & uicinas partes vires habent, adhibenda esse consulit rei natura. Quamobrem primò sanguinem copiosè fundes, ac si facta semel, aut bis sanguinis detractione vires non suffecerint, cucurbitas quoq; fœmorib. aut furis affixis scarificabis, quo facto ventrem inunges oleo amygdalarum dulcium, sesamino, de uitellis ouorum, de liliis albis, & de baccis lauri cum dialthea, axungia gallinæ, & medulla crurium uituli. Profunt & prædicta fomenta ex uino dulciq; oleo facta, maximè si in eis bullierit hypericonis aliquid: cinnamomi, radicis, vel seminis angelicæ, casia, vel quid simile. Quem quoq; vsu afferunt, præter pessarium superius ab Hip. adductum, infusiones, & clysteria emollientia, & potus aqua calida, præsertim si aqua ex medicatis sit, in qua ferbuerit cinnamomum, fœniculum, casia, & cortex citri. Quod si sanguis abundantiam suppressioni causam præstare certum sit, nullo auxilio tutius, & certius malo medeberis, quam copioso sanguine per uenas tali effuso: tunc enim natura potentior reddita supra residuum, id facilius consuetum sibi locum expellit. Ac licet non sit quod natura excernitur, aded, copiosum, non ob id mirandum est, si præcessit copiosa sanguinis detractione, quæ maiorem quantitatis copiam imminuit. Atque hanc oportet prouidentiam in ijs, quæ pepererunt obseruare, ne puerperium in aliud grauius malum commigret.

De recta curandi methodo adseruanda in ijs affectionibus, quæ enixis
superueniunt. Cap. II.



IL profectò, iudicio nostro sceminis grauius, molestius, & pe-
riculosius accidere potest, quam a partu, aut abortu, post tot la-
bores, & ærumnas, morbum aliquem succrescere, tum quod
difficiliter eum post partus accidentia tolerabunt; tum etiam
ob corporis imbecillitatem; tum vltimo ob difficilem curan-
di viam, quæ in enixis habetur: quod puerperium neque ipsi
morbo sufficiat, neque alia admittat præsidia. Neque rursus medicis quid an-
xius, & difficilins, & vrgentius in re practica contingere potest. Quamobrem
paulò diligentius rem hanc oportebit, vt prudenter ac generoso, animo quisq;
citra cunctationem quod opus fuerit, aggrediatur, ac vereatur quæ profutura
sunt imprudente præterire.

*Puerperii morbi ex causis
morbi sunt.*

*Morbi ex
suppressione puer-
perii.*

Succrescunt proculdubio enixis morbi post partum vna è duabus causis, vel
ex ipsius puerperii improspere purgatione, modò diminuta, modò exuperans
fit: vel ex morbo corporis apparatu, quem dolores, & labores partus excita-
runt: præter quos nec tertiam aliam reperies. Nam plerisq; accidit etiam si pro-
be purgentur, in medio purgationis tempore externam causam euenire, quæ
febris vel alterius mali occasionem præstet, vt Hipp. refert lib. I. popu. part. 3.
Philini vxori in thaso accidisse, cui probè deinceps procedente, fortasse ob cau-
sam externam, aliqua purgatione febricitabit ex recursum materiæ ad hepar, &
interiores vteri venas, quo erysypelas vtero succreuisse credendum est, & in he-
pate inflammationem, quod ostendunt hepatis adiecta signa. Quam sanè historia
constat, non sat esse purgationem ex ratione fluere, sed fluxuram sperare, &
præcauere ne præpediatur. Quippe causæ externæ alteram prædictarum, vt v-
tranq; commouere prius tenetur, quàm in affectum aliquem prorumpere pos-
sint, ni morbus genitus ex solutæ continuitatis genere sit. Sic in miserrimis vt-
cunque suppressa puerperii purgatione conuulsiones paraplexias, ardentes fe-
bres, maniam, melancholiam, anginam, difficilem respirationem, pleuritidem,
sanguinis sputum, alui fluxum, dysenteriam, sanguinis vomitum, hydropem,
animi deliquia, syncopim, & pleraque alia mala accidisse frequentissimè com-
perimus. Quam sanè morborum differentiam faciliè distingues, si puerperi quæ-
ritatem modum, ac substantiam diligenter intuearis. Quoniam si nihil fluat, si
diminutè, si cum torminibus, & grauioribus symptomatis, si sculentum, corru-
ptumve vtrunque aliter excernatur, vel calore partes pudendas exulceret, vel
ob admixtam alienam extraneamq; substantiam præternaturale & diuersum a
puerperii conditione, siue mola sit, siue quid aliud, quod cum eo excernatur:
credibile quidem est, quod intus relinquitur, morbo materiam præstaturum.
Idq; maxime periculum subeunt quæ abortiunt sceminæ, quibus grauiora ma-
la frequentius succrescunt, vt ex Hip. colliges 3. popu. par. 2. in historia eius quæ
apud Pantimedem ex abortu igne correpta est, & ex historia vxoris Oecete. At
si partus laboriosus sit, scemina primipara, & corpus viuosis succis abundans, si

uita

A vita præcessit intemperata victu, potu, aut exercitiis, si aliquo morbo ante partum præueniatur, etiam si optimè a partu purgetur, rationi videtur consonum morbum non ex puerperio, sed ex reliquo corporis apparatu principium sortiri, ut accidit mulieri, quæ decumbibat in foro mendacii, ut refert lib. 3. pop. par. 2.

Quibus equidem sic cognitis, ut unde morbi principium sit sumendum, & computationem dierum ipsius ineunda discas, expendendum est, a quo morbi principium desumere liceat, cuius rei gratia distingues, an affectus proficiatur ex puerperio, tunc. n. certum est, non a partu, sed ab eo die, quo in puerperio aliquod vitium apparet, computationem ineundam esse. Nam si primis diebus purgationem prosperè successisse constet: postmodum verò, vel supprimatur, vel utcumque aliter vitietur, ab eo quidem die rationabile est computationem esse sumendam; ut in Philini vxore Hipp. aperte docuit. Verum si certum sit morbum corporis apparatus affectum prorupisse ob partus labores, mihi non est dubium, quin ex die partus principium computationis sumi debeat, tanquam ex causa, quæ affectum creauit, velut accidisse constat Dromeadae vxori, quæ filiam cum peperisset, mortua est ex febre acuta septimo a partu, & sexto ab acuta febre. Quamobrem mirum videri non debet, si apud priscos illos medicos sapientissimos, & apud neotericos etiam comperiamus nunc a partu, nunc verò a die morbi ceptam computandi rationem, nam prout affectus principium sortiebatur, ita computationem exposcebat. In aliis verò, quæ instante partu ægrotare ceperunt a die ipsius mali ineunda computatio est, ut in vxore Epicratis Hipp. docuit li. 1. pop. par. 3. Quod si quis a die partus velit computare, non errabit, quia iam labores illi ex instante, & incipiente partu aderant. Quæ sanè mala, & alia quæ puerperis euenire passim conspiciamus grauiora, & plerumque ex filiarum quam filiorum partu cernimus, quæ excrementis magis abundant eaq; sint spurcissima, & grauiora, quod non immerito signat Hipp. dicens filiam peperit, quæ si insinuant non esse paruam mali occasionem.

Pari quoque causa in recta medendi ratione, rem hanc varietatem aliquam nancisci comperimus, quippe affectus, quos suppressa purgatio incitat, duplicè omnino medendi rationem sibi acciscunt: alteram, quæ ex puerperio proficiatur: alteram verò ex particula, quæ affectum susceperat. Illa proculdubio duplicem prouidentiam commendat, unam, quæ quantitati prouideat, alteram, quæ qualitati: hæc verò membrum præcauet, quominus recipiat, & impetum humoris ad ipsum fluentis, vel compescit, vel ad vterum transfert: nam ad aliam partem deferre tutum non est. Sic omnes, qui ex puerperio diminuto, vel suppresso proficiuntur affectus, hanc vnum habent communissimam curandi rationem, copiosiores nimirum excitare purgationem. Quod si vel nequiuert, vel remoretur, vel affectus citius, & maiorem prærequirat diligentiam, tunc quidem altera vacatione, quæ ei sit affinis defectum supplere opus est. Quamobrem venas tali inscindimus, vel cucurbitas in suris, & fœmoribus affixas sacrificamus, uel si ex toto puerperium supprimatur, & nullis remediis cesserit, ut non speremus iterum rediturum, hemorrhoides euocamus, quæ ob partium viciniam defectum purgationis vteri mirè adimplent. Quod si vel parum, aut nihil profluxerit ex vtero, coniectandum est, an sanguis a natura purgatus puerperij

Morbi ex puerperio quomodo curandi.

*Purgatio in
puerperis
et in
feto.*

rii quantitati, vt par est, respondeat: ac si ita sit, tunc vltra est considerandum an affectus maiores, & plures præstet cacochimia, quàm plenitudinis notas. Nam eo tempore cessante purgatione vteri, vel si parca fuerit, aut impuri sanguinis, ac vrgenti malo, purgationi humorum innitendum est in quouis affectu pro idea humoris peccantis. Nec vereri plurimum oportet affectu vrgente purgatione vti, etiam si aliquid per vterum instillet, dummodo sanguis nō sit: si enim purgamentum aliud fuerit, verendum non est. Quippe non raro pleraq; mori conspiciamus, aut in graui aliquo periculo versari, cum medici timidiore facti purgare renuunt sperantes, donec ex toto purgamenta illa fluere desint. Quam obrem tutius mihi videtur consilium, si vacuatio illa sufficiens non videatur, purganti medicamēto vitiosos humores copiosius expurgare, vt deonerata natura facilius, quos adseruauerit, concoquat, ac pellat, modo per vterum, modo per signatam aliam regionem: nam mihi non erit impedimentum: per aliam regionem ab vtero naturam reuocare, si per ipsam vacuatio facta nō sufficit, & affectus vrgētiōr indies fit. Tutius enim est subito causam deponere, quantum affectui sufficiat, quam parca vacuatione à natura facta contenti, auxilium differe, donec ex toto natura succumbat, & nihil subinde proficit.

Cæterum si affectus ex immodica puerperii purgatione suboritur, prudenti coniectura pensitandum est, quantum id, quod profunditur, excedat naturalis purgationis puerperarum copiam: vel quantum vires prosternat. Et nulla ratione antè prouidendum est affectui, quàm profusioni, si immodicam quoad debitam quantitatem, vel vires esse comperiamus. Verum si tempore, & duratione copiosior potius, quàm subita quantitate, & immoderantia extiterit; tunc affectui prouidendum primò est, & profusionem moderaberis medicamentis, & alimentis.

*Dexteras
oculis habendo*

Sed maiorem prorsus, & grauiorem infert dubitationē affectus, qui ex morbooso corporis apparatu proficitur, vtero sese optimè expurgante. (Nam si rectè non purgetur, prædictam diligentiam requirit) quod eo tempore nec reuocare neq; citare vteri purgationem liceat, nec rursus naturam aliis vacuationib. distrahere, aut aliquam illi contrariam mouere. In quo sanè ancipiti casu vel affectus exacerbabitur nullo facto præsidio: vel si aliquod præstiteris, natura à proprio munere distrahetur, & fortasse puerperium præpeditum fiet materia morbi. Quamobrem tunc videndum est purgata ne satis femina fuerit, an minime: quod si puerperii purgationem, vt par est, præcessisse compertum sit; aliam, qualem affectus postulauerit, excitare, si vrgentiſſimus fuerit, non erit ab re. Si verò mitior, tenuiori victu, & optimo viuendi gñe affectū conterere satius erit, quam ob leue periculum incertum, in grandius, & certius naturam deferre distractam à necessaria, & consueta vacuatione. At si compertum fuerit puerperium satis naturæ non esse, nullum aliud reperire poteris præsidium, quàm vteriorefficerere per vterum purgationem, vel per aliquam ex iis, quas eius defectum antea supplere diximus. Consimilem quoque curationem scribes, si ex causa aliqua procatactica affectum proficisci cognoscas, facta prius coniectura, vtrum ex hic causis continentibus exterior moueat aliquam: nam si puerperium vitiet, vt illi conuenire diximus curationem institues: si uerò morbosum corporis apparatus, vt mox dictum est. Verum vt exactius intelli-

gas

Agas quid in unoquoque affectu agendum sit: proponam exempli gratia grauior affectus, quos enixis frequentius accidisse comperimus: illicq; adscribā peculiarem curandi rationem prout puerperarum status exposcere uidetur.

Quod frequentius ijs, quæ pepererunt euenire scimus, febris quidē est, idq; plerunque febrilem enixis, vt constat ex Hip. lib. 3. pop. par. 3. in historia eius quæ decumbebat circa frigidum, & lib. 4. par. 3. in historia uxoris Cycici, quæ gemellas pepererat, quibus non solum febrile, sed & periclitari non raro contigit: nam rationi videtur consonum, cohibitam semel menstrui purgationē (maximē quod feculentum ex fœtu superest) aliquod posse contrahere vitium, quod licet aliquo tempore leue sit, & occultum, ex aliquo tamen partus labore vel errato, aut sola fœtus commotione in putredinem, ac febrem degenerat, vel reliquum totius corporis apparatus conspurcat: haud secus, quam vehemētes dolores efficere habent ubi corpus humoribus abundat. Sic. n. Epicratis vxori accidisse retulit Hip. li. 1. pop. par. 3. tex. 22. cui ex partus laboribus præexistēte in corpore apparatu, rigor non mediocri superuenit, quo tertio die a rigore filiam peperit, & omnia ritē habuit. Quam postridie partus febris acuta inuasit: In cuius enarratione constat crudos, & biliosos humores abundare: illos, quia riguit citra febrem; hos uerō, ob accidentia, quæ deinceps annumerat. Cui consimilem affectionem recenset eod. li. tex. 28. in Dromeadis vxore, quæ filiā enixa, postridie a partu rigore, & febre correpta est; licet partus optimē successisset tamen ex commotione morboſi apparatus id malum principium duxit. Cuidā ē mulieri, quæ apud Pantimedem degebat, idem malum accidisse refert. 3. pop. par. 2. tex. 7. dicens. Ex abortione infantis, primo die igne est correpta. Quam equidem ex abortus labore febre affectam fuisse euidenter constare arbitror, sicut alteri accidit, cui ex abortione ad quintum mensem febrem succrenisse refert tex. 8. & 9. Plures quoq; alias facillē reperies, & experimēto quotidiano discēs: sed longē plures ex retentis, vel improbē purgatis a partu mensib. Quod sanē uxori Philini in Thaso filiam enixæ contigisse retulit Hip. 1. popu. p. 2. tex. 21. quæ igne est correpta 14. die a partu, cuius computationem ab eo die instituit Hip. q. ex suppressa purgatione, vt Gal. primis commentarij verbis retulit, laborare cœpisset. In reliquis uero, quas nuper retulimus, iuxta optimam rationem est computationis principium sumere a die laboris & partus, ut ex historijs satis patere censeo. Sed febrem accidisse ex mensium suppressione mulieri cuidam, quæ apud frigidam aquam in Thaso egrotabat, retulit Hip. lib. 3. popu. par. 3. tex. 75. quæ licet ante partum febricitasset, tertio die a partu acutā inceptit febrile præcedente rigore ualido.

In quibus sanē febribus, & in ijs, quæ similes existunt, omni studio curandū est inceptam naturę purgationem cōplere, si eius defectu morbo traxisse principium constet: sin aliter, & ab apparatu morboſo suboriat, per eandē regionem (nisi urgentissimus fuerit affectus, & ex propinquiore loco expostulauerit euacuationem) euocandam esse naturam, omnes uno consensu docent, idq; euidentius Hip. qui balneis, seu (ut Gale. docet) pēsis utebatur, quibus purgatio euocaretur, & inflammatio subsideret.

*Curatio febri
a reſto puer
lenio. et a mor
boſo apparatu.*

Sic

Sic equidē li. i. pop. par. 3. tex. 21. retulit; & eadem parte in historia Hēpycratis vxoris inquit. Per suppositum autem hæc releuata sunt. Nos autem eandem rationem in sequentes, suppositis seu pessis, qui menses moueant, vtendum esse censemus. Sed tutius quidem mihi videtur, ad maiora auxilia manus extendere, quia febrium furibunda conditio rarò tandiu differt symptomata, & grauiora mala, quæ solēt afferre, quin aliquod protinus præsidium adhibere sit opus. In quo sanè malo (si nobis constet ex lactis vbertate febrem non oriri; qđ prius, quam auxiliares manus adhibeas, distinxisse est necessum ex mammarum durtiē, turgentia, dolore, calore, cum dorsi, & scapularum grauitate, & calore) sanguinem quam citissimè mittes ex tali venis, quantum sufficere videatur ad plenitudinem deponendam, vna aut repetitis vicibus. Postmodum verò si vires vltiorem sanguinis profusionem per venam magnam non posse ferre videantur: purgationem euocabis, & sanguinem quoq; minues, affixis, & scarificatis cucurbitulis fœmoribus, & furis: aut, si mauis, per mariscas id facito. Cessante autem protinus puerperij fluxu, transactòq; statuto purgationis tempore, ex vena iecoris, si distemperiem adhuc præsse constet; aut ex venis brachiorum, si plenitudinem, tutò mitti sanguis potest. Quo facto, humorum, qui morbosum continent apparatus, vel eorum, in quos degenerat puerperium, prouidentia habere oportet; & cuiusque naturam tenuatis crassioribus, retusis quæ acres existunt, refrigeratis calidioribus, admixto tamen aliquo ex ijs, quæ tenuandi vim habent, quo promptiores sint ad expurgationem per vterum. Ac si id non tentauerit natura, tu ipse medicamentis per aluum purgato: cessante tamen sanguinis purgatione; vel adminus solum instillante: nam si necessitas vrgeat, cunctandum non est, quin protinus cessante (vt diximus) sanguine purgemus: præsertim si, quod excernitur, corruptum fœculentumq; est, & parcissimum, & quod magnitudinem mali non minuit. Itaque, & copiam sanguinis, quantum natura assuescit, & nititur expellere, minuere oportet; & reliquorum humorum expurgationem moliri, prædictis coniecturis præhabitis: & vteri curam gerere, vt patentior primo fiat: quo facilius per ipsum prorumpant qui abundant humores, vt vna sequamur naturæ motum, & noxij eductionem: quod pessarijs, & inunctionibus. 2. lib. adductis faciliè consequeris. Reliqua verò, sicut in cæteris corporibus agenda sunt, excepto acidorum, & nimis frigidorum vsu, nam semper in his vereri oportet vteri naturam, conditionem & opus, quod eo tempore molitur, nimirum sanguinis, & aliorum humorum expurgationem: quam equidem interdicit frigidorum vsus. Sic & acida vterum quoq; maximè offendunt, iis maximè, quæ nuper pepererunt, nisi constiterit ob ingentem calorem, & siccitatem forsan prohibitam esse humorum expurgationem, quod ipsi crassiores ex nimio calore adurente fiant, & viæ ob siccitatem arctiores: quo tempore paulo liberabilius frigidis potionibus utendum est.

Est quoque alia febris natura, & conditio enixis peculiaris, & propria, quæ nulli alteri fœminarum sorti accidere visa est, aut saltem per quam raro: nimirum cum ex puerperij suppressione, vel diminuta profusione purgamentum ipsum in vtero putrescit, suppuraturve. In quo sanè opere necesse est febres fieri iuxta Hippocrat. decretum. Dum pus conficitur, & cætera. Id certè monstrant, quæ

- A** quæ ab utero eo tpe prodeunt graueolentia fetida, aquosa, aut saniosa, vel alia quavis qualitate pessima affecta. Quæ febris species eodem omnino mō fit, ac ceteræ omnes, quæ principium sortiuntur ex minera aliqua putredinis, vel ex bubone, aut tumore alio præter naturam: nam putrescentibus in utero humoribus cor incalescere, & febrem subinde fieri certum est. Cuius affectionis latè et meminisse Hip. constat lib. 1. de morb. mul. referentem cuiusq; febris à partu pificientis causas per hæc verba. Quum mulieri puerperæ purgatio non facile procedit, velut vteris inflammatis, & osculo ipsorū concluso obtorquetur. n. stomachus vteri post pueri egressum. Si. n. quid horum fuerit, purgatio nō procedit. Has autem veluti causas primo scribit, & subdit. Si verò non processerit purgatio, continget ipsam febrere, & horrorem habere, & ventrem magnū esse & si ipsam attigeris, totum corpus dolere, maximè si quis ventrem attingat, & aliàs atq; aliàs stomachi dolore vexatur, & lumbos dolet, & cibi fastidium, & vigiliæ, & punctura adest. Postea quinto, aut septimo die qñq; venter turbatur, & succedunt nigra, & valde graueolentia aliàs atq; aliàs, & vrina velut asinina.
- B** Quibus verbis euidenter ostendit signa, quæ prædictā affectionem apertè monstrant: & pergit dicens. Si verò venter ipsi non turbetur, neq; purgatio prodeat sua sponte, neq; ea, quæ commoda sunt, breui exhibeantur, & tps autè progrediatur, multò magis ex prædictis affligetur, & insuper periclitabitur, ne liuida fiat, velut plumbum, & aquam inter cutem incidat: & vmbilicus stabit ipsi ab vteris eleuatus, & circuncirca nigrior erit: & vbi hæc facta fuerint, fieri non pōt vt mulier superstes maneat: pereunt autè alias alio tpe pro corporis, & affectionis ratione: verum unam, & vigesimam diem non excedunt, id quoq; plerunq; sic contingit. Quæ sententia vñ complexum fuisse vniuersam huius affectus præ sagandi rōnem: & mox inquit. Si verò purgatio ipsi eruperit siue a pharmacis, siue sua sponte: fit etenim hoc si vteri os laxarit à sanguine aceruatim de repēte coacti. Quo verbo complexus est potissimam, & immediatam horum malorū cām. Et si eruperit, graueolentia purulenta depurgantur, qñq; et nigra, & melius habebit, & curata sanescit. Hæc. n. vltima snæ parte sapientissimus Hip. præ sagium ad salutem, & medendi rōnem videtur docuisse. Consulit quidem purgandum est, idq; duplici modo; altero per vterum ipsum, quo secedat, quod cōfertim ibidem immorabatur. Qualia verò sint, quæ id efficere valeant (velut pefaria, & alia huius generis) mille in locis reperies, præsertim c. de vteri distemperie cum affluxu humorum, & de epilepsia per consensum ab utero. Altero vero per ea pharmaca, q̄ totum corpus expurgent ab humorum vitio, dum ipsis ex malo vteri aliquid iam cōe factum est. Verum ut quis exactè intelligat, quid in hoc malo agendum sit, expendēdū est in eius curatione nil vilius fore, q̄ mē ses euocare: quia tñ maiorem calorem medicamenta id efficientia concitare nata sunt, ob id ad sanguinis detractionem ex talo confugiendum est. Quo sufficienter extracto per venæ sectionem, aut per scarificationes, syrupis putredinē compescere est opus: tandem vias reserare, humores inscindere, & attenuare. Ac postmodum si febrem cōem factam esse reliquis humoribus cōperiamus, corpus vniuersum purgare dubitandum non est: et si aliquid purgamentorū vteri adhuc supersit. Cognosces aut febrē factam esse cōem, q̄ præcesserit copiosa fetidorum purgatio: & non solum ob id non est facta miuor, verū indies exacer-

ba-

*Si affectus febris
est communis
motus in eam
evacuatio faciam
regionem ac
vter.*

batur magis: quod evidens est argumentum, reliquos corporis humore vitium iam contraxisse. In hac etenim re scitu dignum iudicavi, solo vteri vitio, quum-
uis putrido humore scateat, purgandum non esse, nisi per ea medicamenta, & pessaria, quae vterum ipsum purgare solum nata existunt. Ceterum si vel incorpore praesit morbosus apparatus, quo vereamur, ne communis fiat febrilis affectio: vel reliquis venis, & humoribus totius corporis iam putredinosus calor elucescat: tunc quidem mihi non est dubium, quin corpus purganti pharmaco euacuandum sit. Nam si quis dixerit, solum per regionem, cui natura innitur, per loca conferentia purgandum esse: intelligat velim, id non esse semper verum, neque tutum, sed quoniam vacuatio per aliquam regionem facta sufficiens est pro humoris peccantis copia, & regio conveniens est illi humorum sorti. Verum ubi quantitas non satis facit cachochimiae vbertati, aut regio non est in illis humoribus euacuandis idonea innitendum illi amplius non est. Sic profecto vterus humoribus putridi (quos è sanguine separare studemus) euacuandis conveniens regio minime existit. Praeterquam, quod si alicui sanguis ex nimia copia per nares erumpit, vena in brachio scissa praesidium sit, & si praenimia plenitudine exudat, sanguine misso leuamen suscipit. Ac rursus est longe maius beneficiū, quod sequitur ex corruptorum conferta uacuatione, quam sit damnum, quod sequitur ex modica distractione euacuationis, quae per vterum fiebat. Hoc tamen intelligas velim, dummodo sanguis non purgetur, nam eo tempore tutius est alijs vi auxilijs. Quamobrem non oportet ob rusticum timorem differre, aut simulare quod iuxta optimam rationem fieri tuto possunt: nec rursus tam audacter purgationem aggredit, ut post habitis praedictis indicationibus aliquid in considerate fiat. Quo sane facto, ad alia auxilia confugiendum est, quae putredini, & vitio humorum proficua sunt iuxta humoris peccantis ideam, & vitium. Quae quidem (praeter-

*De alui
fluxu in
puerperis.*

quam quod enixis, & reliquis communia sunt) enuper citatis abunde reperies. Solet non leue periculum ijs, quae peperunt, asserre alui fluxus, sicut medicis non paruum haesitationem. Quippe si vterus ad hoc fluat, quis compescere audebit aluum, siquidem eisdem prorsus auxilijs vteri purgamenta cooperimus: si verò puerperium supprimatur, praedictis medicamentis pressius cooperescet. Itaque aluum fluere graue existit, sed grauius purgamentum comprimere: cum hoc tamen alius ocysimè est cohibenda, ut Hipp. consuluit lib. de mor. mul. dicens. Si verò mulieri cum puero in paro in partu non prodierit humor, velut oportet, sed siquidem in capite habuerit humorem à calore attractum in partu, & antè, caput dolebit; Si verò in ventrè aceruatim descenderit, ubi concitatus fuerit, ipsum turbabit, & non oportet longè progredi sinere, sed auxiliū ferre, ut ne ex partu ventris profluuiū succedens corpore malè habete ipsam dolore affligat. Quamobrem in re tam graui & dubia pensandum est primò quum conferat enixae alui fluxus, qualiterve feratur: ac si constiterit vel non conferre, vel ferri non posse: tunc considerandum est, fluxerint èt partu purgationes, nec ne: quod si pro voto fluant, optimis alimentis, & recto vitae instituto laborantem moderari oportet, donec alter fluxu sua sponte cesset. Verum si alui fluxus immoderatio fuerit, nulla alia ratione melius ad puerperij purgationem naturam renocabis, quam cessante alui fluxu ijs medicamentis, quae aduersus causam ipsius pugnent, nullo vel leuissimo ex astringentium silua exhibito: quinimmo administratis quae menses euocent, saltem per inunctiones,

pessaria-

- A** pestaria, euaporationes, & reliqua, quæ c. de mēsum sup preſſione adduximus. At ſi ex toto vteri purgationem ſuppreſſam eſſe comperiamus, naturamq; fluētū aluo intentam, tunc citra vllam cūctationem aluū ſupprimere oportet, purgatis prius humoribus, qui ipſam citatiorem reddunt, & exhibito rhabarbaro cū modico ſaccharo roſaceo: ni fortē defectum purgationis vteri aluo citata natura ſupplere ſtudeat: quod equidem ex conferentia, & tolerantia rimari eſt facile. Quod ſi aſtringentibus vti quoquo mō cogaris, ea quidem extrinſecus adhiberi ventriculo conuenit: ne intrinſecus ſumpta, vias oēs, & quæ ad vterū pergunt, fieri aſctiores contingat. In ſumma autē ventriculi vitio concitatam aluum alimentis, & optimo viuendi genere moderaberis, & adhibita ē ventriculi ptiuitia externis inuſtionibus, & alijs, quæ ipſi robur addere nata ſunt: nec diſplicebit electarium diarrhodonis porrigere cum decocto abſinthij, aut modicum rhabarbari, q̄tum ſat ſit, ventriculus beneficiū ſuſceptet vtero illaſo. At ſi diarrhæa, ſit totumq; corpus fluxu expurgetur, neq; ipſum impedire, neq; vterū amplius citare, ſed vires cuſtodire eſt opus, q̄tum ſatis ſit, vt naturam ſe exoneratſe, & vtriq; vacuationi ſuffeciſſe comperiamus. Si verō in dyſenteriam fluxū degeneraſſe conſtet, ipſum poſt habita vteri purgatione finire rhabarbaro exhibito oportet, prius tñ tentatis, q̄ abluunt clyſteribus, aut ijs, quæ obleniunt, retunduntve humorum acrimoniam, & mordacitatem medicamentis. Quod ſi minimē profuiſſe videatur, ad eorum expurgationem veniendum eſſe conſulit vrgentiſſima morbi natura: in qua non dubitarem ante rhabarbari vſum, ex talo ſanguinem mittere viribus nō rennentiſſibus. Poſtmodum autem ad ea, quæ in quouis fluxu indiſcriminatim Hip. præcipit, adeundū eſt. Inquit. n. lib. de natu. mul. Si ex partu fluxus corripit, & cibi in ventre non maneat, vuā paſſam nigram dato, & mali punici dulcis grana trita, & coagulum hædi vino nigro diluito, ac vttere. Quibus conſimilia verba ſcripſit lib. i. de mor. mul. dicens. Si ex partu fluxus corripit, & cibi in ventre non maneat, vuam paſſam nigram dato, & punici dulcis mali corium, & interdum nucleum, & coagulum hædi, hæc vino nigro diluta, & caſeo caprino, & polenta triticea inſperſis bibenda dato: triticum autē modicē torreto. Ex his. n. ſententijs ego methodum generalem, & ſiſtendi tantum eruerem, materiam autem in aliam vſui probatiorem mutarē.
- C** Vomunt quidem quæ nuper pepererunt femina, idq; non rarō; plerunque cibum, aliquando crudos, & pituitoſos humores, vel quosuis alios iuxta ſuccorum, qui redundant, naturam: ac nonnunquam ſanguinem ipſum, vt ex Hipp. conſtat lib. i. de mor. mul. dicente. Si ex partu ſanguinem vomat, hepatis ſiſtula ſauciata eſt, & dolor ad viſcera procedit, & conuellitur. Et lib. etiā de natu. mul. eadem iterum verba refert. Vtunque enim vomitus enixis ſuper excreſcant, graue & periculoſiſſimum eſt. Quippe ſi alimentum excernatur, deficiet ad puerperij purgationem vires, & enixa indices labascer magis, & lacti deerit commoda materia. Si vero reliqui humores expurgentur, vereri oportet, ne præ nimia eorum turbatione, & agitatione febris ſubſequatur, quæ vomitib. adiuncta, & cacochimæ ſubiecta periclitari procul dubio ſæminam cogit. Verum ſi ſanguis erumpat ex ſauciata iecoris vena; perumeſcendū eſt, ne iecur impenſe refrigeretur, & ob id malus corporis habitus, & hydrops ſubſequantur. Præterquam, quodd. omnes tres uomitus ſortes (ſed maximē quæ ex ſanguine ſit)

na-

De puæ
petari
vomitu.

natae sunt puerperij purgationem sistere, & ad supernas sedes ocysimè euocare, quamobrem peculiari diligentia curandum est vomitum compescere. Eum quidem, qui ex alimentis concitatur, roborata retentrice ventris facultate ijs, q̄ exterius apposita calorem, & viscera firment, & simul corrigant, si quod vterii vitium illuc transmittitur: qualia diximus c. de ventriculo ob vterum affecto: q̄ referre iterum hac in parte, ne tædiosus fiam, non placet. At si vomitus ex alimentis quoq; fiat vitio alicuius humoris aduentrem confluentis, acris nimirum, & mordacis, ea lege compescere opus est, ac si iidem humores vomitib. excernerentur. Quo tpe, præter debitam victus institutionem, vitiosos humores q̄ primum occasio permiserit, expurganti pharmaco educito, seruatis omnino eisdem legibus, quas in alui in fluxibus adseruandas esse diximus. Verum si sanguis vomitu reijciatur, omni diligentia curandum est sanguinem ad vterum reuocare. Primò quidem ipso per tali venas profuso, & copiosè aliqñ: vel si femina non tulerit, per cucurbitas cum scarificatione suris, ac femoribus affixas. Quo facto coniectandum est, an sanguinis profusio ex vbertate, vel ex naturæ errabundo impetu fiat: an potius ex vase aliquo in iecore disrupto, aut exeso (cuius Hip. meminisse constat lib. 1. de mor. mul. in cuius subsidium hæc adducit præsidia. Hæc lac asinæ bibat, deinde vaccæ nigræ ad quadraginta dies, & sesamum tritum, donec probè habeat) si primum quidem, nullis medicamentis vtendum est, sed deoneranda natura, aut ad vterum euocanda. Si verò secundum, eis vtendū erit pharmacis, quæ vel emplasticam habeant vim, vel agglutinantem non omnino posthabita puerperii fluxione: sed partim euocantibus menstrua per vterū, & inferas partes, partim verò per ea, quæ sanguinem sistunt deuorata, aut epotare: reperiens autem huius census non pauca lib. huius operis 1. c. de immodicis mensibus, & lib. 1. nostro indic. c. desistendis fluxionibus. Dimitto et hac in parte vitus tum parsimoniam, si ex vbertate sanguis fluat, tum tenuitatem, & laudabilem substantiam, & alia itidem, quæ prædictis locis abundè scripsimus. Est, pculdubio in puerperis difficilis respiratio graue admodum malum summeque periculosum: tum ratione signi: tum verò, & quod grauius est, ratione causæ. Vt signum, quia indicat instrumenta respirationi subseruientia purgamentis partus vitari, ac repleri, quod quidè quantum mali sit, nemo ambiget: vt causa verò grauius profectò est, & perniciosius, q̄ vehemētissima illa, ac velocissima thoracis dilatatione, & compressione copiosius trahetur puerperij humor ad thoracem ipsum. Censeo tñ, vtcunq; sit, difficilem spiritum, & gutturis inflammationem, vel iecoris, aut cuiusvis alterius partis, præsertim internæ ex suppressio puerperio frequentius aduenire, si vtcunq; respiratio vitietur, q̄ quoquis aliud malum: & ob id omni arte curandum est per vterum naturam euocare, vel saltem per infernam regionem, & quod in corpore supererit, euacuare sanguine misso ex talo, vel ex suris, aut fæmoribus. Verum in his omnibus inflammatio nibus, ac difficili respiratione id perpetuò obseruandum est, nimirum quòd si sanguine ab inferis partibus sufficienter misso affectionem adhuc crescere contingat, facta cōiectura plenitudinis affectæ particulæ, siue guttur, siue caput, aut pletura sit, mihi nō est dubium sanguinem ex viciniore parte esse mittendū, et si puerperium fluat. Nullo enim alio modo citius praeuere poteris suffocationis periculum in pleuritide, difficili respiratione, vel angina, quā ex viciniore-

*Vomitum sanguinis
curatio
in puerperis.*

*De puer
perarū
angina,
& diffi
cili re
spiratio
ne.*

Abus sanguine misso: euocatis etiam eo tpe mensibus per frictiones, ligaturas, & cucurbitas inferis partibus adhibitas, quibus irruentis sursum sanguinis impetus citius retrahatur: maxime si citior factus fuerint sanguine misso ex superioribus. Cetera vero, vt in reliquis corporibus administrabis.

Contingisse aliquando comperimus, praesertim primiparis incautis vel ex frigore compressa purgatione, vel ex interno apparatu pleuritide, & perditione, quidem a partu corripitur graue aliqui malum, quod in priuocationis periculum enixas non raro deducit. Quod tenuisse Hipp. constat lib. de natu. mul. docentem, magnis malis puerperas esse expositas, si parum sibi cunctant, & primiparae sint, quod sane contingit non raro comperimus, ex quauis alia mensium suppressione, vt Hipp. refert lib. 7. populi in historia vxoria Cleomenis, quae ex zefiri flauo in grauem pleuritidem delapsa fuit, ob menstrua ad thoracem recursura, quod & his & enixis facillime contingit, quod sanguis per vterum affluxurus promptè, ab his causis per venas coas (quas non paucas, neq; paruas vterus cum thorace habeat) regurgitet in aliquod latius, quo sane fit, vt non raro accidat enixis difficilis respiratio, vel grauiore alia thoracis affectiones.

B Sed in hac quidem re licet ex neotericis aliqui primo morbi accessu audeant ex brachio sanguinem deirahere, mihi id consilium nunquam arrisit: siquidem primo naturae motum sequi, & alterum praeter naturam motum ab affecta parte ad quam distantissimas auertere, tutius & vilius longe visum est, ex talo nimirum sanguine primo sufficienter extracto, quantum videlicet sit satis, & pro puerperij fluxuri copia (si non omni, saltem vti aliunde non facile natura permittat, ex quauis superna vacuatione abire) & pro impetu motus ad partem affectam reuulsione, euacuatione. Praeceperat. Avic. in pleuritide (nullo adhuc habito ad corpus enixae respectu) sanguinem ex talo, ne dicam contrario, mittere, nedum in femina, cui puerperium adhuc fluitat. Quam ob rem cum puerperium ipsum sua sponte videatur correpugnare millioni sanguinis ex brachio, quatenus vires vitant; vacuationem non permiserint: quia brachium contrario in loco existit ei, quem natura in puerperio sibi elegit, & tuetur, ob id quidem verendum plurimum est, ne illi vim facto sanguinis contrario motu inferamus, retrahamusq; fortasse puerperium ad locum affectum.

C Quapropter consulto primo sanguinem mitti, semel bis, aut ter ex talo, postea vero si affectum his non cedat cum iam sanguine misso ex talo satis factum sit puerperio, ad venas brachij deueniendum esse consulit, & permittit affectus urgentia, & ratio. Deinceps vero sicut in quauis alia pleuritide ad expectorandum humorem confugiendum est eclegmatis, decoctis pectoralibus, & syrupis. Postea, ne tussis, & dolore puerperium ad superiores partes euocetur, clysteribus utendum est, qui & purgent, & attrahant, ac vteri vias aperiant, purgationiq; aptiores reddant, velut est, qui recipiunt maluae, bisualuae, mercurialis, blitis, branchiae urinae, & foliorum caulium rubeorum ana. m. j. florum chamemali, meliloti, ana. p. j. seminum lini, anethi, althaeae, fenugraeci, & anisi conuassatorum ana. ʒ. i. fiat omnium decoctio ad li. j. & colentur, ac dissolue in colatura catholici ʒ. i. mellis rosati, olei violarum, & sacchari ana. ʒ. ij. Reliqua vero sicut in quauis alia pleuritide facies, semper tñ praehabita vteri fluentis prouidentia, quominus puerperij purgationes cessent, donec debitum ipsi praeterierit. Tunc. n. (vel ante, si necessitas urgeat, aut purga-

De plen
tude in
puerpe-
ritudinē
da.

De plen
tude in
puerpe-
ritudinē
da.

De plen
tude in
puerpe-
ritudinē
da.

*In pleuritide
puerperae
in qua parte p.
sanguis mittit
huius est a qua
post.*

iones cessasse constet) leni aliquo expurgante non recusarem alui subducere. **A**
De tussis in puerperis. Est quidem molestissimum enixis, ac periculosum accidens tussis. nam præter causam, quæ ipsam extitit, considerationem & periculum, motu illo vehementissimo ad superiora proculdubio puerperii euocatur, fitq; lætissimè causa maioris mali, quàm tussis ipsa sit. Quamobrem duo in hanc curationem summo opere obseruanda esse censeo: primum quidem, ne mēstrua purgatio subsistat, suppressaturve, facta summa diligentia, vt copiosior euocetur, ita vt quantum tussi ad superna retrahitur, auxilijs ad consuetum euocetur locum: secundum verò, vt omni arte vel humoris crassitiem inseindamus, tenuitatem compescamus, & aduersus vnāquāq; eius qualitatem ex aduerso pugnemus: exhibitis adinuicem, quæ tussim leniunt, pharmacis. Quippe hæc sola prodesse in hoc casu non rarò probauimus: quorum rationem, & copiam reperiēs facile lib. nostro de auxil. indic. c. de expurgantibus per sputum. In qua sanè re expendendum quoq; est, an vitio uteri, & ob aliquid ab eo ascendens halituosum, mordax, & acre tussis moueatur: cui prouidebis præmunito a causæ inclementia corpore, cauēs ne, si frigida fortè sit, nimium superiores partes calfacias, periculum. n. est, ne calore ad eas puerperium euoces. Verum si ex vitio fuerit damnum, maiori diligentia purgationem eius procurabis immixtis pessarijs ex mercuriali, agarico, aut aloë. Solent non rarò hæc affectiones enixis superuenire vel vitio sanguinis fluentis vel defectu congruæ, & copiosæ purgationis. Sed delirium aliquñ oriri ex melancholia, ob nimiam sanguinis suppressionem, qua crassior propter adustionem efficitur, aut ob nimiam profusionem qua relicto crassiore melancholiam fieri, mihi certum est. Dimitto aliquñ ex adustis febre humoribus, caputq; irruentibus, vel ex tetro, deprauatoq; halitu posse quoq; fieri. Si tamen ex immodico fluore succrescat affectio, curandum semper est, vt sanguinis profusio cesset, vires reficiantur, & distemperies frigida, ac sicca corrigatur, sicut in reliquis corporibus. Quod si ex vitio, vel suppressione purgationis fiat, studendum omni diligentia est, sanguinem euocare: vel, si id perdifficile fuerit, ipsum expurgare medicamentis, quæ aduersus adustos, fæculentos, & crassos humores pugnent: qualia retulimus lib. huius operis 2. c. de melancholia virginum, & vidu. Sed peculiarior prouidentia habenda est de talo inseindendo, scarificandisve suris, ac femoribus, & de crurum lauacris, ac omni deniq; auersione, & euocatione ad inferas partes, idq; maximè per hæmorrhoidum, prouocationē, & sanguine, ab ipsis per irudines vacuato, quod magni momenti in his affectionibus esse solet. Necnon curandum est paulatinis purgationibus ab spurcitiis humorum sanguinem vindicare, donec purgationem vel redire comperiamus; vel si nō redeat, ad maiora auxilia subsitaditus, vt deinceps sicut in reliquis corporibus curari possint prædicti affectus.

De pedum, & totius corporis inflatione a partu. Non desunt quæ ex improbo vitæ studio toto gestationis tempore habito, à partu intumescant non solum pedes, verum, & vniuersum etiam corpus. Quod pulchrè aduertit Hip. 2. pop. 2. dicens; Quæ filias peperit gemellas, & difficulter peperit, & non valde purgata est, tota intumuit, deinde venter ipsi magnus fiebat. Hanc sanè affectionem (vt ex loco citato colligi potest) tribus de causis prouenire posse censeo: vel ex improbo vitæ studio, vt dictum est: vel ex immo dico potu post partum: vel ex copioso sanguine, quem fœtus non valuit continere,

A rere, neq; fœmina, in partu purgare: & ob id superabundans, & recrudescens in tumorem eleuat partes, præsertim infimas. Sed cessat profectò hoc malum facta à partu copiosiore purgatione, vel superueniente alui fluxu, aut febre. In prima quidem causa curandum est, transacto purgationis statuto tempore, vel saltem diminutis purgamentis, corpus purgare, ac non semel, sed bis, & per epicrasim. In secunda verò, nisi puerperium vberimè fluxerit, sanguinè mittere est opus, præsertim si sanguis adsit, idque ex talo quantum sat sit pro affectus vehementia, & sanguinis redundantia: & postea cessante vteri purgatione pharmaco purgandum est. In vltima autem (nam de potu immodico nil aliud dicendum arbitror, quàm præscindendum esse, & calfactorijs, ac resoluentibus curandū, maximè puerperio transacto) puerperium omni arte euocare est opus, vel sanguinem ex talo mittere, aut cucurbitulas suris, & fœmoribus affigere. In omnibus autem causis reliqua facies, sicut dictum est c. de hydropo vteri. Quibus et omnibus peculiari dote hepar ouillum conferre dixerat Hip. lib. de nat. mulie. Si pariens (inquit) inflata fuerit, hepar ouillum aut caprilum calido cinere obrutum bibendum dato meracius ad dies quatuor, & vinum bibat vetus.

B Superfunt quidem ex affectionibus, quæ enixis accidunt, plures, veluti est conuulsio, tremor, rigor, paralytis, & pleraq; alia. Quæ omnia Hipp. complexus est lib. i. de morb. mulie. his verbis; Si verò processerit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracemq; ac pulmonem (sit enim, & hoc) moriuntur sæpe statim si detineatur ac firmetur. Si vero probè exeat per os, aut nares sana euadit. Si vero morbus paulò diuturnior fiat, patietur sanè mulier ea, quæ dicta sunt de virgine, cui primum menses comparentes, sursum impetum fecerunt. Narrat item eadem parte quas nam affectiones fœmina sic affecta partiatur: & dum ad faciem fluxio fertur, quæ mala efficiat, ac quibus signis innotescat. Ex quo loco euidenter constat, talem fieri ex puerperio affectionem, qualis fuerit natura partis, in quam humor ille vitiosus incumbit, aethalitus ab eo ad partem ipsam transmissus. Quocirca cum omnibus ferè eandem sit, & communis causa, intellectis & exactè pensatis, quæ hucusq; diximus præcepta, haud difficile erit nosse, quid agendum, aut non agendum sit. Sic profectò multa alia in hac re prudenti medico pensanda dimitto, vt ea aptè disponat, sicut occasio ac tempus permiserint.

De vteri inflammatione, & vlceribus à partu relictis.

Cap.

12.



CONTINGIT non rarò in primiparis, vt strictis oris vteri fœminis, vel ex laborioso partu, aut ex fœtu grandiori, vel abortu vterum inflammari, & exulcerari. Quod sanè vel sterilitatis, vel grandioris mali causam præstare assolet: ob id profectò si quid huius à partu supererit, curandum est nosse, & præstò auxilijs esse antè, quam in maius vitium commigret. Dixerat enim Hippoc. libro i. de morb. mulie. Si ex partu vteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest, ex vêtre verò nunquā deficit calor, & sitis, & coxas dolet, & venter imus fortiter intumescit, & aluus turbatur,

Kk 2

batus, fecellus autem est humidus & solidus, & calor vehementer coarctat, & cibum auersant, & dolor iuxta principit est, & ventris stomachus non potest trahere cibos, ac potus, & concoquere nequit, & nisi curentur statim, plurimum moriuntur. Ex hac affectione si forte femina euadat, superest proculdubio vlcuscula, quæ peculiarem prærequirunt in artifice diligentiam, ut paulo inferius monstrabo. Sed primitus inflammationi medebis copiosius sanguinem missio per venas tali, & tandem adhibita ea prouidentia & curandi ratione, quæ capite de vteri inflammatione adduximus, initium curationis sumentes à sanguinis detractio-
ne ex talo: cauentes tamen ne vtero nimis frigida adhibeamus, ne puerperii purgatio cohibeatur. Sed eodem lib. Hipp. peculiarem adducit curandi rationem vteris ex partu inflammatis, ac præter illam cõis inflammationis naturam, affert inflammationis rationem. Inquit enim; Si puerperæ inflammati fuerint vteri intumescunt, & ubi puerperii purgamenta intus manserint, occulte distenduntur: distenduntur autem ubi condensati fuerint à frigore. His si quidem perfrigerentur, calfacere cõducit. Si verò inflammati fuerint, & frigus discesserit, medicamentum subditum facere, quod inflammationi aduersatur, & simul lauare, ac fovere, & pharmaca adhibere, quæ ego adscribam. Verum ex iis, quæ generaliter docet, constat, qualiter sit in hoc affectu agendum, licet quæ ibidem recenset, non sint admodum proficienda: non quod mala sint, sed quod alia vtiliora eligi possint. Sat. n. est docuisse primitus adhibenda esse quæ dolores leniant, quæ ventrem emolliant, & quæ inflammationi aduersentur lauacra, fomenta, & tandem reliqua, quæ capitato adduximus, quæ eo loco reperiet diligens lector.


Verum si aut inflammatio in vlcus degeneret, aut vlcus ob causas à me superius adductas suboriat: id prout diligenter nosse cõuenit, antea nimirum quam aut mali moris fiant, (ut facillime ob loci conditionem, & excrementa, quæ expurgantur, fieri solent) aut in aliud grauius malum degenerent. Docuit quidem id cognoscere Hippoc. lib. i. de morb. mulie. dicens; Si vteri exulcerati fuerint, aut sanguis, & pus, & serosa sanies fluit, putrescentibus enim vteris morbus ab ipsis fit, & venter inus eleuatur. Tandem subdit inferius. Morbus autem maxime coarctat ex partu, siquid in ipsis diuulsum computruit. Item quæ ex abortu, & aliis sua sponte. Ex paulo inferius inquit. Si verò vehementer exulcerati fuerint, sanguis & pus purgatur, & dolor fit grauis, & cum dolor apprehenderit, velut à partu dolore hinc ea, quæ circa fluxum contingere solent: & cum tempus affuerit, crura & pedes intumescunt, & curam medici hinc morbum velut hydropem, verum hic talis non est. Docet autem eodem li. i. clarius occasionem, & signa vlcusculæ, & curandi rationem his verbis. Quum vlcera rationes in vteris fuerint, ex abortu aut alia quædam causa eas omnes respectu ad totum corpus facto curare oportet, quacumque curatione opus habere visa fuerint: siue ex vniuerso corpore homineam curandam esse putaueris, siue ex ipsis vteris; cognosces autem an ab ipsis vteris sint hoc modo. Quum enim vlcera rationes ab ipsis vteris sunt, purgationem exhibent purulentam, & compactam: quæ verò non ab ipsis tenuem, & saniosam. Curandi tamen rationem scribit; dicens; Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharmaco eas curare oportet, & dare quod sursum, & deorsum purget; primum autem quod sursum, postea verò quod deorsum.

- A** sum. Eodem etiam loco docet dum exulcerationes fiunt ex partu, aut abortu labore euocata materia exedēti, & mordaci, quæ id malum efficiat ad uterum, omni arte finita puerperij purgatione pharmaco euacuandum esse, ut humores vomitibus, & alui excretionibus diuertantur, minuanturq;. Verum præmissa hac generali providentia studendum est, ut relictum vlcus quam citissime sanescat: quibus autem id fiat, dictum est abunde lib. huius operis. 2. ead. de vteri vlceribus. Caterum si exulceratio sola partus difficultate, vel fetu grandiori dilacerato vtero fiat, nulla totius corporis providentia habenda est, sed solius tantum vteri, ut c. nuper citato diximus. Hoc tamen in hac curatione expendendum plus est; ut ea, quæ in vtero dilacerantur, non astringentibus (ne menses supprimantur) reduci debent ad pristinum statum, sed modicè siccis, & modicè quoq; glutinantib. qualia eodē c. non pauca reperies. Qd si ex dilaceratione in vlcus malum degenerasse cōperiamus: tunc sanè ve' ut quoduis aliud vlcus curari desiderat; hoc uno excepto, quod si menses adhuc fluxerint, velut vlcus cum sanguinis profusione curari debet, licet sanguis ab vlcere non prodeat. Quæ in re primò donec sanguinem cessasse comperias, vlceris curatio post habenda est: non autem fluxus compescendus, velut in prædictis vlceribus cū sanguinis fluxu, sed finiendus, ut sola subsit vlceris indicatio. Si verò fluere cessauerit, curationem institues iuxta vlceris naturam, & conditionem, ut abunde loco citato dictum est.

De rugis, quæ post partum in ventre supersunt.

Cap.

13.

- C**  tantam plerunque magnitudinem excrescit in vtero fetus, ut ventris ipsius eum non solum tensam reddat, verum, & scissuris non leuibus sæpissime discindat, maximè in infima, & secunda cuticula. Quod sanè vitium licet omnibus vtero gerentibus commune sit, ijs præsertim peculiare existit, quæ (ut diximus) grandiores progignunt fetus: malum quidem feminis indecorum, & molestum. Quapropter non pauca ex feminis huic malo providentes, à quarto mense grauidationis ventre imponunt linteū oleo amygdalarum dulcium, aut sesamino inunctum, & expressum: quo facilius citra scissuras cutis ipsa mollior fiat, extensionique aptior. Sed à partu rugas comprimat, & ad pristinum statum redigit vnguentum ex succo radicis liliorum alborum cum melle, & cera ad ignem compositum.

Confert etiam pinguedo recens, & actu calida cum modica cera rubra ventri apposita: vel mesenterium verbecis, vel capræ; aut hædi calidum ventri adhibere, uel corium oleo inunctum, uel quod oleum continuerit. Benefacit non minus oleum nucis indicæ illitum: vel (ut ferunt) adipis detracti è vulua vallenæ ʒ. vj. in fictili liquato, & cum puluere cornu cerui fiat vnguentum, quo venter illiniatur: prodest quoque aqua ex albumine oui instillata: item

K k 3 adeps

adepsagni illitus: cinis testudinis cum albo oui, vel lacte asinino illitus. Ad quorum etenim censum facile erit cuius alia rimari præsidia huic vsui proficua, dummodo quæ astringunt fugiat, ne menses quoque cohibeat.

De virginali astrictione à partu comparanda.

Cap. 14.



NISI de restrictione amplitudinis vteri propter honestam causam liceret tractare: nullam profectò eius mentionem fecissem. Verum cum ex huiusmodi laxitate aliquando sterilitatem proficisci comperiamus, nonnunquam vteri procidentia, ut Hip. insinuat lib. de nat. mul. præter quam, quod femina sic affecta proprijs viris ingratiore sunt: ob id sanè pauca quædam studui huic malo asserre præsidia. Confert quidem primò post prægressam puerperij purgationem fomentum ex aluminosa aqua: profunt & pelli ex succo seminis rumicis aridi, & virentis: uel ex gallis in aqua maceratis, deinde siccatis, & lana exceptis. Semen etiam oxila pati tritum in vteri sinu impositum; uel gallam in aceto maceratam, & postea siccata, cuius puluis super sinum mulieris ablutum conspergatur. Sed summo opere profecisse scimus id præsidium, quod recipit sanguinis draconis, boli armeni, corticis mali granati, aluminis, mastichis, gallarum, ana .j. in puluerem redige, & omnia simul in aqua chalibeata confice; quo illinito, pessarium ex grossipio factum, in uterum immittito. Prodest, & aliud, quod recipit gallarum, sumac, plantaginis, còsolidæ maioris, aluminis, chinolix, chamælex ana .j. coquantur in aqua pluuiali, & hac decoctio ne foueantur pudibunda: cui quidem addes aliquid ex ijs, quæ astrictoriâ uim hênt, velut folia oliuæ, folia vitis & quercus, balauistiû, cupressi poma, cortices granatorum, scoria ferri præparati cum aceto, & reliqua huius naturæ. Quorû vsum, sicut & reliquorum, quæ à principio diximus, cauere oportet ante integram purgationem, nè fortè ipsa simul suppressa, graue aliquod malum subsequatur.

De nutrice eligenda, & moderanda.

Cap. 15.



Lectionem nutricis pulchrè Moschus visus est depinxisse, dicens; Adolescentula, quæ pulchro etiam sui corporis sit colore, & iam bis pepererit, & pectus latum habeat, ipsasq; mammas neq; nimium laxas, & rugosas, neq; interim valde tensas papillas: neq; multum graciles, neq; valde breues, & quæ non multas cauernas habet, neque iterum parua, & breuis; animosa, & quæ cum integro affectu puerum amare possit, & quæ nunquam irascatur, fieri potest, grata, & munda sit. Ex qua equidem sententia arbitror, apud omnes ferè peritiores decretam esse, eam in nutricem eligenda fore, cuius ætas sit inter vigesimum quintum, & trigessimum quintum annum, viridi coloris, fortis ac robusti colli, pectorosa, musculosa, duræ ac multæ carnis: non obesa, non gracilis: cuius et mammae solidæ, ac firmæ sint, mediam magnitudinem, mediamque duriciem obuenientes: quibus lac plurimum sit: à uiro seiuncta, abste-

mia,

A mia, à menstrua purgatione immunis toto nutritionis tempore: nullis sit affecta morbis, neque alicui peculiariter obnoxia. Quæ omnia expendenda sunt in nutrice, præsertim si addideris enixam esse duorum mensium, & non ultra decimum: non primiparæ, sed quæ purgatissimum habeat lac idque plurimum odoratum, candidumque mediocriter, neque subliuidum, nec gypso simile, nec subacidum, aut amarum, sed dulce, æquabile, non admodum crassum, neque tenue, cuius superuitem uabonem rectè probatio fit, si neque prorsus stuit, neque umbone reclinato omnino constet. Item si in vasculo illius lactis pars aliqua reponatur, cui tantillo myrrhæ adiecto feri pariter atque casei pars equa detur. Probatissimum est, si in vngue hæreat, nec protinus defluat. Cæterum inter reliqua conditiones potissima est, si laudatorum morum nutrix extiterit, quæ neque ocysimè animi passionibus afficitur, neque penitus obtusi sensus, & stolidi sit.

B Atqui licet has omnes dotes in nutrice exquirendas esse dictum sit, nihilominus tamen longè vtilius infanti æstimatur matris lac, quamuis his dotib. careat, quam sit, quod ex nutrice fingitur, quantumuis laudabile existat. Verum in nutrice ob id ea omnia exquiruntur, quæ indicium sint mediocris seu temperatæ lactis substantiæ, quæ cuique infantium temperamento proficuum fore scimus: medium, n. omnibus temperaturis vtile existit, & amicum, quod illis erat necessarium, quibus maternum lac, qualecunque fuisset, denegatur. Si tamen matri puerum committere studueris, vsque quo ipsius temperatura pristina natura restituitur, eundem nutrix supra electa interdum bis, aut ter lactet, donec puerperæ primum lac, quod colostrum appellatur, instillet, & loco eius probatius generet: qui, n. hoc vtuntur infantes, colostrati fiunt. Quamobrem nuper natis, nutricis lac potius exhiberi conuenit, quod matris exitiosum sit eo tpe: quoniam genitum fuit ex sanguine à quo iam optima pars secreta erat ad infantis alitionem intra uterum: ob idque exugi debet, & abijci. Bonum autem est lac, quod prodit post purgationem puerperij perfectam, hoc est, in masculo à trigésimo die: in femina vero, à quadragesimo secundo, vt refert Hip. lib. 1. de mor. mul. aut saltem, vt amice id intelligamus, donec impetus purgationis desierit: deinceps quidem maternum lac fetus suggat, quippe quod alimoniam, qua, dum in utero infans erat, utebatur, perquam simile existat: muliebria namque in vbera delata, concoctione lactescunt. Quod si vel ex præstantia, & dignitate matris, vel quia lac integrum non sit, aut quia languida uel aliquo mammarum, capitis, oculorumve defectu parens affecta existat, tunc quidem eligenda nutrix est, qualem depinximus.

C Nutricis aut custodiam, & moderamen primò instituire oportet per id exercitium, quo partes supernæ magis exerceantur, vt lac copiosum, & probum gignat. Item viro non accedat, ne vsu ueneriorum menses profiliant. Lac quidem donec mulier conceperit, adseruari facile potest; ulterius aut minimè: ac si menses fluant, corrumpi necesse plerumque est. Ex quo vitio pueri citra dubitationem uel in epilepsiam, uel scabiem, aut alia mala maiori ex parte prolabuntur. Nam licet sint, qui existiment, purius & perfectius fieri lac fluëibus mensib. duo certe suadent contrarium omnino accidere: primum, turbatio, quam natura perpetitur singulis mensib. quia eo tpe quid deterius lacti, & nutrici accidere scimus quouis alio: scilicet, in quibus menses non fluunt, id profectò necessum non est, siquidem

Kk 4 id natura

id natura non tentat: ex quo constabit purum superesse lac, sicut in reliquis; & longè magis: quandoquidem nil est, quod naturam turbet, & irritet: ex quo constabit foetum immunem esse a menstruorum spurcitiâ. Quamobrem consilium est apud omnes ferè, probatissimos viros, lac statim post mensium exortum mutare: quanquam feminis partus suos alentibus minus inconueniens existat: nec deest, qui asserat non corrumpi lac feminis, si ex eodè viro rursus conceperint. Item nutrix admonenda est, vt probatis cibarijs vescatur, & primis diebus quaque vice ante lactationem puero mellis paucillum lingendum tribuat. Præterea, vt lactis quicquam mulgeat, quod mamillæ pressione, pueri suctionem iuuet, ne fortè vehementi suctugulæ instrumenta lædantur, & malarum articulationes laxentur: quod non rarò contigisse constat. Item instituenda est, ne singulis lactationibus vberem lactis copiam, sed parcam exhibeat. Insuper, dieb. primis, quibus lactare incipit, simplicem cibum accipiat, & aquam bibat (nā quæ ratione à pueris vinum arceri consulunt autores, eadem, & à nutrice) ne solidū lac nuper natis infantibus difficulter per angustos gutturis meatus descendat. Pari etiam ratione à falsis, acutis, & astringentibus absteineat, vt neq; porros, cepas, allia, aut cætera huius naturæ degustet. Sed cuique talis vitæ, & victus ratio instituenda est, qualis fuerit pueri natura, & cōditio, & parentum dignitas, aut præstantia permiserit. In qua sanè re cum non parua sit differentia, vna viuendi forma, quæ omnibus sit proficiua, signari non potest. Quod si ne his quidem sana degat nutrix, non erit ab re corpus purgare; & vitæ rationem iuxta lactis vitium, & infantis indigentiam immutare.

De lactis defectu. Cap. 16.



INTER alia vitia, quibus mulieres, quæ pepererunt, & nutrices sunt affici solent, potissimum profectò est lactis defectus, cuius hac in parte rationem, causas, & præsidium scribere est in animo. Hanc sanè primam, & maximam, vt Gal. visum est 7. de vsu par. c. 22. animantibus matrum præbent vtilitatem, q̃ in eis ea parte, qua sitæ sunt in mulieribus, copiosissimum benigni alimenti residuum colligi possit, ex quo lac fieri contingit. Quod cum utilis alimenti superfluum sit, cibus exactè confectus eo potissimum loco constituere mammas conueniebat, vbi facillimè simul, & citissime elaborari lactis copia perfectè cōsistere poterat idq; maximè vltimis gestationis tempore, vt Hip. testatur lib. 2. pop. p. 3. tex. 34. dicens, lac nutrimento mutationem accipere octi mēstri vero perficiente. Quo fit quod à principio gestationis in puerum insumatur materia illa, & postea in lac. Est sanè lac nil aliud, quàm quædam veluti superfluitas nutrimenti partis ipsum generantis, similis quidem ipsius naturæ existens. Quippe mammarum adenes quosdam sortiuntur, vim quidem habentes alterandi alimentum ad ipsos confluens, ac sibi ipsis assimilandi: & quia exangues sunt, & albi quando plus alimenti ad ipsos deferitur, lac proculdubio efficere habent, vt Gal. est sententia 3. aphor. 39. Sed Hip. modum generationis lactis, ac defectus eius clarius exponit lib. 1. de mor. mul. dicens; At verò lac quomodo fiat dictum est a me, in natura pueri in partu. Postquam aut prægnans fuerit mulier,

Alier, menses non valde prodeunt, præterquam quibusdam pauci. Dufcimus. n. humor ex cibis, ac potibus ad mammas vertitur, ac exugitur, & necesse est etiã reliquum corpus magis euacuati, & minus sanguine plenum fieri: atq; hoc ita contingit. Sunt autem quæ natura sine lacte sunt, & quibus lac deficit ante tps. Hæ verò natura solidæ sunt, & dense carnis, & propterea sufficiens humor non penetrat à ventre in mammas; cum ita sit densa. Quam causam ad enixas, non minus transferendam esse censeo. Cum. n. humoris, qui veluti superfluitas alimentum ipsarum mammillarum est, vel admodum exiguus existit, vel omnino deficit lactis defectum seu inopiam appellamus. Atq; cum ad fetus alimoniam vteri venas natura comparauerit, dum vtero geritur, ac dum in lucem prodit mamas; et hac ratione certum quendam respectum inter has duas partes tribuisset: sit facile, ut è toto corpore in vterum sanguis dilabatur, & post partum ex vtero, & reliquis partibus ad mammas relabatur, futurum infantis alimentum. Quod cum defecerit, vitium ipsarum mammillarum esse inficiabitur nemò, modo id per essentiam sit, modo per consensum vel a toto, vel ab vtero. Ex quibus cum affectum

B prodire censemus, quem ad genus retentorū immodicè iure optimo reduxeris: Causam verò inuestigabis, si prius modum generationis contempleris: quippe generatur, vel non transmissio sanguine à reliquo corpore in mammas, vel ab ipsis non attracto: quamobrem, & mammarum vim, & sanguinis copiam rimari prius oportet, & quantus qualisve in venis existat, ut Gal. optimè aduertit. §. simplic. 20. & 21. Si quidem vel quia vitiosus est non trahetur, vel, quod parcissimi malit eius copia, aut corpus sit imbecille, non transmittetur. Quibus non raro accedit infantis imbecillitas, qui ob id lac suggere nequit: nam ad ualidam suctionem certum est tractionem sequi. Rursus hic accedit corporis ariditas, cuius ratione auidè alimentum quantum particula ad sui alimoniam completitur ita ut nihil sit pro lactis generatione residuum. Extrinsecus insuper subitus aliquis casus adueniens, animæ perturbatio, dolorve frequentissimè illuc sanguinem, & humores alliciunt: quo fit, vel lac diminuat, ut vel auferatur omnino.

C Quod si totius corporis habitus, vel temperamentum siccum existat, gracile, & ex carne: uel si præcesserint sanguinis copiosiores uacuationes, exercitiū uehemens, fames, uigilia, meror, sollicitudo, aut febris arida æstuansq; , ac id genus aliqui; quod plusquam expediat corpus dissipet; rationi uidetur consonū sanguinis defectum potissimam esse diminuti, uel deficientis lactis causam: nam hæ omnes causæ non solum sanguinem minuunt, uerum, & lac ipsum conterunt, aut saltem uitiāt, cuius naturæ censemus esse, quæ frigide sunt temperiei. Verum sine hæc quidem adesse constet, sed graciles, rugosas, & contractas esse mammas; ob propriam earum imbecillitatem, aut aridam intemperiem prone nire lactis defectum credendum est: quod trahere tñ sanguinis nequeant, quantum sat est ad lactis confectionem. Quod si ex uitio sanguinis lac defecerit, id facile distinguēs signis, quæ ipsum esse biliosum, melancholicum, aut pituitosum ostendūt: quippe qui hmoi est sanguis, nequit in lac mutari, aut in uitosum commigrat. Qd sanè ex lactis colore, substantia, & sapore potissimum inuestigandum est. Biliosum etenim sanguinē cognosces ex lacte seroso, tenui, flauo, amaro, maxime si consideres nutricis habitū, & iecoris temperamentū. Pituitosum, si extiterit crassioris substantiæ, albi coloris, & saporis accidi: quib. maiore fidē præstāt nutricis

Causa.

Signa.
causa-
tum.

nutricis temperies, ætas, & habitus pituitosis. Quemadmodum si lac fuerit maioris spissitudinis, paucum, obscuriorisque, & fusci coloris: tunc amplius id confirmabis, si cætera, quæ diximus in nutrice, melancholiam attestentur.

*Curatio
ratio.*

Si lac deficere sanguinis inopia compertum sit, unica superest medendi ratio, quæ ipsum adaugere sit nata, velut est ea victus ratio, quæ plurimum sanguinis generare valeat. Quam equidem duplicis naturæ esse oportet, calidæ nimirum, & humidæ, neutra tamen excedat: nam talia esse, quæ lac generant, lib. 5. simpli c. 20. Gal. dixerat, siue medicamentum sit, siue alimentum. Secundo etiam optimæ substantiæ, & multi nutrimenti, si quidem eiusdem naturæ lac esse oportet. Quo fit ut totum corpus humectare opus sit, & bonis cibis alere, qui copiosum sanguinem gignant. Præstat itaq; primo optimum alimentum lac est sanis animalibus desumptum, velut, & caprilum aut ouillum, lac decoctum cum vitellis ouorum, & saccharo: item pulmentum ex oriza prius in aqua, deinde in lacte elixa, & amyllum cum lacte, & melle. Carnes in super gallinarum, caponum, phasianorum, pavonum, præsertim eorum, quos ex India asportantur: caro hæduli, agni, & porcellorum assa, verum hæc carnes cum pane, & salsamentis edantur, eruca & melle confectis. Præstant ex piscibus barbuli, troctæ, besucus, salmo, & id genus alij. Item cibus albus ex gallinarum pectoris, oriza saccharo, & lacte confectus. Cui quoq; vsui placentas formamus ex sesamo cum melle, quas novimus abundè lac præstare, si post cenam exhibeantur, ac interdum. Conferunt & amygdalæ dulces, vuae passæ, & amyllum cum lacte amygdalarum. Valent pistachia, nuclei pini, eruca, pastinaca assa sub cineribus. Potus optimus est ex nigro non austero, sed dulci, aut albo, & tenui. Sed quod mihi videtur huic vsui commodissimum est, lini semen cum melle confectum, & fœniculum, aut anisum cum ptisana decoctum, & butyrum cum saccharo. Ex quibus, & alijs similibus varia obsoniorum genera effingere facillimum erit.

*Si ex sanguinis
initio.*

Lactis quidem velut, & seminis effectrices facultates partim in medicamentis duntaxat, partim quidem in alimentis consistunt, cum succos pituitosos ex calfacientes in sanguinem vertimus. Sic enim crassi, & pituitosi sanguinis vitium contemperamus: nam cum longius à natura lactis pituita, quam sanguis dissideat, ob id paulò calidiora medicamenta, & alimenta porrigere est opus, ea ne pe quæ primo, aut secundo ordine calfaciant, desiccantia tamen non sint, ut Gale. aduerit loco nuper citato. Inter quæ sanè potiore locum, quæ non rantum sunt medicamenta, sed & nutrimenta, velut eruca, fœniculum, anethum, si virentia, & humida adhuc fuerint: sicca enim plus, quam par est, conterunt & exsiccant. Sic etiam conferunt smyrnium, apium, syon, polium; ac fœniculi radix ptisana incocta, cytisi folia ex vino nigro dulci, & anethum, sesamum crudum cum vino. Intestina quoque terræ si quinque aut sex, teras, & cum duobus gallinarum ovium decoctas, paucò fœniculo, aut anetho addito, ex quo ferculum parabis huic vsui maximè proficuum si cum vino dulci, eius 3. ij. exhibeas: fœniculum etiam parabis, ut placuerit, nam multum ad bonitatem, & multitudinem lactis comparandam prodesse scribitur. Prodest, & porrum tritum aqua dilutum potui datum: item fœniculi succus, & cytisi decoctum: his enim sanguis attenuabitur, & ocynus in lac commigrabit.

Quod si caloris, vel flauæ bilis abundantia lac vitiosum efficiatur: purgationem

A nem eius humoris protinus institues, facta prius preparatione, ac deinceps refrigerantem, & humectantem victum porriges.

Verum si ex mammarum gracilitate sanguis non trahatur, frictione, fomento calido, & humido cucurbita ad radices mammarum admoti, sanguinem euocabis & lac augebis. Item pugnandum est eadem ratione aduersus dominante in corpore intemperiem propriis contrarijs: siue sola existat intemperantia, siue cum humore adiuncta. Quod si haec omnia prodesse non uideantur, nutrice mutare, aliamq; seligere proba iore opus erit. Sed antea (quia graue est lac infantibus immutare) multa experiri ex ijs, quae lactis abundantiam praestare sciimus, oportet: quale est illud quod recipit pulueris seminis anisi 3.ij. ex iusculo caulium bibat, quando it dormitum: praestat & illud, quod recipit seminis anisi, feseleos ana 3. s. crystalli 3. j. cum saccharo, & uino albo fiat potio, quam duabus vicibus sumat. Confert aqua hordei cum semine fœniculi pota. Item pulueribus seminis viticis decorticati pisti 3. j. cum decocto anethi: etiam serpyllâ potum, cinis vnguis caprae potus: quatuor oua perdicis sorbilia epota, aut illita mammis cum adipe anseris. Hip. autem lib. i. de morb. mul. plura alia scribit dicens. Si lac fuerit extinctum, porrum tritum, & aqua dilutum bibendum dato. Lib. etiam de natu. mul. sic ait; Si lax extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, fœniculi uero semen bibendum dato, & radices fœniculi decorticatas, ac butyrum simul coquito; cum autem cocta fuerint, frigefacito, ac bibenda dato. Commodum est etiam hypomarratrum, & hyposelinum simul coctum. Refert in super eodem loco. Si lac extinctum fuerit, porrum tritum bibendum dato, & calida lauetur, & porrum ac brassicam edat, simul coctis cythi folijs, & succum sorbeat. Praeterea inquit eadem parte. Si lac extinctum fuerit, sal uiam cedri aut iuniperi bacis adiectis coquat, & adiecto uino bibat, & ad cetera farina inspersa addito bulbo, modicoq; affuso oleo edat, & acia, & acida, & falsa, atque cruda olera omnia uicer. Refert etiam lac mirum in modum augere semen lactucae tritum, & cum aqua vel iure ingestum. Folia item in aqua hordei cocta, aqua postea potui data, lac plurimum augent, si postmodum mammae blanda manu fricentur. Idem facit brassica decocta cum oleo comesta, sicut, & foris eiusdem decocti. Ferunt etiam succum menthae idem beneficium praestare: quod mihi suspectum uidetur, praeterquam in quibus lac concreuit; sed id praestantius efficit ocyum hortense. Ad quorum sanè pensum facile erit plura alia huic vsui proficua excogitare.

De lactis redundantia. Cap. 17.



Abundantiam quidem lactis dupliciter hac in parte considerari dam fore arbitror. Vno modo, cum femina lactare desinit, puero vel mortuo, uel grandiori facto, aut alteri nutrici commisso. Alio quidem, cum tanta ubertate abundat, tamq; parum puerulus conterit, ut vel sua sponte defluat, aut in graue aliquod mammarum vitium degeneret: utrisq; autem meminero initio sumpto ab ea abundantia, quam infans conterere nequit.

Causa.

Lac igitur cum plurimum in māmīs abūdat, affectum sanè efficit in adaucta quanti-

quantitate: etenim lactis immodica copia, si detineatur, velut quævis alia pleni-
tudo, causa morbi existit. Huic profecto causam seu materiam præstat boni san-
guinis multitudo, ea præsertim, quæ abundat in eis venis, quæ sunt intra mam-
mas, & uterum. Quod etiam evenit mulieribus utero gerentibus, interdum ob
conceptus imbecillitatem, interdum vero, cum neq; gravis est, neq; peperit;
sed, ut refert Hipp. 5. apho. 39. & 52. quia ei menstrua defecerunt. Verum si lac-
multum è mammis effuxerit, non amplius causa morbi, sed symptoma erit, sub
genere excretorum modicè contentum. At nobis non est in animo de his affe-
ctionibus quicquam agere: sed tantum, de ea lactis abundantiâ, quæ in mammis
existens, mammarum inflammationem minatur, concretionem vel coagulatio-
nem casei instar, seu commutationem in grumos, aut exulcerationem, & si vi-
tiarum quoq; lac sit, scabiem, pannos, & papillarû eruptiones. Quamobrem sta-
tim præcauendum est, ne in prædicta mala, vel in furorè, ut ex Hipp. constat, de-
generare contingat. Primò igitur curandum est victum instituere tenuissimum
ac potum ex aqua, & aquam parçissimum exerceri in super partes infernas oportet,
& vinculis ac frictionibus ad eas quod redundat, euocare: & in vniuersum
prohibenda sunt ea, quæ lac aut sanguinem multum procreare, & ipsum ad mā-
mas allicere possunt. Ob id quidem vbi mammae dolitant, ut Soranus optimè
aduertit, neq; a mulieribus lac exugri debet: quippe suctione plus materiæ tra-
hitur ad ipsas. Quod decretum Paulum confirmasse constat lib. 3. c. 35. Cû hoc
tamen, ut ex Aetij sententia colligi potest, vbi mammae non doluerint, vtilissimū
esse censeo si leniter exugantur: effertur namq; foras leui hac eductione quod
præter modum in mamillis cõtinetur potius, q̃ aliquid amplius trahatur. Qd̃
si ne id quidem sufficere videatur, nullum præstantius auxilium reperies, quā
circa initia, si quid non obstiterit, tali venam secare, copiosumq; sanguinem ex
ea fundere. Verum si ob mensium retentionem id malum fieri constet, eos euo-
care omni arte curandum est, quod Gal. aduertisse constat 5. simpl. c. 21. At si so-
la totius corporis abundantia lac exuberet, media, quæ in cubito est vena, aut
interna primò secanda erit (nisi menses, aut puerperium eo tpe fluxerint) mox
ea, quæ in talo est. Si verò nobis in animo fuerit lac ex toto non auferre, sed ex-
cessum, & copiam solum minuire, hæc mihi sufficere videntur, præsertim si lin-
teum ex crudo lino omphancino madidum apposueris.

De lacte
omnino
extinguē-
do.

Verum si lac omnino restinguere in animo fuerit, tunc quidem consideran-
dum est, an femina partui proxima fuerit, vel iam diu peperit. Quod si mox a
partu lac auferre velis, cauendum eo tempore est a repellentium vsu, sed omni
arte curandum menstruam purgationem adaugere, & lac digerentibus, ac exsic-
cantibus minuire ijs, quæ mox referam. Si autem longissimis intervallis a par-
tu distauerit mulier: tunc quidem præmissa vniuersali totius corporis prouidē-
tia, repellentibus primo vtendum est, velur est linteum posca madefactum, vel
spongia: & portulacæ folia cum aceto trita, aut apium tritum cum aceto, & ro-
faceo. Præstat, & emplastrum, quod recipit farinæ fabarum, & lentium ana. 3. j.
succu plantaginis 3. iij. olei rosacei 3. ij. aceti 3. j. Valet ad id quoq; petroselinum
cum posca tritum: vel illud, quod recipit succu plantaginis, succu methæ ana. 3. j. &
f. farinæ hordei 3. j. aceti 3. f. Item valēt palmulæ cū pane, & posca trita, ouū agi-
tatū cū rosaceo, uel decoctū lentium cū eodem rosaceo, aut lentes ipsæ cum de-
cocto

Curā di
ratio.

prauati lactis solum indicia scribam. Vitiosum igitur lac puerorum ora facile
erodit item mammas quoq; exulcerat, & nomas siue depascentia vlcera, ac ser-
pentia infert. Cuius naturam docet cognoscere Aetius dicens; Tenuia ac candi-
dissima linteorum frustra eo lacte imbuta in vmbra siccabimus, & in his quan-
tum a nativo calore lac discessit speculabimur. Id quidem facile erit cognosce-
re ex calore relicto in linteolis. At verò virosū ne sit, aut foetidū olfactu co-
gnosceamus, sicut falsedinem, amaritudinem, acorem, & insipiditatem gustu:
tenuitatē, crassitiē, ac lentorē ex vngue probabimus, & eo et mō, quo superius
dictū est. Verum licet Aetius has minimē esse purgādas referat nos tñ, aut infan-
tes alijs lactandos comittimus, aut eas purgamus, animaduersa humoris pec-
cantis idea, vt apertē Hip. lib. 6. pop. consuluisse constat: quippe sic, & nutrici,
& infanti prouidemus. Ob id primò victum instituimus contraria omnino na-
tura ei succo, quem redundare comperimus; & ea insuper copia, quæ optimē
conficiatur, confecta; puero, & nutrici sufficiat. Quo facto, ac pleniore semel
instituta purgatione, proficuum est per epicrasim, & interualla, aut ter quater-
ve in anno nutricem eo pharmaco purgare, quod vel humorem seligat peccan-
tem, vel leniendo vias communes expurget, tum, vt attemperentur reliqui hu-
mores: tum verò, vt si quid crudum, aut prauē confectum iuxta venas maiores,
& iecur adhaeserit, ante q̄ venarum succū conspurcet, excernatur euacueturq;
Tandē attēperamenti gratia alijs vtendum est medicamentis, & alimentis, q̄ ad-
uersus cuiusque humoris conditionē pugnent: frigidis quidē calida adhibente
& calidis frigida, ac sic de re reliquis iuxta cuiusque opposiūonis naturam.

De lactis concretionē.

Cap. 19.



ACTIS conrescentiam si quis rectē examinet, reperiet duobus
posse modis fieri: vno quidem, dum in grumos, ac trombos concre-
scit: altero verò, cum in casei speciem degenerat: quod idem esse (vt
multi censent) vitium, falsum proculdubio arbitror. Ambo tamen
(nisi ad immodicē retenta reducere volueris) ad morbum in ma-
gnitudine omnes referri autumant. Materia autem horum affectuum lac equi-
dem est: ceterum siue crassum, siue multum fuerit, indifferenter in casei naturā
vel in grumos conuerti poterit: id autem a longe diuersissimis causis. Quippe
grumos non potest, nisi à frigiditate fieri: neq; in casei naturam lac mutari, nisi
caliditatis, vi, & efficacia. Quamquam multis non placere hoc dogma scio:
quod existiment viuente fœmina non posse tantam subesse frigiditatem, vt lac
subinde concreseat. Nolle autem hac in re oportet, in casei speciem commutari
lac ex immodica mammarum caliditate exsiccata, ac per halitum digesta parte
eius tenui, & serosa. Quod facile probari potest ex Gal. lib. 5. simpl. indiget nan-
que vt coaguletur, quod sereum eius, ac tenue separetur, & quod crassum est, in
se se cohareat. Quæ sanē opera (vt ipse refert) absq; valido calore fieri nequeūt.
Id quod etiam ex Aetio, & Paulo colligi facile potest, & medicamenta et huic
affectioni proficua palam ostendunt. Verum quod lac in grumos conuerti ne-
queat, nisi à frigido, iam probare aggredior, si prius dixerō certum mihi esse,
lac non alio modo quam sanguinem in grumos posse degenerare: sed is nō nisi
extravasatus frigiditatem contrahens defectu, caloris valorum in grumos abit:
ergo

A ergo neque lac. Probatur etiam id siquidem argumenta vtrique; concretioni proficua non humida, sed calida, & tenuium partium ab omnibus commendatur, qualia sunt, quæ ijs, quæ frigore deficiunt, proficua esse comperimus. Præterea sanguis extra vasa, aut lac non opus est in grumos mutari à frigiditate positua, sed solum ex defectu prærequisiti caloris: quo fit, vt sola hac ratione in quouis ventre sanguis, aut lac existant, ocysimè concrecant, destituta proprio, & prærequisito calore, licet ventres, & partes, vbi præ sunt, actu calidissimæ existant. Sic quoque lac in mammis deficiente earum calore necesse est in grumos mutari: præsertim siue vasis mammarum in spongiosa spatia dilabatur, aut ob plenitudinem resudet. Quamobrem ni præsto auxilia sint, dubitandum nõ est, quin aut inflammationem, aut aliud malum affectio degeneret. Quam sanè cognoscas ex actu: quippe mamma eo tempore in trombosas durities, inæqualesq; & cum dolore non parum turgent, lacte nullo neque adhuc suctu ab eis instillant. Curandi quoq; ratione duplicem esse ipsa affectus natura, & differentia aperte docet euariari nanq; curationem, quæ caseationi debetur ab ea, quæ grumoso lacti proficua est, nulli erit dubium. Sic enim vbi in grumos conuersum lac fuerit, victus rationem extenuantem, & modice calidam instituere oportet: sed in curatione prodest pannos cum muso, aut hydraleo, vel cum perdicio herba viridi super mammas apponere. Super infusio etiam calentis olei dulcis plurimū conducit, aut fons aquæ calidæ, vel decoctum fœnugræci, althææ, apij, aut chamæmali, adhibito desuper emplastro ex farina seminis lini, fœnugræci cum hydromelite, vel oleo sesamino, de semine lini anethi, & axungia gallinæ.

Curandi ratio.

Item coagulum leporinum butyro, aut aliquo ex prædictis oleis liquatum illitum præstat: sicut potum cum vino lac in ventre coagulatum dissoluit. Betæ item folia, si tandiu oleo fuerint incocta qd intabuerint cum pane, & fabarū farina, paucoq; oleo sesamino, permixta, & imposita cōferūt. Mentha quoq; viridis idē bñficiū p̄tat: sed apiū hortense tritū, & māmīs duris appositū prodesse plurimū scimus: sicut succus eius mica panis exceptus, & māmīs appositus: ruta idē cum sulphure, & pauco aceto cocta, māmīs adhibita, excepto papilla. Grume scentiam quoq; dissoluit ammoniacū cum assa fetida, cera, & oleo ad formā emplastri. Præterea alia auxilia sic conficito: aquæ liliorum & menthæ singulorum ʒ. iij. aquæ chelidō. ʒ. j. aquæ rosæ. & nymph. sing. ʒ. iij. misce, & frequenter mammās laua, pannosq; his madidos appone, vel ceratum ex cera, & oleo violarū. Utendum quoq; est puluisculis, quæ recipiunt seminis fen. ʒ. j. anisi ʒ. j. apij, petro. & agnicasti an. ʒ. j. coralli rubei, cornu cerui vsti, an. ʒ. ij. sacchari duplum, quorū mane sumat eocleare vnū. Ex salua quoq; mētha, & virga pasto. fiat puluis, quo vtrūq; in iusculis. Quod si māmæ in tumore attollātur, & dolitent, vngendæ sunt linimento, quod recipit vngu. ros. & cerathi santhal. sing. ʒ. j. olei ros. & chamæ. sing. ʒ. ij. misce. Prodest, si vltra p̄gat affectio, cataplasma, qd recipit farinæ fa. & orobi sing. ʒ. iij. succi chelid. mai. & menthæ, an. ʒ. iij. olei lili. & mēthæ, an. ʒ. ij. fiat cataplasma. Præstat & aliud, quod recipit farina fab. & hordei sing. ʒ. j. styracis in oleo ros. dissolutæ. ʒ. j. coagulū vnū hēdi, misce, & fiat cataplasma. idem efficit vngu. album Gal. aceto dissolutum: & butyrum cum aceto. Prodest & aqua rosacea cum aceto mixta: argilla in puluere redacta, & cum aceto mixta, maximè si dolor pungēs adsit, idē efficit nidū hirūdinis cum aceto. Quibus positis

resolu-

resolutionis, & mitigationis gratia adhibere oportet cataplasma, quod recipit
 furfuris p. j. florum chamae. & meliloti an. p. j. & f. farina fab. 3. iij. pinguedinis
 gallinae 3. x. croci. 3. ij. olei rosa. & anethi an. 3. ij. olei violarum 3. j. misce, & fiat
 cataplasma. Quod si ad suppurationem tumorem deuenire constet, emplastro
 utendum est, quod conficitur ex maluis coctis, & butyro recenti, vel alio, quod
 recipit malvarum, violarum sing. m. j. florum chamae. & meliloti sing. p. f. fiat
 decoctio: cui adde micę panis lib. j. butyri 3. j. & vitellos oui ij. olei rosacei. 3. ij.
 olei chamae. 3. j. misce. Appones etiam micam panis albi ea decoctione imbuta
 vitellis ouorum, & croco admixtam. Curandum tamen est ante omnia sangui-
 nem mittere, & reliqua veluti inflammationibus efficere. B

At dum lac calcis formam acquirit, tunc quidem posca pane, vel spongia im-
 posita summo opere prodest. Item succus solani cum aceto, aut succus portulacę:
 vel farina hordei cum aceto mulso, Furfures etiam cum aceto cocti, aut metha
 aceto admixta: folia alica. cabi cum brassicę folijs contrusa, pauca myrrha, croco
 & aceto adiectis, idem beneficium præstant. Item decoctum scenugraci cū oleo
 violaceo, rosaceo, & paulo aceto. Præterea succus herba, quam appellant, mor-
 fus gallinae cum rosaceo in linteis exceptus. Verum si ob lactis copiam concre-
 scere, caseariq; contingat: scilicet emulgendum à catulo est, aut ab aliquo mini-
 stro, qui id probè efficere sciat: postea super manus lentium decoctum cum
 oxirhodino adhibere conuenit. B

Ad mammarum rugas ea omnia ex usu esse scimus, quæ ad ventris rugas sur-
 perius scripsimus: sed specialius confert ceratum, quod conficitur ex cera, &
 putaminibus ouorum perdicis.

De morbo pilari nil dicere studui: nam sicut inflammationis principium cu-
 rari proculdubio debet.

VENETIIS, Apud Ioannem Guerilium.

M D X C V I I

~~Handwritten text, heavily scribbled out with dark ink.~~

005666010

